

Verlag des Verlegers
Verlag des Verlegers
Verlag des Verlegers

Verlag des Verlegers

Verlag des Verlegers

Verlag des Verlegers

Verlag des Verlegers

Verlag des Verlegers

Verlag des Verlegers

Verlag des Verlegers

Verlag des Verlegers

Verlag des Verlegers

Verlag des Verlegers

Verlag des Verlegers

Verlag des Verlegers

Verlag des Verlegers

Verlag des Verlegers

Verlag des Verlegers

Verlag des Verlegers

Verlag des Verlegers

Verlag des Verlegers

Verlag des Verlegers

Verlag des Verlegers

Verlag des Verlegers

Verlag des Verlegers

Vermehrtes und verbessertes
Blackwellisches Kräuter-Buch

das ist

Elisabeth Blackwell

Sammlung

der

Heuräthe

die zum Arzney-Gebrauch in den Apotheken aufbehalten werden

deren Beschreibung und Kräfte

aus dem Englischen übersezt angezeigt

die Abbildungen grossen Theils nach der Natur verbessert

mit Beyfügung

der Theile der Blume und Frucht

vermehret

wie auch mit bewährten Rahmen der Kräuter-Lehrer erläutert werden

Erstes Bunder

Mit einer Vorrede

Tit. Pl.

Herrn D. Christoph Jacob Trems

Verlegt gemahlet und in Kupfer gestochen

von

Nicolaus Friederich Eisenberger

Hochfürstl. Sachsen-Hildburghausischen Hof-Mahler in Nürnberg

Nürnberg gedruckt bey Joh. Joseph Fleischmann An. 1752.

NB 135

HERBARIUM BLACKWELLIANUM

EMENDATVM ET AVCTVM

ID EST

ELISABETHAE BLACKWELL
COLLECTIO
STIRPIVM

QVAE

IN PHARMACOPOLIIS AD MEDICVM VSVM ASSERVANTVR

QVARVM

DESCRIPTIO ET VIRES

EX ANGLICO IDIOMATE IN LATINVM CONVERSAE SISTVNTVR

FIGVRAE MAXIMAM PARTEM AD NATVRALE EXEMPLAR EMENDANTVR

FLORIS FRVCTVSQVE PARTIVM REPRÆSENTATIONE AVGENTVR

ET

PROBATIS BOTANICORVM NOMINIBVS

ILLVSTRANTVR

CENTVRIA I

CVM PRAEFATIONE

Tit. Pl.


D. D. CHRISTOPHORI IACOBI TREW

EXCVDIT FIGVRAS PINXIT ATQVE IN AES INCIDIT

NICOLAUS FRIDERICVS EISENBERGERVS

SERENISS. DVCIS SAXO-HILDBVRG. PICTOR AVLICVS

NORIMBERGAE DEGENS



NORIMBERGAE

TYPIS IO. IOSEPHI FLEISCHMANNI A. MDCCL.

V. 1770.

HERBARIUM BLACKWELLIANUM

RENDITUM ET AUGMENTUM

1841

ELIZABETHAE BLACKWELL

COLLECTIO

STIRPVM

CVL

IN PHARMACOPOLIS AD MUSEUM VIVUM ASSERVANTUR

CVL

DESCRIPITIO ET VIRE

EX ANGLICO IDIOMATE IN LATINUM CONVERSA EST

FIGURAE MAXIMAM PARTEM AB AUTORE ELIZABETHAE BLACKWELL

PERIT EXACTISSIME IN PHARMACOPOLIS AD MUSEUM VIVUM ASSERVANTUR

ET

PROBATAE BOTANICORVM NOMINIBVS

REVISE

CENTVRIA I

CVM TRACTATIONE

THE PL.

D. D. CHRISTOPHORI IACOBI TREW

INSTITUTIO HORTUS PULCHRI AD MUSEUM VIVUM

NICOLAUS FRIEDRICHUS KUNZ

SECTIO IV. DE HORTIS PULCHRI AD MUSEUM VIVUM

NOMINIBVS BOTANICIS

REVISE

NOMINIBVS

PERIT EXACTISSIME IN PHARMACOPOLIS AD MUSEUM VIVUM ASSERVANTUR



P R A E F A T I O.

Ab omni aevo magnam existimationem consequuta sunt vegetabilia tum ob delectationem, quam praebeant eorum amoenus gratusque habitus, color, sapor ac odor, tum ob amplissimum usum, quem eadem, in praesidium secundae aduersaeque valetudinis, ex alimentorum et medicamentorum aliarumque rerum necessarium copia suppeditant: magna etiam industria semper excultum fuit studium, quo deteguntur eorundem qualitates, iis, quae sensibus externis iam patent, satis docentibus, quamlibet stirpem propriis viribus esse instructam. Probatione ergo haud opus est, disquisitionem et cognitionem stirpium vniuersarum omnibus esse iucundam, earum vero, quae ad conseruandam et restituendam sanitatem vtiliter repertae sunt, singulis, quibus haec cura demandata est, vtilem et necessariam.

Si sensus nostri ea pollerent facultate, quae omnes has qualitates statim clare discernere et cum corporis humani oeconomia comparare possent: possent etiam absque difficultate atque errore semper eligere ea, quae secundum naturalem et peacternaturalem singulorum corporum dispositionem, vtilissima forent. His autem viribus deficientibus, multum quidem de his qualitatibus earumque efficacia aequae ac fructuosa applicatione detexit casus fortuitus, plus indefessa inquisitio, meditatio et exploratio; plurimum autem adhuc latet et semper occultum manebit, minimum ratione cognitionis perfectae omnibusque perspectae. Multa etiam ex his iam nota quidem fuerunt veteribus medicis; sed per pauci ex illis horum quaedam scriptis consignarunt, quorum praeterea usus haud erat communis ante artis typographicae inuentionem; quae vero per relationes tantum tradebantur, tam longo temporis interuallo maximam partem corrumpebantur.

Quam vilis atque errorum plena propterea stirpium cognitio seculo XV adhuc fuerit, satis testan-

Sind die Erdgewächse von allen Zeiten her in grossen Werth gewesen, weil sie nicht nur alleine durch ihre annehmliche Gestalt, Farbe, Geruch und Geschmack vieles Vergnügen, sondern auch in gesunden und kranken Tagen durch die Nahrungs- und Arznei-Mittel, ja auch auf viele andere Weise in mancherley Bedürfnissen einen unbeschreiblichen Nutzen verschaffet haben: man hat auch allezeit sich angelegen seyn lassen, ihre Eigenschaften zu entdecken, weil die schon in die äusserliche Sinnen fallende genugsam zu erkennen geben, daß eine jede Art der Gewächse einen besondern Nutzen oder Kraft habe. Es ist derothalben kein Beweis nöthig, daß die Betrachtung und Erkenntnis der Gewächse und ihrer Eigenschaften überhaupts jedermann ergötzlich, derjenigen aber, die insonderheit zu Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit dienlich befunden worden, allen, welchen dafür zu sorgen anbefohlen ist, nützlich und nöthig seye.

Wann unsere Sinnen das Vermögen hätten, alle diese Eigenschaften sogleich deutlich zu unterscheiden und mit der jedesmaligen Verfassung des menschlichen Körpers zu vergleichen; würde man auch ohne Mühe und Irrthum allezeit erwählen können, welche von denselben nach der besondern, sowol natürlichen als widernatürlichen, Verfassung eines jeden Körpers, am nützlichsten wären. Weil uns aber dieses Vermögen fehlet: so ist zwar vieles von diesen Eigenschaften und derselben Kräften sowol, als ihrer Anwendung, nur zufälliger Weise und noch mehr durch ein mühsames Nachsuchen, Nachdenken und Prüfen entdeckt worden, das meiste aber annoch verborgen blieben; wird auch wol, wenigstens in Ansehung einer vollkommenen und allgemeinen Erkenntnis, unbekand bleiben. Den alten Aerzten war zwar auch schon vieles davon bekand: es haben aber sehr wenige von ihnen etwas schriftlich verfaßt, und dieses konnte nicht einmal jedermann zu seinem Nutzen anwenden ehe die Buchdrucker-Kunst ihren Anfang nahm; was aber nur mündlich fortgepflanzt wurde, ist durch eine so lange Zeit meistens verderbet worden.

Wie schlecht und irrig demnach die Erkenntnis der Gewächse noch in dem XVten Jahrhundert

testantur libri huius generis typis primum exscripti; et quam auide nihilominus eiusmodi informationem omnes ferme gentes cultiores exceperint, facile probat liber iste, qui inter primos *Herbarii Hortique Sanitatis* titulo in publicum prodiit et paucis annis variis in regionibus saepiusque, quam postea utilissimorum vllus, recusus fuit. Quum deinde mox veterum, tum graecorum et latinorum, tum etiam arabum, scripta in communem vsum ederentur: plurimarum stirpium descriptio deprehendebatur tam brevis et imperfecta, vt difficillime cognoscerentur illae, quibus vires laudatas tribuerunt, adeo, vt viri doctissimi et solertissimi, qui a seculo XVI. ad nostra vsque tempora omnes intenderunt neruos, vt singulas a veteribus commendatas stirpes detegerent et inuenirent, multas nihilominus nondum ab omni dubio liberare potuerint. Postquam autem hi ipsi de publica utilitate meritissimi viri stirpes, quae ipsis occurrebant, accuratius descripserunt, potissimum vero additis earum iconibus (vtut magna ex parte, praecipue a primis inuestigatoribus, rudi minerua et valde imperfecte repraesentatis) notiores reddiderunt: ea nunc gaudemus felicitate, vt certi simus, cuiusnam vegetabilium speciei, ex aliquot millibus detectis, haec vel illa virtus denuo asserta fuerit.

Quonam vero operosissimis his primorum botanographorum conatibus aliter fieri haud potuit, quin et ipsae stirpes et earundem qualitates vsusque paulatim tantum innotescerent; aliquot praeterea annorum decursu plures praestantissimi atque industrii viri hunc laborem in se suscepserunt suaque inuenta peculiaribus scriptis in publicum ediderunt: cuncta apud multos non nisi dispersa reperiri poterant, ideoque necessitas exigebat, vt pro commodiori vfu singula in vnum opus colligerentur, praecipue quum non omnes ea ingenii vi gaudeant, tot varias expositiones inter se componendi.

Propterea medio iam seculo XVI. IACOBUS DALECHAMPIVS eiusmodi collectionem quidem suscepit, sed IOANNI MOLINEO perficiendam tradidit, qui vero post obitum eandem pariter imperfectam reliquit, talem nimirum, qualis a. 1587. in duobus voluminibus magnis, noto titulo *Historiae generalis plantarum Lugdunensis*, Lugduni typis excusa est; id quod opus modo nominatus MOLINEVS seu MOULIN in gallicam quoque linguam traduxit, qua, secundum SEGVIERII indicem, duobus pariter voluminibus comprehensum ibidem a. 1615. prelum reliquit et a. 1653. auctum et emendatum (testante titulo huius editionis, quam ego possideo) recusum est. Paul-

bert gewesen, bezeugen gnugsam die ersten Bücher, die von dieser Art durch den Druck im Vorschein kamen; und wie begierig gleichwol fast alle wohlgesittete Völker einen solchen Unterricht aufgenommen, kan man leichtlich daraus erkennen, daß dasienige Buch, welches eines von den ersten und *Herbarius* auch *Hortus sanitatis* genannt ist, in wenig Jahren, in unterschiedlichen Ländern und öfters, als wol nachmals keines der besten Bücher, aufgelegt wurde. Als auch bald hernach die Schriften der alten sowol griechischen und lateinischen als auch arabischen Aerzte durch den Druck bekand gemacht wurden: befande man die Beschreibung der meisten Gewächse so kurz und unvollkommen, daß schwer zu erkennen war, welche dieienige seyn sollten, denen sie den beschriebenen Nutzen zugeeignet haben, so gar, daß auch die gelehrtesten und fleißigsten Männer, die von dem XVIten Jahrhundert an bis auf unsere Zeiten die von den Alten gerühmte Gewächse aufzusuchen und ausfindig zu machen sich alle mögliche Mühe gegeben haben, gleichwol noch viele von allem Zweifel nicht haben befreien können. Nachdem aber eben diese hochverdiente Männer dieienige Gewächse, die ihnen zu Handen kommen sind, deutlicher beschrieben, vornehmlich aber durch die beigefügte Abbildungen (so unvollkommen auch viele derselben, sonderlich im Anfang, gewesen sind) desto kenntlicher gemacht haben: so genießen wir nun die Glückseligkeit, daß wir ohne allen Zweifel wissen können, welcher Art der Gewächse unter viel tausenden, die von ihnen entdeckt worden, diese oder jene Kraft nachmals von neuen zugeeignet worden ist.

Weil nun aber bey denen so mühsamen Unternehmungen dieser ersten Kräuter-Beschreiber es nicht anderst geschehen kunte, als daß so wol die Gewächse selbst, als auch ihre Eigenschaften und Nutzbarkeiten, nur nach und nach bekand wurden; über dieses in einigen Jahren viele gelehrte und fleißige Männer diese Bemühung auf sich nahmen und ihre Entdeckungen in besondern Werken bekand machten: so war alles bey vielen nur zerstreuet zu finden, mithin zum bequemen Gebrauch aus allen eine Sammlung in ein einziges Werk nöthig; zumalen nicht ein ieder die Fähigkeit hat, so vielerley Erklärungen mit einander zu vergleichen.

Es hat demnach schon in der andern Helfte des XVIten Jahrhunderts IAC. DALECHAMPIVS eine dergleichen Sammlung zu machen, zwar angefangen, solche aber zu vollenden IO. MOLINEO übergeben, der es iedoch auch unvollkommen nach seinem Tode hinterlies, so, wie es a. 1587. in zwey großen Folianten unter dem bekanden Titel *Historiae generalis plantarum Lugdunensis* zu Lyon im Druck erschienen ist; welches Werk gedachter MOLINEVS oder MOULIN auch in die Französische Sprache übersezte, in welcher es, nach SEGVIERII Anzeige, a. 1615. eben daselbst in 2. Bänden gedruckt und a. 1653. (wie der Titel der Ausgabe, die ich besitze, anzeigt) verbessert und vermehret wieder aufgelegt

Io post similem laborem adgressi sunt IOANNES BAVHINVS et IOANNES HENRICVS CHERLERVS, et quidem studio atque ingenio longe superiori, BAVHINO tamen potissimum adscribendo, qui vero e vita excessit, antequam praestantissimum hoc opus publicam lucem videret, quod demum contigit a. 1650. et 1651. DOMINICI CHABRAEI cura, qua Ebroduni tribus voluminibus *Historiae plantarum vniuersalis, nouae et absolutissimae* titulo comparuit. Eundem scopum praefixum habuit ROBERTI MORISONI *Plantarum historia vniuersalis Oxoniensis*, cuius tomus secundus (primus, arboribus et frutricibus dicatus, cum auctore periit) in folio Oxonii a. 1680 excusus, tertius vero a IACOBO BOBARTIO ibidem a. 1699. editus est, quod opus multa comprehendit, quae BAVHINI temporibus nondum cognita erant. Idem opus ibidem a. 1715 recusum prostat, cui editioni, in supplementum primi tomi deficientis, praefixa est eiusdem MORISONI *Plantarum umbelliferarum distributio*, quae a. 1672. sigillatim excusa, tertio vero iam tomo, figuris tamen minoribus, inserta est. Omnia, quae opera hactenus recensita continent, et adhuc plura postero tempore de stirpibus earumque qualitatibus et viribus detecta, mira industria et peculiari dexteritate in compendium redegit IOANNES RAIVS in sua *Historia plantarum generali*, cuius primus atque secundus tomus in folio a. 1686 (testante LINNAEI atque SEGVIERII *bibliotheca botanica*) Londini editus et a. 1688 (quae editio in mea bibliotheca prostat) itemque a. 1693 (monente HALLERO *Stirp. Helvet. Enumerat. no. CXLVII.*) recusum est, tertius autem tomus, tanquam supplementum, a. 1704 (LINNAEVS indicat a. 1702) accessit, omnes autem simul ibidem 1716. prodierunt.

Singula haec opera magni quidem facienda et vsus adeo amplissimi sunt, vt nemo, qui omnium in hac disciplina ad illa vsque tempora detectorum notitiam sibi comparare auet, iisdem carere queat; quoniam vero intellectus humani cancelli sunt nimis angusti pro capiendis et ad vsum applicandis omnibus, quae iam detecta sunt (praesertim quum primi stirpium indagatores sibi proposuerint, singularum ferme obuiam sibi factarum plantarum vires et vtilitates proprias indicare) quaeque continuis laboribus adhuc deteguntur: necessitas docuit, eas stirpes, quarum vires et vsus contra morbos praestantiores deprehendebantur, feligere easque ab eo iam tempore, a quo officinae pharmaceuticae dictae conditae sunt, in his asseruare, quare eadem plantarum officinalium nomen obtinuerunt.

Circa has ipsas ergo, missis reliquis, indicandas et cognitatas reddendas plantas alii de bono publico solliciti viri ad nostra vsque tempora occupati fuerunt variaque hunc in finem elaborarunt

leget wurde. Eben dergleichen Arbeit unternahme bald darauf IO. BAVHINVS und IO. HENR. CHERLERVS, und zwar mit bessern Fleis und Geschicklichkeit, woran jedoch BAVHINVS den größten Antheil hatte; der aber ehender mit Tod abgieng, als dieses herrliche Werk zum Druk kunte befördert werden, welches erst a. 1650. und 1651. durch DOMINICVM CHABRAEVM geschah, da es unter dem Titel *Historiae plantarum vniuersalis, nouae et absolutissimae* zu Ouerdon in 3 Folianten gedruckt wurde. Hierauf kam a. 1680. zu Oxfurth in Engelland der zweyte Theil *plantarum historiae vniuersalis Oxoniensis* ROB. MORISONI (der erste Theil von den Bäumen und Sträuchen ist mit dem Verfasser verlohren gangen) in folio in gleicher Absicht zum Vorschein, und a. 1699. gab IAC. BOBARTIVS den dritten Theil heraus, in welchen beyden Theilen vieles zu finden ist, das zu BAVHINI Zeiten noch nicht bekand war. Beyde Theile sind a. 1715. eben daselbst wieder aufgelegt und, zu Ersezung des ersten, MORISONII *Plantarum umbelliferarum distributio* (welche schon a. 1672. besonders gedruckt war) vorgefetzt worden, aber auch dem 3ten Theil, wiewol mit kleinern Figuren, eingerüket ist. Alles dieses, und was fernerhin von den Gewächsen, ihren Eigenschaften und Nutzen entdeckt worden, das hat endlich IO. RAIVS in seiner *Historia plantarum generali* mit erstaunlichem Fleis und besonderer Geschicklichkeit in die Kürze gebracht, davon der erste und zweyte Band a. 1686. (wie LINNAEVS und SEGVIER anzeigen) zu London in folio gedruckt, auch a. 1688. (welche Ausgabe ich besitze) und a. 1693. (wie Herr von HALLER meldet) daselbst nachgedruckt, der dritte Theil aber, als ein Supplementum, a. 1704. (Herr LINNAEVS hat 1702.) beygefüget ist, und a. 1716. zusammen daselbst wieder aufgelegt worden sind.

Alle diese Werke aber sind zwar hoch zu schätzen, und denen unentbehrlich, die eine Erkenntnis von allem, was bis auf die gedachte Zeiten in dieser Wissenschaft bekand war, zu haben verlangen; weil aber die Schranken des menschlichen Verstandes zu enge sind, daß sie alles, was entdeckt worden ist (zumalen die ersten Kräuter-Beschreiber sich dahin bestrebet haben, fast eines jeden Gewächses, das ihnen vorkommen, besondere Kräften und Nutzen anzuzeigen) und immerzu von neuen entdeckt wird, fassen und zum Gebrauch anwenden könnten; so hat die Nothwendigkeit gelehret, diejenige Gewächse, deren Nutzen und Gebrauch wider die Krankheiten vor andern kräftig befunden worden, auszuwählen und solche schon von der Zeit an, da besondere Officinen oder so genannte Apotheken aufgerichtet worden, in denselben aufzubehalten, weswegen dann dieselbe ins besondere Officinal-Kräuter genennet werden.

Diese nun, mit Uebergehung der übrigen, anzuzeigen, haben bis auf unsere Zeiten andere um das gemeine Beste besorgte Männer sich gefunden, solche in besondern Werken abzuhandeln

rarunt opera, sed non vna eademque ratione: pauci namque stirpes tantum descripserunt, vel etiam figuris repraesentarunt; alii easdem, tanquam iam cognitae, solo nomine suo indicarunt earundemque vires et vtilitates tantum exposuerunt; alii ea sic dicta simplicia, quae ex reliquis naturae regnis pariter vtilia deprehensa sunt, simul pertractarunt, et quidem vel ordine alphabetico mixta, vel secundum haec regna per sectiones peculiare distributa; alii adhuc e contrario secundum diuersas vires classes condiderunt, hisque vegetabilia aliaque remedia viribus iisdem gaudentia iunctim proposuerunt, sed iterum solo nomine noto et recepto indicarunt. Facile ergo ex his patet, plurima horum operum cognitionem, vt aliorum remediorum, ita etiam e vegetabili regno defunctorum, de quibus agunt, supponere; et quicumque reliqua opera, quae descriptionem aut imaginem eorum addiderunt, examini subiicit, deprehendet, ea quoque dubiam saepius relinquere cognitionem illorum, quae ipsi ignota sunt: descriptio namque, etiam perfectissima, magnam requirit attentionem ad omne dubium tollendum, et imagines vel vitiosae, vel saltem eo vsque imminutae sunt, vt illarum ope omnis error aequè minus praecaveatur, praestantiores vero in aliis variisque operibus maioribus conquirere, non omnibus licet, vt taceam, plures stirpes peregrinas, quarum vna vel altera pars aut productum quoddam a pharmacopoeis colligitur et asseruatur, in amplissimis etiam operibus vel plane omittas vel imperfecte adhuc explicatas aut depictas esse.

Quam facile autem quilibet persuasum habet, ab omnibus, qui stirpes officinales aut earum partes vel colligunt vel ad vsum medicum adhibent, necessario requiri, vt certa perfectaque earundem cognitione instructi sint: tam facile etiam demonstrari potest, errorem in his saepissime committi posse, quoniam multi stirpes sibi valde similes sunt, quae tamen qualitatum et virium ratione maxime inter se differunt. Haecce quidem similitudo occurrit etiam in ipsis quibusdam generibus, praecipue quando planta perfectionem suam nondum attigit, nec indagator satis edoctus est, vt illam tunc ex propriis eius qualitibus semper dignoscibilibus, v. g. sapore, odore &c. distinguere valeat; multo maiorem tamen similitudinem offerunt variae species vnus eiusdemque generis. Haud equidem me fugit sententia nonnullorum, affirmantium, omnes vnus generis species vna eademque etiam virtute instructas esse; sed error huius opinionis facile demonstrari potest, dum plurimae saporem et odorem insigniter differentem statim produnt iisque satis manifestant, effectum si non plane alium, certe tamen maiorem minoremue eius gradum, hinc expectandum esse: quae specierum quoad vires differentia magis adhuc obseruari potest iis in generibus, quibus, secundum recentiorum

und bekand zu machen, aber nicht auf einerley Weise: dann einige wenige haben die Kräuter alleine beschrieben, oder auch abgebildet; andere haben solche nur den Nahmen nach, als schon bekand, angezeigt und von ihrem Nutzen und Gebrauch alleine geschrieben; andere haben die aus den übrigen Reichen der Natur nützlich befundene Dinge zugleich abgehandelt, und zwar entweder unter einander in alphabetischer Ordnung vermengt, oder nach diesen Reichen in besondern Abtheilungen unterschieden; noch andere hingegen haben die Ordnung nach den Kräften eingerichtet und nach derselben bey ieder Abtheilung die Kräuter und andere Dinge, die dem Nutzen nach übereinkommen, zugleich abgehandelt, aber ebenfalls nur dem bekanden Nahmen nach angezeigt. Hieraus ist aber leicht zu erkennen, daß die meisten von diesen Werken eine Erkenntnis, so wie der andern Arzneymittel, also auch der Kräuter, von denen sie handeln, voraussetzen; und wer die übrigen Werke, die eine Beschreibung oder Abbildung derselben beygesetzt haben, untersucht, wird auch leicht finden, daß ihm zur Erkenntnis derjenigen, die ihm unbekand sind, noch vieler Zweifel übrig bleibe: weil die Beschreibung eine grosse Aufmerksamkeit erfordert, wann man nicht irren will, und die Abbildungen wo nicht fehlerhaft, doch so verkleinert sind, daß damit dem Irrthum eben so wenig abgeholfen wird, bessere und deutlichere Abbildungen aber in andern und vielerley größern Werken aufzusuchen, nicht iedermanns Thun ist, ohne zu gedenken, daß die meiste ausländische Gewächse, da von wenigstens einige Theile in den Apotheken gesamlet werden, selbst in den größten Werken noch gar nicht oder doch sehr unvollkommen erkläret zu finden sind.

So leicht nun aber zu beurtheilen ist, wie nothwendig es seye, daß nicht nur alleine diejenigen, die diese Gewächse oder einige Theile derselben sammeln, sondern auch diese, die solche zum Gebrauch anwenden, eben dieselben vollkommen kennen müssen: eben so leicht ist auch zu erweisen, daß oft ein Irrthum kan begangen werden, weil viele Gewächse eine grosse Aehnlichkeit mit einander haben, die in Ansehung ihrer Eigenschaften gar sehr von einander unterschieden sind. Diese Aehnlichkeit findet sich zwar auch so gar zwischen einigen Geschlechtern, zumal wann das Gewächs nicht seine Vollkommenheit erlangt hat, und der Untersucher nicht genugsam unterrichtet ist, solches aus seinen allezeit wahrzunehmenden besondern Eigenschaften des Geruchs, Geschmacks &c. zu unterscheiden; noch mehr aber haben solche Aehnlichkeit die unterschiedliche Arten eines Geschlechtes mit einander gemein. Es ist mir zwar wol bekand, daß einige dafür halten, es hätten alle Arten einerley Geschlechtes auch einerley Wirkungen; es kan aber der Ungrund dieser Meinung gar leicht erwiesen werden, indeme bey denen meisten sogleich im Geruch und Geschmack ein merklicher Unterschied sich äußert und also genugsam, wo nicht eine ganz andere Wirkung, doch einen größern oder geringern Grad derselben

botanicorum doctrinam, omnes plantae ut species adnumerantur, quae floris et fructus conformatione inter se conveniunt, licet reliquarum partium habitu longissime a se invicem recedant, e. g. *Lapathum* et *Acetosa*; *Salvia* et *Horminum*; *Leucanthemum* et *Matricaria*; *Absinthium*, *Artemisia*, *Abrotanum* et *Draco herba* seu *Dracunculus hortensis* &c. circa quae et alia eiusmodi genera nemo sane probare poterit, idem esse, num haec an alia species in usum medicum certum et experientia determinatum adhibeatur: imo rationi convenientissimum erit, eandem cuiusvis generis speciem, quam medicorum observationes annotatae indicant, semper esse eligendam, licet aliae toto habitu suo cum illa penitus conveniant, nisi accurato examine iam probatum sit, unius et alterius partes constitutivas non solum easdem, verum etiam uno eodemque gradu coniunctas esse. Nemo ergo in dubium quidem vocabit, e. g. *Chamaemelum inodorum* et *romanum*, *Absinthium vulgare* et *insipidum*, *Abrotanum hortense* et *campestre* &c. easdem vires exserere haud posse, quia odor et sapor contrarium statim probat: sed aequae facile demonstrari poterit, non solum *Helleborum Hippocratis Tabernaemontani* (cuius radices in officinis pharmaceuticis superioris et inferioris Saxoniae *Hellebori nigri* nomine adhuc reperiuntur) a reliquis *Hellebori nigri* speciebus viribus suis propterea differre, quia ad aliud plane plantarum genus, imo ad aliam classem, referendus est; verum etiam alias *Hellebori nigri* species, licet ad unum idemque genus pertineant et eundem ferme habitum prae se ferant, nempe *Helleborum foetidum*, *Helleborum flore viridi* et *Helleborum flore roseo*, quid? quod varietates harum specierum, viribus suis haud prorsus inter se convenire, unam potius debilius et mitius, alteram fortius et atrocius illas exserere. Impossibile ergo est, medicum observationibus circa usum cuiusdam plantae gaudere posse iisdem, quas alius quidam de illa annotavit, nisi certus sit, se aequae ac hunc eandem ipsam plantam in usum vocasse.

Vt ergo neque hi, qui plantas officinales colligunt, neque illi, qui easdem ad usum applicant, facile in errorem incurrant, sed certam earum cognitionem absque laboriosa meditatione et inquisitione obtineant, tutissimo certe et facillimo modo succurrit collectio quaedam, qua plantae officinales a reliquis usu medico haud celebratis separatae accurata naturaeque simillima praecipuarum earum partium repraesentatione, et quidem secundum magnitudinem et colorem naturalem, ante oculos ponuntur. Talis collectio, quae ubique locorum usum praestet ita concinnata, ut nec vlla plantarum officinalium deficiat,

ben offenbahret, welcher Unterscheid der Arten in ihren Kräften noch mehr wahrzunehmen bey den Geschlechtern, welchen nach der heutigen Lehr-Art der Botanisten alle Gewächse als Arten zugezehlet werden, die in der Bildung der Blüte und der Frucht mit einander übereinkommen, ob sie gleich in der übrigen Gestalt ganz unterschieden sind: z. E. *Lapathum* und *Acetosa*, *Salvia* und *Horminum*, *Leucanthemum* und *Matricaria*, *Absinthium*, *Artemisia*, *Abrotanum* und *Draco herba* seu *Dracunculus hortensis* &c. bey welchen und andern dergleichen Geschlechtern niemand wird behaupten können, daß es einerley seye, ob diese oder jene Art derselben zu einem gewissen und durch die Erfahrung bestimmten Arzney-Gebrauch angewendet werde, ja es wird auch der Vernunft am ähnlichsten seyn, daß man bey derjenigen Art eines Geschlechtes, welche die Anmerkungen der Medicorum angezeigt haben, allezeit bleiben müsse, ob gleich andere in der ganzen Gestalt völlig mit derselben übereinkommen, es seye denn, daß durch eine genaue Untersuchung schon erwiesen wäre, daß die Bestand-Theile bey einer wie bey der andern nicht nur einerley, sondern auch in einerley Grad vereiniget seyn. Niemand wird also wol zweifeln, daß das *Chamaemelum inodorum* und *romanum*, das *Absinthium vulgare* und *insipidum*, *Abrotanum hortense* und *campestre* &c. nicht einerley Wirkung haben könne, weil der Geruch und Geschmack sogleich das Gegentheil beweiset: es wird aber auch leicht zu beweisen seyn, daß nicht nur allein der *Helleborus Hippocratis Tabern.* (dessen Wurzeln noch heutiges Tages fast allenthalben in den Apotheken Ober- und Nieder-Sachsens unter dem Namen des *Hellebori nigri* gefunden werden) darum von den andern Arten des *Hellebori nigri* in seiner Wirkung unterschieden seye, weil er zu einem ganz andern Geschlechte, ja zu einer ganz andern Classe gehöret; sondern daß auch die andere Arten, ob sie gleich eines Geschlechtes und auch fast einerley Gestalt sind, nemlich der *Helleborus foetidus*, *flore viridi* und *flore roseo*, ja auch so gar die Abweichungen dieser Arten, in ihren Kräften nicht völlig übereinkommen, sondern wenigstens eine schwächer und gelinder, die andere stärker und heftiger wirke. Es ist also unmöglich, daß ein Medicus eben die Anmerkungen von dem Nutzen eines Gewächses machen könne, die ein anderer davon aufgezeichnet hat, wann er nicht versichert ist, daß er eben die Art desselben, wie iener, dazu anwendet.

Damit nun also weder diejenige, die die officinal-Kräuter sammeln, noch auch diejenige, die sie gebrauchen, so leichtlich irren, sondern zu einer gewissen Erkenntnis derselben ohne mühsames Nachdenken und Nachsuchen gelangen möchten, ist wol der sicherste und leichteste Weg, solche durch eine ganz ähnliche Abbildung ihrer fürnehmsten Theile in der natürlichen Größe und Farbe, und zwar in einer besondern und von allen nicht gebräuchlichen Gewächsen abgesonderten Sammlung, für Augen zu legen. Nun ist zwar nicht zu erwarten, daß eine solche Sammlung, die allenthalben brauchbar wäre, so könne

ciat, nec alia hac laude carens immisceatur, expectari quidem nequit, quia aliis in locis plures, in aliis pauciores, pro talibus venditantur; hoc tamen vsum primum non tollit, quum nihilominus maxima earum pars ubique hoc nomine recepta sit, quaedam ex insertis hic vel illic non vtitatae praetermitti, omiffae vero minori studio, quam omnes, aliunde cognosci vel adhuc addi queant.

Eiusmodi vero collectio desiderabatur, vique dum artificiosissima Femina, infaufti medici anglici, Doctoris BLAKWELL, relicta vidua, opitulantibus quibusdam viris officiosissimis et peritissimis, feliciori fidere eam adgressa est et duobus voluminibus, Anglorum vernacula expositis, in lucem edidit hoc titulo: *A curious Herbal, containing five hundred Cuts of the most useful Plants, which are now used in the Practice of Physic. Engraved on folio Copper Plates after Drawings, taken from the Life by ELISABETH BLACKWELL. To which is added a short Description of the Plants and their common Uses in Physick. London printed for JOHN NOURSE at the Lamb without Temple Bar 1739: i. e. Herbarium selectum, quod continet quingentas figuras plantarum utilissimarum, quae nostris temporibus medico vsum inferuiunt et secundum imagines ab ELISABETHA BLACKWELL ad viuum repraesentatas aeri folii magnitudine incisae sistuntur. Accedit brevis descriptio plantarum earumque vsum in medica praxi communis. Londini apud IOANNEM NOURSE 1739. Reperiuntur quippe hoc in opere singulae plantae modo supra indicato aeri incisae singulis dimidiis chartae foliis secundum magnitudinem atque colorem naturalem satis apte repraesentatae, eaeque vel integrae, vel, spatio deficiente, earum ramus cum adiuncta saepius radice, praesertim si haec quoque medicis vsum venit, semper autem cum floribus, fructibus feminisque figura (a quibus hodie generum characteres petuntur) sigillatim depicta. Descriptiones, pari modo aeri incisae, continent alia 125 dimidia folia, singula plerumque earum quatuor, quibus, ex Domini IOSEPHI MILLERI Botanico officinali desumptis, breuibus indicantur plantae magnitudo et habitus, locus ubi reperiunda, tempus quo florere solet, et vires ipsi adscriptae, additis denique nominibus graecis, latinis, anglicis, hispanicis, gallicis, italicis, germanicis et batavis. Nullus quidem obseruatus est ordo, sed plantae occurrunt secundum occasionem, qua fuerunt oblatae; singulae tamen facile reperiuntur ad ductum indicis nominum latinorum et anglicorum, vtrique volumini ad calcem subiuncti.*

Paucis deinde annis elapsis aliud opus, eundem scopum praefixum habens, in Italia latino sermone explicatum in publicum prodit hoc titulo: *Historia botanica practica, seu plantarum, quae ad vsum medicum pertinent, nomenclatura, descriptio et vires, cum ab antiquis, tum a recentibus celeberrimorum auctorum scriptis desumptae, ac aeneis tabulis delineatae, atque ad viuum*

abgefasset werden, daß keines von den Officinal-Kräutern ausgelassen, und auch keines, das nicht gebräuchlich ist, untermischet seye, weil an einigen Orten mehrere, an andern weniger dafür erkannt werden; es hindert aber dieses den Haupt-Nutzen nicht, weil doch die meisten allenthalben dafür angenommen sind, einige untermischte hier oder dar nicht gebräuchliche übergangen, und die ausgelassene leichter als alle anderswoher erkannt oder noch beygefüget werden können.

Dergleichen Sammlung aber fehlte so lange, bis eine geschickte Frau, des unglücklichen Englischen Medici Dr. Blakwells hinterlassene Wittwe, mit Beyhülfe dienstfertiger und geschickter Männer einen glüklichen Anfang dazu gemacht und zwey Folianten in Englischer Sprache unter folgenden Titel an das Licht gestellet hat: *A curious Herbal &c.* Das ist: ein auserlesenes Kräuter-Buch, welches enthält 500 Abbildungen der meist nüklichen Gewächse, die heutiges Tages zur Arzney angewandt werden, und nach denen nach dem Leben von ELISABETH BLACKWELL gemachten Zeichnungen in Kupfer Bogens-Größe gestochen sind. Diesen ist beygefüget eine kurze Beschreibung der Gewächse und derselben gemeinen Gebrauchs in der Arzney. London, 1739. Dann in diesem Werk findet man jedes Gewächs nach obangezeigter Art in Kupfer gestochen auf einem halben Bogen besonders, in seiner natürlichen Größe und Farbe, entweder ganz oder, wann dieses der Raum nicht erlaubte, einen Zweig des selben sehr geschickt vorgestelllet, und diesem öfters noch die Wurzel, vornehmlich wann sie auch zur Arzney gebraucht wird, bey allen aber die Gestalt der Blüte, der Frucht und des Samens (wovon heutiges Tages das Kenn-Zeichen des Geschlechts genommen wird) besonders beygefüget. Die Beschreibung ist ebenfalls auf 125 halben Bögen, gemeinlich auf jedem viere, in Kupfer gestochen, welche aus Herrn JOSEPH MILLERS Botanico officinali eine kurzgefaßte Nachricht giebet von der Größe und Gestalt des Gewächses, von dem Ort oder Gegend wo es wächst, von der Zeit wann es blühet, und von dem Nutzen der ihm zugeschrieben wird: deme noch beygefüget werden die Namen in lateinischer, griechischer, englischer, spanischer, französischer, italienischer, hoch- und niederdeutscher Sprache. Eine Ordnung ist darinnen zwar nicht beobachtet worden, sondern die Gewächse stehen untereinander, wie sie mögen zu Handen kommen seyn; man kan aber ein jedes leicht nach Anzeige des beygefügeten lateinischen und englischen Registers finden.

Nach wenig Jahren kam ein anderes Werk in gleicher Absicht in Italien in lateinischer Sprache zum Vorschein, unter folgendem Titel: *Historia botanica practica, oder Benennung, Beschreibung und sowol aus den alten als neuern berühmten Schrift-Stellern genommene Nüzbarkeiten derienigen Gewächse, die zum Arzney-Gebrauch gehören, in Kupfer gestochen*

ex prototypo expressae, nec non in classes XXXV distributae, ut facilius cuiusque simplicis genus ac species dignoscantur. Opus Equitis IOANNIS BAPTISTAE MORANDI, Mediolanensis, Botanici-Galenici-Pictoris. Mediolani A. MDCC XLIV ex typographia PETRI FRANCISCI MALATESTAE, in folio maiori. Huius operis expositio comprehenditur quadraginta et duabus phylis, non computatis undecim, quibus titulus, praefatio &c. exhibentur, et, praeter frontispicium aeri incisum, ex sexaginta octo tabulis dimidii chartae folii magnitudine, quae repraesentant vnam et quingentas sexaginta species vegetabilium (quibus nonnulla, ad plantas officinales plane non pertinentia, ornamenti quasi loco intercesserunt) naturali exemplari valde, non tamen semper penitus, similes, et quidem secundum integrum earum habitum, adeoque etiam, paucis exceptis, unacum radice. Quoniam vero singulae tabulae comprehendunt quatuor minimum, interdum plusquam decem figuras: ex minimo earum numero naturalis magnitudo cognosci potest, et in reliquis, ob imminutam magnitudinem, partes earum, naturali conformatione exiguae, prorsus non comparent; separatus tamen flos fructusque, dummodo haud nimis magni sint, ut et semen in magnitudine naturali et satis accurate expressa figura singulis speciebus adponuntur. Descriptionem habitus singularum plantarum, loci quo occurrunt, temporis quo florent, ac vires quae ipsis adtribuantur, Auctor hic ex aliis collegit, et opus suum secundum generum characteres nostro aevo stabilitos, et quidem ad ductum systematis Boerhaaviani, in XXXV sectiones annexamque appendicem digessit, praetereaque amplissimum indicem alphabeticum subiunxit.

Vt autem opus hoc, ratione ordinationis, nomenclaturae, descriptionis et virium ex probatissimis et semper citatis scriptis desumptarum, Blackwelliano operi longe praeferendum sit; eidem tamen intuitu primarii usus, plantas scilicet hasce absque omni haesitatione cognitae reddendi, eidem longius adhuc postponendum venit, quia non solum, ut iam indicatum est, plurimae icones multum, et ne quidem vna eademque proportionem servata, imminutae hincque minus dignoscendae sunt, verum etiam quia color in exemplaribus hoc illustratis, raro naturae penitus similis, potius caeruleus, ruber, luteus imo viridis saepissime idem est, quum tamen natura per gradus ineffabiles, attamen constantes, in his procedit. His accedit, quod opus Blackwellianum, et praecipue alterum eius volumen, multas contineat peregrinas stirpes officinales haecenus quoad figuram plane ignotas et in aliis operibus frustra quaerendas, de quarum genuina et naturae respondente imagine eo minus dubium fovere licet, quo magis omnibus notum est, quousque Anglorum curiositas in plantarum exoticarum detectione et inquisitione se extendat, qua occasione opportuna gaudeant, quos sumtus huic negotio

chen und nach dem Leben abgebildet von dem Ritter JOH. BAPT. MORAND, aus Mayland, Botanisch-Galenischen Maler. Mayland, 1744 gros folio. Dieses Werk bestehet aus 42 Bogen Text, 11 Bogen die den Titel, Vorrede &c. ausmachen, und, ausser dem Kupfer-Titel, aus 68 Kupferplatten auf halben Bögen, welche 561 Arten von Gewächsen (worunter einige, die unter die Officinal-Kräuter gar nicht gehören, gleichsam nur zur Zierath eingemischt sind) der Natur ziemlich gemäß, jedoch nicht allezeit ganz ähnlich, und zwar nach ihrer ganzen Gestalt, mithin auch, wenige ausgenommen, samt der Wurzel abgebildet darstellen. Weil aber eine jede Platte wenigstens 4 manchmal mehr als 10 Figuren enthält: so ist bey den wenigsten ihre natürliche GröÖe zu erkennen und bey den übrigen kommen, wegen der Verkleinerung, die an sich selbst kleine Theile gar nicht zum Vorschein; doch ist eine einzle Blume und die Frucht, wann sie nicht zu groß sind, und der Same in natürlicher GröÖe und genau genug nachgeahmter Gestalt einer jeden Art beygefüget. Die Beschreibung der Gestalt einer jeden Art, des Ortes wo sie wächst, der Zeit wann sie blühet, und des zugeeigneten Nuzens hat der Verfasser aus andern zusammen getragen und sein Werk nach den heutiges Tages fest gesetzten Geschlechts-Zeichen, und zwar fürnehmlich nach dem Börhaavischen Lehrgebäude, in XXXV Abtheilungen und einem Anhang eingetheilet, und noch über dieses ebenfalls ein weitläuffiges alphabetisches Register beygefüget.

Ob wol nun dieses Werk, in Ansehung der aus bewährten und allezeit angezeigten Schriften genommenen Ordnung, Benennung, Beschreibung und Nuzens, das Blakwellische um vieles übertrifft; so ist es doch in Ansehung des vornehmsten Nuzens, nemlich diese Gewächse ohne allen Zweifel bekand zu machen, demselben weit nachzusetzen, weil nicht nur alleine, wie schon gemeldet, die allermeisten Abbildungen um gar vieles, und nicht einmal in einerley Haltung oder Vergleichung, verkleinert und also unkenntbarer gemacht sind, sondern weil auch in den illuminirten Exemplaren selten die Farben der Natur ganz ähnlich, vielmehr öfters die blaue, rothe, gelbe, ja auch die grüne, einerley ist, da sie doch in der Natur ihre unbeschreibliche doch beständige Stufen haben. Dazu kommt noch, daß in dem Blakwellischen Werk, sonderlich in dessen zweyten Band, gar viele von den ausländischen Officinal-Gewächsen, deren Gestalt bisher noch ganz unbekand gewesen und vergeblich in andern gesucht wird, zu finden sind, an deren Aehnlichkeit mit der Natur desto weniger zu zweifeln, ie mehr bekand ist, wie weit sich in Engelland die Curiositet in Entdeckung und Untersuchung der ausländischen

tio impendant, et quot stirpes ex omnibus mundi plagis collectae in ipsis eorum hortis colantur et ad plenam perfectionem perducantur.

Quoniam vero hoc ipsum opus Blackvvellianum non solum caro pretio redimendum, verum etiam lingua minus vsitata explicatum est: paucissimis hinc vsu tam necessarium praestare potest. Vt ergo vtraque haecce difficultas, quantum fieri potest, tollatur, publicae vtilitati inferuendi studio permotus meum huius operis exemplar viuis coloribus illustratum Dom. NICOLAO FRIDERICO EISENBERGERO, pictori nostrati, eum in finem obtuli, vt, pro diminuendo pretio, illud partitis vicibus et praenumerationis ope denuo in publicum ederet, pro communi vero vsu explicationem in latinam et germanicam linguam traducendam curaret, quod propositum, quum ipsi arriserit, programme quodam de d. 12. Martii 1747. idem enunciauit, et, impetrata mox huius studii cultorum approbatione, hucusque exequi continuauit. Satis quidem perspectum habui, commentarii ratione multa, atque etiam nonnulla imaginum intuitu, emendari posse; sed reliquae meae occupationes haud permittebant, vt ipsemet hoc ex voto praestarem. Plantarum quidem descriptionis, ipsi imagini haud raro contrariae, mutatio omnium minime necessaria quidem visa est, quoniam, quod ad habitum illarum attinet, eundem imago clarius, quam accuratissima descriptio, cognitum reddit, floris tempus autem et natale solum omnibus regionibus haud commune est; quae vero ratione saporis, odoris aliarumque qualitatum, medicarum praecipue virtutum, vltius indicari potuissent, plus temporis postulatura fuissent, quam mihi quidem reliquum est, etsi eiusmodi labor iis forsitan gratus acceptusque fuisset, qui in compendium redacta desiderant omnia iam obseruata, vel etiam copia librorum, ex quibus haec conquirenda sunt, carent. Prostant autem insuper iam talia et medicis satis nota opera eiusmodi instructionem suppeditantia; reliquis autem id, quod in opere Blackvvelliano indicatum est, sufficit. Si vero horum aliquis etiam plura scire desiderat, adeat vel SAMVELIS DALE Pharmacologiam, vel PAVLI HERMANNI Cynosuram materiae medicae, praecipue a IOANNE BOECLERO continuatam et auctam, vel etiam STEPHANI FRANCISCI GEOFFROY tractatum de materia medica, hisque pro cognoscendis facultatibus plantarum ex illarum resolutione omnium optime patentibus, addat CASPARIS NEVMANNI Praelectiones chemicas a IOANNE CHRISTIANO ZIMMERMANNO editas, vel potius auctiores et emendatiores a D. D. CHRISTOPHORO HEINRICO KESSEL titulo Chymiae medicae dogmatico-experimentalis nunc in publicum prodeuntes.

dischen Gewächse überhaupts erstreckt, welche gute Gelegenheit dazu daselbst ist, wie viele Kosten darauf gewendet werden, und wie viele Gewächse aus allen Theilen der Welt in den dasigen Gärten gezogen und zur Vollkommenheit gebracht werden.

Weil aber dieses Werk nicht nur alleine sehr theuer, sondern auch in einer Sprache, die wenige verstehen, verfasst ist: so können die meisten sich solches nicht zu Nutz machen. Damit nun beyden Hindernissen so viel es möglich abgeholfen werde, hab ich aus Liebe zum gemeinen Besten einem hiesigen Mahler, Herrn Nicol. Fried. Eisenberger, mein illuminirtes Exemplar dazu an gebotten, daß er zu Verminderung der Kosten solches Stückweis und durch Beyhülfe eines Vorschusses nachmachen, zum allgemeinen Gebrauch aber die Beschreibung in die lateinische und teutsche Sprache übersezen lassen möchte, wozu er sich dann auch entschlossen, solches Vorhaben in einer Nachricht vom 11. März 1747. bekand gemacht und, weil es seine Liebhaber gefunden, bisher fortgesetzt hat. Ich habe zwar wohl erkannt, daß vieles in Ansehung des Textes, auch einiges in Ansehung der Abbildungen, noch könnte verbessert werden, aber meine andern Verrichtungen erlaubten mir nicht, solches so auf mich zu nehmen, wie ich es gewünscht. Die Beschreibung der Gewächse, die zuweilen mit dem Gemählde selbst nicht übereinstimmt, zu ändern, hielt ich zwar am wenigsten für nöthig, weil, was ihre Gestalt und Farbe anlangt, solche die Abbildung deutlicher als die genaueste Beschreibung erkenntlich macht, die Zeit der Blüte aber und der Ort, wo sie zu wachsen pflegen, in allen Landen nicht einerley ist; was aber in Ansehung des Geruchs, Geschmacks und anderer Eigenschaften, insonderheit ihrer Arzneykraften, ferner hätte können angezeigt werden, würde mehr Zeit erfordert haben, als mir übrig war, obgleich dergleichen Arbeit denen, die alles, was angemerkt worden ist, in einem kurzen Begriff beisammen zu haben wünschen, oder auch mit vielen Büchern zum Nachsuchen nicht versehen sind, vielleicht angenehm möchte gewesen seyn. Ueberdieses sind auch solche Werke schon vorhanden und den Medicis bekand, worinnen diese Nachrichten zusammen getragen sind; andern aber kan das angezeigte genug seyn. Wann aber unter diesen auch jemand ein mehrers zu wissen verlangt, so suche er solches entweder in SAM. DALE Pharmacologia, oder PAVL. HERMANNI Cynosura materiae medicae, vornehmlich von JO. BOECLERO fortgesetzt und vermehret, oder auch in STEPH. FR. GEOFFROY tractatu de materia medica, und füge solchen, um die durch die Auflösung am besten sich offenbarende Eigenschaften der Kräuter zu erkennen, noch bey CASPAR NEVMANN'S praelectiones chemicas, welche J. D. CH. ZIMMERMANN heraus gegeben, oder vielmehr, welche viel vermehret und verbessert unter dem Titel der gründlichen und mit Experimenten erwiesenen medicinischen Chymie Herr Dr. CH. H. KESSEL nun an das Licht stellet.

Was

Quic-

Quicquid ergo pro viribus et temporis spatium ad emendationem huius operis contuli, sequentibus comprehenditur.

1.) Vbi Blackvellianum opus latino nomine illud, quod in Germaniae pharmacopoliis usu receptum est, non indicat, idem adposui; germanica vero plerumque nomina, et quidem saepius ad RVPPII Florae Ienenfis ductum, emendavi, quoniam haec maximam partem corrupta vel penitus omissa fuerunt: interdum, quando tempus vacabat, idem circa nomina quoque aliarum linguarum observavi sequutus potissimum DODONAEVM, IO. BAVHINVM ac CAMERARIVM, consultis simul circa gallica nomina TOURNEFORTII institutionibus et VAILLANTII botanico Parisiensi, circa italica ZANNICHELLI historia plantarum ad littora Veneta nascentium, immo etiam circa anglica GERARDI, PARKINSONII et RAII historia huiusque synopsi. Exemplar Blackvellianum praemittit nomina latina officinalia et anglicana, deinde sequitur descriptio ipsius stirpis eiusque virium medicarum et tandem hanc tractationem claudunt nomina aliarum linguarum cum repetitione latinorum absque vlla mutatione; hac autem noua eius in editione omnia haec nomina primo loco occurrunt et deinde reliquae annotationes ex anglico idiomate translatae.

2.) Quum nomen latinum in exemplari Blackvelliano illud tantum indicet, quod in officinis pharmaceuticis vsitatum est, hoc vero, post magis magisque emendatam doctrinam botanicam huiusque ope stabilitam ex certis infallibilibusque characteribus plantarum in determinata genera distinctionem, saepius mutatum fuerit: eorum in gratiam, qui de his etiam certiores fieri cupiunt, eadem quoque ex praestantissimis auctoribus, qui vel integra systemata vel secundum haec ordinatos catalogos (dummodo in his eiusdem speciei mentio fit) in publicum ediderunt, indicaui et quidem ordine chronologico, quo eorum auctores se inuicem exceperunt, ita tamen limitato, vt eo in casu, quando sequentium quidam, idem nomen alicuius antecedentis seruauit, huic statim ille adiungeretur. Auctorum autem opera, quae hunc in finem selegi, sunt ordine chronologico sequentia: IO. RAII plantarum historia et methodus nec non synopsis methodica stirpium Britannicarum, IOSEPHI PITTONI TOURNEFORTII institutiones, AVGVSTI QVIRINI RIVINI ordines plantarum, IOANNIS HENRICI HEVCHERI index plantarum H. medici academiae Vitembergensis et noui prouentus eiusdem horti, HENRICI BERNARDI RVPPII flora Ienenfis, IOANNIS IACOBI DILLENII catalogus plantarum Giffensium, HERMANNI BOERHAAVE index alter plantarum H. Lugduno-Bataui, SEBASTIANI VAILLANT botanicum Parisiense eiusque communicata ad acta academiae regiae Parisiensis, LAVRENTII HEISTERI indices plantarum H. academiae Iuliae eiusque systema plantarum, CAROLI LINNAEI genera plantarum, ADRIANI

van

Was ich also zur Verbesserung dieses Werks nach Vermögen und so viel die Zeit erlaubte beigetragen, bestehet in folgenden.

1.) Wann in dem Original mit dem lateinischen Namen nicht der in teutschen Apotheken gewöhnliche angezeigt ist, so hab ich solchen beigefügt; alle teutschen Namen aber meistens nach RVPPII flor. Jen. verbessert, weil solche öfters verfälschet oder gar ausgelassen sind: zuweilen ist solches auch bey den Namen der andern Sprachen geschehen, woben ich sonderlich DODONAEVM, IO. BAVHINVM und CAMERARIVM gefolget, in Ansehung der französischen aber TOURNEFORTII institutiones und VAILLANT Botan. Paris., der italiänischen ZANNICHELLI Istoria delle Piantes, ia selbst der englischen GERARD, PARKINSON, RAI histor. und synopsi., wann es die Zeit erlaubte, mit zu Hülfe genommen habe. Im Original werden die lateinische Officinal-Namen nebst den englischen voraus gesetzt, sodann folget die Beschreibung des Gewächses und seines Nutzens, und die Namen aus andern Sprachen mit unveränderter Wiederholung der lateinischen machen den Beschluß; in dieser neuen Ausgabe aber stehen alle diese Namen voran und dann die übrige Anmerkungen nach dem Original übersezt.

2.) Weil in dem Original durch den lateinischen nur der Officinal-Name angezeigt, dieser aber, bey mehr und mehr geschehener Verbesserung der Kräuter-Lehre und dadurch nach gewissen und unbetrüglischen Kennzeichen gemachter Eintheilung derselben in besondere Geschlechter, vielmals geändert worden ist: so hab ich denen zu gefallen, die auch hiervon eine Nachricht verlangen, diese Namen aus den fürnehmsten, die entweder ganze systemata oder nach diesen eingerichtete catalogos, (wann diese der vorkommenden Art Meldung thun) gemein gemacht haben, angezeigt, und zwar in der Ordnung, wie die Verfasser derselben der Zeit nach auf einander gefolget sind, doch mit dem Unterscheid, daß, wann von einem nachfolgenden der Name eines vorhergehenden beybehalten worden, diesem iener sogleich beygesetzt wurde. Die ich nun dazu erwähnt habe, sind nach obbemeldter Zeit-Ordnung IO. RAII historia, methodus et synopsis, IOSEPH. PITTON. TOURNEFORTII institutiones, AVG. QVIR. RIVINI ordines plantar. IO. HENR. de HEVCHER index plant. et noui prouentus H. Vitemb. HENR. BERNH. RVPPII flor. Ienenf. IO. IAC. DILLENII catal. plant. Giffens. HERM. BOERHAAVE index alter H. L. Bat. SEB. VAILLANT botan. Paris. et acta acad. R. Paris. LAVR. HEISTERI indices H. Helmst. et systema, CAR. LINNAEI gen. plantar. ADRIAN. van ROYEN flor. Leyd. prodr. ALB. de HALLER stirp. Heluet. IO. GE. HENR. KRAMERI tentamen bot. CHRISTIAN GOTTLIEB LVDWIGII definit. plant. EVERH. IAC. van WACHENDORF H. Vltrai. ind. Die Geschlechter Kennzeichen aber selbst eines jeden Gewächses nach

(C)

van ROYEN florae Leydensis prodromus, ALBERTI HALLERI enumeratio stirpium Helvetiae, IOANNIS GEORGII HENRICI KRAMERI tentamen botanicum emendatum et auctum, CHRISTIANI GOTTLIB. LUDWIGII definitiones plantarum, EVERHARDI IACOBI van WACHENDORF horti Ultraiectionis index. Singularum autem plantarum genericos characteres ipsos ad mentem horum virorum laudatorum addere, nimis prolixum et tamen haud valde utile fuisset; quoniam omnes, quibus haec curae cordique sunt, eorum operibus carere nequeunt.

3.) Dum in Blackwelliano opere speciei depictae nomen specificum nunquam indicatur, hoc autem necessario scire debent illi, qui plura de eadem planta ex aliorum scriptis colligere student: haec quoque nomina sigillatim addidi hoc ordine, ut illa primo loco posita sint, quae nunc ad normam operum systematicorum excluduntur, deinde vero sequantur emendata, omnia autem utriusque huius distinctionis iterum temporis ordine, quo proposita fuerunt, ita tamen, ut magis simplicia praecedant et, quae proxime inter se conveniunt, coniungantur. Ut subleuarem laborem hunc molestum, primum ex D. LINNAEI horto Clifortiano et D. de HALLER enumeratione stirpium Helvetiae (si quidem hi exercitatissimi et accuratissimi viri eiusdem speciei mentionem fecerunt) tot ex his nominibus conquisiui, quot scopus praefixus requirebat, deinde opera citata ipsemet euolui et demum haec nomina secundum ordinem supra memoratum digessi, sique nonnunquam alia notatu digna reperi, haec quoque addidi, praecipue autem simul curavi, ne primum nominis officinalis auctorem praeterirem. Quando imago quaedam apposita (de quo mox no. 5. plura) aliam speciem vel varietatem repraesentat, huius quoque nomina specifica, sed separatim, indicaui.

4.) Quod ad imagines Blackwellianas attinet, extra dubium quidem positum est, eas naturae eoque respondere, ut planta repraesentata absque errore statim cognosci queat; quoniam vero nihilominus accuratior inquisitio manifestavit, multas earum, et formae et coloris ratione, non satis vivide nec perspicue depictas esse, EISENBERGERVM admonui, ut, quoties occasio permittebat, exemplar naturale conferret et, ubi necessarium videbatur, vel ramum recens depictum Blackwellianae figurae iungeret, vel imaginem plane novam substitueret et huic ramum tantum Blackwellianae figurae adderet, itemque, ubi radicis ad medicum usum pariter commendatae imago deficeret, hanc quoque subiungeret. Etsi autem artifex, his lubenter morem gerens, omnes vires intenderit, ut novas imagines additas naturali exemplari proxime accedentes pararet easque ipsemet aeri incideret: impossibile

nach Anleitung dieser belobten Männer beizufügen, wäre zu weitläufig und doch ohne grossen Nutzen gewesen: weil alle, denen etwas daran gelegen ist, mit ihren Werken schon versehen seyn müssen.

3.) Weil in dem Original niemals der besondere Name der abgebildeten Art angezeigt ist, darauf aber alles ankommt, wann man eine weitere Nachricht aus andern Schriften verlangt: so habe ich auch solche insbesondere angezeigt in dieser Ordnung, daß ich diejenigen, die heutiges Tages in den systematischen Werken nicht mehr für gültig erkannt werden, voran gesetzt und dann die verbesserten, alle aber von beyderley Eintheilung ebenfalls nach der Ordnung der Zeit, wie sie bekannt gemacht worden, doch so, daß bey jedem Namen die mehr einfachen voran, diese aber, die am nächsten mit einander übereinkommen, beyammen stehen. Zur Erleichterung dieser mühsamen Arbeit habe ich jedesmal aus des Herrn LINNAEI Horto Clifortiano und des Herrn von HALLERS Enumerat. stirp. Helvet. (wann diese geübte und sorgfältige Männer eben diese Art angezeigt haben) die Namen, so viel derselben zu meiner Absicht nöthig gewesen, zusammen gesucht, alsdann die angezeigte Schriften selbst aufgeschlagen, endlich die Namen nach meiner gemeldten Einrichtung in Ordnung gebracht und, so ich zuweilen noch andere merkwürdige gefunden, solche beygefüget, dabey ich dann sonderlich auch darauf gesehen, daß der Urheber des Officinal-Namens nicht mögte übergangen werden. Wann die beygesetzte Figur (davon sogleich no. 5. ein mehrers) nach einer andern Art oder Abweichung gemacht worden, so habe ich auch derselben besondern Namen, aber unterschieden, angezeigt.

4.) Was die Blackwellische Figuren anlanget, hat es wohl seine Richtigkeit, daß sie der Natur so ähnlich sind, daß man das abgebildete Gewächs alsobald ohne Irrthum erkennen kan; weil aber gleichwol eine genauere Untersuchung entdeckte, daß viele in Ansehung der Gestalt und Farben nicht lebhaft und deutlich genug vorgestellt sind: so habe ich Herrn EISENBERGER dahin angewiesen, daß er, so oft es die Gelegenheit erlaubte, das natürliche Muster dagegen gehalten und, wann es nöthig schiene, entweder einen neu-abgebildeten Zweig der Blackwellischen Figur beygefüget, oder eine ganz neue Figur fertiget und nur einen Zweig von der Blackwellischen beygehalten, in gleichen, wo die Abbildung der Wurzel, wann sie ebenfalls in den Apotheken gesammelt wird, mangelte, solche auch beygesetzt hat. Ob nun wohl dieser Künstler diesem willig folgte und allen Fleiß anwandte, daß die neuen beyge-

bile nihilominus fuit, eas eadem accurate, colorum praecipue intuitu, in hoc opere repraesentare: quum vile pretium, quod singulis tabulis (quae tamen, cum Blackwellianis comparatae, saepius figurarum numero duplo auctiores sunt) constitutum est quodque secundum genus plerorumque emtorum necessario constituendum erat, plura praestanda impediuit. His tamen non obstantibus, nouae hae aequae ac illae Blackwellianae imagines vsui, cui destinatae sunt, satisficient, vt taceamus, illa maioris et nitidioris chartae exemplaria, ob pretium paululum auctum, maiori etiam cura elaborata esse.

5) Quoniam minores et separatae figurae florum, fructuum seminumque in exemplari Blackwelliano minime omnium naturalem eorum conformationem eousque repraesentant, vt ex illis generis characteres ea accurate, quae nostris temporibus desideratur, cognosci queant: EISENBERGERVS eas quidem absque mutatione adposuit, simul vero studuit, easdem partes, quoties possibile fuit, accuratius et secundum earum analysin depingere, figillatim etiam staminum et pistillorum numerum et conformationem indicare, et quidem plerumque ex eadem specie, quam Blackwellianum opus sistit, desumptas, interdum autem, hac opportuno tempore deficiente, ex alia eiusdem generis specie, quae vero, vt supra no. 3. dictum, peculiari suo nomine specifico semper distincta est. De his autem porro monere cogor, me quidem conatum hunc necessaria instructione adiuuissse, saepissime autem temporis penuria impeditum fuisse, quo minus hasce imagines cum naturali exemplari conferrem, vnde ergo artifex nunquam aliquos errores commisit; quousque vero nunc ipsemet continua exercitatione peruenit, id recentiores imagines satis declarant: forsitan etiam occasio adhuc erit priores errores corrigendi et pares analyses iis speciebus quoque addendi, quae ob defectum exemplarium naturalium hucusque omissae sunt.

6) Quidquid autem imaginum ratione mutandum, emendandum et augendum, quidque praeterea ad illustrationem huius vel illius speciei addendum necessarium et vtile visum est, id omne in notis subiunctis declarare haud intermisi.

7) Quum huncce laborem susciperem, mea intentio nequaquam erat, has additiones qualescunque amplificare, quare priorum phylarum expositio reliquis multo breuior est; quoniam vero eiusmodi occupationes mihi semper fuerunt gratissimae, eae ipsae me pedetentim ad plura attexenda excitant, praesertim spe lactatum, iis forsitan omnem vtilitatem haud defuturam esse.

bennefügten Abbildungen mit der Natur auf das genaueste übereinkamen, solche auch selbst in das Kupfer ätzt: so war es doch unmöglich dieselbe mit eben dem Fleis, vornehmlich in Ansehung der Farben, in diesem Werk vorzustellen: weil der geringe Preis, der auf eine iede Kupfer-Platte (die in Vergleichung mit den Blackwellischen oft noch einmal so viel Figuren enthalten) gesetzt wurde und wegen der Neigung der meisten Käufer nothwendig gesetzt werden musste, ein mehrers zu liefern nicht erlaubte. Dessen ungeachtet, werden doch diese neue sowol, als die Blackwellische Abbildungen, dem bestimmten Nutzen ein satisfames Genügen leisten, ohne zu gedenken, daß dieselbe bey den Exemplaren auf grösser und feiner Papier, wegen des etwas grössern Preises, auch mit mehrern Fleis ausgearbeitet sind.

5.) Weil in dem Blackwellischen Exemplar die besondere kleine Figuren der Blüthe, Frucht und Saamen am wenigsten der Natur so ähnlich kommen, daß daraus die Kennzeichen des Geschlechts nach der heutigen Tags erfordernten Accurateffe können erkannt werden: so hat Herr EISENBERGER solche zwar unverändert beybehalten, zugleich aber sich bemühet, eben diese Theile, so oft es möglich gewesen, genauer und nach ihrer Zergliederung nachzuahmen, fürnehmlich auch die Zahl und Bildung der Staubfäden und Stempel anzuzeigen, und zwar meistens von eben der Art, die in dem Blackwellischen Werk abgebildet ist, zuweilen aber, wann diese zu der Zeit nicht zu bekommen war, von einer andern Art dieses Geschlechtes, welche jedoch allezeit mit ihrem besondern Nahmen, wie oben no. 3. gemeldet, angezeigt worden. Hiebey mus ich aber nothwendig erinnern, daß ich ihme zwar hiezu die nöthige Anweisung gegeben habe, gar oft aber so viel Zeit nicht hatte, diese Abbildungen mit der Natur zusammen zu halten, dahero dann einige Fehler von ihme begangen worden sind; wie weit er aber nunmehr durch die beständige Uebung gekommen, solches bezeugen genugsam die neuern Abbildungen: vielleicht zeigt sich auch noch die Gelegenheit, die ersten Fehler zu verbessern, und eben dergleichen Zergliederungen bey den Arten, wo sie aus Mangel des natürlichen Musters nicht konnten bennefügget werden, nachzuholen.

6.) Was nun aber in Veränderung, Verbesserung und Vermehrung der Figuren geschehen ist, und was ich sonst beyzusetzen für nöthig und dienlich erachtet, das hab ich in den bennefügten Anmerkungen zu erklären nicht ermangelt.

7.) Im Anfang war zwar mein Vorsatz nicht, mich in Ansehung dieser Beysätze weitläufig einzulassen, dahero dann die ersten Blätter viel kürzer abgefasst sind; weil ich aber allezeit eine besondere Liebe zu dergleichen Arbeit hatte, so verleitete mich die Ausarbeitung nach und nach zu mehrern, zumal ich mir die Hoffnung machte, daß es vielleicht nicht ohne alle Nutzen seyn würde.

8.) Quoniam ergo hac in editione multum unius speciei nomina latina indicata, saepius etiam ex aliis linguis plura addita sunt, necessarium duxi, ut cuilibet centuriae peculiaris adderetur index alphabeticus, ex quibus denique, Deo volente, alius uniuersalis in commodiorem usum confici poterit. Quomodo latina nomina differant, eorum indicis inscriptio docet, et quod ad reliqua attinet, monendum adhuc habeo, pauca quaedam nomina aliarum linguarum his indicibus inserta esse, quae loco citato non reperiuntur, quia postliminio occurrebant: numerus tamen additus, certo indicat, quorsum pertineant.

9.) Plantas huius operis, quae in officinis Germaniae non colliguntur, signo + notauimus; ubi alia species, quam quae depingitur, apud nos in usu est, ea signo D distinximus, et ubi figurae vel emendatae vel auctae fuerunt, signum O id indicat. Si Deus vitam et sanitatem largitur, haecque noua Blackwellianae collectionis editio ad finem perducta est, non solum illae species, quae loco illarum figura D notatarum in nostris officinis pharmaceuticis prostant, verum etiam aliae multae plantae officinales in hac collectione plane omissae, in supplemento quodam depictae et explicatae accedent, quarum nonnullae imagines iam paratae ad manus sunt. Ceterum noxiarum et venenatarum stirpium aequae, ac salubrium, cognitio necessaria ac utilis est, hincque parem et imagine et descriptione repraesentationem merentur.

10.) Quoniam, ut supra iam innui, tempus mihi haud vacabat totum opus in alium ordinem redigendi, optimum consilium visum fuit, ut eo ipso modo, quo excusum est, recuderetur, ideoque nonnisi occasione fauente emendaretur et augeretur, unde haecce editio eum etiam praestaret usum, ut, ubi Blackwellianum opus in scriptis citatur, eius loco inferuire queat, quare vel ipsae erucae aliaeque insecta interdum adpicta, haud omissa sunt, licet ad scopum primum prorsus non pertineant et imperfecta tantum repraesententur. Eandem ob rationem etiam non solum iis in tabulis, quae Blackwellianam et nostram emendatam plantae imaginem simul haud capiebant, illius saltem pars quaedam conseruata, verum etiam omnibus idem nomen latinum adsculptum est, circa quae tamen indicare cogor, haec in primis quadraginta tribus tabulis nondum tam accurate obseruata fuisse, unde sequens informatio nonnullis grata erit, licet praecipua in notis additis iam indicata sint. Quod ad nomina attinet, sub figurarum tabulis Blackwellianae editionis leguntur sequentia: t. 1. Dens leonis, Taraxacum; t. 2. Papauer rubrum, erraticum, rhoeas; t. 6. Argentina, Potentilla; t. 9. Scorodonia, Salvia siluestris; t. 10. Salvia; t. 12. Vrtica; t. 13. Iasminum; t. 19. Faba; t. 21. Agrimonia, Eupatorium Graecorum; t. 22. Nasturtium, Nasturtium hortense; t. 25. Periclymenum

8.) Weil nun in dieser Ausgabe viele lateinische Namen einer Art angezeigt, auch in den übrigen Sprachen öfters die Namen vermehrt worden sind, so habe ich für nöthig erachtet, einem jeden Hundert ein besonderes Register beizufügen, daraus künftig B. G. ein allgemeines zum bessern Gebrauch kan verfertigt werden. Den Unterschied der lateinischen Namen zeigt die Ueberschrift dieses Registers an, und bey den übrigen habe ich dieses noch zu erinnern, daß einige wenige Wörter im Register stehen, die im Text nicht zu finden sind, weil mir solche erst nach der Hand befielen: es zeigt aber die beigesetzte Zahl sicherlich an, zu welcher Pflanze sie gehören.

9.) Die in dieser Sammlung befindliche Gewächse, welche in unsern teutschen Apotheken gar nicht gebräuchlich sind, habe ich im Text mit einem + bezeichnet; wo eine andere Art, als die vorgestellte, gesammelt wird, ist solche mit D unterschieden, und wo eine Verbesserung oder Vermehrung der Figuren vorkommt, wird solches mit O angezeigt. Wann Gott Leben und Gesundheit giebet, daß diese neue Auflage der Blackwellischen Sammlung zu Ende gebracht wird, sollen nicht nur diejenige Arten, die statt derer mit D bezeichneten gewöhnlicher sind, sondern auch viele andere Officinal-Kräuter, die in dieser Sammlung gar ausgelassen worden, in einer Zugabe noch vorgestellt und erkläret werden, davon schon einige Gemälde verfertigt worden; wie dann auch die Erkenntnis der giftigen und schädlichen Gewächse eben so, als der heilsamen, nöthig und nützlich ist, und sie also eine gleichmäßige Abbildung und Beschreibung verdienen.

10.) Weil, wie anfangs gemeldet, ich ohnmöglich so viel Zeit übrig hatte, das ganze Werk in eine andere Ordnung zu bringen, so schiene es am besten zu seyn, es so wieder aufzulegen, wie es verfaßt ist und nur nach Gelegenheit es auszubessern und zu vermehren, wodurch diese Ausgabe auch dazu dienlich ist, daß sie, wo das Original irgendwo in Schriften angeführet wird, statt dessen kan gebraucht werden, weswegen so gar auch die Raupen und andere Insecten, die zuweilen beigesetzt sind, nicht ausgelassen worden, ob sie gleich zum Hauptwerk gar nicht gehören, auch unvollkommen vorgestellt sind. Um eben dieser Ursache willen ist dann auch nicht nur von den Blackwellischen Abbildungen der Gewächse wenigstens ein Theil beygehalten, sondern es sind auch unter dieselben eben die im Original befindliche lateinische Namen gestochen worden: woben ich doch noch anzeigen mus, daß bey den ersten 43 Kupfer-Tafeln dieses noch nicht so genau ist beobachtet worden, daher folgende Nachricht einigen nicht unangenehm seyn wird, obgleich das meiste davon in den Anmerkungen schon angezeigt ist. In Ansehung der beigesetzten Namen, sind im Original folgende unter den Figuren zu finden: tab. 1. Dens Leonis, Taraxacum; t. 2. Papauer rubrum, erraticum, rhoeas; t. 6. Argentina, Potentilla; t. 9. Scorodonia, Salvia siluestris; t. 10. Salvia; t. 12. Vrtica; t. 13. Iasminum;

menum, Caprifolium, Matrifilua; t. 26. Consolida regalis, Delphinium; t. 27. Melissophyllum; t. 31. Ranunculus; t. 32. Mentha aquatica, Sifymbrium; t. 33. Lamium album, Vrtica mortua; t. 36. Borago; t. 40. Triticum, Triticum aristatum. Vbi ergo his locis indicatis nostra in editione plura vel pauciora horum nominum indicatorum tabulis aeneis adsculpta sunt, ea ab illis, qui eiusmodi accuratorem obseruandam praecipunt, secundum hanc normam mutari possunt. Quod ad figuras ipsas pertinet, t. 6. figura floris et color foliorum; t. 10. color floris et foliorum; t. 21. figura floris et separatim adpicti fructus seminisque et t. 25. color floris secundum naturale exemplar emendabantur et huic ultimae seorsum appositae figurae floris, fructus seminisque mittebantur, ceterum autem ubique totae Blackwellianae imagines imitatae seruabantur, e contrario vero t. 15. 17. 18. 19. 22. 24. 26. 28. 30. 33. 36. et 43. nouae prorsus imagines Blackwellianis plane omisissis substituebantur: erit forsitan in posterum occasio, et harum omisissarum repraesentationem Blackwellianae similem addendi.

Hac itaque forma apparet prima collectionis Blackwellianae centuria pro viribus emendata et aucta, quam reliquae pari, imo maiori, cura DEO aspirante elaboratae sequentur. Partitiones huius editionis hactenus praenumerantibus statuto termino non semper quidem traditae fuere; sed, vt verum fatear, mea potius, quam artificis, culpa. Cuicumque vitae meae conditio nota est, secundum quam mihi, eiusmodi opera molienti, eae tantummodo vacant horae, quas alii laboribus defatigati quieti destinant; et quem praeterea non latet, me eiusmodi conatus propterea tantum fouere, vt opportuna artificum nostratum occasione gaudens publicum quoddam vtile pro viribus proueham et in actum perducam: is aequum, vt spero, feret iudicium de omnibus, quae vel minus ordinate proposita vel prorsus omisissae sunt. Nullum praeterea in hisce lucrum quaero, et coeptum quoddam opus alii perficiendum lubens trado. Hanc ergo ob causam et, vt omnia impedimenta remouerentur, iam diu in votis habui, vt huius quoque operis expediendi curam alius in se susciperet, quod etiam nunc fortunato contigit, dum, opitulante Dom. IOANNE AMBROSIO BEVRE-RO, Academiae Caesareae Naturae Curiosorum Sodali et huius loci Pharmacopoeo claro, celeberrimo et de orbe litterato optime iam meritis Professor Lipsiensis, D. D. LVDWIGIVS hoc munus beneuole in se suscepit ita, vt sua sub directione omnia ordine coepto continuentur et celerius elaborentur, quod auxilium in posterum melius, quam meae quidem vires concedebant, huius operis expeditioni succurret, quemadmodum eius primitiae propediem in lucem edendae id satis iam probant. Licet autem hac ratione de futura expositionis elaboratione non

num; t. 19. Faba; t. 21. Agrimonia, Eupatorium graecorum; t. 22. Malua; t. 23. Nasturtium, Nasturtium hortense; t. 25. Periclymenum, Caprifolium, Matrifilua; t. 26. Consolida regalis, Delphinium; t. 27. Melissophyllum; t. 31. Ranunculus; t. 32. Mentha aquatica, Sifymbrium; t. 33. Lamium album, Vrtica mortua; t. 36. Borago; t. 40. Triticum, Triticum aristatum. Vbi nun an diesen angezeigten Orten in unserer Ausgabe mehr oder weniger von diesen Nahmen auf der Platte bengestochen worden, sind solche von denen, die dergleichen genau beobachtet haben wollen, darnach zu ändern. In Ansehung der Figuren selbst sind t. 6. die Gestalt der Blüthe und die Farb der Blätter, t. 10. die Farb der Blüthe und Blätter, t. 21. die Gestalt der Blüthe, auch der neben bengesezten Frucht und Saamens, und t. 25. die Farb der Blüthe nach der Natur verbessert, und die nebenbengesezte Figuren der Blüthe, Frucht und Saamens weggelassen, im übrigen aber allenthalben die ganzent Blackwellischen Figuren beybehalten, hingegen t. 15. 17. 18. 19. 22. 24. 26. 28. 30. 33. 36. und 43. ganz neue Figuren mit völliger Uebergehung der Blackwellischen eingerückt worden: vielleicht wird zur Ersezung dieser ausgelassenen auch eine Gelegenheit kommen.

Auf diese Weise nun erscheinet das erste Hundert der Blackwellischen Sammlung nach Möglichkeit verbessert und vermehret, und die übrigen werden mit noch mehrerer Sorgfalt ausgearbeitet unter Göttlichen Beystand nachfolgen. Bisher ist zwar mit Auslieferung der Abtheilungen zur bestimmten Zeit nicht ordentlich eingehalten, aber, die Wahrheit zu gestehen, die Hindernis mehr von mir als dem Künstler gemacht worden. Wer meine Lebens-Umstände kennet, nach welchen ich nur alleine die Zeit, die andere zur Ruhe von ihrer Arbeit anwenden, zu dergleichen Unternehmungen übrig habe, und auch weiß, daß ich solcher nur deswegen mich unterfange, um bey der guten Gelegenheit der hiesigen Künstler nach Vermögen etwas gemein nütliches zu befördern und in Gang zu bringen: von dem hoffe ich eine billige Beurtheilung alles dessen, was nicht ordentlich genug ausgeführt oder wohl gar ausgelassen worden ist. Ueber dieses suche ich dabey keinen Gewinn, und übergebe allezeit gerne einem andern das angefangene auszuführen. Dieser Ursache wegen, und damit allen Hindernissen besser möchte abgeholfen werden, habe ich längstens gewünscht, daß auch die Ausfertigung dieses Werkes von einem andern möchte besorget werden, und es ist nun zum guten Glück dahin kommen, daß, durch Vermittelung Herrn Jo. Ambros. Beurers, der Kaiserlichen Acad. Nat. Curiosor. Mitgliedes und hiesigen berühmten Apothekers, der um die gelehrte Welt bereits Hochverdiente Herr Doctor und Professor Ludwig in Leipzig solches gütigst auf sich also genommen hat, daß unter seiner Aufsicht in der angefangenen Ordnung fortgefahret und alles nach Wunsch beschleuniget wird, wodurch dann diesem Werk noch besser, als meine Kräfte vermochten

non amplius participem; non intermittam tamen, omnes porro intendere vires, vt maiori adhuc cura non solum imagines, vbi id necessarium erit, emendentur, verum etiam characteres generum ex floris fructusque analysi petendi repraesententur (praesertim quum id nemo aptius, quam qui artificii ad manus est, exsequi potest) atque praeterea naturalia plantarum exemplaria cum imaginibus Blackvvellianis conferenda, quoties possibile erit, procurentur, qua in re supra laudatus Dom. BEVRERVS et Dom. MARTINVS GERHARDVS BVSCHMANNVS, Officinae pharmaceuticae Kellnerianae Prouisor praestantissimus, saepissime succurrunt, id quod silentio praeterire nefas esset.

Quod reliquum, necessarium esse duxi, huic praefationi annectere indicem omnium operum eorumque editionum, quas haecenus in elaborata expositione citavi paucissimis vero tantum verbis indicaui, vt illis, qui eadem euoluent, nullum dubium relinquatur. Et quum sperarem, catalogum eorum herbariorum, quae mox post typographicae artis inuentionem excusa postea vero saepissime recusa sunt, & quorum iam ab initio huius praefationis mentionem feci, etsi non omnibus necessarium & vtilem, nonnullis tamen gratum & iucundum fore: eundem etiam subiunxi, praesertim quum non solum haec opera, verum etiam plurimas eorum editiones, ipsa mea librorum collectio continet, ideoque mihi occasionem praebet, accuratorem de iisdem relationem et comparisonem suppeditandi, quam quidem hucusque ab aliis factam esse reperi. Apparatus plurium antiquorum herbariorum a Germanis elaboratorum, quem mea collectio pariter sufficiebat, excitabat me, vt de his quoque ad annum MDL. vsque breuem recensitionem suppeditarem eamque variarum editionum, quae ad manus erant, collatione quodammodo illustrarem et ita indicarem, quantum renouata stirpium cognitio Germanis debeat. Ne autem auxilia ab exteris eodem temporis decursu praestita silentio penitus praeterirem, consilium tandem cepi, haec pariter enumerandi. Hinc quidem catalogus huius contra scopum ab initio praefixum prolixior factus eiusque elaboratio praetero pinionem tardius absoluta est; nihilominus tamen spero, nonnullis me gratum praestitisse officium. Ceterum aequitas cuiusuis censoris sperare me iubet, eum studium potius, quo publico inferuire cupio, quam modum, quo id exegi, consideraturum esse. Dabam Norimbergae ipsis Calendis Iunii c1710ccclii.

mochten, wird aufgeholfen werden, wie solches schon der gute Anfang, der nächstens im Druck erscheinen soll, genugsam bezeuget. Ob ich nun aber schon in so weit künftig keinen Antheil mehr an der Ausfertigung dieses Werkes habe; so werde ich doch (zumalen solches von niemand, als der dem Künstler bey Handen ist, füglich geschehen kan) nicht unterlassen, ferner dafür zu sorgen, daß sowohl die Verbesserung der Figuren, wo es nöthig ist, als auch die Abbildungen der Geschlechts-Zeichen in den zergliederten Blüthen und Früchten, desto genauer nachgeahmet, und dazu, wo es nur möglich ist, dem Künstler die Muster der Natur verschaffet werden, worinnen vorbelobter Herr Beurer und Herr Martin Gerhard Buschmann, der hiesigen Kellnerischen Apothecke angesehener Provisor, vielfältig behülflich ist, welches zu verschweigen unbillig wäre.

Im übrigen habe ich noch für nöthig befunden, nach dieser Vorrede dieienigen Schriften und ihre Ausgaben, deren ich mich in der bisherigen Erklärung bedienet und nur mit wenig Worten angezeigt habe, weitläufiger anzuführen, damit denienigen, die solche nachschlagen wollen, aller Zweifel benommen werde. Und weil ich hoffte, daß ein Verzeichnis der anfangs dieser Vorrede gemeldten ersten gedruckten Kräuter-Bücher und ihren so oftmals wiederholten Auflagen, ob schon nicht allen nöthig und nützlich, doch einigen angenehm seyn möchte, verfertigte ich auch davon einen besondern Catalogum zumalen die meisten derselben in meiner eigenen Bücher-Sammlung sich befinden, und ich also eine genauere Nachricht und Vergleichung, als bisher geschehen ist, mittheilen konnte. Der Vorrath, den ich von noch mehr alten von Teutschen ausgefertigten Kräuterbüchern in meiner Sammlung fand, verleitete mich, auch von diesen bis auf das Jahr 1550. eine kurze Nachricht zu geben und diese durch Zusammenhaltung der in Handen habenden unterschiedlichen Ausgaben einiger massen zu erläutern, um zu zeigen, was man den Teutschen in der erneuerten Erkenntnis der Gewächse zu danken habe. Damit ich aber die zu gleicher Zeit von den Ausländern geleistete Behülfe nicht gänzlich übergienge, faste ich endlich den Entschlus, auch diese anzuzeigen. Dadurch ist zwar diese Verzeichnis wider den ersten Vorsatz weitläufiger und die Ausfertigung länger, als ich vermuthete, verzögert worden; ich hoffe aber gleichwohl, einigen einen gefälligen Dienst geleistet zu haben. Ubrigens versehe ich mich zu der Billigkeit eines jeden, daß er mehr das Verlangen, den gemeinen Nutzen zu befördern, als die Art, wie ich solche ausgeführet habe, beurtheilen werde.
Nürnberg den 1. Juny 1752.

D. CHRISTOPHORVS IACOBVS TREW.

CATA-

I.

CATALOGVS AVCTORVM,

ad quorum opera, plerumque paucis litteris indicata, horumque editiones provocatur. Quibus * praefixus est, rarius citantur. Nonnullis variarum editionum, quas ipsemet possideo, brevis quoad differentiam primariam recensio annectitur.

- * *Anguill.* Semplici di M. LVIGI ANGVILLARA da Giov. Martinello mandati in luce. In Vinegia appr. Vincenzo Valgrisi 1561. 8. pagg. 304. ind. pagg. 32.
- C. B. pin. CASP. BAVHINI Pinax theatri botanici. Basil. impensis Io. Regis 1671. 4. mai. Prior editio ibid. typis Lud. Regis anni 1623. excusa paginis quidem usque ad appendicem respondet, sed huius appendicis contenta in posteriore editione suis locis inserta sunt.
- J. Baub. IO. BAVHINI Historia plantarum. Ebroduni 1650. pagg. 601. et 440. icon 692. T. II. pagg. 1074. (praeter pag. 398. quindecies numeratam) ic. 1436. et III. pagg. 212. et 882. ic. 1449. ibid. 1611. fol. conf. praefatio anteced. p. 3.
- * *Blackst.* I. BLACKSTONI specimen botanicum, quo plantarum plurium rariorum Angliae indigenarum loci natales illustrantur. Londini typ. Guil. Faden 1746. 8. pagg. 106. tabb. aen. 2. agarici et fungi.
- Boerb. I. HERM. BOERHAAVE Index alter plantarum, quae in horto Academico Lugduno Batavo aluntur. Pars prima Lugd. Bat. sumt. Auct. prostat. ap. Petr. van der Aa 1720. 4. pagg. 320. ic. 12. praemiss. pagg. 38. Primus EIVSDEM Index ap. Corn. Boutenstein 1710. 8. prodiit pagg. 278. praemiss. pagg. 14.
- Boerb. II. — — — &c. pars secunda. ibid. 1720. 4. pagg. 270. ic. 27. ind. pagg. 18.
- * *Bross.* Description du Jardin Royal de plantes medicinales &c. par GUY de la BROSSE, à Paris 1636. 4. pagg. 107. tab. aen. magna horti ichnographiam exhibens.
- Brunf. OTH. BRVNNELSII Herbarium tomis tribus absolutum. Argentor. apud Io. Schottum 1539. fol.
- Brunf. Krb. Contrafayt Kreütterbuch &c. durch OTHO BRVNNELS. Straßburg bey Hans Schotten 1532. fol. Ander Teyl ibid. 1537. Huius et antecedentis latini operis eiusque variarum editionum fusiorem recensionem vide Catalog. sequ. art. VII.
- Caesf. ANDR. CAESALPINI de plantis libri XVI. Florentiae ap. Ge. Marescottonum 1583. 4. pagg. 621. Appendix ad libros de Plantis et quaestiones peripatheticas Romae ap. Aloyf. Zannettum 1603. pagg. 32.
- * *R. I. Cam.* RVDOLPH. IAC. CAMERARII observatio de Spinachia et Vrtica androgynis inserta Ephem. Ac. Caesf. N. G. dec. III. p. 485. seqq.
- Cam. Ep. IOACH. CAMERARII de Plantis Epitome PETR. ANDR. MATTHIOLI. Francof. 1586. 4. mai. Huius operis duo possideo exemplaria, unum titulo contractiori, alterum fusiori cum eodem loco et anno adscripto. Satis notum tam est, quantum haec editio ob copiam et praestantiam figurarum praesferenda sit primae editioni, quae hoc titulo prodiit: PETR. ANDR. MATTHIOLI compendium de plantis omnibus &c. Venetiis in officina Valgrisiana 1571. 4. SEGVIERIVS biblioth. bot. p. 121. huius quoque compendii digestionem adscribit CAMERARIO eiusque alterius editionis Venetiis a. 1586. in 4. recusae mentionem facit, procul dubio hanc Venetianam editionem anni 1571. (ubi Camerarii vestigium nullum reperitur) cum Francofurtensi indicata confundens.
- * *Cam.* Krb. EIVSDEM Kreutterbuch MATTHIOLI Edit. II. Francof. 1590. apud Io. Feyrabend, sumpt. Petr. Fischeri et Henr. Dacken haeredum. fol. Haec editio aliquot figuris auctior est illa ibid. a. 1586. primum excusa, cuius iterum duo possideo exemplaria, unum titulo contractiori et figuris (quemadmodum reliquae editiones) ornato, alterum fusiori sine his tituli ornamentis: ceterum hae et sequentes ibid. 1600. 1611. et 1626. recusae paginis respondent. SEGVIERIVS in biblioth. bot. supplem. plantis Veronenfibus addito p. 27. mentionem facit versionis Bohemicae Francof. 1596. in fol. editae, quam nondum vidi.
- * *Cam. Hort.* EIVSD. Hortus medicus et philosophicus. ibid. 1588. 4. pagg. 184. tabb. aen. 47. fig. 49.
- Clusf. CAR. CLVSII Plantarum rariorum historia. Antv. ex offic. Plantiniana ap. Io. Moretum 1601. fol. pagg. 364. et CCCXLVIII. figg. 1110, fungor. 40., plantar. montis Baldi 16. Plusquam dimidiam harum figurar. partem egregius hic auctor antea publicavit hoc titulo: CAR. CLVSII rariorum aliquot stirpium per Hispanias observatarum historia. Antwerp. ex officina Chr. Plantini 1576. 8. pagg. 529. ic. 233. et EIVSDEM rariorum aliquot stirpium per Pannoniam, Austriam et vicinas quasdam provincias observatarum historia ibid. 1583. 8. pagg. 766. ic. 358. app. pagg. 8. ic. 2. Postea accesserunt EIVSDEM exoticorum L. X. ex officina Plantiniana Raphelingii 1605. fol. pagg. 378. (quibus et adhuc aliis 52. pagg. simul comprehenduntur G. ab HORTO, a COSTA et MONARDI tractatus a CLVSIO latius donati) ic. 278. ex quibus vero 55. ad regnum animale vel minerale pertinent reliquae etiam maximam partem fructus, radices, ligna repraesentant: addita sunt CLVSII altera appendix pagg. 26. ic. 19. ut et BELLONII scripta translata pagg. 242. ic. 46. ex quibus autem 14 tantum vegetabilis regni producta sunt. Denique prodiit opus posthumum, nimirum EIVSDEM Curae posteriores ibid. 1611. fol. pagg. 71. ic. 41 stirp. cum 3. animalium.
- * *Col.* FABII COLVMNAE minus cognitarum rariorumque stirpium in φρασίς &c. Romae apud Iacobum Mascardum 1616. 4. pagg. 340 et LXXIII. tabb. aen. 102. figg. 157. animal. tabb. 12.
- * *Col.* stirp. EIVSDEM minus cognitarum stirpium pars altera ibid. 1616. 4. pagg. 99. tabb. aen. 29. figg. 46. anim. tab. 1.
- * *Col.* EIVSDEM οὐτοβανος siue plantarum aliquot historia. Neapoli ex offic. Horat. Saluiani ap. Io. Iac. Carlinum et Ant. Pacem 1592. 4. pagg. 120. et 32. tabb. aen. 33. figg. 35. et 4. eiusdem plantae sub alio habitu, ut et animal. tabb. 5. Prodiit id in opus cum adnotationibus IANI PLANCI Florentiae 1744. 4. mai. pagg. 134. tabb. iisdem, sed figurarum nitore, procul dubio ex usu repetito, paululum cedentibus.

- * *Cord. in Diosc.* VALERII CORDI annotationes in DIOSCORIDIS de medica materia libros V. &c. Argent. excudit. Ios. Rihelius 1561. fol.
- Cord. Hist.* EIVSDEM historiae stirpium Lib. III. &c. prodierunt cum antecedenti; EIVSDEM vero stirpium descriptionis liber quintus ut et emendationes et additiones in opera VALERII CORDI ibid. a. 1563. accesserunt.
- * *Corn.* IAC. CORNVTI Historia Canadensium plantarum. Parisiis apud Sim. le Moyne 1635. 4. mai. pagg. 238. tabb. aen. 68. figg. totidem.
- * *Dale.* SAMVEL. DALEI Pharmacologia &c. Lugd. Bat. imp. Io. Arn. Langerack 1739. 4. mai. Dalech. vid. Lugd.
- Dill.* IO. IAC. DILLENII Catalogus plantarum sponte circa Gissam nascentium. Impens. Auctoris Francof. ap. Io. Maxim. a Sande, 1719. 8.
- * *Dill.* N. G. EIVSDEM noua plantarum genera, quae continet appendix prioris libri.
- * *Dill.* H. Elth. Hortus Elthamensis, seu plantarum rariorum, quas in horto suo Elthami in Cantio coluit Iac. SHERARD &c. auctore IO. IAC. DILLENIO. Londini sumpt. Auctoris 1732. fol. reg. pagg. 438. tabb. aen. 324. figg. 417.
- Dod.* REMBERTI DODONAEI stirpium historiae pemptades sex. Antwerp. ex officina Plantiniana ap. Balth. et Io. Moretos 1616. fol. pagg. 872. ic. 1330. Idem opus iam prodit ibid. 1584. in fol. pagg. 860. ic. 1309. posterior ergo editio 21. figuris (LINNAEVS numerat 36.) auctior est. Prostat autem hoc opus etiam in bataviam linguam traductum hoc titulo: Cruydtboeck REMBERTI DODONAEI volghens syne laetste verbeteringhe &c. T. Antwerpen in de Plantynsche Druckerye van Balth. Moretus 1644. fol. mai. Haec editio eodem ordine, ac posterior latina, huius figuras omnes continet, exceptis 3. omissis et 21. mutatis; inserta autem non solum sunt hinc inde 43. additae, verum etiam accessit p. 1364—1492. appendix 97. icones stirpium, fructuum, radicum et lignorum exoticorum ex CLVSII operibus potissimum mutuatas continens. Editae autem sunt huius Auctoris stirpium imagines iam antea hoc ordine: 1) de frugum historia liber vnus. EIVSD. epistolae duae: vna de farre, chondro, trago, ptisana, crimno et alica; altera de zytho et cereuisia. Antuerpiae ex offic. Io. Loei 1552. 8. pagg. 78. (auctoris non numeratis) figg. 36. et auctoris imago. Epist. p. 83—94. 2) trium priorum de stirpium historia commentariorum imagines vnacum indicibus, graeca, latina, officinarum, germanica, brabantica gallicaque nomina complectentibus. Ibid. 1553. 8. pagg. 439. figg. totidem, praef. pagg. 6. 3) posteriorum trium de stirpium historia commentariorum imagines vnacum marginalibus annotationibus; item EIVSD. annotationes in aliquot prioris tomi imagines &c. ibid. 1554. 8. pagg. 302. figg. 274. quibus icones frugum no. 1. insertae sunt. 4) de stirpium historia commentariorum imagines in duos tomos digestae, supra priorem editionem multarum nouarum figurarum accessione locupletatae ac postremo recognitae. Accessere in vtriusque tomi imagines annotationes. Ibid. 1559. 8. Prioris tomi prima tantum plagula seu pagg. 16. differunt ita, ut ipse index usque ad pag. dictam auctior sit; posterioris vero tomi index totus recusus et auctus est, contenta quoque p. 274 (seu vltimae primae editionis) mutata sunt et hic tomus ad p. 445. ampliatus et 134. nouis figuris auctus est, ceterum autem, uti prior, non differt, quare vtrique index erratorum prioris editionis hic quoque apparet. 5) Histoire des plantes, contenant la description des herbes, leurs especes &c. traduit de bas allemand en françois par CHARLES DE L' ECLVSE (CLVSIVS) &c. ibid. 1557. fol. vid. SEGV. biblioth. p. 57., qui liber vero nondum ad meas peruenit manus. 6) Frumentorum, leguminum, palustrium et aquatiliu herbarum ac earum, quae eo pertinent, historia. Additae sunt imagines viucae recens expressae &c. ibid. ex offic. Chr. Plantini 1556. 8. pagg. 271. ic. 85. quae omnino recens exsculptae et meliores sunt. 7) idem liber eodem titulo ibid. 1569. 8. pagg. 293. ic. 89. expositione ergo et figuris auctus est. 8) Florum et coronariarum odoratarumque nonnullarum herbarum historia. Altera editio ibid. 1569. 8. pagg. 309. ic. 109. Prima editio, quam nondum possideo, a. 1568. prodit, teste SEGVIER. l. c. 9) Purgantium aliarumque eo facientium, tum et radicum, conuoluulorum ac deleteriarum herbarum historiae Libri III. Accessit appendix stirpium ac florum peregrinorum, itemque umbelliferarum &c. ibid. 1574. 8. pagg. 376. ic. 140. app. p. 377—505. ic. 81. 10) Historia vitis vinique et stirpium nonnullarum aliarum, item medicinalium obseruat. exempla. Coloniae ap. Maternum Cholinum 1580. 8. pagg. 46. stirp. (18) hist. p. 47—96. obs. med. p. 97—168.
- Dorst.* THEODORICI DORSTENII Botanicon. Francofurti excudit Chr. Egenolphus 1540. fol. Plura vid. Cat. seq. art. XI.
- * *Durant.* Herbario nuovo di CASTORE DVRANTE &c. In Roma per Jacomo Bericchia et Jac. Tornierii 1585. fol. Huic editioni paginis 492. et icon. 965. respondent illae Venetiis 1602. et 1617. recusae.
- * *Fabreg.* Description des plantes, qui naissent ou se renouellent aux environs de Paris &c. par M. FABRE-GOU Tom. I. à Paris chez Jaq. Lambert &c. 1734. 12. mai. pagg. 354. praef. 24. T. II. ibid. 1736. pagg. 358. Praef. 44. T. III. pagg. 248. praef. 37. et IV. pagg. 312. ibid. 1739. T. V. pagg. 304. et VI. pagg. 471. ibid. chez Giffey 1740.
- Fuchf.* LEONHARDI FVCHSII de historia stirpium commentarii. Basil. in offic. Isingriniana 1542. fol. mai. Plura vid. Catal. seq. art. X.
- * *Garidel.* Histoire des plantes, qui naissent aux environs d' Aix &c. par Mr. GARIDEL. Imprimé à Aix et se vend à Paris chez Charles Osmont 1723. fol. pagg. 522. praemiss. pagg. XLVII. tabb. aen. praeter frontispicium aeri pariter incisum, 100. figg. totidem. Numeri tabulis adsculpti indicant quidem 117; sed deficiunt 16. 24. 26. 31. 41. 43. 66.—70. 82. 86. 88. 92. 93. 95. 105. 115. adeoque vnde viginti, atque hae ipsae non solum in meo exemplari, verum etiam in illo supralaudati BEVRERI, et quum SEGVIERIVS p. 71. pariter 101. (computato procul dubio frontispicio) tantum icones indicet, concludere licet, reliquas nunquam fuisse sculptas.
- Gerard.* The Herball or generall historie of Plantes by JOHN GERARDE, enlarged and amended by THOM. JOHNSON. London by Adam Islip, Joice Norton and Richard Whitakers 1636. fol. pagg. 1630. ic. 2821. praemiss. pagg. 35. ind. pagg. 46. Haec aucta editio nomine Gerardi emaculati plerumque citatur.
- Gesn.* H. CONR. GESNERI de hortis Germaniae liber. Prodit cum VAL. CORDI annotationibus &c. vid. Cordus * Gesn.

- * *Gesn. st. coll.* EIVSDEM de stirpium collectione tabulae &c. per CASP. WOLPHIVM, Tiguri in officina Fro:
Gesn. tab. coll. schouiana 1587. 8. pagg. 146. auctoris non numeratis. Primum editae sunt ab ipso GESNE-
 RO cum DAV. KYBERI lexico rei herbariae trilingui Argentor. ap. Wendel. Rihelium 1553. 8. a. p. 467. ad 548.
- * *Guiland Th.* MELCH. GVILANDINI apologiae aduersus P. A. MATTHIOLVM liber primus, qui inscribi-
 tur Theon. Patauii apud Percacchium 1558. 4.
- Hall.* ALBERTI HALLERI Enumeratio methodica stirpium Helvetiae indigenarum. Tom. I. et II. Goettin-
 gae ex offic. Abr. Vandenhoek 1742. fol. mai. pagg. 794. praemiss. pagg. 36. tab. aen. 24. icones 77.
- Heist. I.* LAVR. HEISTERI Index plantarum rariorum atque officinalium, quas a. 1730. in hortum Acad. Iu-
 liae intulit. 8. pagg. 40.
- Heist. II.* EIVSDEM designatio plantarum, quibus a. 1731. hort. Ac. Iuliae auxit. 8. pagg. 32.
- Heist. III.* EIVSDEM catalogus plantarum, quibus a. 1732. hortum Acad. Iuliae iterum auxit. 8. pagg. 24.
- Heist. IV.* EIVSDEM Enumeratio plantarum, quibus a. 1733. hortum Acad. Iuliae denuo auxit. 8. pagg. 16.
- Heist. syst.* EIVSDEM systema Plantarum. Helmstadii typ. Drimbornii 1748. 8. mai. pagg. 48.
- Herm.* PAVL. HERMANNI Horti Academici Lugduno Bataui Catalogus &c. Lugduni Bat. apud Corn. Bou-
 H. L. B.] testeyn 1687. 8. mai. pagg. 699. tabb. aen. 107. Prostat eadem editio ibid. ap. Farnsonios a. 1720.
 hoc titulo: Index Plantarum, quae in horto Academico Lugduno Batauio aluntur &c. cui loco dedica-
 tionis et admonitionis, praefixa est horti Lugduno-Bataui historia pagg. 16, sola recens excusa.
- Heuch. Ind.* IO. HENR. HEUCHERI Index plantarum Horti medici Academiae Vitembergenfis. Vitember-
 gae sumpt. et typ. Christ. Gerdesii 1711. 4. pagg. 54.
- Heuch. Pr. I.* EIVSDEM noui prouentus Horti medici Acad. Vitemb. ibid. apud eundem 1711. 4. pagg. 87. ic. 1.
- Heuch. Pr. II.* EIVSDEM noui prouentus &c. ibid. ap. Io. Lud. Meiselim 1713. 4. pagg. 60. ic. 1. Quoniam RIVI-
 NVS plantarum flore regulari tantum figuras et nomina specifica exhibuit, HEUCHERVS vero secundaum
 systema Riuiianum plantas flore regulari quoque recensuit, hic in supplementum dicti systematis citatur.
- Hist. Ox. II.* Plantarum historiae vniuersalis Oxoniensis &c. auctore ROBERTO MORISON tomus secundus.
 Oxonii e theatro Scheldoniano 1715. fol. mai. pagg. 617. tabb. aen. 128. ic. 1374. praemiss. pagg. 6. Ind. pagg. 3.
- Hist. Ox. III.* — — — — — &c. tomus tertius. ibid.
 1715. pagg. 657. tabb. aen. 166. ic. 2212. praemiss. pagg. 22. Ind. pagg. 9. conf. praef. nostra p. 3.
- * *Hofm.* CASPARI HOFMANNI de medicamentis officinalibus libri duo &c. Lutetiae Parisiorum apud Gasp.
 Meturas 1646. 4. mai.
- * *Hoffm. Fl. Alt.* MAVRICII HOFFMANNI Florae Altorfinae deliciae syluestres &c. Altd. typ. Henr. Meyeri
 1677. 4. Huic editioni nouus titulus nouaque dedicatio praefigebatur et duae paginae, 36. nouas plan-
 tas recensentes, addebantur: ceterum a prima editione ibid. typ. Ge. Hagen a. 1662. excusa non differt.
- * *H. Chelf.* ISAACI RAND Horti medici Chelseani index compendarius Lond. sumpt. Auct. impr. Guil.
 Strahan et proft. ap. Io. Whiston 1739. 8. mai. pagg. 214.
- H. Eyst.* Hortus Eystettenfis opera BASILII BESLERI 1613. folio maximo plagg. seu foliis 395. dedic. priuile-
 &c. pl. 8. indices 4. class. pl. 19. tabb. aen. 365. icon 1086. Acced. frontispicium et 4. classium tituli aeri
 pariter incisa. Alterum exemplar eodem titulo prodiit, omisso tamen Besleri nomine et aduersis: curis
 secundis anni MDCXL, in quo descriptiones omissae, quartae etiam classis stirpes hiemales vel vernis
 vel autumnalibus insertae, reliquae vero singulae nouo et meliori nominum indice instructae sunt, cuius
 curam, ut ex dedicatione noua colligendum, CARVLVS BERTIVS gessit. Adhuc aliud possideo ex-
 emplar prius iam in publicum editum hac inscriptione: Icones siue repraesentatio viua florum et her-
 barum opera BAS. BESLERI, Philatri et Pharmacopoei Norici, in gratiam herbarum cultorum noui-
 ter accurata diligentia promulgata: hortorumVM Dona et Virtutes nosCere VirtVs est: i. e. a. 1627. in
 quo pariter descriptiones deficiunt et classis plantar. hiem. inter reliquas occurrit, index vero genera-
 lis manu tantum scriptus est: hoc exemplar omnium rarissimum et supposititium videtur: ex dedica-
 tione namque ad IO. CHRISTOPH. Episc. et Princ. Eystett. et IO. CVNRADI a. 1612. iam defuncti (cuius auspiciis
 splendidum hoc opus editum est) successorem a. 1613. data patet, tunc iam tabulas absque descriptione
 impressas fuisse, quarum aliquot exemplaria procul dubio seruauit BESLERVS et titulo peculiari postea
 edidit, reliqua vero Eychstadium misit, quae demum a. 1640 nouo titulo comparuerunt. Vtriusque hu-
 ius editionis tabulis nullus adsculptus est numerus. Quarti denique exemplaris, ad normam primi de-
 nuo recusi, eidem titulo adsculpta sunt: curis Reuerendiss. et Celliss. Episcopi ac S. R. Imperii Principis
 IO. ANTONII MDCCXIII, quae vero editio, noua praefatione I. G. STHENANDRI (STARCKMAN-
 NI) adornata hoc demum anno in publicum prodiit. Tabulae aeneae omnium harum editionum sunt
 eadem, sed primae, ob celaturae primam puritatem et chartae elegantiam, nitidiores.
- H. L. B.* Hortus Lugduno Batauus, vid. HERMANNVS.
- * *H. R. P.* Hortus Regius. Pars prior. Parisiis apud Dionys. Langlois 1665. fol. pagg. 188. app. pagg. 4. Au-
 ctor est DIONYSIVS JONQVET: altera pars non sequuta est.
- * *Hort. Soc.* A catalogue of trees, shrubs, plants and flowers, both exotic and domestic, which are propa-
 gated for sale in the Gardens near London by a Society of Gardeners. London. 1730. fol. mai. pagg.
 90. tit. praef. pagg. XIV. tabb. aen. 21. figg. ad vinum coloratae 57. Est amplioris operis prima tan-
 tum pars; sed continuatio ex dissidio auctorum non sequuta est.
- * *Jussieu.* Histoire des plantes, qui naissent aux environs de Paris, par M. PITTON TOURNEFORT seconde
 edition augmentée par M. BERNARD de JUSSIEU Tom. I. et II. à Paris chez Jean Musier 1725. 12.
 mai. T. I. pagg. 407. Praef. pagg. 116. T. II. p. 528.
- * *Knaut. meth.* CHRISTIANI KNAVT methodus plantarum genuina &c. Lipsiae et Halae in offic. Adami
 Sellii 1716. 8. pagg. 267.
- Kram.* IO. GEORG. HENR. KRAMERI Tentamen botanicum emendatum et auctum, siue methodus Riui-
 Tournefortiana emendata et aucta. Viennae Austriae ap. Leop. Io. Kaliwoda 1744. fol. pagg. 150. cum
 tribus interfertis, tit. dedic. et introductio pagg. 60. tabb. aen. 3. florum, fructuum, foliorum et ra-
 dicum characteres sistentes. Prima editio, cum hac vix comparanda, prodiit hoc titulo: Tentamen
 botanicum siue methodus Riui-Tournefortiana &c. Dresdae typo Io. Guil. Harpeter 1728. 8. mai.
 pagg. 151.

* *Linder*. FRANCO. BALTH. von LINDERN Tournefortius Alsatius &c. Argentor. imp. Heinr. Leonh. Stein 1728. 8. pagg. 160. tit. dedic. &c. pagg. 10. indic. pagg. 16. tabb. aen. 5. ic. 7. Multo auctior postea excusus est hic liber hac inscriptione: Hortus Alsatius &c. conscriptus a FR. BALT. von LINDERN. ibid. impens. Io. Beckii 1747. 8. pagg. 302. praemiss. pagg. 16. ind. p. 74. tabb. aen. 12. figg. totidem, omnibus novis, omisis illis prioris editionis.

Linn. G. CAROLI LINNAEI Genera plantarum eorumque characteres naturales &c. Editio secunda aucta et emendata. Lugd. Bat. ap. Conr. et Ge. Iac. Wishoff 1742. 8. pagg. 527. gen. 1021. praemiss. pagg. 42.

* *Linn*. G. I. EIVSDEM Genera plantarum ibidem 1737. 8. pagg. 384. Gen. 935. cum tabula aen. classium characteres delineante. Acc. EIVSD. corollarium ibid. 1737. pagg. 26. gen. 936—994. et methodus sexualis pagg. 23. Haec prima editio tunc tantum citatur, quando generis nomine a secunda differt.

Linn. H. Cl. EIVSDEM Hortus Cliffortianus. Amstelædami 1737. fol. mai. pagg. 502. praemiss. pagg. 38. tabb. aen. 32.

* *Linn*. H. Vps. EIVSDEM Hortus Vpsalienfis. ibid. ap. I. Wetstenium 1748. 8. pagg. 306. tit. praef. pagg. 10. ind. &c. pagg. 40. tabb. aen. 3.

* *Linn*. Fl. Suec. EIVSDEM Flora Suecica. Lugd. Batav. ap. Conr. et Ge. Iac. Wishoff 1735. 8. pagg. 419. praemiss. pagg. XVI. tab. aen. 1.

* *Linn*. mat. med. EIVSDEM Materia medica, L. I. de plantis. Holmiae typ. et sumpt. Laur. Saluii 1749. 8. pagg. 252. praemiss. pagg. 32. tab. aen. 1.

* *Lob. Hist.* Plantarum seu stirpium historia MATTHIAE de LOBEL. Antuerpiae ex offic. Chr. Plantini 1576. *Lob. Obs.* fol. pagg. 671. ic. 1495.

* *Lob. Adv.* Stirpium aduersaria noua auctoribus PETRO PENA et MATTH. de LOBEL. Fol. pagg. 456. ic. 273. Post p. 456. accedit plagula, cuius utraque pagina sistit descriptiones et icones Mechoacae, plantae cutusdam marinae anonymae, Conchae anatiferae et Lithoxyli anglici, quibus subscriptum legitur: Londini excudebat prelum Thom. Purfootii 1571, itemque alia cum arboris Chisti Ledi folio et copioso mendorum typographicorum indice. Haec eadem editio, noua tantum tituli plagula praefixa, comparuit annexa LOBELII historiae Antw. a. 1676. editae, sed remota sunt duo folia vltima accessoria, quorum contenta tamen (exceptis mendis typographicis) ipsi historiae partim p. 545. et 559. inserta, partim sub finem addita sunt. Accesserunt vero huic editioni appendix nonnullarum stirpium p. 457—471. cum 34. figuris, et post indicem duo adhuc folia, 10. aliarum stirpium icones sistientia. Eadem editio iterum prodiit hoc titulo: Dilucidae simplicium medicamentorum explicationes et stirpium aduersaria auctoribus PETRO PENA et MATTH. de LOBEL, quibus accessit altera pars &c. opera et studio eiusdem MATTH. de LOBEL. Londini ex typogr. Th. Purfootii 1605, quam editionem comprehendit liber, cui titulus, MATTH. de LOBEL in G. RONDELLETH officinam animaduersiones. Londini 1605 prelo Th. Purfootii, pagg. 156. cum icones cassiae fistulae, caryophyll. aromaticorum, piperis, zingiberis et stellae marinae, qui liber, tituli tantum plagula mutata, iterum comparuit hac inscriptione: Pharmacopoeia RONDELLETH cum MATTH. LOBELII et LVD. MYREI animaduersionibus et paragraphis &c. Lugduni Batav. ap. Io. Maire 1618. Huic exemplari annexum iterum est folium istud Mechoacae &c. icones continens cum subscripto primae editionis anno 1571, sed loco alterius folii, praeter cisti figuram mendam typogr. sistens, additum est aliud folium cum pagg. numero 456. 457. antecedentis figuras tres vltimas vberiori explicationi illustrans; appendices autem editionis Antverpianae desunt. Quod autem primarium huius editionis est, accessit illi altera aduersariorum pars peculiari hoc titulo: M. de LOBEL aduersariorum altera pars, cum prioris illustrationibus, castigationibus et auctariis, rariorum aliquot stirpium &c. delineationibus &c. balsami, opobalsami, xylobalsami &c. explanationibus &c. pag. 458.—549. ic. 39. quibus accedunt aliae tres, una fruticis balsami, et duae arboris molle dictae, in una tabula iunctae. Prodiit autem hic de balsamis tractatus antea sigillatim hac inscriptione: Balsami, Opobalsami et Xylobalsami cum suo cortice explanatio. Interprete et auctore M. de LOBEL. Londini excudebat Arnold. Hatfield, impens. Io. Norton 1598. 4. pagg. 40. ic. 5. quae fruticem balsami, racemi arboris molle cum fructibus maturis et duobus foliis appositis, eiusdem plantulam trimestrem ex semine natam, itemque ramum ex CLVSIO, et denique zingiberis plantam cum radice, omnes separatim et paullo maiores sistunt, altera vero Aduersarior. icon rami florentis arboris Molle hic non reperitur. Praeterea et Historiae et Aduersariorum icones aliaeque in unum volumen congestae et belgica lingua expositae prodierunt hoc titulo: Kruidtboeck oft Beschryvinghe van allerleye Gewassen &c. deur MATTHIAS de LOBEL. T' Antwerpen by Christoffel Plantyn 1581. Fol. pagg. 994. ic. 1619. P. II. pagg. 312. ic. 526. succed. et indic. pagg. 80. app. pagg. 3. ic. 8. Ceterum ad haec opera adhuc pertinent: EIVSDEM stirpium illustrationes &c. accurate GVIL. HOW. Londini typis Th. Warren, impensis Ios. Kirton 1655. 4. pagg. 175.

Lob. Plantarum seu stirpium icones. Antwerp. 1581. 4. forma oblonga. T. I. pagg. 816. ic. 1615. T. II. pagg. 280. ic. 558. Eadem editio postea prodiit hoc Titulo: Icones stirpium seu plantarum tam exoticarum quam indigenarum, ibid. 1591, quae non, nisi nouo titulo et adiuncto 7. linguarum indice a prima differt. Continet hoc opus icones omnes et eodem ordine (paucis translocatis) in opere praecedenti belgica lingua eodem anno excusi, sed solis nominibus adscriptis. Titulus quidem auctorem non indicat, eius tamen mentionem facit dedicatio.

* *Loefel.* Flora Prussica, siue plantae in regno Prussiae sponte nascentes, quarum catalogum et nomina IO. LOESELIVS olim differuit, curante IO. GOTTSCHED. Regiom. 1703. sumpt. typographiae Georgianae 4. pagg. 294. tit. dedic. &c. pagg. 8. index germanic. et lat. pagg. 80. tabb. aen. 83. figg. 85. Prima editio hac inscriptione frontispicio aeri inciso insculpta prodiit: Plantas in Borussia sponte nascentes e manuscripto parentis mei diuulgo IO. LOESELIVS Io. filius 1654. sine loci et typographi nomine et sine figuris 4. pagg. 83. ind. lat. et germ. pagg. 11.

* *Lonic. Hist. nat.* Naturalis historiae opus nouum per ADAMVM LONICERVUM. Francof. ap. Chr. Egenolphum. Fol. 1551. teste dedicatione, foliis 352. seu pagg. 703. icon. 627. app. pagg. 2. ic. 4. T. II. ibidem. Fol. 1555. iterum indicante dedicatione, foliis 59. seu pagg. 118. icon. 92. onomast. et ind. pagg. 52.

Lonic. Krb. ADAMI LONICERI vollstændiges Kräuterbuch &c. ehedem von PETRO VFFENBACHIO vermehret

mehret &c. aniezo aber mit einer Zugabe begleitet von BALTHASAR EHRHART &c. Ulm verl. Dan. Bartholomaei und Sohn, 1737. fol. pagg. 750. icon. stirp. 840. *Addisamentum peculiari titulo instructum pagg. 136. comprehendit non solum breuem commentationem in LONICERI herbarium, verum etiam recensionem praecipuorum remediorum in regno vegetabili a recentioribus detectorum, utramque ex propriis observationibus et probatissimis auctoribus collectam. Plura de utroque LONICERI opere vid. cat. fig. artic. XI.*

Luduv. CHRISTIANI GOTTLIB LUDWIG definitiones generum plantarum auctae et emendatae. Lipsi. ap. Io. Frid. Gleditschium 1747. 8. pagg. 316. praemiss. pagg. 16. ind. pagg. 28. *Prima editio alia ratione composita prodit ibid. 1737. 8. mai. pagg. 144. praemiss. pagg. 16. ind. pagg. 16.*

Lugd. Historia generalis plantarum. Lugduni ap. Guil. Rouillium 1587. fol. mai. Vol. I. pagg. 1095. fig. 1451. Vol. II. pag. 1097—1922. figg. 1248. App. pagg. 36. figg. 52. *IACOBVM DALECHAMPIV auctorem esse huius operis postea a IOANNE MOLINEO ampliati, indicat praefatio ut et alia eiusdem editio in linguam gallicam traducta hoc titulo: Histoire generale des plantes, contenant XVIII livres en deux Tomes: tirée de l'Exemplaire latin de la bibliotheque de Mr JAQVES DALECHAMP, puis faite françoise par Mr. JEAN DES MOULINS. Dernier edition reveuë, corrigée et augmentée de plusieurs plantes et figures, qui manquoient dans les precedentes &c. à Lyon chez Phil. Borde, Laur. Arnaud, et Cl. Rigaud 1653. fol. Vol. I. pagg. 960. figg. 1473. Vol. II. pagg. 758. figg. 1279. conf. praefat. nostra p. 2.*

**Magn. Bot.* PETRI MAGNOL Botanicum Monspeliense. Lugd. ex Officina Franc. Carteron, imp. Franc. Bourly 1676. 8. pagg. 287. ic. 23. app. p. 289—309. app. alt. pagg. 2. *Editioni Monspeli ex officina Dan. Pech. imp. Paul Marret 1686. excusae nouus tantum titulus praefixus est; deficit autem altera appendix.*

**Magn. H. R. M.* EIVSDEM hortus regius Monspeliensis. Monspeli apud Honoratum Pech 1697. 4. minor. pagg. 209. praemiss. pagg. 16. tabb. aen. 21. ic. 24.

**Magn. char.* EIVSDEM nouus character plantarum, opus posthumum ab Auctoris filio in lucem editum, Monspeli ap. viduam Hon. Pech 1720. 4. pagg. 340.

Matth. PETRI ANDR. MATTHIOLI Commentarii in VI. libros Dioscoridis. Venetiis ex officina Valgrifiana 1565. fol. mai. pagg. 1459. praemiss. pagg. 170. effig. auctoris et icones plantar. 932. *Huius editionis figurae, ob magnitudinem et artificiosam repraesentationem, praeferendae sunt omnibus in reliquis huius auctoris operibus contentis. Paratae autem sunt maximam partem sumtibus Magnatum in Germania, ubi primum prodierunt in opere bohemica lingua exposito et a. 1562. Pragae excuso. quod recenset D. de HALLER in Praef. operis Weinmanniani §. XVII, quodque anno sequenti in Germanicam linguam versum prodit hoc titulo: New Kreüterbuch von PETRO MATTHIOLO in latein gestellt, durch GEORG HANDSCH verdeutscht. Gedruckt zu Prag durch Ge. Melantrich von Aventin auff sein und Vincenti Valgriffs Buchdr. zu Venedig Uncoften. 1563. fol. mai. foliis 575 seu pagg. 1149. praemiss. 76. imago auctoris et ic. plant. 810. non computatis plusquam 10. eandem plantam ab alia facie sistentibus. Num haec editio a bohemica differat, nescio. Agit tantum de plantis et alio ordine exposita est, quam latina, quae secundum DIOSCORIDIS libros sex disposita, praeter animalium et mineralium figuras has omnes plantarum imagines, aliasque 122. additas et 8 emendatas vel saltem mutatas continet, atque praeterea haud raro nomina plantarum alia indicat. Has editiones plures aliae iam praecesserunt, quarum SEGVIERIVS biblioth. bot. p. 120. sequ. septem, et modo indicatas sequuntur (praeter CAMERARII versionem Germanicam, quam huius nomine supra indicaui) tredecim indicat. Ex his quatuor et alias sex possideo, quae sunt 1) PETR. ANDR. MATTHIOLI commentarii in libros sex PED. DIOSCORIDIS de medica materia Venet. in officina Erasiana apud Vinc. Valgrifium 1554. fol. pagg. 707. praemiss. 46. icon. plant. 506. quae octauam folii partem aequant. 2) I. discorsi di M. PIET. ANDR. MATTHIOLI nei sei libri della materia medicinale di PED. DIOSCORIDE. In Vinegia, nella bottega d'Erasmo, appresso Vincenzo Valgrifi 1555. fol. pagg. 741. praemiss. pagg. 88. icon. 506. eadem. 3) EIVSDEM commentarii secundo aucti in libros VI PED. DIOSCORIDIS &c. His accessit eiusdem apologia aduersus AMATVM LVSITANVM, quin et censura in eiusdem enarrationes. ibid. 1558. fol. pagg. 776. praemiss. pagg. 100. icon. eadem additis 133. eiusdem magnitudinis, adeoque 639. apol. g. pagg. 50. 4) EIVSDEM commentarii &c. iam denuo ab ipso autore recogniti et locis plus mille aucti. Accesserunt quoque ad margines graeci contextus quam plurimi, ex antiquissimis codicibus desumpti, qui DIOSCORIDIS ipsius deprauatam lectionem restituunt. ibid. ex officina Valgrifiana 1570. fol. pagg. 955. praemiss. pagg. 163. icones eadem cum additis eiusdem magnitudinis 936. Harum omnium editionum curam procul dubio habuit auctor: ex illis autem alibi recensis ad manus sunt 5) PED. DIOSCORIDIS de materia medica libri sex innumeris locis ab ANDR. MATTHIOLO emendati ac restituti &c. Lugduni ap. Io. Frellonium 1554. 12. pagg. 564. praemiss. pagg. 29. notar. et indic. curat. pagg. 145. sine iconibus. 6) EIVSDEM commentarii denuo aucti &c. accessit eiusdem apologia aduersus AMAT. LVSITANVM &c. Lugduni ap. Gabriel Cotierum 1562. 4. mai. pagg. 837. praemiss. pagg. 110. icon. 640. quadruplo minores, apol. pagg. 69. 7) Les Commentaires de M. PIERRE ANDRE MATTHIOLI sur les six livres des simples de PED. DIOSCORIDE, traduit de latin en françois (ab ANT. du PINET, Seigneur de Noroy testante dedicatione) (seconde impression &c. a Lyon par la vefue de Gabr. Cotier 1566. fol. pagg. 538. icones numero et magnitudine ut no. 6. eadem, praemiss. pagg. 63. ind. lat. et gall. pagg. 22. 8) eodem titulo traduits de latin en françois par M. ANT. du PINET et de nouveau accrus d'un bon nombre de figures, et reveus et augmentez en plus de mille lieux sur la dernière édition de l'Auteur &c. ibid. 1572. fol. pagg. 606. icon. eadem cum additis eiusdem magnitudinis 838. praemiss. pagg. 124. cum auctoris effigie, ind. pagg. 32. 9) P. A. MATTHIOLI opera quae extant omnia, h. e. Commentarii in VI. Libros PED. DIOSCORIDIS de medica materia, adiectis in margine variis graeci textus lectionibus &c. nunc a CASP. BAVHINO post diuersarum editionum collationem infinitis locis aucti, synonymiis quoque plantarum et notis illustrati, adiectis plantarum iconibus, supra priores editiones, plusquam trecentis (quarum quam plurimae nunc primum describuntur) ad viuum delineatis &c. &c. 1598. folio. pagg. 1027. icon. 1288. praemiss. 116. cum effigie C. Bauhini, ind. pagg.*

22. *Apologiae et reliquis, peculiari frontispicio instructis, subscriptum legitur: Francofurti ex offic. typogr. Nic. Bassaei 1598. pagg. 236. ind. pagg. 6. Huius editionis figurae iterum cum auctoris primis conveniunt, sed omnes recens effigatae et multae Camerarianae Matthioli Epitomes iconum imitationes sunt. 10) eodem titulo editio altera Basil. sumptibus Io. Koenig 1674. quae editio neque contentis neque paginis a priori differt, nova tantum dedicatio accessit.*
- * *Miller. The Gardeners Dictionary &c. by PHILIP MILLER. the third edition corrected, London printed for the Author and sold by C. Rivington 1737. fol. Voluminis II. secunda editio ibid. 1740. Vtrumque Volumen alphabetico ordine conscriptum est, postea vero eorum contenta una serie recensita et recusa sunt hoc titulo: the Gardeners Dictionary &c. by PHIL. MILLER. The fifth edition corrected. Dublin printed by S. Powell &c. 1741. fol. Secundum quod exemplar versio germanica adornata prodit hac inscriptione: das Englische Gartenbuch, oder PHILIPP MILLERS Gärtner-Lexicon &c. übersezt von D. GE. LEONH. HVTH. Erster Theil (A—L.) Nürnberg auf Kosten Jo. Ge. Lochners 1750. fol. pagg. 548. vel potius 528. (typographi enim errore pag. 420. sequitur pag. 441) praemiss. pagg. 14. tabb. aen. 5. Zweyter Theil (M—Z) ibid. 1751. fol. pagg. 620. index angl. et germ. pagg. 20. tabb. aen. 6. ex quibus unica Polygalam Sengavv dictam, tres foliorum et florum variam figuram, reliquae, uti omnes prioris voluminis, ad hortorum culturam pertinentia repraesentant.*
- * *Monti cat. Catalogi stirpium agri Bononiensis prodromus &c. IOSEPHI MONTI. Bononiae studiorum 1719. apud Constant. Pifarri. 4. min. pagg. 66. praemiss. pagg. 28. Ind. pagg. 8. tabb. aen. 3. quarum prima cypri, secunda graminis duas species, tertia locustas et spicas variorum graminis generum repraesentat. Moris. vid. Oxoniens.*
- * *Munt. Oeffen. Waare Oeffening der Planten &c. beschreeven door ABRAHAMVS MVNTING. T' Amsterdams voor Jan Rieuwertsz 1672. 4. pagg. 652. tabb. aen. 40. icon. 52.*
- * *Munt. Aardgevv. Nauwkeurige Beschryving der Aardgewassen &c. door ABRAHAM MVNTING. Te Leyden en t' Utrecht by Pieter van der Aa en Franc. Halma 1696. fol. mai. pagg. 929. praemiss. pag. 36. Ind. pagg. 64. tabb. aen. 243. icon. 262. Eadem icones huius operis, additis duabus tabulis novis, postea absque explicatione, sed accuratiori nomenclatura, prodierunt hoc titulo: AB. MVNTINGII Phytographia curiosa &c. varias denominationes collegit et adiecit FRANCISC. KIGGELAER Amstel. ap. Rod. et Gerh. Wetstenios 1713. fol. mai. expositio pagg. 47. praemiss. pagg. 24.*
- Park. Theatrum botanicum, or an universall and compleate Herball, composed by JOHN PARKINSON. London printed by Tho. Cotes 1640. fol. pagg. 1755. praemiss. pagg. 18. icon. 2716.*
- * *Park. Par. Paradisi in sole paradisi terrestri, or a choise Garden of all sorts of rarest flowers &c. collected by JOHN PARKINSON, the second impressio much corrected and enlarged. London printed by R. N. and are to be sold by Rich. Thrale 1656. fol. pagg. 612. praemiss. pagg. 10. ind. p. 16. tabb. ligno incis. 110. fig. 832.*
- * *Pluk. Phyt. LEONARDI PLUKENETII Phytographia, siue stirpium illustriorum et minus cognitarum icones &c. pars prior Lond. 1691. sumptibus Auctoris. 4. mai. seu fol. min. continet auctoris effigiem et tab. 1—136. figg. 810. Pars altera, ibid. anno eod. continet tab. 137—314 figg. 1015. pars tertia, ibid. 1692. continet tab. 315—454. figg. 890. in summa 2715. Ad hoc opus pertinent 1) EIVSDEM Almagestum botanicum siue phytographiae Plucnetianae onomasticon methodo synthetica digestum &c. adiciuntur et aliquot novarum plantarum icones &c. ibid. 1696. pagg. 402. 2) Almagesti botanici mantissa &c. ibid. 1703. pagg. 192. praemiss. pagg. 12. ind. pagg. 28. 3) EIVSDEM Amaltheum botanicum, i. e. stirpium indicarum alterum copiae cornu &c. ibid. 1705. pagg. 214. praem. pagg. 5. app. et ind. pagg. 10. In sex volumina Londini compacta ita diuisum hoc opus inde accepi. Quum illud primum prodiret, phytogr. P. I. continebat t. 1—72, P. II. t. 73—114. app. t. 115—117. Alt. app. t. 118—120, P. III. t. 121—250, P. IV. (quae a. 1696. una cum almagesto edebatur) t. 251—328, ex quibus autem t. 281. 282. 288. 292. ad. 296. tunc nondum paratae erant, testante Mantissae praefatione. Cum hac mantissa sequebantur t. 329—454. Ita diuisum est exemplar Dom. BEVRERI. Conf. SEGVIERII bibl. bot. p. 149.*
- * *Ponted. IVLII PONTEDERAE Anthologia siue de floribus naturae libri tres &c. accedunt EIVSDEM dissertationes XI. &c. Patavii typis Seminarii 1720. ap. Io. Manfrè 4. pagg. 303. praemiss. pagg. 24. diff. pagg. 296. praemiss. pagg. 12. ind. et tabul. explic. pagg. 54. tabb. aen. maior. 12. variorum generum characteres delineantes, inter quas Chamaeribes tricarpos spinosa folio flabelliformi secundum totum habitum suum repraesentatur.*
- Rand. vid. H. Chelf.*
- Rai. I. Historia plantarum &c. auctore IO. RAI. Tomus primus. Londini typis Mariae Clark, prostant ap. Henr. Faithorne 1686. fol. pagg. 983. praemiss. pagg. 24. Cur consilium de iconibus addendis (cuius ad calcem libri mentio fit) non expletum fuerit, praefatio sub finem indicat.*
- Rai. II. EIVSDEM historiae plantarum tomus secundus cum duplici indice &c. ibid. anno eodem pag. 985—1940. indices pagg. 36. praemiss. pagg. 8.*
- Rai. III. EIVSDEM historiae plantarum tomus tertius, qui est supplementum duorum praecedentium &c. ibid. ap. Sam. Smith et Beni. Walford 1704. pagg. 666. praemiss. pagg. IX. dendrol. pagg. 135. app. pagg. 255. ind. pagg. 6. Conf. praefatio nostra p. 3.*
- Rai. meth. EIVSDEM methodus plantarum emendata et aucta. Accedit methodus graminum, iuncorum et cyperorum specialis. ibid. ap. eosdem 1703. et veneunt Amstelae. ap. Ianssonio-Waesbergios s. mai. pagg. 202. ind. pagg. 26. praemiss. pagg. 32. cum auctoris effigie. Editio Amstelae. ap. Rud. et Gerh. Wetstenios 1710. nonnisi tituli plagula denuo impressa differt; illa vero Londini (Erfordiae ut iam monuit SEGVIERIVS) ap. Christ. Andr. Mynthing 1733. s. recusa paginis non respondet, caret etiam auctoris effigie et dedicatione. Prima editio, (teste LINNAEI biblot. bot.) prodit Londini 1665. s. quam nondum vidi; recusa est ibid. 1682. impensis Henr. Faithorne et Io. Kersey s. min. hoc titulo: methodus plantarum noua synoptice in tabulis exhibita. pagg. 166. praem. pagg. 24. ind. pagg. 34. Huic editioni p. 161—166. annexa est synopsis methodi, qua in suffruticibus et herbis disponendis utitur ANDREAS CAESALPINVS, methodus vero graminum &c. nondum addita est.*
- Rai. syn. EIVSDEM synopsis methodica stirpium Britannicarum &c. Editio III. multis locis emendata et 450. circiter*

circiter speciebus nouiter detectis aucta cum iconibus. Londini impens. Guil. et Io. Innys 1724. 8. mai. pagg. 482. (p. 281-288. bis numeratis et * notatis) tabb. aen. XXIV. fig. 67. praemiss. pagg. 16. ind. &c. pagg. 30. Hanc editionem a DILLENIO adornatam esse constat, licet nec titulus nec dedicatio illum acclaret.

* Rai. syn. II. EIVSD. synopsis methodica stirpium Britannicarum &c. editio secunda &c. acc. RIVINI Epistola de methodo et auct. responsio. Londini impensis S. Smith et B. Walford. 1696. 8. mai. pagg. 346. sine fig. Praemiss. pagg. 37. ind. pagg. 11. Epist. peculiari titulo instructa p. 56. access. porro I. RAI de variis plantarum methodis dissertatio brevis iterum peculiari titulo instructa pagg. 48. praemiss. pagg. 13. Diss. et Epist. in III. editione omissae sunt. Haec editio tantum citata est, ubi DILLENIVS in III. editione alia nomina generica indicauit. Prima editio (teste LINNAEO et SEGVIERIO) excusa est Londini ap. Sam. Smith 1690. 8. pagg. 317.

* Renealm. PAVLI RENEALMI Specimen Historiae Plantarum. Parisiis apud Hadrian Beys 1611. 4. mai. pagg. 150. tabb. aen. 25. ic. 55. tit. dedic. pagg. 3. Ind. pagg. 4.

Riv. I. D. A. Q. R. (i. e. Doct. AVGVSTI QVIRINI RIVINI) Ordo plantarum, quae sunt flore irregulari monopetalo &c. 1690. Lipliae impressus literis Christoph. Fleischneri fol. reg. pagg. 22. cui praefixa est EIVSDEM introductio generalis in rem herbariam. 1690. sumpt. Autoris Lipliae typis Christoph. Güntheri. fol. reg. pagg. 33. praemiss. pagg. 8. cum auct. effigie. Hic ordo comprehendit 125. tabulas et index specierum praefixus pagg. 4. harum indicat 180. In meo exemplari deficit icon Veronicae minima folio serpylli; accesserunt vero 35. aliae species in memorato indice non indicatae, ita ut numerus earum ad 215. ascendat, ex quo patet, post primam harum tabularum impressionem reliquas demum figuras spatiis vacuis relictis a sculptis esse, et proinde exemplaria huius ordinis inter se differre, licet eundem editionis annum praeseferant.

Riv. II. D. A. Q. R. ordo plantarum, quae sunt flore irregulari tetrapetalo. Ibid. 1691. typ. Chr. Fleischneri. pagg. 20. tit. dedic. pagg. 6. index pagg. 4. Hic ordo continet 121. tab. et 164. icones in indice praefixo indicatas.

Riv. III. — — — &c. flore irregulari pentapetalo. Ibid. 1699. typ. Io. Henr. Richteri. pagg. 28. tit. dedic. pagg. 6. ind. pagg. 4. Huius ordinis tab. 139. continent 154. figuras, in meo vero exemplari deficit icon Pyrolae folio rotundo minori in indice indicatae.

Riv. IV. — — — &c. flore irregulari hexapetalo sine loco, anno et descriptione, qui ordo post obitum Auctoris imperfectus in lucem editus est et 17. tabulis 29. figuras sistit.

Roy. ADRIANI van ROYEN Florae Leydenfis Prodrromus &c. Lugduni Batav. ap. Sam. Luchtman 1740. 8. mai. pagg. 538. praemiss. pagg. 72. cum tab. iconogr. horti acad. ind. pagg. 30.

Ruell. De natura stirpium libri III. IO. RVELLIO auctore Basil. 1537. in typographia Frobeniana. fol. pagg. 666. praemiss. cum indicibus pagg. 92. Prima editio Parisiis in offic. Simon. Colinaei 1536. fol. SEGVIERIO p. 172. testante excusa ad meas manus nondum peruenit, alia vero hoc titulo: Prima pars de natura stirpium libri tres, IO. RVELLIO auctore &c. Venetiis ap. Io. Bapt. Pederzanum 1538. 8. pagg. 608. praemiss. cum ind. pagg. 124. Secunda pars IO. RVELLII, Canonici Parisiensis et Medici, de natura stirpium liber II. et III. ibid. anno eodem pagg. 823. Adest etiam In RVELLIUM de stirpibus epitome. Cui accesserunt volatilium, gressibilium, piscium et plantarum, magis frequentium apud Gallias nomina, omnia multo quam antea locupletiora per LEODEGARIVM a QVERCV. Parisiis ap. Io. Lodoicum Tiletanum 1544. 8. pagg. 75. quae nil aliud est, quam catalogus nominum et synonymorum cum nominibus gallicis.

* Rupp. I. HENR. BERNH. RVPPII Flora Ienensis &c. edita a IO. HENR. SCHVTTEO, cui accedit supplementum. Francof. et Lips. ap. Ern. Claud. Baillar 1718. 8. pagg. 376. tabb. aen. 4. plantarum, icon. 9. praemiss. pagg. 12. cum tab. synopt. generum, ind. pagg. 98.

* Rupp. II. EIVSDEM Flora Ienensis multis in locis correctae et auctae. Ibid. 1726. 8. pagg. 311. tabb. aen. eadem, praemiss. pagg. 8. cum tab. gener. synopt. ind. pagg. 124.

Rupp. III. ALBERTI HALLER Flora Ienensis HENR. BERNH. RVPPII ex posthumis Auctoris schedis et prioribus observationibus aucta et emendata. Accesserunt plantarum rariorum novae icones. Ienae sumpt. Christ. Henr. Cunonis 1745. 8. pagg. 416. praemiss. pagg. 16. cum tab. gener. synopt. Ind. latin. pagg. 22. Haec editio semper, priores vero non nisi ubi nomen genericum mutatum fuit, citatae sunt. Tabulae aen. 4. priorum editionum, vix deperditae atque praeterea viles, hic omittuntur; 6. autem novae elegantissimae sistunt 10. plantarum imagines.

* Scheuchz. Agrostographia, siue graminum, iuncorum, cyperorum, cyperoidum, iisque affinium historia. Auctore IO. SCHEUCHZERO. Tiguri typis et sumpt. Bodmerianis 1719. 4. pagg. 512. praemiss. pagg. 40. ind. pagg. 24. tabb. aen. XI. figuris 179. characteres genericos et específicos sistentes, cum aliis 8. tabulis, 20. species integro habitu suo et naturali magnitudine delineantibus. Primum prodit EIVSDEM Agrostographiae helveticae prodromus sumtibus Auctoris 1708. fol. pagg. 28. in quo iam praememorati operis 8. posteriorum tabularum icones publicavit. Sequuta est EIVSDEM operis agrostographici idea. Tiguri typis Bodmerianis 1719. 8. sine figuris pagg. 93. praemiss. pagg. 7. app. pagg. 7.

* Schmiedel. CASIMIRI CHRISTOPH. SCHMIEDEL icones plantarum et analyses partium aeri incisae atque vivis coloribus insignitae &c. edidit Ge. Wolfg. Knorrius Norimb. typis Io. Ioseph. Fleischmanni 1747. fol. Huius operis tunc inchoati IX. tantum nunc exstant tabulae cum expositionis pagg. 28.

* Segu. Ver. Plantae Veronenses &c. Auctore IO. FRANCISC. SEGVIERIO Vol. I. Veronae 1745. typis Seminarii 8. pagg. 516. praemiss. pagg. LXXI. Vol. II. ibid. anno eod. pagg. 480. acced. Biblioth. bot. supplementum pagg. 79. Hoc opus praeter mappam topographicam continet tabb. aen. 16. quibus repraesentantur 47. icones. Serius illud ad manus meas peruenit, quare hinc inde tantum illud citavi.

* Slevogt. Dissertatio medica inauguralis de Urticis, quam praefide IO. HADRIAN. SLEVOGTIO tradit IO. MELCH. DRECHSLER 1707. Ienae litt. Gollnerianis. 4. pagg. 30. cum tab. aenea.

* Svvert. Florilegium EMANVELIS SWERTII &c. in duabus partibus et quatuor linguis concinnatum. Im-

pressum Francofurti ad Moen. apud Anton. Kempner, sumptibus Auctoris 1712. de nouo correctum et emendatum. folio mai. Florilegii pars secunda &c. opera et impensis EM. SWERTII ibid. ex offic. typogr. Erasmi. Kempfferi 1612. *Antiquiorem editionem nullibi indicatam reperi, facile etiam patet, additamentum correctionis et auctoris paullo post huic eidem frontispicio aeri inciso tantum adsculptum fuisse. Possideo aliud exemplar hoc titulo: Florilegium amplissimum et selectissimum &c. auctore EM. SWERTIO. Amstel. ap. Frederic de Wit sine anno, itemque aliud eodem titulo ibid. ap. Io. Ianssonium a. 1620. Pars secunda Francofurti ex officin. typogr. Erasmi. Kempfferi 1614. Inter has editiones nulla intercedit differentia, si excipias tituli plagulam. Pars I. super 67. tabulis aeri incisis repraesentat 320. figuras, pars altera 43. tabulis sistit 240. figuras. Expositio iconum consistit in nudo nominum catalogo quatuor linguis, hortulanorum more, conscripto pagg. 24. Praemittuntur dedicatio, praefatio &c. pagg. 16. cum effigie auctoris.*

* *Tabern. Krb.* IACOBI THEODORI TABERNAEMONTANI neu vollkommen Kräuterbuch, durch C. BAVHINVM gebessert und durch HIER. BAVHINVM vermehret &c. Basel in verl. Io. Ludvv. Königs 1731. fol. pagg. 663. ic. 641. praemiss. pagg. 10. II. und III. Theil durch NIC. BRAVN beschrieben, durch C. BAVH. gebessert und durch HIER. BAVH. vermehret &c. ibid. anno eod. P. II. a p. 665 ad 1316. P. III. p. 1317—1529. icon. 1831. in summa 2472. Acc. Indices X. linguarum, virium et praeparatorum communes in omnes tres partes pagg. 96. Haec editio contentis et pagg. respondet illi, quae ibid. 1664. typis Iac. Werenfels, sumpt. Io. Königii prodit, ibidemque a. 1687. typis et sumpt. Io. Ludou. Königii et Io. Brandmylleri recusa est. *Augmentatio HIER. BAVH. consistit in marginalibus et synonymis. Differunt autem ab his editiones antecedentes. Illa, quam C. BAVH. figuris quoque auxit, primum excusa est Francof. ad Moen. per Nic. Hoffmannum, sumptibus Io. Bassaei et Io. Dreutelii 1613. (cuius vero part. I. tantum possideo pagg. 686.) et denuo impressa ibid. per Paul. Iacobi, sumpt. Io. Dreutels 1625. P. I. pagg. 642. praemiss. pagg. 12, acc. indices proprii pagg. 84; P. II. pagg. 598. praemiss. pagg. 8. P. III. pagg. 202. Indices II. et III. partis pagg. 48. Omnium autem prima et ipsius Auctoris editio, titulo Neuw Kreuterbuch, ibid. typis Nic. Bassaei a. 1588, prodit pariter in folio, quae autem primam tantum partem constituit pagg. 818. icon. 558. praemiss. pagg. 16. cum indice 10. linguarum, uti sequentes editiones, iam instructa pagg. 28. Reliquas partes, illo iam mortuo, edidit NIC. BRAVN M. D. Marpurgensis ibid. 1591. teste eius praefatione in sequentibus editionibus conseruata: hanc enim ipsam editionem nondum vidi.*

Tab. ic. Eicones plantarum seu stirpium &c. in tres partes digestae, adiecto indice gemino, curante NIC. BASAEIO. Francof. ad Moen. 1590. 4. mai. forma oblonga, pagg. 1128. icon. 2303. praemiss. pagg. 8. ind. lat. et germ. pagg. 15. Auctorem titulus non indicat, sed dedicatio, quae porro docet, hoc opus ante commentariorum II. et III. partis editionem, in lucem editum esse. *SEGVIERIVS bibl. bot. p. 190. priorem anni 1588. editionem eiusdem formae indicat, quam nondum vidi, neque etiam dedicatio citata ipsa die S. Bartholomaei a. 1590. data, eius mentionem facit. Forte primae commentariorum partis editio prima anni 1588. erroris ansam dedit.*

* *Thal.* Sylua Hercynia, siue catalogus plantarum sponte nascentium in montibus et locis vicinis Hercyniae, quae respicit Saxoniam, conscriptus a IO. THALIO. Francof. ad Moen. ap. Io. Feyerabend, imp. Sigism. Feyerabendii, Henr. Dackii et Petr. Fischeri 1588. 4 pagg. 133. ic. 14. Prodit cum IOACH. CAME-
RARII Horto supra indicato.

* *Till.* Catalogus plantarum Horti Pisani auctore MICHAELE ANGELO TILLI. Florentiae 1723. typis Regiae Celsitudinis apud Tartinium et Franchium. Fol. alph. 2. tabb. aen. 50. figurae 83.

Tournef. IOSEPHI PITTON TOURNEFORT Institutiones rei herbariae. Editio altera, Gallica longe auctior. T. I. Parisiis ex typographia regia curante Io. Anisson eiusdem typogr. praefecto 1700. 4. pagg. 664. T. II. et III. tabulas aeneas 476. continent. Accessit Corollarium ibid. 1703. 4. p. 54. tabb. aen. a 477. ad 489. Recusum prodit hoc opus eidem titulo hisce additis: editio tertia, appendicibus aucta ab ANTONIO DE JUSSIEU. Lugduni iuxta exemplar Parisiis e typographia regia 1749. 4. cui editioni suis locis inserta sunt addenda in priore editione p. 664—666. indicata, absque paginarum numero mutato; quae autem illuc pertinentia Corollarium continet, cum eodem recusa sunt. Prostant etiam D. DE JUSSIEU additamenta sigillatim hoc titulo: Appendices ad IOSEPH. PITTON TOURNEFORT institutiones rei herbariae ab ANTONIO DE JUSSIEU &c. Parisiis e typographia regia 1719. 4. et continent 1.) TOURNEFORTII vitam p. I—X. 2) Iudicium de methodo eiusdem p. XI—XX. 3.) Botanographorum elogia Tournefortianae Isagogi addenda p. XXI—XXX. 4) Catalogum operum botanicorum, quae in indice scriptorum rei herbariae Tournefortii institutionibus praemisso desiderantur p. XXXI. XXXII. Iplis institutionibus nil accessit.

* *Tourn. hist.* Histoire des plantes, qui naissent aux environs de Paris avec leur usage dans la Medicine. Par M. PITTON TOURNEFORT. à Paris de l'imprimerie royale 1698. 12. mai. pagg. 543. Praeter editionem a D. BERNH. DE JUSSIEU auctam et superius indicatam, prostat etiam in Anglicam linguam traductum hoc opus sequenti titulo: TOURNEFORT'S History of Plants growing about Paris, with their uses in Physick, and a mechanical account of the Operation of Medicines. Translated into English with many Additions, and accommodated to the plants growing in Great Britain by JOHN MARTYN. In two Volumes. Vol. I. London printed for C. Rivington 1732. 8. mai. pag. 311. Vol. II. with copious Indexes of the names and virtues. ibid. anno eod. pagg. 362. Sed haec editio plane differt a prototypo non solum ordine mutato et notis translatoris, verum etiam additamentis ex auctiori JUSSIEU editione et VAILLANTII botanico parisiensi collectis.

Trag. HIERON. TRAGI de stirpium vilitatis nomenclaturis &c. commentarior. libri III. &c. Argentorati excud. Wendelin. Rihelii 1552. 4. conf. Cat. seq. Artic. IX.

* *Turn.* A new Herball &c. gathered and made by WILLIAM TURNER. Imprinted at London by Steven Mierdman 1551. fol. min. absque paginarum numero 2. alph. 2. plagg. 169. figg. The seconde Parte of WILLIAM Turners Herball &c. Imprinted at Collen by Arnold Birckmann. 1562. pagg. 171. auersis non numeratis. figg. 266. ex quibus multae cum FVCHSII figuris conueniunt.

Vaill. Botanicon Parisiense, ou denombrement par ordre alphabetique des Plantes, qui se trouvent aux environs

rons de Paris &c. par feu M. SEBASTIEN VAILLANT &c. à Leide et à Amsterdam chez Jean et Herman Verbeek et Balth. Lackeman 1727. fol. mai. pagg. 205. tabb. aen. 33. icon. 354. ex quibus tamen nonnullae unam speciem a diuersa facie sistunt.

* *Vaill. Act.* Histoire de l'Academie Royale des Sciences année 1718. avec les memoires &c à Paris de l'imprimerie Royale 1719. 4. p. 143—191. cum tabb. aen. 2. anni 1719. ibid. 1721. pag. 9—47. tabb. aen. 4. & p. 277—318. tab. aen. 1. anni 1720. ibid. 1722. pag. 277—338. tab. aen. 1. anni 1721. ibid. 1723. pag. 174—224. tabb. aen. 2. anni 1722. ibid. 1724. pag. 172—215. tabb. aen. 2. quibus in locis vel noua plantarum genera definiuit, vel specierum nomina mutauit Auctor.

* *Volck.* Flora Norimbergensis &c. opera et labore IO. GE. VOLCKAMERI (filii) Norimbergae sumtibus Michaelianis 1700. 4. p. 407. tabb. aen. 25. figurae totidem. Editio anni 1718. ibid. apud Petr. Conr.

* *Monath non, nisi tituli plagula, differt.*

* *Wachend.* Horti Ultraiectioni Index. Auctore EVER. IAC. VAN WACHENDORFF. Traiecti ad Rhen. ap. Nic. van Vucht 1747. 8. mai. pagg. 394. Proleg. pagg. XXX.

* *Weinm.* Phytanthozaiconographia siue conspectus plantarum &c. a IO. GVIL. WEINMANNO collectarum, quae, aeri incisae per BARTH. SEVTERVM, IO. EL. RIDINGERVM et IO. IAC. HAIDIVM, explicantur a D. GE. NIC. DIETERICO Vol. I. August. Vind. apud nominatos artifices, impr. Ratisb. per Hier. Lenzium 1737. fol. pagg. 200. Vol. II. ibid. 1739. pagg. 516. Vol. III explic a D. AMBROS. CAR. BIELERO. Ibid. 1742. pagg. 488. Vol. IV. ibid. 1745. pagg. 540. tabb. aen. 1025. figurae pictae ultra 4000.

* *Zannich.* Istoria delle Piante che nascono ne' Lidi intorno a Venezia. Opera postuma di GIAN. GIROLAMO ZANNICHELLI, accresciuta da GIAN. JACOPO figliuolo dello stesso &c. Publicata a spese sue in Venezia 1735. appresso Antonio Bartoli. Fol. mai. pagg. 290. tab. aen. 311. (quor in singulis foliis) figg. 349. Hoc opere augere et emendare studuit Auctor ea, quae ante illum DONATVS aggressus est in tractatu, cui titulus: Trattato de semplici, pietre et pesci marini, che nascono nel lito di Venetia &c. di ANTONIO DONATI, Farmacopeo. In Venetia 1631. Appresso Pietro Maria Bettano. 4. pagg. 120. tabb. aen. 30. figg. 32. cum aliis duabus, unius lapidis, alterius piscis cuiusdam.

II.

CATALOGVS OPERVM BOTANICORVM

a germanis ab artis typographicae inuentione ad annum MDL vsque compositorum typisque excusorum et a me collectorum.

I. *Vetustissimus* horum librorum, quem mea quidem collectio asseruat, germanica lingua impressus est *Augustae Vindelicorum* per Hans Baemler a. 1475. in folio et inscribitur *das Püch der Natur*, i. e. liber naturae, qui titulus vero non constituit peculiare frontispicium, sed initium ipsius operis. Caret paginarum numero et sic dicto custode, constat foliis 292. seu pagg. 583. Recusus est totidem foliis per eundem a. 1478. et vtraque editio capitibus seu sectionibus XII. agit 1) de homine, 2) de coelis, planetis, elementis &c. 3) de quadrupedibus, 4) de auibus, 5) de monstris marinis, 6) de piscibus, 7) de serpentibus &c. 8) de insectis &c. 9) de arboribus, 10) de plantis, 11) de gemmis et metallis, 12) de fontibus miraculosis cum appendice de monstris humanis. Cuilibet sectioni praefixum est peculiare frontispicium compositum ex figuris ligno incisus, aliquot specimina rerum, quarum expositio traditur, sed vilissime sistentibus et pigmentis rudi penicillo obductis. Paginis 366—503. recensentur arborum circiter 80. et plantarum 90, quarum descriptiones, quae singulae nomen latinum et germanicum vt et qualitates viresque medicas breuissime exponunt, peculiaribus figuris carent.

II. Secundus horum librorum est ORTOLFF von BAYRLANDT *Artztbuch*, i. e. liber medicinalis, quem excudit Ant. Koburger Norimbergae 1477. in fol. pariter sine frontispicio peculiari, paginarum numeris, custode, litterisque initialibus, et constat foliis 84. seu paginis 167. Recusus est *Augustae Vindelicorum*, ab Anton. Sorg a. 1488. 4. cum praefixo titulo: *Ein Artzneybuch von allen gepraestten der menschen, wye man den helffen sol zu irer gesuntheit und stercke*, sine custode, cum litteris tamen initialibus et paginis 186. iam adpressis, cuius exemplari abs me asseruato manus cuiusdam veterani adscripsit: *durch D. ORTHOLPHVM HEYDENBERGER der Artzney usf Bayerlands*, vnde proprium huius auctoris nomen cognitum redditur. In hoc libro non solum sub finem capita 26. agunt de quibusdam vegetabilibus, verum etiam vltima 79. capita figillatim recensent plantas quasdam medicinales; sed vt figuris carent, ita etiam descriptio, quae de viribus potissimum agit, ex veteribus, PLATEARIO, GALENO &c. tantum compilata est, cuius farinae aliquot alios adhuc tractatus iam seculo XV. et plures seculo XVI. excusos producere possem, si scopus praefixus hoc permitteret, vel etiam recensio eorum lectoribus utilis aut saltem iucunda foret. Vnum tamen silentio praeterire nequeo, scilicet S. HILDEGARDIS *Physicam*, quia omnium a germanis editorum operum physicorum et antiquissimum et rarissimum habetur, licet seculo XVI. demum typis excusum fuerit. Separatim nunquam, quantum scio, prodiit, sed aliorum auctorum operibus iunctum, cuius collectionis prima editio (quam nondum possideo) Argentorati apud Io. Schottum 1533. fol. impressa, fusius recensetur eiusque titulus integer sistitur in libro, cui titulus: *Kurtze Nachricht von den Büchern und deren Urhebern in der Stollischen Bibliothec no. DIII. seu part. XIV. Ienae 1741. 4. p. 469. et in CHR. GVIL. KESTNERI Bibliotheca medica Ienae 1746. 8. mai. p. 342.* Meum exemplar, ibid. 1544. editum, illum prolixum prae se fert titulum, qui verbotenus legitur in *Lindenio renouato* GE. ABRAH. MERCKLINI Norimb. imp. Io. Georg. Endteri 1686. 4. p. 332, quare eundem transcribere supersedeo, et pro instituti ratione solius tractatus, de quo sermo est, titulum indico, qui est: *Lib. quatuor HILDEGARDIS de Elementorum, Fluminum aliquot Germaniae, Metallorum, Leguminum, Fruticum, Herbarum, Arborum, Arbustorum, Piscium, Volatilium, et Animantium terrae naturis et operationibus*, cui tractatui haec praefiguntur: *in Physicam Sanctae HILDEGARDIS de Pinguia, eiusdem praefatio.* Ceterum autem moneo, 1) Nomen GE. KRAVT, Hagenoensis, quod huic collectioni a MERCK-

MERCKLINO praefigitur, titulum ipsum non continere, et typographum breui praefatione tantum indicare, se eius opera in TROTVLAE tractatus, qui primo loco positus est, editione usum fuisse: an haec SEGVIERIO *biblioth. bot. p. 85. et 99.* ansam assertionis dederint, exstare EIVSDEM *librum supra quatuor Hildegardis de elementorum &c. leguminum, fruticum, herbarum, arborum, arborum naturis et operationibus Argentinae ap. Io. Schottum 1544. in fol.* iudicent alii; in meo certe exemplari eiusmodi commentarii nullum exstat vestigium, neque talem sigillatim excusum indicant alii; 2) TROTVLAE tractatum pagg. 35. excipere illum HILDEGARDIS pagg. 121. et hunc a pagg. 122. ad 247. ORIBASII, THEODORI et HIPPOCRATIS tractatum; Deinde sequi ESCVLAPII tractatum pagg. LXXIX. distinctum; Denique annexi OCTAVII HORATIANI tractatum et ALBVCASIS chirurgiam (cuius in titulo generali nulla fit mentio et quae propterea procul dubio etiam a MERCKLINO omittitur) pagg. 319, cui ad calcem additur editionis annus 1532. Ex hoc et paginarum numeris distinctis, cum illis vero primae editionis a KESTNERO indicatis conuenientibus, suspicio mihi oritur, numne hoc HILDEGARDIS exemplar sit illud ipsum a. 1533. iam impressum et titulo tantum nouo (vel potius primo remoto in noua collectione) oblatum. 3) quae in HILDEGARDIS opere de vegetabilibus agunt, libro II. capp. CLXXXI, et libro III. capp. LV. a pag. 11. ad 86. pertractantur, quorum et reliquorum expositio anilis a KESTNERO l. c. satis iam declarata est. 4) His addo, HILDEGARDIM, coenobii S. Ruperti prope Bingium in tractu moguntino Abbatissam et multis aliis operibus claram, seculo XII. vixisse: cur autem GVL, DV VAL, teste SEGVIERIO p. 85, hos libros inter supposititios reposuerit, ego quidem perspicere nequeo, siquidem nil continent, quod sequioris sexus ingenium superat. Ceterum conf. art. sequ. V. no. 9.

III. Primus eorum librorum, qui singularum plantarum, quas recensent, figuris ornati sunt, est *Herbarius latinus*, cuius editiones in mea bibliotheca asseruantur sequentes 1) sine titulo, loco et anno; 2) alia iisdem carens; 3) alia, cui, tituli loco, maiori typo inscribitur *Herbarius*, sed locus et annus pariter deficiunt; 4) in fronte gerit hunc titulum: *Herbarius Maguntie impressus anno 1c. lxxxijij*, cum subiuncto scutulo *Io. Fausti et Petri Schoeyfferi* rubro pigmento impressis, ceterum non differentibus ab illis, quae inter ROTH-SCHOLZII insignia bibliopolarum et typographorum no. 26. reperiuntur, curatius vero repraesentantur a celeberrimo Polihyltore SCHWARZIO in suae dissertationis, qua *primaria quaedam documenta de origine typographiae* proposuit, altera parte Altorfii a. 1740. ventilata p. 53.; 5) inscribitur *Herbarius Patavie impressus anno domini et cetera lxxxvj*; 6) *Herbarius Patavie impressus anno domini et cetera lxxxvj*, quae editio omnino recusa est. Omnes hae editiones in quarto, ut aiunt, ordinario excusae sunt sine paginarum numeris et sine litera, quam custodem appellant. Quaelibet ex 150. foliis totidemque capitibus constat, quorum singula vnico formae folio comprehenduntur et praefixam habent figuram cum addito capituli numero, dimidium folii occupantem, ligno incisam, sed adeo ieiune sculptam, vt vix ex vlla naturale exemplar cognosci queat. His, praeter praefationem vnico folio seu pagg. 2. comprehensam et capitulorum indicem 3. pagg., annexa est appendix pagg. 36. capitulis XCVI. alia remedia, quae vocant simplicia, ex tribus naturae regnis breuiter et absque figuris exponens cum peculiari indice pagg. 2. In omnibus praefatio et ipsa expositio eadem typusque monachorum litteris similis est; in figuris autem haec differentia occurrit, ut no. 1. capite II. abrotani iconem plane aliam quam reliquae, no. 4. vero omnes icones ita inuersas sistat, vt dextri lateris partes a sinistris compareant. Omnes autem hae figurae inter se magis quam cum ipsa natura conueniunt, omnesque, exemplari no. 3. excepto, pigmentis vilissime obductae sunt. No. 1. loco germanicorum nominum belgico germanica (*Niederlaendische*) indicat, ceterum huius editionis omnes characteres suspicioni fauent, eam antiquiorem esse illa no. 4. Editio no. 2. cum 5. et 6. tum figuris tum typo plane conuenit, quod docet, eam Pataviae quoque excusam esse; quum vero in his tribus editionibus, vt in reliquis, latino nomini semper additum sit germanicum, nullum est dubium, quin illae secundum exemplar quoddam in Germania prius impressum recusae tantum sint: e. gr. cap. CXXXVI., quod salicem sistit, legitur no. 1. Wilgke, no. 2. 6. Weiden, no. 3. Wyden, no. 4. Widen, no. 5. Weden. Editio no. 3. et figurarum formatione eundem licet ad ductum facta, et capitulorum litteris initialibus romanis grandiusculis (Praefatio tamen et appendicis capitula littera initiali vt editiones 1. 4. carent, 2. 5. 6. vero loco maiorum in areae quadratae vacuae relictae medio typum paruum et ordinarium plerumque impressum habent) omnium maxime a reliquis recedit, conf. art. seq. VII. no. 2. Fusius autem haec omnia hic exponere, nec spatium nec instituti ratio permittit, id vnicum addo, nullam harum editionum nominare auctorem huius operis, omnium vero praefationem indicare hunc eius titulum: *Aggregator practicus de simplicibus*, atque monere, hoc opus in gratiam inopum aegrotorum, vt sibi ipsis subuenire possint paucis expensis, ex veteribus medicis compilatum et in meliorem ordinem redactum esse. Huc 7) pertinet idem opus in linguam belgico-germanicam versum sine titulo et loco; sub finem tamen indicis praefationem excipientis additum est typographi insigne, mihi autem, quid? quod ipsi laudato SCHWARZIO beatae nunc memoriae super eodem abs me consulto, ignotum nec in Rothscholzia collectione contentum, et ad calcem appendicis leguntur haec: *ghe-maeckt int iaer ons heeren mcccc en lxxxijij*. Initium facit interpretis praefatio hac inscriptione *dye prologhe de ouersettere vtr den Laryn in dyetsche*, quam sequitur auctoris praefatio translata, cuius vero nomen etiam in hac editione non indicatur, operis vero titulus ita explicatur: *de verghering der simpel der medicinen in manier van practissen*. Haec editio constat fol. 163. seu pagg. 326. praef. et ind. fol. 7. app. fol. 36. ceterum autem paginarum numeri, custodis, et appendicis capitulorum litterae initialis defectu, nec non forma et contentis conuenit cum editionibus latinis, figuris vero, pari modo coloratis, sigillatim cum illa no. 1. indicata, a qua tamen se distinguit nominibus belgicis hinc inde mutatis et plerumque pluribus latino iunctis, ex quo opinio confirmatur, illam no. 1. prius, quam hanc et reliquas, excusam esse; vt taceam, verosimile haud esse, editionem 1. et 4. (quae editionis annum primum declarat) ob mutatas figuras, vt 1. et 7. ob mutatum sermonem et belgicorum nominum augmentum, vno eodemque anno typographorum prelum relinquere potuisse. His recensitis editionibus D. SEGVIERIVS *Biblioth. bot. p. 215. seq.* cum eius *supplementi vnacum plantis Veronensibus editi p. 40.* collata sequentes addit: 8) Vicentiae 1491. 9) Venetiis 1509. 10) lingua italica Venetiis sine anno, 11) ibidem 1520. omnes itidem in quarto, in octauo vero 12) ibid. 1539. 13) capitibus XVIII. aucta ibid. 1536. et denique gallica lingua 14. 15. 16.) tres editiones Parisiis sine anno publi-

publicatas, vt et in folio 17) sine loco et anno: sed de no. 13. et 17. dubium superest, quousque cum hoc opere conueniant.

IV. Hunc latinum herbarium sequutus est alius germanica lingua conscriptus, cuius sequentes asseruo editiones: 1) sine titulo; annum vero, quo excusa est, haec subscriptio ad calcem rubris litteris addita indicat: *disser Herbarius ist tzu Mentz gedruckt und geendet uff dem xxviii. dagt des Mertz anno mccccxxxv.* et insignibus iisdem supra III. 4. indicatis huic subscriptioni rubrica subiectis declarat, illudpariter ex *Fausti Schoyfferique* typographia prodiisse. Recensuit iam hocce cimelium laudatus SCHWARZIVS in sua dissertatione supra citata p. 42. §. XXXVI. Forma integro folio minori respondet, titulus nullus adest, praefatio tamen hunc indicat: *Ortus sanitatis, oder Gart der Gesundheit.* Figurae ligno incisae multo maiores sunt illis Herbarii latini et plerumque duas tertias folii partes longitudine sua expleant, differunt etiam penitus ab iisdem, atque praeterea maximam partem naturae exemplaribus propius accedunt et multae satis respondent, omnes vero pariter rudi penicillo pigmentis obductae sunt. Expositio porro multo amplior et stylo eodem consignata est, cuius specimen mutili sui exemplaris exhibuit ill. D. de HALLER in praefatione operis Weinmanniani §. III. Capitulum numerus ad 435. excurrit, ideoque 285. maior est illo Herbarii latini, vel saltem 189. computatis etiam illius appendicis capitulis. Ex his 369. plantarum et 10. animalium icones praefixas habent, 56 autem illis penitus carent, quorum tamen maxima pars de fossilibus vel ex regno animali productis agit, quae hic illis plantarum passim inserta, in altero opere vero ad appendicem eius relata sunt. Ceterum nec huius operis auctor nominatur et editor in praefatione plura non indicat, quam quod magistrum artis peritum conduxerit, vt herbarum vires atque naturam ex probatis veterum scriptis in vnum opus colligeret, quodque interea figuras colligens deprehenderit, multas dari nobiles plantas in Germania non prouenientes, atque propterea coeptum opus imperfectum reliquerit manuscriptum, vsque dum, peregrinatione in Palaestinam pluresque regiones orientales, quas nominat, abolutas et plantis ibidem nascentibus indagatis earumque genuinis imaginibus viuo colore per idoneum pictorem sibi itineris comitem associatum repraesentatis instructus redux in patriam opus hoc perfici et vulgi in vsum germanica lingua conscribi curauerit. Si huius operis praefatio, capitulum numerus eorumque expositiones aequae ac figurae conferuntur cum iisdem operis praecedentis: vix dubitare licet, vtriusque auctorem esse distinguendum. Vtut autem hoc opus latino longe praefendum sit, quia multas iam continet laudabiles plantarum effigies, multas tamen etiam sistit, tum ratione ipsius figurae tum partium colore, naturalibus exemplaribus parum similes, imo haud paucas manifeste fictas, praecipue omnes fere illas pharmacorum exoticorum, vt adeo ea, quae de his praefatio promittit, non reperiuntur: taceo nomina saepius corrupta, aliaque falsa. Omnem ergo laudem huic operi conciliant plantae, quarum figuras naturae similes repraesentat, quae, me saltem iudice, sunt sequentes: *agrimonia* (eius folium) *apium* (dulce, celery Italorum) *aristologia longa* (studio seruauit nomina auctoris, vti sunt scripta, paucis illustrationis gratia subinde additis et lunulis inclusis) *aristologia rotunda* (fumaria radice caua) *acetosa*, *arum*, *atriplex*, *alleuia*, *asarum*, *acorus* (iris palustris) *alkekengi*, *auena*, *betonica*, *branca vrsina* (spondylii folia) *berberis*, *borago*, *bursa pastoris*, *brionia* (baccis rubris) *barotus* (lamium vulgare album) *brunella*, *beruvinca* (peruinca) *camomilla*, *celidonia*, *cicorea*, *consolidida maior et regalis*, *cardo benedictus*, *cinoglossa*, *cardo* (carduus fullonum s. dipfacus) *cheiri*, *cardiaca*, *costus* (hortorum, eius folia) *castaneus*, *cartamus*, *diapensia*, *durchwachs* (perfoliata) *epatica* (stellata) *esula*, *eufragia*, *ebulus* (eius folia) *edera terrestris*, *elleborus niger* (Hippocratis Tabern., eius caulis cum foliis) *fenugreum* (cum siliquis) *fabia*, *flammula* (ranunculus prat. erectus acris) *frage* (fragaria) *flores frumentorum* (cyanus) *flores S. Iohannis* (leucanthemum seu bellis maior) *gladiolus* (iris hortensis) *gemista* (tinctoria) *gamandria* (teucrium pratense) *herba paralisis*, *herba rubea* (geranium Robert.) *humulus* (lupulus) *garioffilata*, *gallitricum*, *inspianus* (hyoscyamus) *lactuca*, *liquiricia* (eius folia) *leusticum* (eius folia) *lilium album*, *lilium conuallium*, *lauendula*, *linum*, *ladanum* (cistus) *melissa*, *menta*, *mentastrum*, *malua*, (sylvestris repens) *millefolium*, *maiorana*, *marubium*, *moracelsi* (morus) *mercurialis* (mas seu sterilis) *morsus diaboli*, *morsus galline* (alsine) *morabacci* (rubus sylvestris) *nigella* (nigellastrum) *nasturcium* (aquaticum s. silybrium) *nespilus* (mispillus domestica) *origanum*, *orobus* (vicia) *orant* (antirrhinum minimum Lob.) *pionia*, *papauer* (latium) *parietaria*, *pentafilon* (pentaphyllum repens maius) *polipodium*, *plantago maior et minor*, *pimpinella* (tragoselinum) *pirola*, *protentilla* (potentilla s. anserina) *pisa*, *pastinaca domestica* (daucus) *piritrum* (ptarmica vulgaris) *persicaria* (mitis) *premula veris* (bellis minor) *rosa*, *rassanus* (niger) *rapa*, *ribes*, *sambucus*, *salvia* (minor aurita) *serpillum*, *solatrum*, *scolopendria*, *stafisagria* (eius folia) *spinachia*, *sticados arabicum*, *sticados citrinum*, *spica nardi*, *soldanella* (eius folia) *titimallus Springvurtz* (catapucia) *tormentilla* (eius folia) *trifolium*, *trifolium acutum*, *tanacetum* (eius folia) *urtica*, *verbena*, *viola* (martia) *virga pastoris* (diplaci eiusdem alia icon) *Valeriana* (sylvestris maior, eius folia) *ypericon*, *yacea* (viola tricolor). His annumerandae adhuc sunt illae effigies secundum naturam pariter quidem delineatae, sed falso nomine propositae, nempe *affodilus*, cuius et gladioli cap. 195. icon eadem est iridis hortensis; *Apollonaria Schirling*, est tussilago cum flore, cuius sola folia cum radice *ungulae caballinae brantlatti* nomine c. 420. exhibentur, synonymum germanicum *Huflattig* vero *lappacio rotundo* sic dicto c. 245. (quod est bardana cum flore) iungitur, cuius folia sola lappacii *groiss klett* nomine c. 226. exhibentur; *caput monachi* est calendula; *camepitheos* est Dulcamara; *Diptamum* est polygonatum vulgare cum flore; *dens leonis* videtur geranium batrachoides; *egilops* est aquilegia; *ellebori albi* nomine sistitur idem polygonatum cum fructu seu baccis; *filla* est caryophyllata cum flore, quae seminfera *garioffilatae* nomine c. 205. indicata est; *ferula* est sonchus laevis laciniatus; *filago* est bugula; *fistula pastoris* est chelidonium maius cum siliquis, quod florens *celidoniae* nomine c. 85. occurrit; *Hermodattilus* est hieracii vel potius taraxaci species; *herba vrinale* est *linaria* vulgaris florens, quae fictis floribus c. 235. sequitur; *pes corui* est ranunculus aconiti folio flore albo; *pruna* repraesentantur ramulo fructifero rubi idaei; *satirion* videtur anacamperotis species; *sabina* est thuya; *senacion* et *senacionum* est scrophularia aquatica; *tapsia* est barbarea; *Tamarindi* loco exhibetur tanacetum florens; *Vermicularis* est anacamperos vulgaris; *vulgago*, *vulfago* vel *cyclaminus* sistitur eadem asari c. 19. icon; *yringus* est carduus Mariae; *ynquirialis* est eryngium vulgare. Imagines vero prae reliquis prorsus fictae mihi videntur *anacardus*, *aloe*, *asa fetida*, *balaustia*, *bdellium*, *bombax*, *cynamomum*, *cyminum*, *carui*, *cubebe*, *cardamomum*, *camphora*, *crocus*, *coloquintida*, *cassia lignea*, *coconidion*, *cataputia* (cuius genuina icon

icon titimalli nomine sistitur) *dyagridion, dragantum, dactylus, emblici, epitimum, euforbium, filipendula, gummi arabicum, galbanum, granatum, incensaria, karabe seu electrum, lacca, melilotum, mastix, mirra, macis et nux muscata, mirabolani, nux indica, oleander, oliuarum arbor, olibanum, osmunda, peonia* (quae distinguitur a pionia supra indicata) *palma, pes columbinus, peucedanum, pinee* (pinus ital.) *pistacee, psidium, piper, palacium leporis, reubarbarum, rubea tinctura, sinapis, scordeon, squinantum, scammonia, serapinum gummi, squilla, sandalum, sene* (senna) *sanguis draconis, sarcocolla, scrofularia* (cuius vera icon senecionis nomine adest) *turbit, terbentina, tamariscus, tribuli marini, viticella, Zucarum* i.e. saccharum. Prolixam hanc recensionem nemini grauem fore confido ob raritatem huius operis, cuius genuinae icones tanto minus obliuioni dandae sunt, quanto maiorem laudem illae, ceu primae ex barbariei tenebris erutae et sub ipsa figurarum sculpendarum origine factae, omnino merentur, et quanto viliores comparauerunt eadem in sequentibus huius operis editionibus reculis, nimirum 2) sine titulo *Augustae Vindellicorum* 1486.; 3) breui hoc titulo: *Herbarius zu teutsch von allerhand Kreuteren*, *ibid.* 1488. 4) sine titulo, *ibid.* 1496. Hae tres editiones per Io. Schonsperger excusae paginis et figuris iisdem sibi inuicem respondent, ab illa vero Moguntina figuris vilioribus differunt, vtpote quae (licet earum imitationes, si illam cymini cap. 114. illamque cap. 116. additam citri excipias) non solum omnes inuersae multoque minores, et tamen foliorum ferratorum denticuli maiores, verum etiam, praecipue ob partium et extensionis proportionem haud obseruatam, omnes deteriores redditae sunt. Fossilium aliarumque simplicium figurae in Moguntina editione omissae his quidem infertae sunt, sed lepidae et nullius plane vsus. Ceterum ex his editio no. 2. litteris capitum initialibus, foliorum numero atque etiam custode, quem vocant, adhuc caret, no. 3. 4. vero iis, si foliorum numerum excipias, iam instructae sunt. 5) Alia editio prodiit *Vlmae* per *Conrad. Dinckmut* 1487. sine titulo, litteris initialibus, paginarum numeris et sine custode; figurae autem, omnes recens factae, nec Moguntinae nec Augustanae editioni penitus similes, neque tamen Augustanis meliores sunt, et fossilium, animalium &c. lepidas repraesentationes intersertas quoque habent. His editionibus antiquior videtur 6) alia, cuius vero non nisi mutilum exemplar ad manus est: deficiunt enim non solum priora capita, sed etiam indicis vltimae plagulae, ideoque incertum est, num titulo quodam gaudeat, numque editionis locum et annum declaret; aetatis autem suae characterem indicant non solum defectus litterarum capitum initialium, numeri foliorum atque custodis, sed etiam figurarum omnium simplicium illorum, quibus Moguntina caret: addi potest, figuram cymini cap. 114. illi Moguntinae et *Vlmen* editionis similem esse. Omnes autem plantarum figurae et magnitudine et praua imitatione cum Augustanis praecipue vero cum *Vlmen* conueniunt, multae tamen mutatae, non vero emendatae sunt. 7) Alia sine loco et anno, prima autem praefationis plagula deficit, quare et hoc exemplar non indicat, num titulus praefixus fuerit. Hanc autem editionem illa no. 6. aetate parum inferiore esse, vero simile videtur ex defectu foliorum numeri, omniumque earum figurarum, quibus illa no. 6. et Moguntina caret; adest vero iam foliorum custos, adfunt etiam iam litterae initiales, sed omnes quadratae et ligno incisae: neque hae singulis capitibus praefixae sunt, sed totidem ferme iisdem carent spatio quadrato vacuo relicto, cui littera pigmento rubro adscripta est: e. gr. ex capitibus 52., quae lit. A. comprehendit, 29. ornantur eiusmodi litteris sculptis, iisque vario modo figuratis et non vna serie, verum per varias vices additis. Herbarum animaliumque figurae omnes eadem sunt, quas no. 6. continet. 8) Alia editio hoc titulo: *in disem Buch ist der Herbari oder Kreutterbuoch: genant der gart der gesuntheit: mit merern figuren und registern*. Haec editio litteris capitum initialibus, maioribus quidem, sed simplicibus et fulis, foliorum numero atque custode iam instructa est. Figurarum augmentum consistit solummodo in illis, quibus, vti in *Vlmen* et Augustanis editionibus, fossilia aliaque simplicia no. 6. omissa repraesentantur, quae vero, vtut ab Augustanis differant, maioris tamen pretii haud sunt. Ex herbarum autem figuris paucae sunt eadem cum 6. et 7., plurimae quidem illis similes, sed rudiores et plerumque inuersae, multae prorsus aliae. Quum vero in hoc quoque meo exemplari tractationis tria vltima capita et indicis finis deficiant, iterum dubius sum, an locum et annum haec editio indicet. 9) Eodem titulo, ac no. 8., *Argentorati* per Io. Prys 1507. Huius editionis figurae sunt eadem, quas no. 8. continet, paucis exceptis, quae in no. 6. et 7. reperiuntur, ex quibus concludere licet, no. 6. 7. et 8. etiam *Argentorati* excusas esse. 10) *Ibid* per *Renat. Beck* 1515. Titulus et contenta iterum no. 8. et 9. respondent, quemadmodum etiam eadem figurae partim ex no. 6. et 7. partim ex no. 8. et 9. hic comparent. Omnes hactenus recensitae editiones eandem adhuc praefationem, quam Moguntina exhibet, praefixam habent. 11) Hoc titulo: *das Kreutterbuch oder Herbarius von neuen corrigirt und gebessert*, *ibid* per *Balth. Beck* 1527. et 12) eodem titulo *ibid.* 1530. Vtriusque huius editionis figurae, ordo et numerus capitum a prioribus non differunt, neque etiam ipsa tractatio de notabili emendatione testatur, licet hanc titulus & noua praefatio breuissima promittant. 13) Inscribitur: *Kreutterbuch von allem Erdgewächs, ansenglich von D. IO. CVBA zusammenbracht &c. gemehrt von D. EVCHAR. RHODION* (in praefatione ROESSLIN) *Frankof. ad Moenum apud Chr. Egenolff* 1533. Titulus atque praefatio noua primum nominat auctorem huius operis, sed quo iure quibusue testimoniis id fiat, non indicat, neque haec plura de eodem refert, quam quod IO. CVBA (quem cl. D. IO. BRVCKERVS in *historia vitae ADOLPHOR. OCCONVM* p. 11. 12. Augustanis medicis adscribit et primo loco recenset, eius vero abitum vel obitum indicare nequit) *Frankofurti ad Moenum Physicus seu medicus ordinarius* (*vveiland Stat artzt alhie zu Frankfurt*) olim constitutus fuerit. Ceterum in hac quoque editione antiquus contentorum ordo, sed sine capitulorum numero, adhuc obseruatur, figurae autem prorsus nouae, minores quidem, satis tamen artificiose sculptae et naturae exactius respondentes comparent, nonnullae vero etiam omissae sunt. Constat autem hic liber, pagg. 212. icon. plant. 162. fructuum 19. et lignor. vel corticum 4. ex quibus aliquot bis occurrunt, nonnullae etiam falso nomine indicantur. 14) *Kreutterbuch von aller Kreutter, gethier, gesteyne und Metal natur, nutz und gebrauch*, *ibid.* per eundem 1535. pagg. 319. icon. plant. 250. Hac editione plures herbarum icones, maiores, iterumque emendatae sistuntur. 15) Eodem titulo, cum hoc additamento: *alles iiber vorige edition gebessert und gemehret*, *ibid.* per eundem 1536. Haec editio omnino denuo, sed totidem paginis iisdemque plantarum figuris recusa est, correctionem vero et augmentum obseruare non potui. 16) *Kreutterbuch von natürlichen Nutz und gründlichen gebrauch der Kreuter, baeum, gesteyd und Früchten &c.* *ibid.* 1550. foliis 263. seu pag. 526. icon. plant. 708. Haec editio, multis nouis figuris aucta,

omnibus

omnibus autem (13. 14. 15. 16.) RHODIONIS praefatio adhuc praefixa, eius tamen aequae ac CVBAE nomen in titulo omisum est. 17) *Kreuterbuch new zugericht von allerhand Baeumen, Stauden, Hecken, Kreutern, Fruchten und Gewürtzen &c. mit vielen neuen Kreutern und Figuren, in die zweyhundert, über andere ausgegangene Edition gemehret &c. ibid. apud heredes Egenolffi 1557. foliis 342. leu pagg. 683. icon. plant. 708.* 18) *Titulo eodem ibid. 1560.* absque vlla mutatione recusa haec editio, quam demum AD. LONIZERVS (teste praefatione vtriusque eadem) in meliorem ordinem redegit et expositione multum emendauit ita, vt antiquus Herbarius germanicus nunc noua et correctiori sub facie in lucem prodiret, qua postea, LONICERI nomine praefixo, saepius recusus est, de quo sequenti articulo XI. plura. Dum haec sub prelo iam sudabant, emtionis iure ad me peruenit 19) alia antiqua editio hac ad calcem subscriptione: *Gedruckt und volendet diser Herbarius durch Hannsen Schönsperger in der Keyserlichen Statt zu Augspurg an der mittwochen nach dem weysen suntag. Anno mcccc. und in dem lxxxvij. jare.* Haec ab illa no. 2. recensita non differt, et cum 2. 3. 4. collata docet, intra triennium in vno loco tertium, et post octo annos quartum recusum fuisse hoc opus, quod solum satis testatur de cupiditate, qua exceptum fuit. Ex his exemplaribus no. 1 — 7. 11. 12. 15. 18. et 19. figurae pari negligentia, ac in herbario latino, pigmentis obductae reperiuntur. Ad hoc opus pertinet quoque 20) editio Batava lingua excusa hoc titulo: *den groten Herbarius, gheprent t' Utrecht van Sinte Martens Tooren by Jan Bernts 1538.* Huius editionis capita et figurae cum illis no. 2 — 12. adhuc conueniunt, sed hae multo minores vilioresque sunt. Praeter has editiones, quas omnes in folio excusas possideo, a D. SEGVIER *biblioth. p. 215.* et sub CVBAE nomine *p. 242. supplem. p. 40.* sequentes indicantur: 21) Herbarius lingua vernacula Germano Belgica Moguntiae 1483. in folio sine figuris, ex Mscr. spicilegio veterum seculi XV. editionum. SAM. ENGEL *biblioth. selectiss. p. 73.* alius quidem editionis Moguntiae 1483. cum figuris editae mentionem facit; sed quum ipse addat: hanc esse eundem librum, quem IO. GE. SCHELHORNIVS *amoenit. litterar. tom. III. p. 123.* recenset, hic vero ibidem non solum formam in quarto, verum etiam annum 1484. indicet, nullum est dubium, quin typographi vitio annus 84. in 83. mutatus, adeoque hic liber ille ipse sit herbarius latinus supra artic. III. 4. expositus: conf. D. de HALLER l. c. Num vero liber a SEGVIERIO indicatus expositione et capitulorum numero cum latino, an cum germanico herbario conueniat, numque forsan eadem prioris in belgicam linguam translatio supra art. III. 7. recensita sit, et anno antecedente iam sine figuris in folio prodierit, iudicet ille, cui eum ipsum inspiciendi occasio suppetit. Praeterea a SEGVIERIO l. c., hoc opus recensetur excusum belgico idiomate 22) Antverpiae 1514., germanico 23) Lybecae 1492. 24) ibid. 1520. 25) Argentor. 1521. 26) ibid. 1528. 27) ibid. 1529. 28) ibid. 1536. 29) Venetiis 1538. Hae omnes itidem in folio prodierunt, ad quas etiam *Biblioth. p. 243.* refertur 30) alia in 4to, Francof. 1535. per *Herm. Gölffrich*; Gallica lingua expositae 31) sine loco et anno; 32) Parisiis sine anno; 33) ibid. 1539. et denique Anglico sermone 34) Londini 1526. 35) ibid. 1539. 36) ibid. 1561., quarum forma iterum in folio indicatur: num autem hae citatae editiones omnes cum hac, an cum antecedente, an cum sequente opere conueniant, an aliquae earum opus prorsus aliud constituent, iterum nonnisi ex illarum inspectione affirmari potest.

V. Horti sanitatis titulo latine compositi operis editiones a me asseruantur sequentes: 1) *Ortus sanitatis, de herbis et plantis, de animalibus et reptilibus, de auibus et volatilibus, de piscibus et natatilibus, de lapidibus et in terre venis nascentibus, de vrinis et earum speciebus, tabula medicinalis cum directorio generali per omnes tractatus,* sine loco et anno, sine foliorum numeris et sine litteris capitum initialibus maioribus, cum minoribus tamen areae vacuae relictae adpressis et cum custode. Alph. 4. pl. 8. seu pagg. 400. 2) Alia editio sine loco et anno atque a no. 1. difficulter distinguenda, siquidem nonnisi custodis litterae et numeri his additi quandoque variant, atque praeterea sectionis posterioris variorum tractatum peculiare tituli alio typo exscripti sunt. 3) Alia editio sine loco et anno itemque sine foliorum numeris; sed non solum vbique typo verum etiam capitulorum litteris initialibus maioribus distincta. 4) *Venetiis per Bernardinum Benalium et Io. de Cereto de Tridino alias Tacuinum 1511.* 5) sine loci et typographi nomine 1517. Omnes hae editiones in folio excusae eodem titulo ordineque in publicum prodierunt. Prior *sectio* agit de herbis et plantis, et continet 530. capita, quo numero quidem illum herbarii seu horti sanitatis germanici nonnisi 85. superat; sed quum ex illis, quae in germanico opere de animalibus et fossilibus simul agunt, pauca tantum huic, reliqua vero posteriori sectioni inserta sint, numerus capitum de plantis ad 150. ferme auctus est. Reperiuntur autem inter has omnes plantae operis germanici, sed alio ordine, eodem tamen modo expositae, et illarum figurae, paucis exceptis, conueniunt cum iisdem adeoque, vt illae editionis no. 1. 2. 3. 5. sint plane eadem ac istae Argentoratensis editionis art. IV. 10., ex quo colligere licet, illas operis huius editiones pariter Argentorati excusas esse. Quae huic operi accesserunt figurae, eiusdem cum reliquis farinae, imo quaedam ex his vere monstrosae et ex ludicro auctoris ingenio factae sunt: conf. D. de HALLER l. c. §. V. His accedit, quod haud raro figurae aliis capitibus, quam quo pertinent, praefixae reperiuntur. Quod ad figuras editionis no. 4. attinet, eae omnes non nisi harum imitationes et adhuc viliores ceterum in meo exemplari pari negligentia coloratae sunt. Praefatio huius sectionis in singulis editionibus recensitis ab illa germanici operis hoc tantum momento praecipue differt, quod auctor eius declaret, illum, qui peregrinationem in Palaestinam ceterasque regiones orientales, non solum plantarum, verum etiam animalium, lapidum ceterarumque ad confectionem medicinarum necessariorum et propter raritatem incognitorum gratia suscepit, fuisse permaxime nobilem quendam dominum, cuius instinctu opus hoc conficiendum aggressus fuerit. Reliqua huius operis alteram seu posteriorem eius sectionem constituunt capitibus 144. absolutam et peculiari frontispicio instructam hac inscriptione: *sequuntur alii tractatus, primus de animalibus, secundus de auibus, tertius de piscibus, quartus de lapidibus,* quas sequitur *tractatus de vrinis* et denique *tabula medicinalis cum directorio*, de quibus vero plura si referrem, ab instituti ratione alienum esset: id vnicum moneo, priores quatuor tractatus germanico sermone conscriptos annexos iam esse germanici operis editioni supra artic. IV. 9. indicatae et sigillatim etiam Argentorati per eundem Io. Prys 1509. vt et per Balb. Beck 1529. (conf. no. 9. 11. et 12.) excusas in mea bibliotheca exstare, tractatum vero de vrinis et reliqua in Moguntina iam et omnibus editionibus recensitis reperiri. Latini operis editionibus indicatis

addit D. SEGVIER *biblioth. p. 242.* 6) antiquiorem Moguntiae 1491. fol. ad cuius exemplar procul dubio reliquae recusae tantum sunt; 7) recentiorem Venetiis 1521. fol., quibus forsitan 8) iungendus est liber gallico idiomate expositus et ab eodem *supplem. p. 40.* hoc titulo indicatus: *Arbolayre, contenant les qualitez, virtus, proprietes des herbes, arbres, gommess et semences &c.* fol. sine loco et anno. 9) Nuper admodum D. FRID. BOERNER in Epistola quadam gratulatoria germanice scripta (qua praecipue exposuit: *ob dem Frauenzimmer erlaubt sey, die Arzneykunst auszuüben* i. e. an feminis liceat, artem medicam exercere) Lipsiae ap. Io. Gottl. Imm. Breitkopf 1750. 4. pl. 2. excusa, aliam adhuc huius libri editionem, quem ipse possidet, p. 12. hoc indicavit titulo: *Hortus sanitatis, quatuor libris haec quae sequuntur complectens: de animalibus et reptilibus, de auiibus et volatilibus, de piscibus et natatilibus, de gemmis et in venis terrae nascentibus. Singula autem capita suis pulcre depicta sunt schematibus siue figuris. Omnia castigatius, quam hactenus videre licuit, id quod aequus lector ex collatione facile peruidere poterit. Appositus est index rerum, quae ad medicinam spectant, quam copiosissimus. Argentorati per Matthiam Apiarium. 1536. Fol. foliis 130.* Non solum ex hoc titulo, verum etiam ex primi capituli initio, quod auctor citatus speciminis loco addidit, satis clarum est, hunc librum posteriorem tantum Horti sanitatis partem esse: num prior, de vegetabilibus potissimum agens, eodem anno simul recusa sit, neque hic indicatur, neque alibi annotatum reperi. Ceterum huius libri l. c. mentio facta est, quia auctor in ea opinione versatur, ac si esset opus S. HILDEGARDIS supra art. II. indicatum. Auctores, qui ab ipso citantur, nempe PASCHALIS GALLVS *biblioth. med. Basl. 1590. 8. p. 419.* ISR. SPAACHIVS *nomenclat. script. medicor. Francof. 1591. 8. p. 168.* THOM. IAMES *catal. biblioth. Bodlejanae 1620. 4. p. 253.* IO. CASP. EBERTVS *Eröffnetes Cabinet des gelehrten Frauenzimmers Francof. et Lps. 1706. 8. p. 184.* et POLYC. FRID. SCHACHER *Diss. de feminis ex arte medica claris Lips. ex offic. Langenh. 1738. 4. p. 31.* omnino HILDEGARDIS physicam 1533. et 1544. typis excusam recensent, sed Horti sanitatis ne verbulo mentionem faciunt, vtpote qui non solum figurarum additione, verum etiam expositione se penitus distinguit.

VI. Sub finem seculi XV. comparuit quoque HIER. BRVNSVIGII de arte destillandi tractatus eiusmodi figuris refertus: dum enim eius liber secundus agit de aquis ex herbis per destillationem parandis, atque etiam ipsius herbae brevis historiam (quae excerpta reperitur in BRVNVELSII herbarii tom. II. appendice pag. 183. vsque ad finem HIERONYMI herbarii Argentorat. apodixis germanicae titulo) tradit, singulis herbae ipsius imago praefigitur. In mea collectione tractatus hic sequentibus titulis prostat. 1) *Hie anfa- hen ist das büch genant liber de arte distillandi von der Künst der distillierung, zusammen colligiert und gesetzt von HIERONYMO BRVNSCHWYGK, so dan von vilen erfahrenden Meystern der ertzny er erfahren und ouch durch sin teglich hantwürckung erkundet und geleret hatt.* Ad calcem: *Hiemit volendt das büch genant lyber de arte distillandi de simplicibus von IERONIMO BRVNSCHWYG vruandt Artzot der Keiserlichen freyen statt Straßburg, und getruckt durch den vvolgeachten Johannem Grüeninger zu Straßburg in dem achten tag des meyen 1500. fol. pagg. 212. auersis non numeratis, icon. plantar. 238.,* quarum vero aliquot bis terue alio nomine insertae, omnes autem cum iisdem Herbarii Germanici editionis Argentoratensis, supra art. IV. no. 6. sequu. recensitae, vel eadem vel saltem iisdem similes sunt, additis aliquot aliarum rerum imaginibus futilibus: comprehendunt hunc librum II. pag. 15 — 123. In praefatione Auctor de se ipso haec scribit: *ich HIER. BRVNSCHWYG des geschlechts SALERN, bürtig von Straßburgk &c.* 2) *Medicinarius. Das buch der Gesuntheit. Liber de arte distillandi simplicia et composita. Das nüv büch der rechten kunst zu distilliren. Ouch von MARSILIO FICINO und anderer hochberöpm- ter Artzte natürliche und güte Kunst zu behalten den gesunden leib und zu vertryben die kranckheit mit erlengerung des lebens. Ibid. per eundem 1505. fol. pagg. 188. (vel potius ob errorem in numeris com- missum 192.) auersis non numeratis, icon. 200.: nonnullae enim plantarum aeque, ac aliarum rerum, figurae primae editionis omissae sunt. Titulus equidem auctorem priorum librorum non nominat, praefatio vero iisdem verbis modo citatis eundem declarat. 3) *Das Distilierbuch. Das buoch der rechten Kunst zu distilieren und die wasser zu brennen, mit figuren angezögt &c. Erstmales von meister IERONYMO BRVNSCHWICK zefamen coligiert und ouch dabei von MARSILIO FICINO des hochberümpften, des langen und gesunden lebens, als er an im selb bewert, und hundert und zehen iar rüwigglichen gele- bet hat. Ibid. per eundem 1515. fol. pagg. 130. auersis non numeratis, icon. 198. futilibus omis- sis. 4) eodem titulo *ibid. per eundem 1521. fol. pagg. 130. icon. 207. futilibus iterum missis.* Marsilii tractatus peculiari ti- tulo vti in praecedenti editione instructus a. 1528. Omnium harum editionum lingua germanica excusarum figurae, paucis exceptis, sunt eadem, et no. 2. 4. coloratae, in omnibus vero pari negligentia locatae, quare vero simile videtur, eas a typographo tantum, vtpote iam paratas, pro lubitu lucri causa additas esse, hincque in omnibus editionibus in eadem typographia excusis, numero, ordine, quandoque etiam habitu (vti etiam illae herbarii germanici eiusdem officinae typographicae) variare. 5) *Distilierbuch der rechten kunst, neue und gemein distilier und brennöfen mit aller zugehörender bereitschafft zu machen, aus allen Kreütern die wasser zu brennen und distilieren. Von M. HIERON. BRAVNSCHWEIGEN colligiert &c. sampt lebendiger abcontrafactur der Kreuter &c. iezund von newem gemehrt und gebessert &c. Francof. ad Moenum per Weygand Han, sine anno 4. pagg. 101. plantar. ic. (a pag. 13. ad 90.) 185. 5) Eodem titulo *ibid. per eiusdem typographi haeredes, sine anno, 4to pagg. 126. figurae eadem (vnica sam- buci omissa) sed vilissime coloratae.* Hae editiones quoad expositionem et ordinem cum Argentoratensibus conueniunt (si excipias aquas, quae ex aliis rebus, quam herbis, parantur, quae alteram partem constituunt, pariter cum imaginibus inutilibus praefixis, et FICINI tractatum omis- sum) sed figurae omnes recens sculptae, minores quidem, naturae tamen magis respondentes et illis Egenolfiani herbarii germanici similes sunt. Plures huius operis editiones non vidi, neque etiam vllam ab aliis indicatam reperi. Conf. D. de HALLER l. c. §. VI. Prodiit quidem primus huius tractatus liber, de arte destillandi in genere, cum herbarii germanici editione a RHODIONE publicata (art. IV. no. 13.) et procul dubio etiam vires aquarum simplicium reliquis ibidem re- censitis insertae sunt; sed hae non solum nullibi distinguuntur, verum etiam ipsa plantae historia, quatenus a BRVN-***

BRVNSCHWIGIO traditur, nullibi reperitur, et icones, vt l. c. iam indicatum est, prorsus aliae sunt. Recusus quoque est hic tractatus cum PED. DIOSCORIDIS herbario, primum per IO. DANZIVM von AST germanice reddito et deinde a PETRO VFFENBACHIO correcto, figuris aeneis ornato et Francof. ad Moen. sumtibus *Conr. Cortboys* 1610. in fol. edito, hoc peculiari titulo instructus: *Ars destillandi, oder Diestellier Kunst* HIER. BRAVNSCHWEIG &c. *aufs new übersehen, mit schönen Figuren in Kupffer geziert, von allen erratis entlediget und mit besserm Teutsch begabet* 1610. a pagg. 474. ad pag. 616. Sed hac quoque in editione plantarum descriptiones et figurae omissae sunt, et illae in titulo indicatae repraesentant tantum instrumenta pro aquis destillandis necessaria, plantarum vero icones nonnisi priori DIOSCORIDIS herbario insertae reperiuntur, quae, satis laudabiles, primae forsan sunt in Germania aeri incisae. Asseruatur porro in mea collectione eiusdem Auctoris tractatus hac inscriptione: *liber de arte distillandi de compositis, das buch der waren kunst zu distillieren die composita und simplicia, und das buch thesaurus pauperum, ein schatz der armen genant Micarium &c.* von mir JHERONIMO BRVNSCHWICK &c. (in praefatione BRVNSCHWEIG von SALERN, bürtig zu Straßburg) *Argentor.* 1512. sine typogr. nomine, fol. pagg. 344; paucis tituli verbis mutatis *ibid.* per Io. Grüninger 1519. fol. pagg. 330; *ibid.* per Balth. Grüninger 1532. fol. pagg. 280. in omnibus auersis non numeratis. Sed hoc opus pariter germanico idiomate et in folio excusum, pars altera est prioris et agit solummodo de compositis medicamentis, neque etiam ullam plantarum descriptionem aut iconem continet, adeoque ab antecedenti penitus distinguendum est. Liber eiusdem tractatus quintus est sic dictus thesaurus pauperum, quem sigillatim excusum possideo hoc titulo: *thesaurus, pauperum Haus Apotek guter gebräuchlicher Artzeney &c.* durch HIER. BRAVNSCHWEIG, *Francof. ad Moen. apud Chr. Egenolfs haeredes* 1591. 8. pagg. 133. auers. non numer. nil continet quam remedia euphorista contra varios morbos, et procul dubio idem est cum illo, quem SEGVIERIVS p. 233. titulo *Apothecae vulgi* 1729. 8. germanice impressae indicat.

VII. Silentio denique hic praetereundum haud est PETRI DE CRESCENTIIS opus ruralium, quoniam aliquot stirpium figuras pariter continet, licet hae quoque nonnisi typographis tribuendae, ipsae viles et absque iudicio plerumque locatae sint. Huius operis possideo sequentes editiones in folio excusae 1) *PETRVS DE CRESCENTIIS zu teutsch mit figuren.* ad calcem: *gedrückt und volendet noch der Geburt Christi M CCCC XCIII.* sine paginis sed cum custode. foliis 229. ind. 5. 2) *PETRVS DE CRESCENSIS Das büch von Pflanzung der aecker, boem und aller krüter.* ad calcem: *nüvv getruckt und geendet M D XII.* vna cum indice pagg. 172. auersis non numeratis. Vtraque editio locum, ubi excusa est, non indicat, inter figuras autem, quas haec et illa exhibet, nulla prorsus est differentia, si paucas excipias in posteriori omittas vel alio loco insertas. Reperiuntur harum circiter 160, ex quibus illae herbarum maximam partem sunt eadem cum istis herbarii germanici Argentorati excusi (vnde coniectura de loco typographi facilis est) arborum vero circiter 40, adhuc viliores. Praeter has stirpium icones plures insertae sunt aliae nullius prorsus momenti. 3) *PETRVS DE CRESCENTIIS von dem nutz der ding die in aeckern gebowt werden.* *Argentor. impress. apud Io. Schott* 1518. pagg. 169. auersis non numeratis, tit. praef. et ind. fol. 6. icon. stirp. 157. ex quibus ultra 100. sunt illae ipsae, quae editio Herbarii latini superius art. III. no. 3. recensita continet, ex quo concludere licet, eam herbarii latini editionem Argentorati quoque excusam esse. 4) *De omnibus agriculturae partibus et de plantarum animaliumque natura et utilitate lib. XII.* per PETRVM CRESCENTIENSEM &c. *Basil. per Henrich. Petri* 1548. pagg. 385. tit. praef. et index pagg. 12. icon. stirp. 135, quae, ante memoratis minores, paullo maiori quidem artificio sculptae et maximam partem naturali exemplari similiores sunt; nihilominus tamen pariter de incuria auctoris testantur et haud paucae, vti in antea memoratis, incongruo loco, imo etiam plus quam semel insertae reperiuntur. Plures huius operis editiones variis linguis impressas indicat saepius citatus D. SEGVIERIVS p. 354, ex quibus tamen non nisi tres occurrunt cum figuris, nempe Venetiis 1511. 4. *ibid.* italica lingua 1561. 4. *ibid.* eadem lingua 1564. 8. cum 16. figg. quas nondum vidi; sex aliae autem sine figuris ab ipso etiam indicatae mihi ad manus sunt, nempe 5) latino sermone exposita in folio columnis diuisis, sine titulo, sine paginarum numeris et sine litteris initialibus (pigmento nunc rubro nunc caeruleo artificiose adscriptis) cum littera tamen custodis. Ad calcem legitur: *Praesens opus ruralium commodorum PETRI DE CRESCENTIIS hoc industrioso caracterisandi stilo ad cunctorum utilitatem omnipotentis dei suffragio novissime impressum est in domo Johannis de Westfalia. Alma ac florentissima in universitate Lovaniensi, foliis 195. sine anno* 6) Alia editio iisdem characteribus eademque mole cum hac rubra ad calcem subscriptione: *Praesens opus ruralium commodorum Petri de Crescentiis. quodam industrioso caracterisandi stilo: novissime omnipotentis dei suffragio adinuento, extitit hac littera vera modernata abscisa. et formata: impressum per Joannem de Westfalia Paderbornen dyocesis. In alma ac florentissima universitate Lovaniensi residentem. Anno incarnationis Dominice m'cccc. lxxiii. mensis Decembris die nona. ???* Hoc in exemplari aliquot litterae initiales auro et variis pigmentis elegantissime pictae sunt. 7) Antiquior editio in fol. sine paginarum numero, custode et sine litteris initialibus foliis 205. columnis integris cum hac in fine subscriptione: *Petri de crescencys ciuis bononi. ruralium commodorum libri duodecim finiunt feliciter per iohannē Schüssler ciuem augustensem impressi. circit. xiiij. kalendas marcias. anno vero a partu virginis salutifero Millesimo quadringentesimo et septuagesimo primo 1c.* 8) editio pariter in folio cum hoc simplici titulo primo folio impresso: *Opus ruralium commodorum Petri de Crescentiis.* Ad calcem: *Praesens opus ruralium commodorum Petri de crescentiis hoc industrioso caracterisandi stilo ad cunctor. utilitatem omnipotentis dei suffragio impressum est argentine. Anno domini m cccc lxxvj Sinitum quinta feria ante festum sancti Gregorii.* Haec editio constat foliis 147. columnae sunt diuisae et singulis paginis tituli loco adscriptus est librorum numerus, ceterum nec paginarum numeri nec custodis litterae adsunt, et loco initialium litterarum maiorum areis vacuis impressae sunt litterae minores. conf. Scriptores rei rusticae &c. curante IO. MATTH. GESNERO *Lips. sumpt. Cass. Fritsch* 1735. 4. mai. editi praemissor. p. XLIX. 9) *de agricultura,*

cultura omnibusque plantarum et animalium generibus libri XII. auctore optimo philosopho et agricola PETRO CRESCENTIENSI &c. Basil. per Henr. Petrum 1538. 4. pagg. 574. 6) Trattato dell' Agricoltura di PIERO de' CRESCENZI &c. di nuovo rivisto e riscontro con Testi a penna dallo NFE. RIGNO. In Firenze 1605. appresso Cosimo Giunti. 4. pagg. 576. tit. dedic. et praef. pagg. 8. ind. pagg. 12.

Atque haec sunt opera illa stirpium imaginibus ornata, ex quibus, renascente rei herbariae studio, eius cultores informationem haurire poterant, vsque dum feliciori fidere, priori iam seculi XVI. dimidio, plures viri cordatiores et doctiores, omnes quantum scio (neque etiam LINNAEVS biblioth. bot. alios istius aevi inter ichniographos indicat) Germani, stirpium descriptiones figuris naturae magis similibus illustratas cum publico communicarunt, quorum operum breuem recensitionem coronidis loco addo.

VIII. Omnium autem primus genuinas stirpium imagines paratas cum publico communicare coepit immortalis memoriae BRVNfelsivs, cuius opera huc pertinentia sequenti ordine prodierunt. 1) *Herbarum vivae eicones ad naturae imitationem summa cum diligentia et artificio effigatae, unacum effectibus earundem, in gratiam veteris illius et iamiam renascentis herbariae medicinae per OTH. BRVNf.* recens editae 1530, quibus adiecta ad calcem appendix isagogica de usu et administratione simplicium, item index commentariorum singulorum. Argentorati apud Io. Schottum. fol. praeter dedic. et indic. pagg. 266. App. plagg. 14. icon. 86. 2) *Noui herbarii Tomus II. per OTH. BRVNf.* recens editus 1531. *ibid.* pagg. 90. icon. 49. cum appendice varios aliorum auctorum commentarios continente pagg. 199. et ind. pagg. 5. 3) *Tomus herbarii OTHONIS BRVNfelsii III.* (posthumus) *collariis operi praefixis, quibus respondet calumniatoribus suis, passim errata quaedam priorum tom. diluens.* *ibid. ap. eundem* 1536. pagg. 240. ind. pagg. 2. icon. 103. 4) Recusus est *ibid.* apud eundem *Tom. I.* eodem titulo et absque mutatione a. 1532. 5) *Tom. II.* vero a. 1536. eodem quidem titulo, sed ita mutatus prodiit, ut non solum paginis, verum etiam quatuor iconibus (*Iaceae nigrae, Rorismarini, Salviae, Valerianae*) sed parvis additis differat. 6) A. 1537. *ibidem* apud eundem comparuit iterum *Tom. I.* a. 1632. recusus vna cum *Tom. II. et III.* a. 1536. edito, sed hoc titulo generali praefixo: *OTH. BRVNfelsii herbarium tomis tribus exacto tandem studio, opera et ingenio candidatis medicinae simplicis absolutum:* qua in editione nil reperitur mutatum. 7) Tandem a. 1539. iterum eodem titulo generali apud eundem prodibat hocce opus, cuius *Tom. I.* paginis quidem respondet praecedentibus editionibus, sed non contentis, quibus denuo accesserunt sex icones (*plantaginis aquaticae, Dracontii maioris, Parietariae, Aristolochiae, Verbenae foeminae, Perfoliati*) ex quibus autem quatuor ultimae totidem aliis hic omissis (*Boni Henrici, Fumariae bulbosae secundae speciei, Senecionis, Bifolii sine flore*) ceu emendatae substituuntur. *Tom. II.* est idem a. 1536. recusus; *Tom. III.* vero etiam denuo impressus, paginis quidem convenit cum eius prima editione, sed cotinet quatuor figuras novas (*Astrantiae, alteram iconem Semperuii, Filicis, Cumini*) et duas emendatas (*Allii, Porri*) totidem vero etiam viliores (*Acatosellae, Arisi*) et vna (*Colchici*) prorsus omissa est. Ceterum huius editionis ultimo tomo iterum accessit appendix de usu et administratione simplicium in praecedenti editione omissa. Praeter has latinas editiones 8) prodiit hoc opus in germanicam linguam traductum hac inscriptione: *Contrafayt Kreüterbuch nach rechter vollkommener art, und beschreibungen der alten, bestberümpften ärztz, vormals in Teutscher sprach, der massen nye gesehen, noch im Truck aufsgangen. Sampt einer gemeynen Inleytung der Kreüter vrhab, erkantnuss, brauch, lob, und herrlicheit. Durch OTHO BRVNfELSS newlich beschrieben 1532. zu Straßburg bey Hans Schotten.* fol. pagg. 332. praemiss. pagg. 20. index nom. german. et morbor. pagg. 14. icon. 176. ex quibus 4. bis occurrunt. 16. novae autem (p. 34. *vveisser Augentrost*, 90. et 92. *Teuffels Abbiss*, 97. et 185. *Frauwven rößlin* (lychnis coronaria) 102. *vveißs Gilgen*, 112. *Blavv Gilgen*, 128. *Edler Hanen Fußs* (Geranii species) 136. *Chamillen*, 214. *Groß Vogelkraut* et *Klein Vogelkraut*, 233. *Wolffsmilch* (*Esula rotundifolia*) 238. *Edler Steinbrech* (*Herniaria*) 241. *Schlutten* (*Alkekengi*) 243. *Widerihon oder W. dertodt* (*polytrichon aureum*) 262. *Springkraut* (*Cataputia*) 323. *Katzentreubel männlin und vveiblin*) accesserunt, quae in III. tomis latinis omnium editionum non reperiuntur. 9) *Ander Teyl des Teutschen Contrafayten kreüterbuchs. Durch Doctor OTTH. BRVNfELSS zusammen verordnet und beschriben 1537. fol. ibid. ap. eundem*, pagg. 173. tit. praef. pagg. 3. ind. pagg. 2. icon. 98. ex quibus 27. ad priorem tomum, vtpote *ibidem* iam descriptae, referuntur, et vnica, scilicet p. 145. *Ricinus*, descriptione caret, ceterum 32 icones (p. 14. *Crocus* (*Colchicum cum fructu*) 32. *Knoblauch*, 36. *Zybeln* (*cepa*, cuius eadem icon quidem op. lat. T. III. edit. 1540. iam reperitur, sed minor) 41. *Weißer Senff*, 48. *Mörrettig*, 62. *Reiß* (*Nasturtium hortense*) 67. *Zyßeren* (*Cicer*) 75. *Römischer Mangold*, 76. *rother Mangold*, 84. *Weinreb*, 87. *Hartryegel* (*Ligustrum cum baccis*) 88. *Schlehen*, 88. * *Wegkholder* (*luniperus*) 90. *Brombä. en*, 92. *Beerenkloe* (an *Astrantia*) 96. *Bertram* (*Ptarmica*) 98. *Diptam* (*Fraxinella*) 108. *Wyllder Hysop*, 112. *Stabvürtz*, 114. *Encian* (quo nomine damno errore sistitur icon *Belladonnae*) 116. *Bachbunn* (*Beccabunga rotundifolia*) 118. *Saurrauch* (*Berberis cum fructu*) 132. *Hausvürtz* (*Sedum maius*) 137. *Beervürtz*, 138. *Nept*, 139. *Peonien Rosen*, 140. *Hopff* (*Lupulus*) 142. *Weisse Nyessvürtz* (an *Arnica*) 144. *Geyßblatt* (*Caprifolium*) 145. *Wunderbaum* (*Ricinus*) 146. *Rosen*, 148. *Röte* (an *Carthamus*) novae sunt. Praefatio docet, hunc tomum post auctoris obitum in lucem prodiiisse, et illarum plantarum, quae postea latinis tomis accesserunt, descriptionem latinam ex schedis auctoris relictis Doct. MICH. HERR adornasse. His operibus accensendus adhuc est 10) liber, cui titulus: *In DIOSCORIDIS historiam herbarum certissima adaptatio, cum earundem iconum nomenclaturis graecis, latinis et germanicis. Der kreüter rechte warhafftige contrafactur, erkantnuss, und nahmen kryechisch, latinisch und teutsch, nach der beschreibung DIOSCORIDIS* 1543. Argentorati Io. Schottus aere perennius dedit. fol. pagg. 372. sed falso calculo: siquidem pagg. 108. ad 111. et pagg. 244. ad 299. omissae sunt, et quidem non solum in meo exemplari, verum etiam in alio collato. Accedit index plantarum, nominum latinorum, temporis quo florent et quo colligendae, naturae seu complexionis eiusque graduum, et loci ubi crescunt pag. 14. Continet nempe hic liber 314 icones, ex quibus 271. eadem sunt, quae in BRVNfelsii operibus vel latinis vel germanicis apud eundem

dem typographum excusis reperiuntur, si excipias quinque (secundae edit. T. II. p. 63 *Rosmarinum*, 92. *Saluiam*, primae edit. T. III. p. 105. *Anisum*, p. 135. *Allium*, Germ. edit. T. II. p. 40. *Sinapi*) quae hic eodem quidem habitu, sed magnitudine aucta, sistuntur; reliquae vero quadraginta tres (p. 27. *Cicuta*, 28. *Ruta montana* (Thalictrum) 78. *Aloe*, 79. *Sena*, 81. *Sambucus*, 96. *Helix* (Bryonia baccis rubris) 113. *Omphalocarpon* (Aparine) 114. *Solidago Saracenica*, 115. *Stichas vel stoechas* (an Cinara) 146. *Ribes*, 161. *Hymphor* (Rubus idaeus), 162. *Vitis alba* (Bryonia baccis nigris), 170. *Cyclaminus* (Lathyrus aruensis tuberosus), 178. *Hieracium paruum*, 179. *Androsomon* (Hypericum Androsaemum dictum), 196. *Ein Wasserkrant* forte *Wasser Epff* (Apium palustre), 197. *Nardus indica* (Lauendula latifolia), 198. *Pseudonardus*, *Lauendula* (Lauendula angustifolia), 200. *Anethum*, 201. *Blitum*, 202. *Betonica pratensis* (Caryophyllus sylvestris) et *Betonica sylvestris* (Lychnis flore laciniato), 206. *Ocimum minus*, 217. *Aconitum pardalianches* (Paris), 219. *Tusago* (Chamaedrys montana), 307. *Sanct Catharinen Blüm* (Nigella aruensis) et *Weinkrant* (an Lycopodium), 313. *Absinthium maritimum*, 314. *Abrotanum foemina*, 315. *Ononis*, 316. *Heracleotica*, *nux auellana*, 317. *Cypressus* (an Chamaepitys, parua icon), 319. *Narcissus* (planta flore radiato ex icone non cognoscenda), 321. *Lysimachia* (quadrifolia lutea), 322. *Pteris*, *Filix mas* (an Polypodium), 328. *Centummorbia* (Numularia), 352. *Spatulula foetida* (falsa icon mihi ignota), 353. *Polygonum*, 356. *Vergiss mein nit* (Echium scorpioides palustre), 358. *Veratrum album*, 361. *Ruta sylvestris mas* (Thalictrum), 366. *Telephium*, *Crassula maior*, *Aizoum sylvestre* (an Baccharis), 372. *Brennkrant* (an Galeopsis calycibus aculeatis) accesserunt, quum omissae sint e contrario decem et septem (*Plantago rubra* T. I. p. 25, *Chamaedrys* 125, *Bifolium* absque flore 183, *Gänsblumlein* (Alyssi species) T. II. p. 34, *Vaisfolium* 68, *Pentaphyllum* app. 215, *Elichryson* T. III. p. 114, *Centauria* (Centaurium minus) 125, *Cuminum* 138, *Chaerophyllum* 141, *Origanum* 159, *Millefolium paruum* 171, *Napus* 193, *Sifer* 198, Germ. edit. T. I. *Napi* alia figura p. 45, *Thymus* 109, *Wilde vvelsche bohnen* (Lychnidis species) 119) quae memorata opera continent. Ceterum huius libri singulis stirpibus nuda tantum nomina graeca, latina et germanica adduatur saepissime correctae, unde etiam species vnus generis accuratius coniunguntur; seruantur tamen multorum nomina falsa et praecipue etiam illud *Gentianae* p. 87. *Belladonnae* imagini iterum adscriptum. Pag. 221, ad 312. inferuntur plantarum nondum cognitarum descriptiones ex DIOSCORIDE in germanicam linguam versae. Quoniam huic libro nulla praefatio nec alia informatio praefixa est, incertum manet, cuius ope vnus sit typographus in illis, quae ad correctionem et auctiorem eius pertinent. Ceterum adhuc moneo, SEGVIERIVM p. 54. hunc librum annumerare FVCHSII operibus, deceptum a catalogo bibliothecae Riuiianae ab ipso citato, vbi p. 577. no. 6419. Fuchsi opera botanica sequitur.

IX. Eodem tempore, quo BRVNfelsivs rem herbariam egregie illustravit, pari studio eundem scopum sibi praefixit TRAGVS siue, quod germanica lingua idem significat, BOCK, quem SEGVIERIVS p. 15. BOACK perperam scribit: quousque tunc temporis iam in distinguendis stirpium nomenclaturis penetraverit, satis docet eiusdem epistola ad BRVNfelsivm a. 1531. data et huius herbarii Tom. II. append. p. 272 — 281. inserta. Operum, quae ipsemet edidit, sequentes possideo editiones. 1) *New Kreütter Buch*, von unterscheydt, wurckung und namen der kreütter so in Teutschen landen wachsen. Auch derselbigen eygentlichen und wolgegründten gebrauch in der Artzney, zu behalten und zu fürdern leibgesundbeyt fast nutz und tröstlichen, vorab gemeynem uerstand. Beschriben durch HIERONIMVM BOCK aus langwiriger und gewisser erfahrung, und gedruckt zu Straßburg, durch Wendel Ribel. Im Jar 1539. fol. Pars I pagg. 174. auersis non numeratis. Praemiss. ind. pagg. 20. Pars II. pagg. 88. ind. pagg. 8. Capita 200. describere 478 plantas, ipsa indicat praefatio; sed tot capita comprehendit pars I. et 119. pars II: caret autem haec editio iconibus. 2) *Kreutter Buch*. Darin Unterscheid, Wurckung und namen der kreuter, so in Deutschen landen wachsen, auch derselbigen eigentlicher und wolgegründter gebrauch inn der Artzney fleissig dargeben, Leibsgesundheit zu behalten und zu fürdern seer nützlich unt tröstlich, vorab dem gemeinen einfältigen man. Durch H. HIERONIMVM BOCK aus langwiriger und gewisser erfahrung beschriben, und jezund von neuen fleissig übersehen, gebessert und gemehret, dazu mit hüpschen artigen Figuren allenthalben gezieret &c. ad calcem: gedrubkt zu Straßburg bey Wendel Ribel 1546. fol. pagg. 353. auersis non numerat. icon. 477. (inter quas cap. 42. p. 51. b, vbi de aquilegia agit, icon quoque *Rhapontici enulae folio* nomine *Rapontic* occurrit, quae in omnibus sequentibus editionibus omissa est.) praemiss. cum indic. pagg. 38. Pars I. iterum comprehendit cap. 200.; sed P. II. 150. Hanc esse primam huius autoris editionem figuris ornatam, testatur typographi praefatio eodem a. 1546. scripta, vbi indicat, se ante 3. annos de figuris addendis sollicitum fuisse, ex quo simul patet, eum curam earundem habuisse, id quod probabilius redditur ex eo, quod auctor in sua praefatione et dedicatione eodem anno consignata figurarum nullam plane mentionem facit: hinc vbicunque hae figurae illarum BRVNfelsii aut FVCHSII (de quibus artic. sequ.) imitationes tantum sunt, plagium hoc forte non auctori sed typographotribuendum est. SEGVIERIVS l. c. ex Cat. bib. Lugd. bat. editionem eiusdem anni ibidem excusam titulo longe alio recenset, quo elementorum, quadrupedum, avium et piscium simul mentio fit; sed nullum aliud exemplar in citato catalogo reperire potui, quam p. 131. solo hoc titulo: *HIER. BOCK Kreutterbuch*. Straßb. 1546. fol. de erroris origine conf. numerum 8. mox sequentem. 3) *HIERON. TRAGI de stirpium, maxime earum, quae in germania nostra nascuntur, vsitatis nomenclaturis, propriisque differentiis, neque non temperaturis ac facultatibus, commentariorum libri tres, germanica primum lingua conscripti, nunc in latinam conuersi, interprete DAVIDE KYBERO Argentinenfi*. His accesserunt a fronte praefationes duae, altera D. CONR. GESNERI &c. rei herbariae scriptorum, qui in hunc vsque diem scripserunt, catalogum complectens: altera ipsius Authoris, herbariae cognitionis laudes, et alia nonnulla scitu tum necessaria, tum iucundissima, continens. Praeterea corollarii vice ad calcem operis adiectus est *BENED. TEXTORIS Segusiani de stirpium differentiis ex DIOSCORIDE secundum locos communes libellus &c.* Ad haec indices sex: quibus non tantum nomenclaturae graecae, latinae, germanicae, arabicae, hebraicaeque, sed et morborum curationes optimo ordine indicantur, subiunximus. Argentorati excudebat Wendelin. Ribelius anno 1552. 4. pagg. 1200. praemiss. pagg. 66. indic. pagg. 62. Hac editione continentur eadem no. 2. icones et 15. nouae (p. 13. *melissa vulgaris*, 130. *polygonaton*, *Lydwveich*, 144. *Bellis maior*, 167. *Phyllium*, 297. *τιθύμαλος καπαρισσίας*, 312. *Prunella*

la (Bugula), 464. vulgare apium, 523. iecoraria, 678. gramen, 781. orchis foemina altera, 790. ἀσφάδεος, 832. cucumis siluestris, 841. tribulus aquaticus, 863. acanthus seu branca vrsina italica vera, 876. cuminum sativum) vt et 3. emendatae (p. 406. elleborus niger verus (adonis), 543. filicis maioris alterum genus (osmunda), 904. Sphatula foetida) nec non totus liber III. a p. 939. ad 1127. capit. 80. et figg. 76. arborum et fruticum potissimum historiam tradens. Ceterum icones L. I. et II. totidem capitibus et eodem ordine ac in no. 2. recensentur, si excipias illas p. 37. 72. f. 1. 729. 772. 778. 814. 885. alio nomine et loco expositas. Praefatio TRAGI noua et multo prolixior, sed sine die et consule data, cap. XI. de artifice, qui figuras delineauit haec commemorat: *nostros vero commentarios iconibus illustrauit adolescentulus quidam Argentinenſis Dauid Kandel nomine. Is enim Wendel. Ribellii nostri sumptibus ad me Hornbachium concessit, ubi herbarum fruticum, arborumque imagines simplicissime, sed et ad imitationem viuuarum stirpium, quas illi proponebam, diligentissime expressit &c.* 4) *Verae atque ad viuum expressae imagines omnium herbarum, fruticum et arborum, quarum nomenclaturam et descriptiones HIER. BOCKIUS in suo tum germanico, tum latinitate donato ac recens aedito Herbario comprehendit, nunc primum hac minori forma in gratiam et utilitatem omnium herbariae rei studiosorum excusae, cum subscripto hoc ipso titulo germanice reddito. Straßburg bei Wendel Ribel 1553. 4. pagg. cccxxxiii. continet eodem ordine omnes icones no. 3. vnica Acanthi omiſſa, cum appposito nomine latino et germanico. Tituli pagina auersa ostendit auctoris effigiem, et ad calcem adiectus est index nominum germanicorum pagg. 6. ceterum praefatione et omni descriptione caret.* 5) *Kreuter Buch, darinn Unterscheid, Nahmen und Würckung der Kreütter, Stauden, Hecken und Beümen, sampt ihren Fruchten, so in teutschen landen vvwachsen &c.* iisdem verbis ac no. 2. ad calcem: *Straßburg durch Jos. Ribel 1560. fol. pagg. 413. auersis non numeratis, praemiss. indic. pagg. 48.* In hac editione omiſſae sunt editionis 2. 3. 4. figurae 15. sequentes: *vulgare rapum alterum s. rot Ruben, Vicia, lilium album, cuscuta, edit. no. 3. acanthus, edit. no. 3. et 4. psyllium, gramen, orchis foemina altera, asphodelus, tribulus aquaticus, cuminum sativum, sphatulae foet. icon emendata, rhymelaea, sebesten, iuiubae.* 6) *Eodem titulo, ibidem per eundem 1565. nec paginis nec contentis, nec figuris differt a no. 5, si excipias iconem viciae, cuscutae, sphatulae foet. emendatae, rhymelaeae, sebesten, iuiubarum ex edit. no. 2. 3. et 4. additas.* 7) *Eodem titulo ibid. per eundem 1572. differt pagg. 369. auersis non numeratis, contenta autem cum figuris respondent no. 6., si vnicam tribuli aquatici figuram ex edit. no. 3. et 4. additam excipias.* 8) *Eodem titulo cum hoc additamento: item van den vier elementen, zamen und wilden thieren, auch Vögeln und Fischen, Milch, Käs &c. alles durch H. HIER. BOCK aus langvüriger und gewisser erfahrung beschriben. Fezund aufs neu mit allem Fleiß übersehen und mit vielen nützlichen Experimenten gebessert und gemehret, auch wie man die Kreütter zu rechter Zeit samlen und distilliren soll. Durch MELCHIOREM SEBIZIVM &c. sampt fünff nützlichen Registern, ibid. per eund. typograph. 1580. fol. pagg. 450. auersis non numeratis, praemiss. cum ind. plantar. nominum graecor. arabic. latinor. et germanicor. pagg. 60. virtutum pagg. 44. Differt haec editio a praecedentibus praefatione SEBIZII d. d. 14. Aug. 1577. data, instructione de plantarum collectione et aquis ex illis destillandis inter praemissa contentis, vt et Parte IV. pag. 397. seqq. quae antea sigillatim iam excusa fuit. Reliquum et quod ad stirpes proprie pertinet opus, praeter virtutum expositionem paullo prolixiorem, figuris conuenit cum no. 5. si excipias 6. icones (p. 35. gefüllter Hanenfuß, p. 43. Wild Nigella, p. 54. Krotendill, p. 122. b. klein Stabwurcz, p. 294. b. melonen p. 315. mondragora Weiblein) et vnam (p. 295. Peponen) mutatam. 9) *Kräutterbuch, weylant des weitberhymten und hocherfahrenen Herren HIERONTMI TRAGI, genant BOCK, auf vielfaltiges begeren und freündliches Ersuchen mit Fleiß übersehen und mit der kräutter zunamen vrsachen, qualiteten, deren gradibus, gebrauch in den Apotecken in sehr vielen innerlichen und äußerlichen experimentis gemehret und gebessert durch MELCHIOREM SEBIZIVM &c. sampt angehenchten Speiskammer ermelten Herrn H. BOCKEN, darinn aber für dissmal nichts geändert vworden. Straßburg in Verlegung Wilhelm Christian Glasers 1630. fol. pagg. 892. praemiss. p. 47. indic. pagg. 79. P. IV. pagg. 94. ind. pagg. 8. Huius editionis titulus aeri incisus est et eius curam habuit MELCH. SEBIZII filius eiusdem nominis. Figurae omnes sunt eadem ac no. 8. Quae pater eius addidit, littera s. et quae filius adiecit* notata sunt, ad quem porro pertinent (synonyma plantarum ex aliis auctoribus collecta et ad margines notata. Omnes hae editiones (no. 5—9) continent TRAGI praefationem eandem, quam no. 3. exhibuit, germanice compositam cum subscripto d. 4. Febr. a. 1551. Eodem etiam anno operis huius editionem germanico sermone recusam esse, indicat SEBIZIUS filius in sua praefatione, quam editionem nondum vidi neque etiam a LINNAEO et SEGVIERIO annotatam reperi. Praeter has SEGVIERIVS p. 15. aliam editionem germanici operis in fol. a. 1580. et 1586. itemque imaginum (no. 4.) in 4. a. 1554. indicat, quae etiam ad manus meas nondum peruenerunt.**

X. Tertius vtilissimi huius instituti socius erat LEONARDVS FVCHSIUS, vel propterea praestantior, quod primus excusserit inueteratum illud praeiudicium, DIOSCORIDEM omnes nouisse plantas, omnesque plantas, quas nouit, vbique crescere. Primitiae scientiae suae sunt *Annotationes aliquot herbarum et simplicium a medicis haecenus non recte intellectorum*, quae cap. 34. comprehensae extant in Brunf. herb. T. II. app. a p. 129. ad 155, quae vero epitome tantum sunt earum, quas inter alias, ad materiam sic dictam medicam non pertinentes, continet huius auctoris libellus Haganoae in aedibus Io. Seceril a. 1530. impressus hoc titulo: *Errata recentiorum medicorum LX. numero, adiectis eorundem confutationibus in studiosorum gratiam iam primum aedita.* 4. pagg. 79. auersis non numeratis. Operum eius botanicorum editiones in mea bibliotheca afferuantur sequentes: 1) *de historia stirpium commentarii insignes, maximis impensis et vigiliis elaborati, adiectis earundem viuus plusquam quingentis imaginibus, nunquam antea ad naturae imitationem artificiosius effectis et expressis, LEONHARTO FVCHSIO autore &c.* Accessit iis succincta admodum vocum difficultium et obscurarum passim in hoc opere occurrentium explicatio. Vnacum quadruplici indice, quorum primus quidem stirpium nomenclaturas graecas, alter latinas, tertius officinis seplatorum et herbariis vsitatas, quartus germanicas continebit. Basil. in officina Isingriniiana 1542. fol. mai. capp. 343. pagg. 896. ic. 512. praemiss. cum auctoris effigie p. 28. Acced. ad calcem effigies Henr. Füllmaureri et Alb. Meyeri pictorum, nec non Viti Rad. Speckle sculptoris super vna pagina. 2) *New Kreuterbuch, in wvelchem*

nit allein die gantz histori, das ist, nahmen, gestalt, statt und zeit der vachfung, natur, krafft und vvürkung, des meystentheyls der kreüter so in teutschen und andern landen vvachsen, mit dem besten vleiss beschriben, sonder auch aller derselben vvurtzel, stengel, bletter, blümen, samen, frucht, und in summa die gantze gestalt, also artlich und kunstlich abgebildet und contrafayt ist, das desgleichen vormals nie gesehen, noch an tag kommen. Durch LEONHART FVCHSEN &c. Mit dreyen nützlichen Registern &c. Basel durch Mich. Isingrin 1543. fol. mai. capp. 346. pagg. 345., inter quas (secus ac in latina editione) non numerantur illae iconum, quarum reperiuntur CCCCXV. vel potius XVIII: numerus XXII. enim duabus figuris additus est, figura post XII. numero caret et figuras 357. et 358. vna pagina continet. Accesserunt ergo huic editioni sex icones (c. 7. f. 12. * Hünerebiss, c. 11. f. 23. spiziger vvegerich, c. 186. f. 276. vvilder meerhirs, c. 210. f. 315. knabenkraut vveible das mittel, c. 325. f. 482. vveiss mertzenblüm, c. 344. f. 512. kuchenschell) nouae. Ceterum figurae vtriusque editionis sunt eadem, et singulae integram folii paginam magnitudine aequant, iis tantum exceptis, quarum exemplaria natura sua minora sunt: paucae in edit. no. 2. aliis nominibus et alio ordine reperiuntur. Qui has icones cum illis TRAGI confert, facile deprehendit, illarum vt et earum a SEBIZIO additarum, magnam partem imitationes tantum harum esse. 3) Laebliche abbildung und contrafaytung aller kreuter, so der hochgelert Herr LEONHART FVCHS, der Artzney Doctor, inn dem ersten theyl seines neuwen kreüterbuchs hat begriffen, in ein kleinere form auff das allerartlichest gezogen, damit sie füglich vonn allen mögen hin und vvider zur notürfft getragen und geführt vverden. Gedr. zu Basell durch Mich. Isingrin 1545. 4) LEONHARTI FVCHSI medici, primi de stirpium Historia commentariorum tomi viuae imagines, in exiguum angustioremq. formam contractae, ac quam fieri potest artificiosissime expressae, vt quicunque rei herbariae radicibus cognoscendae desiderio tenentur, eas vel deambulantes vel peregrinantes in sinu commodius gestare, adque natiuas herbas conferre queant. Vnacum duplici indice, quorum primus stirpium nomenclaturas latinas, alter vero germanicas continet. Basileae 1545. 5) Plantarum et stirpium icones LEONHARDI FVCHSI, medici et botanici celeberrimi, exquisite simul et artificiose in manuales hanc epitomen, Phytologiae studiosis percommodam, congestae: adiecto omnium quae continentur indice diligentissimo. Lugduni 1595. Hae tres (3. 4. 5) libri in 8. pagg. 516. prodierunt, ad quam magnitudinem icones etiam redactae sunt, satis quidem exemplari illarum no. 1. et 2. respondentes, sed ob imminutam magnitudinem non omnia tam clare repraesentantes, atque praeterea, more artificum, figuras denuo sculpsimus, inuersae. Ipsae figurae in singulis sunt eadem, atque omnes illae, quas no. 1. et 2. continet, vnica (Verbenaca recta siue mas no. 1. p. 592. et no. 2. fig. 236.) excepta hicque omissa, vt adeo 517. (p. 361. nempe duas) icones contineant. Singulis his, sine vlla descriptione, additum est nomen latinum et germanicum, paucis aliud, quam in no. 1. et 2. quae propterea etiam alio ordine occurrunt. Ceterum no. 3. 4. et 5. non differt nisi titulo et praefatione germanica. Prodiisse autem no. 3. et 4. auctoris consensu, docet eiusdem praefatio praefixa, prior d. 10. Augusti, posterior d. 28. eiusdem scripta. Prioris tomi no. 3. et 4. mentio fit, quia auctor sibi proposuit alterum quoque edere, atque etiam iam multas icones illi destinatas parandas curauit, quae nunc ad manus D. D. IO. GESNERI, Tiguri Canonici et medicinae Professoris celeberrimi peruenerunt. conf. ill. HALLERI Praef. ad opus Weinmann. §. VIII. nota k. 6) de historia stirpium commentarii insignes maximis impensis et vigiliis elaborati, LEON. FVCHSIO auctore: scholiis in singula prope capita longe vtilissimis a viro quodam medicinae doctissimo adiectis et plantarum voces gallicas passim exprimentibus. Accessit iis succincta admodum vocum difficultium et obscurarum passim in hoc opere occurrentium explicatio. Vnacum triplici indice (germanico omisso) &c. Parisiis apud Carolum Guillard 1547. 12. p. 492. auersis non numeratis, praemiss. et ind. pagg. 32. 7) de Historia stirpium commentarii insignes LEONH. FVCHSIO auctore. Accessit iis succincta &c. vt no. 6. Adieci mus praeterea indicem vlgarium seu gallicarum dictionum, nunquam antea excusum. Lugduni ap. Guil. Gazelum 1547. 12. p. 957. praemiss. et ind. pagg. 20. vocum explic. pagg. 16. 8) eodem titulo et addito: vnacum quintuplici indice, graecas, latinas, herbaris seu officinis vsitatas, gallicas et italicas nomenclaturas continente. Lugd. ap. Io. Tornaesium et Guil. Gazelum 1555. 12. pagg. 976. praemiss. et ind. pagg. 48. voc. expl. pagg. 15. Hae editiones (6. 7. 8.) figuris carent. 9) De Historia stirpium commentarii insignes. Adiectis earundem vltis et ad naturae imitationem artificiose expressis imaginibus, LEONH. FVCHSIO auctore. Accessit iis succincta admodum vocum quarundem &c. explanatio. Triplex item index. Prior stirpium latinas nomenclaturas, alter officinis et vulgo vsitatas, tertius gallicas dabit. Lugd. apud Balthaz. Arnoletum 1549. 8. pagg. 852. icon. 512. praemiss. cum ind. et auct. effigie pagg. 29. voc. expl. pagg. 11. Haec editio ad exemplar no. 1. recusa est, sed figurae eousque imminutae sunt, vt longitudine vix 3 pollices superent adeoque ad vsum prorsus ineptae sint. 10) Commentaires tres excellens de l'histoire des plantes, composez premierement en latin par LEONARTH FOUSCH (corrupto nomine) medecin tres renomé. Et depuis, nouvellement traduiz en langue Francoise, par vn homme scavant et bien expert en la matiere (in Regis priuilegio adpresso nominatur ELOY MAIGNAN, Docteur en la faculté de medecine a Paris) a Paris, chez Jaques Gazeau 1549. fol. sine paginis. Constant autem praemissa cum indice nominum gallicorum et latinorum vt et virtutum pagg. 22. opus ipsum pagg. 154. icon 512. quod ad normam editionis latinae no. 1. compositum est ideoque totidem icones continet, quae vero sunt eadem ipsae in minorem formam redactae, quas no. 3. 4. et 5. ostendunt, omissis illis, quae no. 2. acceperunt.

XI. Inter primos, qui rem herbariam imaginibus illustrarunt, fuit quoque CHRISTIANVS EGENOLPHVS, Francofurti ad Moenum bibliopola notissimus. Iam a. 1533. enim coepit, antiquum herbarium germanicum a RHODIONE emendatum nouis et naturae similibus figuris ornare, quas successu temporis emendare et augere continuauit, conf. articul. super. IV. no. 13—16. Has easdem figuras etiam sigillatim in publicum edidit hoc titulo: 1) Herbarum imagines viuae, der kreuter lebliche conterfeytunge. Francof. Chr. Egenolphus excudebat, ad calcem, 1535. 4. foliis 40. seu pagg. 80. ind. lat. et germ. pagg. 7. figg. 226. Recudebatur absque mutatione a. 1538. 2) Imaginum herbarum Pars II. Ander Theyl der kreütter conterfeytungen. Ibid. 1536. foliis 20. ind. pagg. 3. figg. 65. Praeter figuras nil continet hic libellus

bellus, quam nomina germanica et latina, atque haec saepius adhuc barbare scripta. 3) Super his ipsis figuris deinde commentatus est DORSTENIUS in opere, superiori catalogo iam citato, cui titulus: *Botanicon, continens herbarum, aliorumque simplicium, quorum usus in medicinis est, descriptiones, et iconas ad vivum effigatas: ex praecipuis tam graecis quam latinis authoribus iam recens concinnatum. Additis etiam, quae Neotericorum observationes et experientiae vel comprobarunt denuo, vel nuper inuenerunt. Aut. THEODERICO DORSTENIO, medico. Francofurti Christianus Egenolphus excudebat.* fol. foliis 306. seu pagg. 612. ic. 284. Huius operis unica tantum editio mihi nota est. Possideo quidem eiusdem duo exemplaria, quorum vnum praefixum habet simplicem inscriptionem addito typographi signo, alterum eandem, cum iconibus martagi, scrophulariae et papaveris erratici subiunctis, operi ipsi tamen iterum insertis, ornatam; sed vtrumque eandem praefationem, kalendis Martii 1540. datam, et ad calcem eundem impressionis annum 1540. ostendit, ceterum etiam nullam differentiae notam exhibet. 4) Paulo post ex eadem typographia prodierunt *P. E. D. DIOSCORIDIS de medica materia libri sex, IO. RVELLIO interprete &c. additis annotationibus per GUALTH. H. RYFF, Access. scholia noua cum nomenclaturis graecis, latinis, hebraicis, germanicis, IO. LONIZERO auctore 1543.* fol. pagg. 439. icon. 595. Lonic. schol. pagg. 174, cui operi hae ipsae figurae, et multae earum maiores, plures quoque recens factae insertae sunt, 5) et quum idem opus eodem titulo (mutato tamen nomine RYFF in RIVIVM et additis VAL. CORDI annotationibus, itemque EVRICI CORDI iudicio de herbis et simplicibus medicinae &c. et CONR. GESNERI nomenclaturis DIOSCORIDI adscriptis &c.) *ibid.* 1549. fol. pagg. 448. reliquar. a p. 449. ad 554. recuderetur, numerus harum plantarum imaginum ad 786. usque auctus est, 6) Anno sequenti 1550. idem Egenolfus novam paravit Herbarii germanici editionem (art. IV. 16.) in qua hae ipsae icones maximam partem iterum comparuerunt. 7) Anno 1551. edidit ADAMVS LONIZERVS, Egenolfi gener. sui operis historiae naturalis Tom. I. et a. 1555. Tom. II. (vid. hoc nomen catal. I.) quod opus iisdem iterum figuris refertum est. 8. 9.) Tandem duae adhuc Herbarii germanici editiones prodierunt eiusdem LONICERI curis in meliorem ordinem redactae (art. IV. 17. 18) id quod opus postea saepius recusum fuit praefixo LONICERI nomine, (conf. SEGVIERII *Biblioth. bot.* p. 111.) cuius sequentes, omnesque germanica lingua et in folio excusas possideo editiones. 10) *Kreuterbuch, kunstliche conterfeytunge der Bäume, Stauden, Hecken, Kreuter, Getreyde, Gewurtze, mit eigentlicher Beschreibung derselben Namen in sechserley Spraachen, nemlich Griechisch, lateinisch, Italiänisch, Französisch, teutsch, und hispanisch, und derselben Gestalt, natürlicher Krafft und Wirkung. Sampt kunstlichem und artlichem Bericht des Destillirens. Item von furnembsten Gethierren der Erden, Vögeln, und Fischen. Dessgleichen von Metallen, Ertze, Edelgesteinen, Gummi, und gestandenen Säfften. Jetzo aufs fleißigst zum letztenmal von neuem ersehen und durchauß an vilen Orten gebessert, auch weit über vorige Edition gemehret, mit vollkommenen nützlichen Registern alles Inhalts. Durch ADAMVM LONICERVVM. Francof. ap. Christian. Egenolfi haeredes 1582.*, quae omnino vltima fuit, quam ipse Lonizerus auctiorem reddidit, conf. dedic. editionis no. 13 sequentis. 11) Eodem titulo *ibid.* 1598. 12) Eodem titulo *ibid.* per Sigism. Latomum, impensis Vincentii Steinmeyers 1604. Hae tres editiones foliis 382. seu pagg. 763, vt et contentis et stirpium figuris 908. a se inuicem non differunt. 13) Eodem titulo cum hoc additamento: *bisher von H. ADAMO LONICERO &c. zum öfftermal in offenen Truck verfertigt worden, nunmehr aber durch P. E. R. VFFENBACHIVM &c. auf das fleißigst übersehen, corrigirt und verbessert, an vielen Orten augirt und vermehrt, und in acht sonderbare Theil unterschieden, sampt dreyen unterschiedlichen vollkommenen nützlichen Registern alles seines Inhalts hierzu dienlich.* *ibid.* per Matthaeum Kemffer, sumpt. Vincentii Steinmeyers 1630. 14) Eodem titulo apud Mich. et Io. Frid. Endter, bibliopolas Norimbergae, praelo Matth. Wagneri, Ulmae typographi 1678. 15) Eodem titulo Ulmae typis et sumptibus Matthaei Wagneri 1679. Hae editiones (13. 14. 15) iterum pagg. 750. et stirpium figuris 840. a se inuicem non differunt; VFFENBACHII vero correctio ad explicationem et remotionem quarundam iconum inutilium tantum pertinet. Neque etiam 16) recentissima illa editio, in catalogo I. *Lonizeri* nomine citata, ab his vllatenus differt, nisi cel. EHRHARTI additamentis ibidem indicatis. Quod ad stirpium figuras sigillatim attinet, multae ex primis Egenolfianis in omnibus his editionibus adhuc reperiuntur, ex quo facile patet, quoties Egenolfianae figurae a RHODIONIS tempore, adeoque duorum seculorum spatio, non solum in repetitis editionibus vnius operis, verum etiam in diuersis operibus, publico obtrusae fuerint, maximam partem a BRUNFELSIO, FUCHSIO, TRAGO aliisque mutatae, id quod ipse FUCHSIVS virgula censoria notat tum in praefatione operis sui latini, tum in schediasmate peculiari hoc titulo euulgato: *Apologia LEON. FUCHSII, qua refellit malitiosas GUALTHERII RYFFI, veteratoris pessimi, imputationes, quas ille DIOSCORIDI nuper ex EGENOLPHI officina prodeunti attexuit; obiterque quam multas, imo propemodum omnes, herbarum imagines e suis de stirpium historia inscriptis commentariis idem suffuratus sit, ostendit.* Basileae ap. Mich. Ising. (rin) 1544. 8. plagg. 4. cum dimid. seu pagg. 64.

XII. Plures adhuc libros stirpium imaginibus illustratos eodem tempore in publicum hinc inde prodisse, nullum est dubium; num vero aliqui eorum, praeter figuras ab auctoribus hactenus recensitis desumptas, peculiare notatu dignas et ad stirpium cognitionem quicquam conferentes contineant, me latet. Verosimile e contrario est, typographos tantum tales ornamenta potissimum causa addidisse. Probant hoc certe opera sequentia 1) *Kreutter-Buch des hochberümpften PEDACII DIOSCORIDIS Gründliche und gewisse Beschreibung aller materien oder Gezeugs der Artzney, das ist, nicht allein der kreutter, sonder auch alles, was sonst in der Artzney gebräuchlich ist, in sechs bücheren verfasst, jetzt erstmals aus der griechischen und lateinischen Sprachen gründlich verteutschet durch IOHAN DANTZEN von AST, der Artzney Doctor &c. Franckfurt am Mayn bei Cyriaco Iacobi zum Bart, a. 1546.* pagg. 198. auersis non numeratis, icon. 273. praemiss. p. 17. Figurae inaequales, maximae quinque pollices longitudine vix superant, omnes autem Egenolfianis simillimae sunt. 2) Ein newer ALBERTVS MAGNVS. Von Weibern

Weibern und Geburten der Kinder sampt iren Artzneien. Von tugenden etlicher furnemer Kreutter. Von Krafft der edlen Gestein. Von Art und Natur etlicher Thier. Mit sampt eim bewerten Regiment für die Pestilentz. Alles von neuen gebessert durch Q. *APOLLINAREM*. 1549. sine loco et typographi nomine 4. pagg. 44. auersis non numeratis, ic. plant. 36. ind. pagg. 4. 2) *ALBERTVS MAGNVS*, darin durch sechs kurtzer büchlein vil kleinlichkeiten der natur beschriben werden. I. von weibern und geburten der kinder &c. II. von des grossen Alexanders Kreutter (der syben Planeten kreutter genant) sampt iren eigenschafften und vermögen. III. von Krafft und würckung der Edelgestein &c. &c. Jezunder von neuen gemehrt und gebessert durch Q. (QVINTVM) *APOLLINAREM* M. D. Argentor. per Wendel Rihel 1551. 4. pagg. 71. auers. non numeratis, ic. 64., quas sequuntur 7. planetarum plantae. Vtriusque editionis plantarum figurae non sunt quidem eadem, attamen eiusdem formae iterumque cum Egenolfianis conueniunt. 4) Kurtz Handbüchlein und experiment vieler Artzneyen, durch den gantzen Körper des menschen von dem Haupt bis auf die Füß sampt lebendiger abcontrafactur etlicher gemeiner Kreuter, und daraus mancherley gebranten und distillirten Gewässer krafft und tugenden. Durch Q. *APOLLINAREM* erfahren und selbs bewert. Jezund von neuem gemehrt und gebessert an vielen Orten. Francof. ad Moen. typis Hermann Gölfferichen 1550. 8. pagg. 152. auersis non numeratis, ic. 123. omnibus exiguis et illis Herbarii Germanici a RHODIONE editi simillimis; sed absque vlla descriptione. 5) eodem titulo ibid. typis Thom. Rebart et Kilian Han 1570. 8. pagg. 198. auers. non numer. ic. 116. eadem, praemiss. cum ind. p. 16. 6) eodem titulo cum hac additione: Jezundt von neuen mit vielen Kreütern und experimenten gemehret und gebessert. Sampt dem Experiment Büchlin von XX. Pestilenz wurtz. len des hochgel. *TARQVINII OCTORI*. Argentor. per Ios. Rihel 1594. 8. pagg. 214. auers. non numeratis, icon 142. et rad. pestil. 21. inter priores maximam partem iam occurrentes. Ind. et appendix de plantarum collectione pagg. 24. Quo anno quaque ratione prima editio comparuerit, nescio et ab aliis annotatum haud reperio: plures editiones aetate inferiores indicat SEGVIER. p. 223. Ipsum OCTORI opusculum antea sigillatim excusum hoc prostat titulo: 7) Experimenta von XX. Pestilenzwurzeln und Kreutern, wie sie alle und ein jeglichs besonder, für Gifft und Pestilenz gebraucht mögen werden, dem Menschen inn- und auswendig, sampt viel andern heilsamen tugenden und wirckungen, deutsche Recepta, auch der kreuter gestalt und eigenschafft, aus langwiriger und gewisser Erfahrung, durch *TARQVINIVM OCTORVM* alias *SCHNELLENBERGIVM*, der freyen kunste und Artznei Doctor zu Dortmunde an den tag gegeben. Gedruckt zu Franckfurt am Mayn durch Wygand Hahn, sine loco et anno, 8. min. pagg. 47. auers. non numer. fig. 21. dedicatio Tremoniae pridie idus April. 1546. data monet, hanc editionem esse alteram et denuo reuisam. 8) Absque vlla mutatione ibidem durch Hermann Gölfferichen 1552. Huius opusculi stirpium descriptiones, breues et imperfectae quidem, plerumque tamen ex propriis obseruationibus additae sunt et figurae paruae, primis Egenolfianis similes, eodem modo naturali faciei respondent, si excipias Gentianae iconem ex Brunfelsio male Belladonnam (conf. art. VIII. 9. et 10.) repraesentantem et imperfectas Helenii atque Imperatoriae. Quae in Apollinaris editione (no. 6.) occurrunt figurae, non sunt eadem, similes tamen. excepta icone cap. 6. Dictamni, quae loco Fraxinellae figuram Polygonati, cap. 8. quae loco Belladonnae genuinam Gentianae ex Trago, cap. 9. quae meliorem Leuistici et cap. 11. Imperatoriae, nec non cap. 13. quae Scabiosae prat. hirs. loco montanam tenuifol. et cap. 18. ineptam Valerianae sistit. Sed eiusmodi opuscula vix mererentur recensionem, nisi apud bibliographos inter botanicos libros occurrerent.

XIII. Quanquam autem variorum operum haecenus recensitorum figurae non omnes sint aliae aut saltem denuo ad naturae normam factae, potius maximam partem, mutata interdum magnitudine, absque emendatione tantum repetitae, immo saepius, praecipue ex vna eademque typographia publicatae, plane eadem: nihilominus certa et indubia stirpium, quas repraesentant, cognitio earum ope viginti annorum spatio facilius et amplius propagata stabilitaque fuit, quam antea aliquot seculorum decursu, licet ex figuris pariter ac descriptionibus solis nemo ad perfectam stirpium cognitionem vnquam perueniat. Neque tamen etiam ad hos ichniographos solos referenda est vtilissimi huius studii restauratio celeri gradu tam ingens incrementum consequuta: ipsi veterum medicorum codices ad sera vsque tempora conseruati, vt et interpretationes commentariique a Medicis medii aevi in eosdem conscripti, artis typographicae vero ope pedetentim tunc euulgati, multas variarum regionum stirpes, olim iam vsui medico commendatas, in memoriam reuocarunt, licet, si verum fateri fas est, hi omnes potius de viribus earum indicandis, quam de accurata stirpium descriptione, solliciti fuerint, vt taceam, hos ipsos codices, scribarum incuria saepius corruptos fuisse. Postquam autem litterarum barbaries feliciter superata fuit, inde in botanici quoque studii emolumentum res eo feliciter cessit, vt plures variarum Europae nationum viri aequae docti ac industrii, impari licet conatu, auxiliatrices porrexerint manus, atque hos ipsos codices non solum ex variorum exemplarium collatione a mendis suis purgauerint, verum etiam, praecipue Graecos, tum etiam Arabicos, in Latinam linguam transtulerint, indeque vsum eorum magis communem reddiderint. Accesserunt mox nonnulli, qui partim genuina nomina, quibus stirpes vel ab ipsis examinatae vel ab aliis denuo cognitae factae a veteribus iam indicatae fuerint et ad quas proinde vires longo vsu iam commendatae legitime referendae sint, improbo labore detexerunt; partim accuratiori examine et descriptione easdem a similibus distinxerunt; partim etiam nouis obseruationibus et experimentis collectis vsum earum adseruerunt, vbi certum vestigium reperire haud poterant, easdem veteribus iam notas fuisse. Horum Auctorum prolixum catalogum iam exhibuit *CONRADVS GESNERVS* commentariis Tragi supra art. IX. 3. recensitis praefixum ac more suo accuratissime conscriptum vt et subinde probato iudicio illustratum, vbi primo veteres Graecos, deinde Latinos, postea Arabes recenset neque illos omittit, quos ab his citatos tantum inuenit. Sequuntur porro recentiores, quibus Latino-barbaros simul comprehendit. Tandem addit scriptores illos, qui sparsim et obiter vtilia quaedam ad plantarum cognitionem tradiderunt, et qui de medicamentorum simplicium facultatibus secundum

differentias qualitatum, primarum, secundarum et reliquarum scripserunt. Horum singulorum opera si pariter hic recenserem, scopum praefixum excederem, secundum quem non nisi Germani, qui, praeter iconum Auctores, ad seculi XVI. dimidium vsque variis tentaminibus stirpium cognitionem genuinam docere coeperunt, supersunt recensendi, et quidem ita, ut, ratione haecenus obseruata, eorum operum vnam vel alteram editionem ex mea suppellectile libraria, ordine chronologico producarn, simul vero primam, si ea ipsimet adhuc careo, citatam ex aliis addam.

XIV. Adest autem 1) libellus hoc titulo: *Margarita medicine: Einmeysterlichs aufferlesens büchlein der Erzney, für mancherley kranckheyt und siechtagen der Menschen. Gemacht durch JOHANNEM TOLLAT von Vochenberg, in der weytberühmbten Universität zu Wienn, bey dem allerfährnisten Man der Erzney Doctor SCHRICK: ad calcem: gedrückt und volendt zu Nürnberg durch Jobst Gutknecht 1517. 4. foliis 28. index foliis 4.*, qui liber procul dubio est idem, cuius aliam editionem Gesnerus l. c. inter recentiores his adducit: *IO. TOLLATI cuiusdam liber de remediis herbarum aliisque, Margarita medicinae inscriptis, ordine litterarum Argentinae publicatus est a. 1518. chartis 10.* Ad botanicos autem libros haud referendus est, vires namque tantum, et quidem maximam partem ex auctoribus latino-barbaris excerptas, remedium (circiter 350. ex quibus tamen multa ad vegetabilia non pertinent) nominibus plerumque barbaris litterarum ordine indicatorum recenset. 2) Ex Germanis, qui rei herbariae emendationem serio et cum fructu susceperunt, primus procul dubio fuit IOANNES siue IANVS (quod nomen proprium vsurpari aut affectari potius nuper incepit a scriptoribus quibusdam loco Ioannis, quem et Galli sua lingua Jan vocant, monet Gesner. biblioth. p. 369. b. lin. 1.) CORNARIUS Zuiccauiensis, ante HAYNPOL vel HAGENBVT (teste Mercklin. Linden. renou. p. 502. b.) vocatus, vir doctissimus ac de vtraque lingua, graeca inquam ac latina, et vniuersa re medica optime meritus, et qui ex graecis scriptis latina fecit multo plura, quod sciam, quam quisquam alius nostro saeculo: sunt verba Gesneri l. c. conf. Merck. l. c. Huius ope *DIOSCORIDIS* opera Basil. 1529. 4. edita indicantur in Catal. Biblioth. Acad. Lugd. Bat. p. 132. a. et ex hoc a Seguierio p. 52., qui addit latine; sed meum exemplar graecum, cum sola dedicatione latina, hanc prae se fert simplicem inscriptionem: ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΗΣ. *DIOSCORIDES*. ΙΑΝΟΥ ΤΟΥ ΚΟΡΝΑΡΙΟΥ. Basil. ex aedibus Io. Bebelii 1629. Mens. Aug. 4. pagg. 446. dedic. et graec. ind. pagg. 20. Quae vero horum operum eiusdem interpretatio latina proficit, multo serius prodit hoc titulo: *PED. DIOSCORIDAE Anazerbensis de materia medica libri V. IANO CORNARIO, Medico Physico, interprete. Eiusdem IAN. CORNARII emblemata singulis capitibus adiecta. DIOSC. de bestiis venenum ei aculantibus et letalibus medicamentis libri II. eodem CORNARIO interprete. Eiusdem CORNARII in eosdem libros expositionum Libri II. Adiunctis in fine tribus tabulis locupletissimis, quibus omnia, quae toto tractantur opere, indicantur. Basil. per Hier. Frobenium et Nic. Episcopium 1557. fol. pagg. 560. praemiss. pagg. 20. index general. pagg. 44. corrigendor. pagg. 2.* Ipsa epistola nuncupatoria a. 1555. scripta, indicat, hanc esse primam latinae interpretationis editionem. 3) AEMILII MACRI, qui Augusti aetate vixit, scripta de virtutibus herbarum omnia interuisse, ea vero, quae eiusdem nomine adhuc prostant, ad alium MACRVN, Aemilio longe iuniorem, pertinere huiusque verum nomen ODOBONVM esse, annotat Seguier. p. 273. sequ. Haec notis illustravit ATROCIVS, medicus Friburgensis, hoc titulo: *AEMILIVS MACER de herbarum virtutibus, cum IOANN. ATROCIVS commentariis longe utilissimis et nunquam ante impressis. Adhaec STRABIGALLI* (qui teste Segu. p. 302. sec. IX. vixit) *Theologi clarissimi, Hortulus vernantissimus. Apud Friburgum Brisgoicum, ad calcem: Friburgi apud Io. Fabrum Emmeum Juliensem 1530. 8. pagg. 108. auersis non numer. praemiss. pagg. 8. Commentatoris dedicatio scripta est Colmariae anno eodem. III. Idus Iulii.* 4) PAVLVS a patria Aegina insula AEGINETA dictus, vixit seculo IV. vel V. et operum suorum libro VII. egit de simplicibus et compositis medicamentis, quem alii iam compendium ex GALENO compilatum (imo alii eius auctorem Galeni simiam) dixerunt. Huius operis (cuius exemplar graecum primum prodit iam a. 1528. fol. Venetiis in aedibus Aldi et Andr. Asulani, teste Mercklino p. 865. b., Maittaire Annal. typogr. T. II. p. 703., Kestn. Biblioth. p. 107.) librorum V. priorum et VII. interpretis forte primus fuit TORINVS Vitodurano-Tigurinus, cuius ope hoc prodit titulo: *PAVLI AEGINETAE, medici insignis, opus diuinum, quo vir ille vastissimum totius artis oceanum, Laconica breuitate, sensibus argutis, merisque aphorismis in epitomen redegit. ALBANO TORINO, Vitodurensi, interprete. Basileae per Andr. Cratandrum et Io. Bebelium mense Martio 1532. fol. pagg. 514. praemiss. pagg. 24.* 5) Quum anno sequenti ex eadem typographia ederetur *PAVLI Aeginetae de chirurgia liber inter caeteros eiusdem auctoris medicae artis ordine sextus, a IOANNE BERNARDO FELICIANO Veneto primum latinitate donatus fol. pagg. 29. auers. non numer. praemiss. pagg. 4. et ind. pagg. 4.*, ad calcem iungebantur *Castigationes ALBANI TORINI in suam AEGINETAE translationem pagg. 5.* 6) Eodem anno 1532. eosdem libros interpretatus est IOANN. GVINTHERIVS Germanus, a patria ANDERNACVS vulgo dictus, cuius cura anno memorato Parisiis et a. 1534. ut et 1546. Coloniae in folio prodierunt, vid. Merckl. p. 865. b. Segu. 289. et Kestn. 108. nota *. Mea exemplaria librum VI. eodem interprete simul continent et inscribuntur a) *PAVLI AEGINETAE medici opera, a IO. GVNTHERIO ANDERNACO, Medico exercitatissimo summi iudicii conuersa et illustrata commentariis. Adiectae sunt annotationes IACOBI GOUPILLI, medici Parisiensis, in aliquot singulorum librorum capita. Lugduni ap. Guill. Rouillium 1551. 8. pagg. 846. praemiss. pagg. 16. ind. pagg. 61.* b) *PAVLI AEGINETAE Medici opera, IO. GVNTHERIO ANDERNACO Medico peritissimo interprete. Eiusdem GVNTHERII et IANICORNARII annotationes: item IAC. GOVPTLI et IAC. DALECHAMPII scholia in eadem opera, cum indice copiosissimo ac locupletissimo. ibid. 1567. 8. pagg. 923. praemiss. pagg. 32. ind. pagg. 52.* 7) Ipse BRVNfelsivs, praeter commentarios suos iconibus

bus illustratos, alios in appendice Tomi II. a. 1531. (vel potius 1532, quod vltima plagula docet) euulgati et superius Artic. VIII. 2. recensiti, tum proprios, tum ex aliis excerptos edidit. Continentur namque hac appendice a) *Exegema omnium simplicium, quae sunt apud Dioscoridem, et collatio eorundem cum iis, quae in officinis habentur, Auctore BRUNFELSIO* p. 3—30. b) *SCRIBONII LARGI, medici vetustissimi, de simplicibus fragmentum* p. 31. Prodiit huius Auctoris liber hoc titulo: *SCRIBONII LARGI, medici vetustissimi, de compositione medicamentorum liber, iam pridem IO. RVELLII opera e tenebris erutus et a situ vindicatus. ANTONII BENIVENTII libellus de abditis nonnullis ac mirandis morborum et sanationum causis. POLTBVS de salubri vitus ratione privatorum, GVINTERIO IOANNE ANDERNACO interprete. Basil. apud Io. Cratandrum 1529. 8. pagg. 318. tit. et ind. pagg. 16. Largi opusc. a p. 1. ad 185. §§. 271. Prius, eodem tamen anno eademque forma, prodiit Lutetiae Parisior. (teste KESTNERO l. c. p. 117.) postea vero in Collectione Medicorum antiquorum omnium, qui latinis litteris diuersorum morborum genera et remedia persecuti sunt &c. Venet. ap. Aldi filios 1547. fol. (vid. Mercklin. l. c. p. 961. b. Kestner. l. c. p. 344.) et inter Medicae artis Principes &c. 1567. fol. ab Henric. Stephano recusus T. III. a p. 128 ad 237. atque etiam cum notis IO. RODII adiecto lexico Scriboniano. Patauii 1655. 4. vid. Mercklin. l. c. Fragmentum hoc de simplicibus sigillatim indicatur a SEGVIERIO p. 271. et a KESTNERO p. 355, quasi a libro indicato distinctum, quod tamen cum pluribus eiusdem argumenti hoc ipso in libro reperitur: e. gr. *σταφύλες ἀγρία* §. VIII. *πολύρυος* §. XII. *Herba vrceolaris* §. XXXIX. *πολύρυος* §. XLVI &c. c) *Demonstrationes aliquot herbarum ex corollariis HERMOL. BARBARI, de quibus dubium quibusdam est, qualibus nominibus designentur apud auctores.* p. 31. Pauca haec excerpta, de caryophyllo arbore et altili, de bacchari, rosa, caprifolio et materisylvia, ex corollariis in Dioscoridem petita sunt. conf. Art. sequ. XV. d) *IO. MAINARDI* Ferrar. Medici clarissimi *annotationes aliquot simplicium e scriptis eius extractae* p. 32 ad 43. Desumpta haec sunt ex IO. MANARDI (quod nomen in MAINARDVM mutauit Brunfelsius, hinc vero vtrumque distinxit Segu. p. 114. et p. 275.) Epistolar. medicinal. libris sex prioribus: conf. sequ. artic. XV. e) *NIC. LEONICE-NVS de falsa quarundam herbarum inscriptione a Plinio* p. 44—89. vid. art. XV. seq. f) *PANDVLPHVS COLLINVTIVS de interpretatione simplicium, quae sunt apud Plinium, calumniis Leonici respondens* p. 89—116. Huius libri, quem nondum vidi, titulus hic est: *Pliniana defensio aduersus Nic. Leonici accusationem.* Ferrariae ap. Andr. Bellfortem 1511. 4. vid. Merckl. p. 364. b. conf. Segu. p. 42. et 148. Kestn. p. 275. 355. g) *LEONH. FVCHSI Principis Brandenburg. Medici annotationes de simplicibus a medicis haecenus perperam intellectis et aestimatis* p. 129—155. vid. art. super. X. h) *Generosi Comitum HERMANNI a NVENAR censurae aliae herbarum super eadem re* p. 116—128. Praefatio praefixa docet, auctorem misisse has annotationes manuscriptas Colonia Argentoratum ad typographum Schottum a. 1529. i) *IOACH. (in titulo appendicis primae edit. falso BERNARDI) SCHTLEER medici iudicium de caryophyllis* p. 155. ad BRUNF. scriptum. k) *HIER. TRAGI medici dissertationes fere quinquaginta de herbarum quarundam nomenclaturis* p. 156—165. vid. Artic. super. IX. l) *MARC. GATINARIAE medici quondam Ticinen. annotatio una et altera de Taraxaco, Cicorea, Iua, Esula et Soldanella* p. 166. Opus, ex quo haec desumpta sunt, hunc prae se fert titulum: *MARCI GATINARIAE de curis egritudinum particularium. Noni Almanforis practica vberima. BLASII ASTARII de curis febrium libellus utilis. CESARIS LANDVLPHI de curis earundem opusculum. SEBAST. AQVILANI tractatus de morbo Gallico celeberrimus. Eiusdem quaestio de febre sanguinis.* Ad calcem: *Lugduni per Io. Moylin alias de Cambray 1525. 4. min. fol. 100. f. pagg. 200. conf. Merckl. p. 778. b. qui huius editionis formam 8. nominat, antiquiorem ibid. apud Beuelaque 1506. 4. et octo recentiores, ceterum autem annotationes ex Brunf. iterum sigillatim indicat, vti etiam Segu. illas inter libros botanicos p. 71. recenset itemque Kestn. p. 356. qui p. 130. nota w et p. 602. operis indicati mentionem facit. Leguntur autem citata de taraxaco fol. 35. b. de cicorea fol. 37. b. de iua vero iam fol. 9. a. reliqua fugituo oculo reperire haud potui, plus temporis vero impendere poenituit.* m) *IO. IAC. de MANLIIS Alexandrini interpretatio simplicium secundum ritum officinarum* p. 167—182. Editus huius auctoris liber simplici hoc titulo: *Luminare maius: addito: Cinthius vt totum radiis illuminat orbem. illuminant latebras sic medicina tuas.* ad calcem: *Venetis impressum per Sim. de Luere sumpt. Andr. Torresani de Asula 1501. fol. pagg. 81. auers. non numeratis.* Auctorem declarat praefatio et haec ipsius tractationis inscriptio: *IO. IACOBI de MANLIIS de BOSCHO Alexandrini super descriptiones antidotarii et practicae diuini IO. MESVE et aliorum illustrium medicorum clarissima interpretatio incipit: dicta luminare maius.* Singula simplicia, ex quibus pharmaca descripta componuntur, in notis fusc exponuntur, ex quibus BRUNFELSIVS excerpta collegit: e. gr. de asaro p. 2. b. col. 1. de secacul seu S. Mariae sigillo, de raphano, de dracontio f. Luff plano p. 4. b. col. 2. de eruca, de lingua auis, p. 5. a. col. 1. de scariola ibid. col. 2. de garyophyllis p. 5. b. col. 1. &c. Perperam ergo ex Brunfelsii inscriptione peculiaris fingitur tractatus. Porro, quum hic in titulo suae appendicis nomen IOANNIS omisit, quem tamen p. 167. addit, sunt, qui inter Iacobum et Ioannem Iacobum distinguunt, vid. Merckl. p. 487. b. 614. a. Kestn. p. 356. et 368. Ceterum conf. Segu. p. 276. et Allgem. Gelehrten Lexicon Ioecheri T. III p. 115. Hoc ipsum opus etiam prodiit hoc titulo: *Luminare maius omnibus cum medicis tum aromataris pernecessarium: in quo multa clarissimorum medicorum pharmaca, NICOLAI MVTONI medici Mediolanensis opera, nuper addita, et quae prius extabant, ab infinitis quibus scatebant erroribus, purgata reperies: vt vere nunc illustrius redditum, luminare maius appellari possit.* In quo etiam duo sunt additi indices, alter, ad minima quaeque simplicium nomina reperienda ante operis initium, alter in fine libri, quid in unaquaque sectione contineatur amplissime declarans. Appositi etiam sunt duo illi libri aromataris familiarissimi, lumen apothecariorum et aromatariorum thesaurus. Venetiis apud Iuntas 1549. fol.*

fol. pagg. 200. auers. non numerat. praemiss. fol. 8. f. p. 16. Eodem titulo ibid. apud Hier. Scotum 1550. fol. pagg. 157. auers. non numeratis, praemiss. pagg. 16. et hoc tantum mutato titulo: *Luminare maius, Lumen apothecariorum et aromatariorum thesaurus*, omnibus cum medicis tum aromataris pernecessaria opera. In quibus multa clariss. medicorum pharmaca, NIC. MVTONI, medici Mediolanensis, olim opera et nunc aliorum plurium diligentiss. medicorum addita et quae prius extabant ab innumerabilibus erratis purgata reperies. Indices duo insunt &c. Venetiis ap. Nic. Beuilacquam 1561. fol. pagg. 157. auers. non numer. praemiss. pagg. 16. Harum editionum tituli, licet satis prolixi, primum et primum auctorem tacent, eius tamen nomen singulis eius commentariis praefigunt, et a Mutoni appendicibus (ad simplicium cognitionem vero nil conferentibus) distinguunt. Plures huius operis editiones, quas nondum possideo, citantur a Mercklino, et Seguierio, l. c. n) *HIERONYMI Herbarii apodixis germanica*, ex qua facile vulgares herbas omnes licebit perdiscere pagg. 183—199. vid. art. VI. Haftenus ex Brunfelsio. 8) Huc etiam pertinet *ONOMASTIKON seu Lexicon medicinae simplicis OTHONIS BRUNFELSII* primum ingenio, tum amicorum post se recognitione et studio, iustiore lima repurgatum auctumque. Addita vocum quarundam Germanica expositione, iuxta veriore *DIOSCORIDIS* historiam. a. 1543. Argentorati Io. Schottus aere perennius dedit fol. chartis seu foliis 195. praemiss. fol. 6. Iam anno 1534. prodierit hoc opus, indicat Kestn. p. 72. et testatur ipsa auctoris praefatio Bernae 11. Februarii a. 1534. scripta. 9) Eodem anno 1534. Lutetiae apud Simon. Colinaeum in 16. prodierunt *BENEDICTI TEXTORIS, Segusiani, stirpium differentiae ex Dioscoride, secundum locos communes, opus ad ipsarum plantarum cognitionem admodum conducibile*. vid. Merckl. p. 123. a., Maitt. annal. T. II. p. 304. et Venetiis in offic. diui Bernardini 1537. in 12. teste Segu. p. 54. et 190. quam utramque editionem nondum vidi. Recusum autem est hoc opusculum cum *TRAGI* stirpium nomenclaturis Argent. 1552. in 4. editis (vid. art. IX. 3.) eodem titulo a pag. 1129. ad 1200., et auctoris praefatio (qua IAC. SYLVIVM praeceptorem suum laudat) scripta est Lutetiae ex aedibus IO. TAGAVTII medici ad Idus Iunias 1534. 10) *HENRICVS VRBANVS*, seu ficto nomine magis notus *EVRICVS CORDVS*, Simesusae vico Hassiae a. 1486. natus (vid. vita eius a WIGANDO KAHLERO descripta et Rintelii 1744. in 4. excusa p. 7. 8. 11. et 12.) haud pauca protulit ad momenta rei herbariae tunc temporis valde adhuc obscura illustranda opusculo hoc titulo euulgato: a) *EVRICII CORDI, Simesusii medici Botanologicon*. Coloniae apud Io. Gymnicum a. 1534. 8. pagg. 183. ind. pagg. 20. b) Eodem titulo, his additis: *Elenchus meliorum rerum, quae in eo continentur. VALERII CORDI annotationes in DIOSCORIDIS de medica materia libros. Index locupletissimus. De herbis singulis ac reliquis simplicibus, quorum medicinae usus est, iudicium, et huius generis eorum, quae apud medicos contrahuntur, explicationem, hi duo libelli complectuntur*. Parisiis ap. Guil. Morelium 1551. 12. Botanolog. pagg. 193. praemiss. pagg. 8. annotat. pagg. 395. ind. pagg. 38. De VAL. CORDO vid. num. ult. seq. 11) Inter Auctores, qui in *PLINII* historiam naturalem commentati sunt, recenset Cl. D. Seguier. p. 145. IAC. MILICHIVM (Friburgo-Brisgoium) et indicat eius commentarii in *Librum II. editionem* a. 1534. (Maitt. Annal. T. II. p. 823. vero a. 1535.) Hagenaee in 4. publicatam: meum exemplar hunc prae se fert titulum: *C. PLINII liber secundus de mundi historia cum commentariis IACOBI MILICHII, diligenter conscriptis, et postremo ab autore recognitis, et multis in locis auctis* a. 1552. Francofurti ap. Petrum Burbachium 1553. 4. pagg. 459. praemiss. cum ind. pagg. 20. Sed hoc in opere nil ad stirpes pertinens deprehenditur. 12) Botanicis libris etiam annumeratur Stockhorni montis descriptio, quam IO. RHELLICANVS (alias MVLLER, e loco Rhellicon patria sua in ditione Tigurense sic dictus, vt Segu. p. 159. monet) bonarum litterarum apud Bernenses Professor composuit, quaeque inscribitur *IO ANNIS RHELLICANI Stockhornias. Qua Stockhornus mons altissimus in Bernensium Heluetiorum agro versibus heroicis describitur*. Tiguri apud Gesneros, f. a. Num sigillatim typis excusum fuerit hoc schediasma, annotatum haud inueni: testante dedicatione, tituli paginae auersae adpressa, scriptum est Bernae 12. Aug. 1536. et prostat cum *CONR. GESNERI* de raris et admirandis herbis, quae siue quod noctu luceant, siue alias ob causas, Lunariae nominantur, commentariolo &c. Tiguri apud Andr. Gesnerum F. et Iac. Gesnerum fratres, 4. sine anno (secundum Gesneri dedicationem a. 1555.) vbi a pag. 77. ad 82. reperitur, ideoque totum hoc carmen 4. paginis continetur et nonnisi tres plantas in hoc monte repertas, nempe Gentianam, Elleborum niueum, et Manum Christi flore fusco et atro odore moschi, simpliciter tantum nominat. Antea tamen hoc ipsum carmen prodierit cum Vita HOMERI, quam idem RHELLICANVS ex Plutarcho latinitate donauit, et observationes marginibus adiecit, quamque Rob. Winter excudit Basil. 1537. in 8. chartis 10, reperi in Biblioth. Gesn. pagg. 450. b, vbi MULLERI nominis nulla mentio fit, quod vero etiam asseritur in Joech. Gel. Lex. T. III. pagg. 730. Cl. Seguierius Biblioth. p. 74. inter Gesneri edita hanc quoque editionem sed in 12. indicat. 13) MARCELLVS, Gallus et Burdegallensis ciuis, medicus empiricus atque praeterea summe superstitiosus, vixit sub finem seculi IV. Opus, quod composuit, CORNARII cura prodit hoc titulo: *MARCELLI, viri illustris, de medicamentis empiricis, physicis ac rationalibus liber, ante mille ac ducentos plus minus annos scriptus, iam primum in lucem emergens, et suae integritati plerisque locis restitutus, per IANVM CORNARIVM, Medicum, Physicum Northusen*. Item *CLAVDII GALENI* libri nouem nunc primum latini facti, idque opera eiusdem *IAN. CORNARII*, quorum argumenta versa pagina indicabit. Elenchi in utrumque opus. Ad calcem: Basileae in officina Frobeniana per Hier. Frobenium et Nic. Episcopium 1536. fol. vnacum tit. et praef. pagg. 252. ind. pag. 10. Galeni libri (quae agunt de respiratione, de vtero, foetu et femine) pagg. 178. ind. pagg. 6. Primam et vnicam hanc esse MARCELLI editionem nec ab vllo commentario illustratam, cum Medicis antiquis vero ex Aldi editione Venet. 1547. p. 81. et cum Medicae artis Principibus ex editione Henr. Stephani 1567. (vbi tom. III. a pag. 238. ad 414. inserta reperitur) recusam, monet Kestner. p. 122. §. VI. p. 345. not. t. p. 347. §. XI. conf. Merckl. p. 772. a. qui addit, eam cum AETHI contractae

ex veteribus medicinae Tetrab. (vid. sequ. n. 19. c.) ibidem, forma et anno eodem extare. De simplicibus vegetabilibus sigillatim quidem haud agit hic auctor, eorum tamen synonyma hinc inde indicat. Ceterum silentio haud praetereundum est, quod ipse CORNARIUS in praefatione iam indicavit, nempe SCRIBONIVM LARGVM (conf. num. super. 7. b.) totum in hoc opere contineri diuersis locis insertum ab ouo (vt aiunt) fere vsque ad mala &c. ex quo simul probare annitur, SCRIBONIVM graece scripsisse; ex citatis tamen Brunfelli aliquot euoluens, ea non eadem in Marcello inueni. 14) MVSAE atque APVLEII opuscula a) primum aliis operibus iuncta prodierunt hoc titulo: *De re medica huic volumini insunt. SORANI Ephesii Peripatetici, et vetustissimi Archiatri, in artem medendi Isagoge, haftenus non visa. D. CRIBASII Sardiani fragmentum, de victus ratione, quolibet anni tempore utili, antea nunquam aeditum. C. PLINII Secundi de re medica libri V. accuratius recogniti et (notis ac pseudepi-graphis semotis) ab innumeris mendarum millibus, fide vetustissimi codicis repurgati. L. APVLEII Madaurensis, philosophi Platonici, de herbarum virtutibus, vere aurea et salutaris historia, e tenebris eruta, et a situ vindicata. Accessit bis vice coronidis libellus utilissimus de Betonica, quem quidam ANTONIO MVSAE, nonnulli L. APVLEIO adscribendum autumant, nuper excusus. Praeterea rerum et verborum locupletissimus index. Ad calcem: Basileae in aedibus Andr. Cratandri, mense Augusto 1528. fol. pagg. 125. auers. non numeratis, praemiss. c. ind. pagg. 24. Epil. pag. 2. Apul. a pag. 99. ad 123. vbi haec inscriptio praefigitur: L. APVLEII &c. historia, quam a Chirone Centauro praeceptore Achillis, et ab Aesculapio accepit, haftenus nunquam in lucem aedita. Musa p. 124. a. b. 125. a. Collectio haec et contentorum emendatio debetur ALB. TORINO, supra no. 5. iam laudato, qui in praefatione de Apuleio addit, se duorum vetustissimorum exemplarium collatione vsum esse. Bibliothecae Riui, catalogus a Ge. Sam. Hermanno Lips. 1727. 8. editus p. 573. no. 6386. recenset APVLEII Platonici herbarium ad Marcum Agrippam, Romae 8. mai. ap. Phil. de Lignamine. Edit. antiquiss. c. f. illum., cuius etiam mentionem facit Kestnerus in der Stollischen Biblioth. P. XIII. p. 410. §. II. not. c. et Biblioth. med. p. 341. not. m. vt et Segu. p. 224. Quum annus editionis non addatur, ex inspectione indicet alius, quousque haec editio vetustior habenda sit illa Basiliensi, quae eodem anno Parisiis apud Chr. Wechelium in fol. recusa est, vid. Merckl. p. 758. b., et alio titulo p. 85. b. seq. vt et Segu. p. 224. addatque, quo pretio habendae sint figurae, quas continet. Ceterum etiam in dubium adhuc vocant varii auctores, num hocce opus LVICIO APVLEIO, Afro, qui sec. III. floruit, an APVLEIO CELSO Siculo, qui ante Chr. tempore Augusti Romae iam claruit, an vero horum neutri sed iuniori cuidam tribuenda sit, de quo conf. Kestner. Stollisch. Biblioth. I. c. p. 413. §. 7. et Jöch. Gel. Lex. T. I. p. 882. seq. quemadmodum etiam incertum adhuc est, num capitulum de Betonica ad ANT. MVSAM, Augusti Caesaris archiatrum, adeoque Apuleio Celso synchronum, an ad ipsum Apuleium pertineat: huius certe et reliquorum capitum expositio vno eodemque stilo exarata est. Singulis capitulis praemittitur stirpis, de qua agit, historia, quae vero in synonymis tantum variarum linguarum vndique collectis, sed vix fide dignis, consistit: quae de viribus addit, merito vilipenduntur. b) Eadem Musae et Apuleii opuscula deinde sigillatim recusa esse cum commentario HV-MELBERGII in 4. Tiguri ap. Froschover 1537. indicat Maitt. Annal. T. III. p. 268. Meum exemplar hunc prae se fert titulum: *In hoc opere contenta: ANT. MVSAE de herba Vetonica liber I. L. APVLEII de medicaminibus herbarum Lib. I. per GABRIELEM HV-MELBERGIVM, Rauen-spurgensem, Archiatrum Ipinensem, recogniti et emendati, adiuncto commentariolo eiusdem. 4. sine loco et anno; dedicatio autem data est Ilinae mense Februario 1537. pagg. 305. praemiss. pagg. 8. ind. pagg. 7. Musae liber cum comment. ap. 1. ad 17. Ex hoc quoque commentario quoad plantarum cognitionem nihil profici, monuit iam Gesnerus in saepius citato catalogo. 15) PAVLI Aeginetae exemplar Graecum alterum, cuius curam egit HIER. GEMVSAEVS (quem Merckl. p. 432. b. Heluetium dicit, Joecherus vero in Gel. Lexic. T. II. p. 915. Muhlhufae in Alsatia a. 1505. ex veteri prosapia Sueviae, von GESCHMAVS dicta, natum indicat) primo Aldino (vid. num. super. 5.) longe praefereendum esse, monuit iam Kestn. biblioth. p. 107. §. XV. Prodiit illud hoc titulo: ΠΑΥΛΟΥ ΑΙΓΙΝΗΤΟΥ Ιατροῦ ἀρίστου, Βιβλία ἑπτά. ἐν ἀρχῇ καὶ τοῦ τῶν βιβλίων δέξινται τὰ ἐν ἐκείνῳ περιεχόμενα. PAVLI AEGINETAE medici optimi, libri septem. In principio singulorum librorum omnia indicantur, quae in eo continentur libro. Omnia haec collatione vetustissimorum exemplarium, magna fide ac diligentia emendata et restituta, nec non aliquot locis aucta: vt hic liber plane nunc primum e tenebris erutus, in lucem prodiiisse dici possit, quemadmodum in calce operis videre licet. Basileae 1538. sed ad calcem: Basileae per Andr. Cratandrum mense martio 1543. (conf. sequ. n. 22.) fol. pagg. 306. praemiss. pagg. 12. quae praeter titulum continent Gemusaei praefationem latinam Calend. Aug. 1538. scriptam; opus reliquum vero totum Graecum est. 16) IOANNES AGRICOLA, cognomine AMMONIVS, Doctor et Professor Graecae linguae et medicinae Ingolstadii (vid. Joecher. Gel. Lexic. T. I. p. 151.) edidit librum hoc titulo: *Medicinae herbariae libri duo, quorum primus habet herbas huius seculi medicis communes cum veteribus, Dioscoride videlicet, Galeno, Oribasio, Paulo, Aetio, Plinio et horum similibus. Secundus fere a recentibus medicis inuentas continet herbas, atque alias quasdam praeclaras medicinas, vt quae post Galenum vel inuestigatae sunt, vel in vsum medicum peruenerunt. Autore IOANNE AGRICOLA AMMONIO, artis medicae Professore. Basileae ex offic. Barthol. Westbemerii, mense Augusto 1539. 8. pagg. 336. ind. pagg. 52. cui subnectitur Hippocratis Coi de medico medicinae officio Lib. pagg. 10. Dedicatio a p. 3. ad 13. Ingolstadii Kal. Maii 1530. scripta est. Librum secundum a pag. 232, praeter stirpes, alia quoque simplicia pharmaca recensere, scilicet succos, decoctiones, lapides &c. praefatio huic sigillatim praefixa vltius exponit. Agit autem A. vbique nonnisi de nomenclaturis et virtutibus. b.) Qui post biennium eiusdem cura prodiit NICOLAI ALEXANDRINI, Medici Graeci vetustissimi, liber de compositione medicamentorum secundum loca, translatus e Graeco in Latinum a NICOL. RHEGINO, Calabro, antehac nusquam impressus, cum breuissimis annotationibus locorum difficilium IO. AGRICOLAE***

*AMMONII Sc. Ingolstadii in officina Alexandri Weissenborn 1541. 4. sine paginar. numeris, foliis 260. seu alph. 2. plag. 16. ind. fol. 7. vix huc referendus est: rarius namque simplicium remediorum ex vegetabilibus nomina explicantur, idque nonnisi per vnum alterumve synonymon. Plura eiusdem edita huc rectius forte referenda indicat Gesner. in Biblioth. p. 382. a. 17) CAROLVM FIGVLVM Confluentiae in Germania scripsisse methodum de herbis Coloniae 1540. in 4. excusam, annotauit iam Gesnerus in Biblioth. p. 162. et in Catalogo saepius citato addit, eum ibidem de herbis cognoscendis in genere quaedam tractare. Libri, quem nondum vidi, integer titulus est: *Dialogus, qui inscribitur botano-methodus, sive herbarum methodus.* Coloniae ap. Io. Schoenstenium 1540. 4. vid. Mercklin. p. 141. b. et Segu. p. 64. 18) Eodem anno MACRI (vid. num. super. 3.) poemata auctiora et emendatiora prodierunt hoc rubro; *MACRI de materia medica L. V. versibus conscripti. Per IAN. CORNARIVM medicum physicum emendati ac annotati et nunquam antea ex toto editi. Contenta singulis libris. I. et II. de herbis ac plantis vulgaribus. III. de plantis peregrinis. IIII. de quibusdam plantis itemque animalium partibus, ac terrae speciebus. V. de lapidibus ac gemmis.* ad calc. Franc. Chr. Egen. 1540. 8. pagg. 132. auerlis non. numer. praef. ind. pagg. 22. dedicatio eiusd. anni Cal. Martii Francofurtadae data est. Annotationes singulis capitibus subiectae potissimum in vocum etymis explicandis versantur. 19) AETIVS, natus Amidae, Meopotamiae oppido, vixit seculo IV. vel secundum alios sub finem seculi V. et PAVLO Aegineta aetate inferior habetur, conf. Merckl. p. 17. b. Segu. p. 220. loecher. Gel. Lexic. T. I. p. 130., quare, habemus in eo GALENVM contractum, ORIBASIVM explicatum, PAVLVM Aeginetam ampliatus, scribit Petr. Castellanus in vita illustr. medicor. Antverp. ap. Guil. a Tongris 1618. 8. p. 131; sed Gesner. in Catal. citat. affirmat, eum, aequae ac Oribasium et Paulum, ne latum quidem vnguem a Galeni iudicio vsquam decessisse et nihil ferme prorsus de suo adiecit, sed omnia sua ex eo vel iisdem verbis vel breuius aliquanto repetisse. Integrum Graecum exemplar typis nondum excusum est: solos libros octo priores editos indicat Maitt. T. II. p. 303. hoc titulo: *AETII Amideni librorum medicinalium tomus primus, primi videlicet libri octo nunc primum in lucem editi, Graece in aedibus haeredum Aldi et Andr. Asulani Venetiis 1534. mens. Septembr. fol., chartis 91. addit Gesner. Biblioth. p. 14. b. conf. Merckl. p. 18. a. Segu. p. 220., et vbi reliqui in manuscripto asseruantur, annotat Keltz. bibl. p. 105. not. o. In Latinam vero linguam translatis prostant libri seu sermones XVI. Librum octauum ad tertium decimum vsque primus ex mutilo exemplari latine edidit CORNARIVS hoc titulo: a) *AETII Antiocheni Sc. Medici de cognoscendis et curandis morbis sermones sex, iam primum in lucem editi, interprete IANO CORNARIO Zwiccauiensi. medico. Quae in singulis sermonibus continentur in principio cuiusque habetur. De ponderibus et mensuris ex PAVLO Aegineta, eodem interprete. Basil. in offic. Frobeniana 1533. ad calc. per Hier. Frobenium et Nic. Episcopium 1533. mens. Aug. fol. pagg. 438. de ponderib. a pag. 439. ad 441. praemiss. pagg. 12. Deinde et reliqui prodierunt hoc titulo: b) *AETII Amideni, quem alii Antiochenum vocant, medici clarissimi libri XVI. in tres tomos diuisi, quorum primus et ultimus IO. BAPTISTA MONTANO Veronensi medico, secundus IANO CORNARIO Zwiccauiensi, et ipso medicinae professore, interpretibus latinitate donati sunt. In quo opere cuncta quae ad curandi artem pertinent congesta sunt, ex omnibus, qui usque ad eius tempora scripserant, diligentissime excerpta. Additus est index in omneis Tomos copiosissimus. Basileae in officina Froben. 1535. fol. T. I. continet L. I.—VII. p. 350. praemiss. p. 12. ad calc. per Hier. Froben. et Nic. Episc. mens. Aug. 1535. T. II. est idem exemplar cum eodem titulo anni 1533. T. III. hoc frontispicio distinguitur: *Tomus tertius habet AETII Amideni medici clarissimi de re medica libros tres, IO. BAPT. MONTANO medico Veronense interprete. ibid. 1535. continet L. XIV—XVI. pagg. 182. indic. general. pagg. 18. ad calc. mens. Aug. 1535. Hoc opus prius Venetiis excusum esse, indicat praefatio editionis sequentis; sed nemo ex auctoribus citatis aliam indicat, quam Venetiis ex officina Farrea 1543. 8. Postea omnes libri recusi sunt hac inscriptione: c) *AETII medici Graeci contractae ex veteribus medicinae tetrabiblos, hoc est quaternio, id est libri universales quatuor, singuli quatuor sermones complectentes, ut sint in summa quatuor sermonum quaterniones, id est sermones XVI. per IAN. CORNARIVM Medicum Physicum latine conscripti. Basil. 1542. ad calcem impensis Hier. Frobenii et Nic. Episcopii mense Septembri 1542. fol. pagg. 929. de ponderib. ex Paulo p. 930—932. ind. pagg. 28. tit. et dedicatio, quae calendis Nouembribus 1541. scripta, pagg. 10. Haec editio recusa reperitur inter Medicae artis Principes Stephani T. II. a p. 1. ad 840. Ex his libris primus agit de simplicibus pharmacis ex plantis. 20) Quibus praerogatiuis CONR. GESNERVS distinguendus sit ab omnibus botanicis, qui eum praecesserunt, satis testantur eius scripta, praecipue ea, quae sub seculo XVI. dimidii alterius initium in lucem prodierunt, et omnium maxime, quae posthuma nunc demum D. V. hic Norimbergae comparitura sunt. Quae hoc in catalogo locum habent, sunt a) *Historia plantarum et vires ex Dioscoride, Paulo Aegineta, Theophrasto, Plinio et recentioribus Graecis. iuxta elementorum ordinem, per CONRADVM GESNERVM Tigurinum: unacum rerum et verborum locupletissimo indice. Basileae ap. Robert. Wynter 1541. 8. pagg. 281. tit. dedic. pagg. 7. ind. pagg. 15. Eodem anno eodemque titulo hunc librum recusum esse Parisiis ap. Io. Lodoicum Tiletanum in 12. annotat. Maitt. annal. T. III. p. 324. et Venetiis per Melch. Sessam in 12. idem T. V. p. 438. Seguierius p. 73. hunc librum eiusque editionem Tigurinam et Venetam eiusdem anni alio titulo tanquam aliam ex Gesn. Biblioth. citat, vbi tamen Gesnerus has ipsas editiones aliis tantum verbis recenset et enchiridium vocat; neque etiam Maittaire, quem allegat, I. c. Parisiensis editionis formam in 8. sed in 12. indicat. Ceterum eundem librum excusum ibid. anno eodem ap. Guil. Richardum in 12. ex Falconeti bibliotheca Parisi., aliamque, titulo de plantis antehac ignotis &c. sine anno et loco ex Biblioth. Reg. Parisi. addit. Epist. dedicat. huius libri Laufannae (vbi tunc A. degebat) IX. Aug. scripta est. Historia singularum plantarum continet simul earundem descriptionem ex veteribus collectam, et ad margines addita sunt vocabula Graeca et quandoque Arabica. Quae praeter Dioscoridem accesserunt plantae, signo * notatae sunt, ut ipse in recensione*******

fione huius libri biblioth. l. c. monet, simul vero indicat, hoc signum typographorum incuria saepius omis-
 esse. b) *Catalogus plantarum Latine, Graece, Germanice et Gallice.* Πίναξ φυτῶν λατινῶν, ἑλληνικῶν, γερμανικῶν, καὶ γαλλικῶν. *Nahmenbuch aller Erdgewächsen lateinisch, Griechisch, Teutsch, und Fran-
 zösisch. Regestre de toutes plantes en quatre langues, Latin, Grec, Aleman, & Francoys. Vna-
 cum vulgaribus pharmacopolarum nominibus.* En tibi candidissime Lector, stirpium interpretationem
 supra omnes omnium hactenus de re herbaria libros locupletissimam instructissimamque, in qua non solum
 omnia recte antehac ab aliis scripta breuiter continentur, sed permulta prius a nemine tradita, vel nunc pri-
 mum inuenta, clarissime docentur. Adiectae sunt etiam herbarum nomenclaturae variarum gentium,
 Dioscoridae adscriptae, secundum litterarum ordinem expositae. Auctore CONR. GESNERO Ti-
 gurino. Tiguri ap. Christoph. Froschouerum 1542. 4. pagg. 162. auers. non numerat. Tit. dedic. pagg. 7.
 Segu. p. 73. addit ibid. 1541. et 1542. vt et Francot. 1543. (ex Biblioth. Bodl. vbi vero p. 219. b. nec locum
 nec annum additum reperi) in 4. sed ipse Gesnerus in biblioth. p. 181. b. non nisi illius a. 1542. mentionem
 facit. Mercklin. p. 208. a. editionem Tiguri apud Froschou. 1552. in 4. indicat; sed procul dubio errore typogra-
 phico. 21) Anno 1542., vel secundum Mercklinum iam a. 1533, acris orta est controuersia inter FVCHSIUM
 atque CORNARIUM, cuius occasione euulgata sunt a) LEONH. FVCHSII tractatus: *Cornarius furens.*
 Basil. ap. Erasmi. Xylotectum 1533. 8. Merckl. p. 744. a. ibidemque 1545. in 8. Biblioth. Riui. no. 1788. et
 in 4. Biblioth. Meibom. P. III. no. 3800. Segu. p. 69. b) IO. CORNARII *vulpecula excoriata, siue refuta-
 tio historiae Leonardi Fuchsi de plantis. Francof. ap. Egenolph. 1543. 4. Merckl. p. 502. a. Segu. p. 45. c) Nitra
 ac brabyla pro Vulpecula excoriata asseruanda per IAN. CORNARIUM ad Leon. Fuchsum. ibid.
 1545. 4. Merckl. l. c. Biblioth. Riui. no. 6420. Segu. p. 45. Controuersiam hanc praeter modum, qui erudi-
 tos decet, agitatam esse, ipsae inscriptiones docent: num stirpium cognitio in tractatione illustrata sit, iudi-
 cent alii: ad meas namque manus nondum haec scripta peruenerunt. 22) Graecum PAVLI exemplar, a
 GEMVSIO in lucem editum, (vid. no. 15. super.) postea idem illustrauit hoc opere: *In libros PAVLI AE-
 GINETAE omnes, annotationes nunc et primum concinnatae, et in lucem editae.* Basileae in aedi-
 bus Andr. Cratandri 1543. fol. pagg. 60. tit. dedic. pagg. 8. Praefatio cum ipso titulo coniuncta indicat,
 has obseruationes aliorum emendationes interea publicatas vel probare, vel refutare, nouamque promittit in-
 terpretationem, quam autem editam ab vilo annotatam non inueni; dedicatio, Basil. eiusd. anni Cal.
 Mart. exarata, autorem harum obseruat. declarat et praecipue ingenium ANDERNACI (vid. n. 6. super.) notat
 et e contrario illud OROSCII (vid. seq. artic. XV.) valde laudat. Interpretatio PAVLI, quam CORNA-
 RIVS denique adornauit, anno demum 1556. Basil. ex offic. Io. Heruagii in fol. prodiit (vid. Merckl. p. 865. b.
 Segu. p. 290. Kestn. p. 108. not. k.) atque etiam occurrit inter Medicae artis Principes a Stephano editos
 T. I. a p. 347. ad 701. cum praemiss. pagg. 5. hoc titulo: *PAVLI AEGINETAE de re medica libri se-
 ptem IANO CORNARIO interprete, et subiunctis eiusd. CORNARII Dolabellarum in PAV-
 LVM AEGIN. libri VII.* a p. 702. ad 749. 23) *Historia mundi seu naturalis, libris XXXVII. com-
 prehensa et L. X—XIX. de stirpibus agens, quam CAIVS PLINIUS (a patre) SECVNDVS (a matre) Maior
 quoque et Senior cognominatus, Veronensis vel Romanus, Augur et Caesareus Procurator, initio seculi I.
 conscripsit (conf. Merckl. p. 137. a. Io. Ge. Fabricii biblioth. lat. Vol. alt. p. 401. Io. Harduini praef. in suam edit.
 Paris. 1723. fol., Segu. p. 141. Ioech. Gel. Lex. T. III. p. 1632.) ab a. 1469. (vid. seq. art. XV.) ad nostra vs-
 que tempora saepissime typis excusa atque praeterea variorum eruditorum emendationibus pariter ac com-
 mentationibus illustrata est. Inter commentatores, quorum amplum catalogum Fabricius, Harduinus, Se-
 guierius l. c. atque Maittaire Annal. typ. T. V. p. 156. exhibuit, Germanos quoque fuisse, haud reperi, si for-
 te MILICHIVM (supra no. 11.) IVL. CAESARIUM Iuliacensem, IAC. ZIEGLERVM Bauarum, RVD. GOCLE-
 NIVM Marpurgensem, et BEAT. RHENANVM Allaticum excipias; ex quibus tamen priores vnum vel alter-
 um tantum librum huc non pertinentem exposuerunt, neque vltimus vltra L. XIVtum progressus est. In
 Germanicam linguam vero traductum esse hoc opus atque editum Francof. 1571. 1584. et 1600. in folio, indi-
 cat Fabricius l. c. et eiusd. Vol. supplem. p. 619. vt et eius libros quinque VII—XI Argentor. iam 1543.
 suppl. l. c. atque ex hoc Segu. p. 144. 145. ex quibus hanc tantum mea collectio continet editionem hoc ti-
 tulo: *CAII PLINII SECVNDI von Veron, natürlicher history fünff Bücher. namlich das VII.
 von der Menschen und Völkern wunderbarlichen Gestalten, Weissen, Wandel, Art, Natur und
 Gebräuchen, beyderley Geschlechtern, Mann und Weibern. VIII. von den Thyeren, so uff dem Erd-
 reich wonen. IX. von der Fisch allerley Geschlecht und Eygenthschafften, so im Wasser wonen.
 X. von dem Geflügel, so im Lufft lebt. XI. von den kryechenden und mynderen Thyeren, so abge-
 spalten an ergänzung irer glyder. newlich durch HEINRICH von EPPENDORFF verteutsch.*
 zu Strassburg bey Hans Schotten 1543. fol. pagg. 235. ind. pagg. 4. Hoc opus autem, vt inscriptio iam
 docet, pariter de stirpibus nil continet, excepto cap. 26. p. 62, quod breuissime de plantis agit, quarum
 vsum medicum animalia docuerunt. Num reliquae editiones germanicae a me nondum visae plures conti-
 neant libros, inquirant alii: mihi dubium mouet exemplar, quod mecum communicauit cl. D. D. GE.
 LEONH. HVTHIVS, Collega honoratissimus, quod per M. IO. HEYDEN germanice redditum et Francof.
 1565. in fol. pagg. 494. per Pet. Schmidt impens. Sigism. Feyrabend editum est eodem ferme ampliori ta-
 men titulo, atque etiam haud plures, quam quinque indicatos, libros continet, figuris vero ligno incisis, at-
 que hinc etiam cap. 26. p. 150. sequi. 18. plantarum Egenolfianis, refertum est. 24) IO. DANTZIVS,
 Astenfis (vulgo von AST dictus) natus quidem est in Comitatu Italiae Astenfi, Germanis tamen accensendus vi-
 detur ex eo, quia non solum postea in Germania, praesertim Francofurti ad Moenum, vitam degit et diem
 supremum obiit, verum etiam et praecipue, quia DIOSCORIDEM in Germanicam linguam, et quidem pri-
 mus, transtulit ibidem 1546. typis euulgatum vid. art. XII. 1. et conf. artic. VI. Ab eodem porro edebantur
*Tabulae simplicium medicamentorum, quae apud Dioscoridem, Galenum et Plinium sunt, omnium,
 exceptis iis, quae ab animalibus sumuntur, facultates tam generales quam particulares continentes,
 et eam quae est ad principia sequelam, et vt omnia ad elementorum rationes consequantur, nec***

quicquam in iis reperiatur pugnans, mira industria euidentissime ob oculos spectanda, exponentes. Quas aliae consequuntur tabulae, eo iudicio doctrina et compendio compositae dispositaeque, ut simplicium viribus ex prioribus tabulis cognitis, primo aspectu medicis ad plerosque morbos remediorum praesidia inuenire promptissimum et facillimum sit. De simplicium medicamentorum facultatibus in genere, deque iis tum ratione tum experientia inuestigandis, dialogi quatuor, quorum argumenta proxima tabula exhibebit. Per IO. DANTZIVM Astensem Medicum. Basileae apud Henrichum Petrum mense Augusto 1543. fol. tit. praef. dedic. et ind. p. 22. tabula prima pagg. 97. secunda a p. 101. ad 155, dialogi pagg. 85. Singulis his diuisionibus proprius praefixus est titulus iisdem ferme verbis; praefatio vsum tabularum docet; dedicatio Basileae XIV. Calendas Martias 1543. scripta, indicat occasionem, qua, ante iter in Italiam stirpes inuestigandi causa suscipiendum, hoc opus composuit, vbi etiam post reditum auctiorem editionem promittit; index morborum remedia indicat; prima tabula stirpium aliorumque simplicium remediorum nudas nomenclaturas Latinas et Graecas secundum priores literarum ordine et simul horum remediorum qualitates viresque indicat; reliqua huius operis contenta ad morborum remedia, remediorumque qualitates solummodo pertinent. 25) Quae IOANNES LONICERVS, ADAMI parens (vid. Joech. Gel. Lex. T. II. p. 2521.) linguae Hebraicae, Graecae Latinaeque, vt et Theologiae in Academia Marburgensi Professor (ibid. p. 2522.) ad Dioscoridis interpretationem contulit, prodierunt hoc titulo: *In Dioscoridae Anazarbei de re medica libros, a VIRGILIO MARCELLO versos, scholia noua, IO. LONICERO auctore, cum rerum et vocabulorum, quae hisce scholiis insunt, indice.* Ad calcem: excusum Marpurgi per Christian. Aegenolphum, mense Augusto 1543. fol. pagg. 87. auersis non numeratis. Praemiss. pagg. 4. ind. pagg. 16. quem tractatum, eodem, vt videtur, anno, titulo communi (seruato tamen huius tractatus titulo peculiari) iunxit idem typographus Dioscoridis operi cum annotationibus RYFFI Francof. excusis vid. art. super. XI. 4.; parum autem laudis obtinuit a Gesnero Biblioth. p. 434. a. Eundem iam a. 1531. edidisse NICANDRI Theriacam et alexipharmaca cum scholiis et interpretatione latina, indicat Merckl. p. 627. b. 26) Multis operibus latine et germanice editis amplam famam aucupatus, exiguum vero vel nullam plane consequutus est GVALTERVS siue WALTERVS HERMANNVS RYFF, RIFFVS vel RIVIVS nominatus, medicus Argentoratensis. Male autem omnibus ferme audit atque etiam iam Gesnero, qui eum biblioth. p. 284. b. sequ. graui virgula censoria notat: sufficiant haec pauca; si quae tamen in illis (operibus) bona reperiuntur, mera sunt furta, et pleraque perperam a primis autoribus exscripta ac deprauata. conf. art. XI. post n. 15. Eiusdem farinae censentur eiusdem in Dioscoridem obseruationes supra iam art. XI. 4. 5. indicatae. 27) Maioris pretii haud est opusculum hoc titulo euulgatum: *Tomus secundus elementorum physiologiae, seu philosophiae naturalis, tres libros continens: Primus animam, secundus plantas, tertius animalia describit. Autore IOANNE MONHEMIO.* Coloniae haeredes Gymnici excudebant 1544. 8. sine paginarum numeris, lib. I. vnacum tit. et dedic. plag. 5. L. II. alph. 1. plag. 9. cum pagg. 5. Accedit ex libello EOBANI HESSI carmen de conseruanda bona valetudine et Horti alcinoui pagg. 9. tertius autem liber de animalibus non additus, neque, quantum scio, postea sigillatim editus est. Hunc pariter plagii crimine accusat Gesnerus l. c. p. 438. b.; sed ipsemet auctor in dedicatione Coloniae Cal. Iulii 1544. scripta indicat, puerorum erudiendorum tantum in gratiam se composuisse hoc opusculum et auctores ipsumque Gesnerum nominat, ex quorum monumentis illud composuit. Primus tomus, huc autem non pertinens, hac inscriptione prius comparuit: *Elementorum physiologiae seu philosophiae naturalis libri septem, in duos tomos distincti, vniuersam artem methodicam complectentes: Authore IO. MONHEMIO.* Coloniae Io. Gymnicus excudebat 1542. 8. plag. 8. cum dimid. LI. rerum naturalium principia eorumque circumstantias describit, II. mundum et eius partes, III. Metœra, IV. metalla atque lapides; reliqui tres ad Tom. II. pertinent. 28) Quum a. 1549. altera DIOSCORIDIS (art. XI. 5.) editio pararetur, mittebantur IO. LONICERI scholia, sed addebantur VALERII CORDI in PED. DIOSCORIDIS de medica materia libros annotationes a p. 449. ad 533. vt et EVR. CORDI iudicium de herbis et simplicibus medicinae, ac eorum, quae apud medicos contrahuntur, decisio et explicatio a p. 534. ad 541. tandemque Herbarum nomenclaturae variarum gentium, Dioscoridi adscriptae, secundum litterarum ordinem expositae a CONR. GESNERO a p. 541. ad 554. vid. artic. XI. 5. Quod a) ad EVR. CORDI opusculum attinet, typographus in praefatione indicat, esse hoc nil aliud, quam epitomen Botanologici (sup. n. 10. a.) eiusdem auctoris; sed continet eandem iam prima Botanologici editio, vti etiam illa Parisiis recusa (n. 10. b.) vbi indicis loco annectitur hac inscriptione: *index et quasi epilogus seu epitome omnium fere eorum, quae in hoc dialogo (ipsum namque botanologicon colloqui in modum conscriptum est) tractantur:* perperam ergo tanquam distinctum huius auctoris opus citatur a Merckl. p. 265. a. et Segu. p. 44. qui praeterea hunc peculiarem titulum indicat: *iudicium de herbis singulis, quarum in medicina usus est, et huius generis eorum, quae apud medicos contrahuntur, explicatio.* Prima editio. Francof. ap. Egenolphum 1539. (sine formae additione) ibidem cum Dioscoride ex editione Ruellii 1549. in fol.; videntur autem haec ex aliorum citationibus variis et imperfectis tantum transcripta. b) VAL. CORDI, EVRICII filii, annotationes ex manuscripto, quod auctor Vitembergae nonnullis medicinae studiosis dictauerat, omnino primum hic publicatae et deinde cum patris Botanologico Parisiis (10. b) recusae sunt. Conscripsit easdem iuuenis adhuc aetatis 17. annum agens et a. 1531. Vitembergae adhuc ipse discipulus in magistrorum admirationem, dum commilitonibus Dioscoridem ter praelegisset: vnde facile colligi potest, qua industria, quoque ingenio praecoci, et nihilominus acri, condecoratus fuerit, et quam ob rationem fata eius praematura, quae d. 25. Sept. a. 1544. aetatis 29. Romae contigerunt, luxerint omnes cordati et de publica vtilitate solliciti viri. Erant autem haec obseruationes non nisi prima collectanea, quae postea vltius perficere haud intermisit, docente id ipsum exemplari manu eius scripto, quod multo auctius et emendatius postea vnacum reliquis eiusdem posthumis operibus edidit GESNERVS hoc titulo: *In hoc volumine continentur VALERII CORDI Simesusii annotationes in PED. DIOSCORIDIS Anazarbei de medica materia libros V, longe aliae quam antehac sunt*

sunt euulgatae. *EIVSD. VAL. CORDI Historiae stirpium Lib. III. posthumi, nunc primum in lucem editi, adiectis etiam stirpium iconibus et breuissimis annotatiunculis. Sylua, qua rerum fossilium in Germania plurimarum, metallorum, lapidum et stirpium aliquot rariorum notitiam breuissime persequitur, nunquam haecenus visa. De artificiosis extractionibus liber. Compositiones medicinales aliquot, non vulgares. His accedunt Stocck-bornii et Nessi in Bernatium Heluetiorum ditone montium, et nascentium in eis stirpium, descriptio BENEDICTI ARETII, Graecae et Hebraicae linguarum in schola Bernensi professoris clarissimi. Item CONRADI GESNERI de hortis Germaniae liber recens, vna cum descriptione Tulipae Turcarum, Chamaecerasi montani, Chamaemespili, Chamaenerii, et Conyzoidis. Omnia summo studio atque industria doctiss. atque excellentiss. viri CONR. GESNERI medici Tigurini collecta et praefationibus illustrata. Ad calcem: Argentorati excudebat Iosias Ribelius 1561. fol. pagg. 303. auersis non numeratis: Praemiss. pagg. 16. Cordi annotat. in Diosc. p. 1—84. historia p. 85—212. icon. 275. descr. Tulipae &c. p. 213—216. icon. 5. Sylua obs. &c. p. 217—231. opusculum ARETII p. 232—235. hort. Germ. p. 236—301. Ind. pagg. 11. Ex praefationibus et dedicationibus Gesneri discimus, a quibus haec omnia Cordi opera acceperit, quidque ipse subinde illis addiderit (conf. nota Seguier. p. 45.) nec non vnde additae icones desumptae sint, nempe (vltra 200) ex apparatu illo, quem typographus pro Tragi historia stirpium edenda parari curauit, reliquis exceptis, quas Gesnerus vel secundum aliorum auctorum (circiter 12) imagines, vel secundum picturas, quas ipse parandas curauit vel a KENTMANNO communicatas accepit (56. praeter 5. vltimas) quas omnes ingenuus Gesnerus notis distinxit. Biennio post sequutus est VAL. CORDI Simesusii stirpium descriptionis liber quintus, qua in Italia sibi visas describit; in praecedentibus vel omnino intactas, vel parcius descriptas. Hunc autem morte praeventus perficere non potuit. De morbo et obitu VAL. CORDI epistola HIER. SCHREIBERI Norimbergensis. In eiusdem obitum CASP. CRVCIGERI elegia. Emendationes quaedam et additiones in opera VAL. CORDI Argentiniae excusa apud Ios. Ribelium 1560. (1561.) Argentorati excudebat Ios. Ribelius 1563. fol. pagg. 13. auers. non numeratis, sine figuris. Quo testimonio MELCH. ADAMI in vita VAL. CORDI operis sui in 8. Heideib. 1620. p. 47. et in fol. Francof. 1706. p. 21. a. affirmauerit, sextum historiae stirpium autographum superfuisse, non indicauit. c) Herbarum denique nomenclaturae Gesneri, quae Dioscoridis editioni supra citatae accesserunt, extabant iam cum eiusdem catalogo plantarum &c. supra no. 22. indicato.*

§. XV. Hi ergo sunt, si recte memini, omnes vel saltem praecipui illi Germani, qui pro instauranda et emendanda re herbaria ad primum vsque seculi XVI. dimidium omnes vires neruosque intenderunt. Quum vero iniquum fore duxi, si reliquorum virorum in eandem scientiam collocata studia, quibus eadem temporis periodo et partim iam ante Germanos pro meritis claruerunt, silentio penitus praeterirem, eorum quoque operum, quatenus mea collectio succurrit, pari ordine chronologico, sed primis tantum lineis adumbrata recensio, colophonem tandem imponat. Ne autem veterum auctorum ea opera, quae stirpium historiam valde ieiune tantum pertractarunt, huic catalogo perperam inserta videantur, in gratiam eorum, qui rei herbariae historiam nondum cognitam habent, pauca praemittenda necessum duxi. Quam diu litterarum barbaries omnes scientias artesque subiugauit, vna cum reliquis botanica quoque penitus negligebatur. Quicquid de stirpium cognitione ad pharmaca inde conficienda conseruandum erat, in nudis ferme consistebat vocabulis, quae ex Arabum praecipue operibus in latinam linguam male translatis et peius adhuc intellectis traditioneque fallaci, absque omni inquisitione vltiori, colligebantur. Quam sterilis ergo atque infida eiusmodi expositio stirpium medicinalium a Barbaro-Latinis medicis conscripta fuerit, facile testantur illi, qui tamen ex his praeferebantur reliquis, e. gr. IO. PLATEARIUS, SIMON IANVENSIS, MATTH. SYLVATICVS &c. quibus adhuc accensendi sunt eiusdem aevi Barbaro-Graeci SIMON SETHI, MYREPSVS &c. Quod ad Arabes attinet, hi iterum stirpium medicinalium recensioem potissimum ex Graecorum, praecipue GALENI eiusque epitomatorum ORIBASII, PAVLLI (§. XIV. 4.) AETIIQUE (ibid. 19) operibus, lingua Arabicis pariter peregrina conscriptis parique difficultate transferendis, desumserunt, multas tamen simul cognitatas fecerunt, quarum apud Graecos nullum vestigium reperitur, ex quibus praecipui sunt SERAPIO, AVERRHUIS, RHASIS, AVICENNA, HALYABAS, MESVE &c. Ex Graecis denique quorum codices conseruati vel saltem huc vsque typis excusi sunt, solus DIOSCORIDES, et iam ante hunc THEOPHRASTVS Eresius, in tradenda stirpium historia curiosius occupati fuerunt: ipse namque GALENVS, medicinae post HIPPOCRATEM nouus reformator, ad DIOSCOR. & THEOPHR. frequenter ablegat (IO. ALB. FABRICIVS in *Biblioth. Graec. L. IV. c. 17. p. 570. & 588.* loca citata sigillatim indicat) et nullibi (quod GESNERVS iam in catalogo saepius citato notauit) quoad stirpium historiam noui quicquam addidit. Ante THEOPHRASTVM quidem eius praeceptor ARISTOTELES problematum sectione XX. de illis, quae ad stirpium genus et oleracea pertinent, egit, et eius opera porro continent peculiare librorum II. de plantis inscriptos: sed (vt taceam, horum librorum auctorem aequae, ac eorum interpretem, omnium fere consensu incertum esse) et hi et illa nil continent, quam inutiles de generalibus stirpium qualitatibus dissertationes, hincque ex botanicorum classe merito proscribuntur. Haec omnia fusius iam explicauit TOURNEFORTIVS in Itagoge in rem herbariam suis institutionibus praefixa, alique in similibus recensioibus, ad quas plura scire desiderantem ablego; ex haecenus allatis autem iam satis patere opinor, quam ob rationem veterum opera in botanicorum recensione praeteriri nequeant. Aliorum catalogi multorum adhuc operum mentionem faciunt, quae, dum morborum remedia indicant, multas variasque stirpes simul nominant, e. gr. ipsius HIPPOCRATIS, CORN. CELSI &c. plurimumque Barbaro-Latinorum; sed haec hinc inde interspersae non solum improbo labore colligendae essent, verum etiam simpliciter tantum nominatae, raro vno vel altero synonymo, nunquam vero sufficiente descriptione explicatae, reliquorum operum indices aliquibus forte nominibus quidem aucturae, vix autem, ac ne vix quidem, ad ipsam earum cognitionem quicquam adlaturae essent, id quod etiam probant specimina illa, quae BRVN-FELSIVS (art. XIV. 7. b. 1.) exhibuit. Huc etiam vocant plurimi, et quidem maiori iure, geoponica seu de re rustica opera CATONIS, VARRONIS, VIRGILII, COLVMELLAE, PALLADII &c. sed ne ad nauseam vsque extendam hanc disquisitionem, ea praeterii, cum primis quia illorum auctores non aequae stirpium cognitionem, quam earundem culturam, emendandam docendamue curae cordique habuerunt.

§. XVI. Ex libris itaque adhuc recensendis 1) quantum ego quidem reperi, typis excusa sunt opera MESVES. Vixit autem sec. VIII. vel initio IX. MESVE ex ciuitate Nisabor regionis Chorofaniae olim Ba-
 ctriariae ortus, seu IOHANNA filius MESVACH, itemque IOANNES seu IANVS Damascenus, medicus Syrus,
 qui pro eodem habetur; inclauit vero etiam seculo XI. vel XII. IOANNES MESVE Damascenus, filius HA-
 MACH filii ABDELA, regis Damasci, cui nomen MESVACH alii tribuunt: quomodo autem hi distinguendi,
 et cuius opera Mesues nomine publicata tribuenda sint, nondum consentiunt auctores: vid. *Castell. p. 143.*
Merckl. p. 640. a Tourm. l. p. 17. Segu. p. 279. Kestn. p. 126 136. Joach. T. II. p. 1917. III. p. 478. Sequitur autem tractatum,
 canones inscriptum, alius tractatus de simplicibus purgantibus, vbi hinc inde, valde tamen imperfecte, hae stir-
 pes vel earum partes describuntur, species nonnullae indicantur et synonyma adduntur; in *Grabadin* seu anti-
 dotario quoque eorum subinde mentio fit. Opus eius de medicinis vniuersalibus Venet. ap. Clementi-
 num Patavinum 1471. in fol. vid. Segu. p. 279. Maitt. Annal. tyogr. T. I. seu IV. p. 310. et eiusd. *practica*
in medicinis particularium aegritudinum cum PETRI APPONI additione Neapol. per Berthold. Rying de Ar-
gentina 1475. die 12. Ian. in fol. Segu. p. 279. Maitt. ibid. p. 346. Mea exemplaria sunt sequentia. a) MESVE
 cum expositione MONDINI super canones vniuersales. ac etiam cum expositione CHRISTOPH. de HONESTIS in
 Antidotarium eiusdem. Additiones PETRI APPONI. Additiones FRANCISCI de PEDEMON-
 TIVM. Antidotarium NICOLAI cum expositione PLATEARII. Tractatus quid pro quo (absque auct. no-
 mine indicat remedia sibi inuicem substituenda) Tractatus de synonymis (iterum sine A. nomine) Libellus
 BYLCHASIS sine SERVITORIS (translatum a SIM. IANVENSIS interprete ABRAAM Iudeo Tortuosiensis). Com-
 pendium aromatariorum SALADINI. IO. de SANCTO AMANDO super antidotarium Nicolai. Venetiis per
 Io. et Gregor. de Gregoriis fratres 1497. d. 14. Oct. in fol. pagg. 360. (sed ex typographi incuria, sunt enim
 374.) auersis non numerat. (Cum inscriptione iisdem verbis impressa per Bonetum Locatellum Bergomensem
 iussu et impensis nobilis viri Dom. Othauiani Scoti ciuis Modacetiensis 1495. prid. Kal. April. vid. Maitt. l. c.
 p. 602. MVNDINI et CHR. de HONESTIS expositiones Ferrariac et Bononiae iam 1488. in fol. Segu. p. 279.)
 b) Eodem titulo ibid. 1508. d. 20. Oct. Sereniss. Dom. D. Leonardo Lauretano Venetiarum Duce impe-
 rante. fol. pagg. 379. auersis non numeratis. c) Eodem titulo cum his additis: Additiones nouae super Mesue
 et Nicolai Antidotariis. Quotationes item marginales. Tabule duae nouiter additae. Prima ad breuius et facilius
 inueniendum quodlibet antidotum in antidotariis Mesue et Nicolai positum. Secunda ut promptius propieta-
 tes et iuuamenta dictorum antidotorum sciri possint. Omnia accuratius quam haecenus fuerint emendata cum
 marginalibus adnotamentis nuperrime adiectis. Ad calcem: Impressa in famatissimo Lugdunenn. emporio,
 industria probi viri Gilberti de Villiers chalcographi Lugdunens. incolae, sumptibus vero et impensis honesti
 viri Vincentii de Portonariis de Tridino de monte ferrato. 1519. die ult. mens. Iulii fol. foliis 327. seu
 pagg. 654. tab. alphabetica pagg. 13. d) Diui MESVE et noua quedam ultra ea quae secum associari
 consueuerunt opera preclarissima ut inferius speculanti sub manus indicio demonstratur. Haec titulo subie-
 cta indicant has accessiones: CHR. GE. (sc. de HONESTIS) Florentini tractatus de aqua et pi-
 sana ordeacea conficienda. ALCHINDI medicorum perspicacissimi de medicinarum compositarum gradibus in-
 uestigandis libellus. Subtilissimus HABENGVEFIT de simplicibus medicinis libellus. Egregius APVLEI medici
 antiquissimi de ponderibus et mensuris libellus. Antidotorum in MESVE et NICOLAI Antidotariis contento-
 rum index. Remediorum variis aegritudinibus conferentium summa copiosissima. Ad calcem: quae dili-
 genti IOAN. BAPT. de NICOLAIS Brixiani Salodiensis elucubratione castigata post vniuersas eorum impres-
 siones in florentiss. Venetiar. urbe Domini Luce Antonii Iunta florentini huius artis curiosissimi sumptibus
 excusa sunt anno NB. ante Chri. aduentum 1527. Martii idibus fol. pagg. 388. auersis non numeratis. e) Opera
 Diui IOANNIS MESVE. Diui IO. MESVE Medicorum euangelistae celeberrimi praeclara opera,
 studiosis artis medicinae perquam utilia, quae non solum quam haecenus fuerint nuperrime castigatiora, ve-
 rum etiam multum locupletiora reddita sunt, ut candidissimo cuique lectori constabit, opusculorum inscriptio-
 nes, quas proxime sequens pagina complectitur, dispicienti (secundum hanc paginam accedunt: insignis medi-
 ci COPHONIS tractatus de arte medendi, omnibus morborum curam auspiciaturis apprime necessarius. GEN-
 TILIS FVLGINATIS de dosi medicinarum inuestiganda libellus. DOMINICI (VICENTINI) ARCHIGNANEI
 de ponderibus et mensuris libellus, tres continens tractatus, qui ad praxim quam maxime necessarij sunt. Praeterea
 addition. nouar. edit. c. d. auctor nominatur D. MICHAEL a CAPELLA Tornacenn.): ad calcem: excusa in
 famatissimo Lugdunenn. emporio sumptibus et impensis honesti viri Vincentii de Portonariis de Tridino de
 monte ferrato: industria vero Ioann. Crespin. alias du Carre 1533. die XV. mens. Maii fol. foliis 357.
 seu pagg. 714. NB. in hoc et antecedenti exemplari MONDINVS nominatur MVNDINVS DE LENTIIS (a LVCIIIS
 Segu p. 279.) et CHR. de HONESTIS, appellatur CHRISTOPH. GEORGIVS. f) IO. MESVAE Damasceni de
 re medica libri tres: (Theoremata seu Canones vniuersales, de medicamentis simplicibus purgantibus, et anti-
 dotarium) IACOBO SYLVIO medico interprete. Parisiis ap. Chr. Wechelium 1542. fol. pagg. 350. Liber secundus,
 qui agit de medicamentis simplicibus purgantibus, copiosis notis ad margines et ad calcem singulorum capitulo-
 rum instructus est, maximam tamen partem ex veteribus Graecis aliisque petitis et semper citatis; neque et-
 iam antidotarium iisdem caret. g) Eodem titulo Lugduni ap. Io. Tornaesium et Guil. Gazaeum 1548.
 8. pagg. 372. praemiss. pagg. 16. ind. pagg. 22. h) In Antidotarium IOANNIS Filii MESVE (censura)
 cum declaratione simplicium medicinarum, et solutione multorum dubiorum ac difficultum terminorum. Ad-
 iecto facilissimo atque copioso indice, nec non et receptario castigatissimo cum suo repertorio. Opus sane quibuscun-
 que tam medicinae studiosis, quam aromataris, utile et necessarium. Ad calcem: per Venerandos Patres et
 Iesu Christi seruos, Fratres BARTHOLOMAEVM VRBEVETANVM et ANGELVM PALEAM IUVENA-
 TIENSEM, Ordinis Minorum obseruantiae Prouinciae Romanae. Impressum Venetiis per Barthol. de Za-
 nettis Brixiensem 1543. XVIII. Mensis Iulii. fol. antidot. pagg. 328. praemiss. cum indice copiosiss. pagg. 12.
 Receptar. pagg. 84. in column. diuisis, singulis diuisionibus numeratis, ind. pagg. 5. Auctores huius operis de-
 clarat subscriptio indicata et dedicatio ex sacro Araecaeli conuentu Romae IV. Nonas Iulii 1542. data, et
 possessor huius mei exemplaris anonymus manu adscripsit, ex ipsius fratris Angeli relatione se eodem publi-
 cationis

cationis anno Venetiis audiuisse, illum cum socio suo in opere hoc elaborando per 20. annos desudasse illudque porro per 15. medicinae Doctores Italiae eruditiores correctum et approbatum esse. Ipse titulus indicat, continere hoc opus solum antidotarium; sed omnia simplicia, quae compositiones ingrediuntur, satis prolixè ubique exposita sunt. i) Eodem titulo Lugduni ap. Io. et Francisc. Fellonios fratres 1546. ad calcem: 1545. in 8. pagg. 622. praemiss. pagg. 32. Receptar. pagg. 81. ind. pagg. 12. k. MESVE et omnia quae cum eo inprimi consueverunt, pulchrioribus typis reformata, diligentiorique animadversione emendata, et pluribus in locis restituta, atque copiosiori indice, quid in quoque opere contineatur, significante, decorata: quae in sequenti pagina descripta sunt. Addita est IAC. SILVII interpretatio canonum uniuersalium, simplicium medicinarum, atque antidotarii: in quo et ponderum varietatem in margine annotauimus. Et duo Trochisci Mesue, quae in manuscriptis exemplaribus inuenimus: et quaedam compositiones ex Galeno, quae nunc ab aromataris in usu habentur. Ad calcem: Venetiis in officina haeredum D. Lucae Ant. Iuntae mense Ianuario 1549. fol. Prior diuisio pagg. 141. posterior pagg. 313. ubique auersis non numeratis, tit. et ind. pagg. 27. Auersa tituli pagina indicantur praeter editionis lit. e. et huius tituli contenta IAC. de PARTIBVS Summula, remedia continens omnium aegritudinum, ad alphabeti seriem dispositarum. l) IO. MESVE Damasceni, medici clarissimi, opera de medicamentorum purgantium delectu, castigatione, et usu, libri duo, quorum priorem Canones uniuersales, posteriorem de simplicibus vocant. Grabadin, hoc est compendii secretorum medicamentorum, libri duo, quorum prior Antidotarium, posterior de appropriatis vulgo inscribitur. Cum MYNDINI, HONESTI, MANARDI et SYLVII in tres priores libros observationibus, quae vulgo cum his prodire consueverunt. His accessere plantarum in libro simplicium descriptarum imagines ex vino expressae. Et IO. COSTAEI annotationes, tum quas in editione priori (forte 1589. vid. Merckl. p. 640. b) dedimus, tum praeterea nouae aliae in postremas nouem Antidotarii sectiones, quae desiderabantur. Reliqua vero, quae cum Mesuae operibus exte solent, in aliud volumen coniecit, quod nomine supplementi in Mesuam inscriptum est. Quae omnia accuratissime hac postrema editione prodeunt emendata et ab innumeris mendis et erroribus, qui in superiori irrepsierant, adhibita doctorum hominum industria, expurgata. Venetiis ap. Iuntas 1623. fol. pagg. 252. supplem. pagg. 278. ubique auers. non numeratis, praemiss. pagg. 12. ind. pagg. 22. Praefixa dedicatio COSTAEI docet, se prioris tomi correctionis, posterioris vero seu supplementi VINCENTIVM COGOLLVM medicum Vicentinum curam gessisse. Supplementi contenta eadem sunt, ac editionis lit. e., quae verbotenus ferme recenset Merckl. l. c. Stirpium imaginum numerantur tantum 39. (quum tamen stirpium 50. describantur) ligno insculptae atque eadem, vel saltem maximam partem ad eandem normam denuo factae, quae in Mathioli editione Valgrisianna anni 1570. reperiuntur, adeoque peculiari consideratione haud dignae. m) IO. IAC. de MANLIIS annotationes in ant. dot. vid. §. 14. 7. m. IO. MANARDI vero num. seq. 19. b - f. n) Qui IANI DAMASCENI Decapolitani nomine ab ALB. TORINO et GERARDO IATRO editi sunt Therapeuticae methodi h. e. curandi artis L. VII. Basil. ex offic. Henr. Petri Mens. mart. 1543. in fol. pagg. 491. praemiss. pagg. 24. penitus sunt distinguendi, neque de vegetabilibus agunt, nisi in remediorum formulis, ubi vero simplicibus tantum nominibus indicantur. 2) SIMON IANVENSIS, seu GENVENSIS, itemque SIMON GENIATES, vel SIMON a CORDO dictus (quae nomina nonnulli absque sufficienti testimonio distinguunt) Genuae natus et sec. XIII. clarus fuit: vid. Merckl. p. 971. a. Maitt. annal. T. I. f. IV. p. 473. V. P. II. p. 246. Segu. p. 268. 304. Kestn. p. 71. 528. nota m. Joeh. T. I. p. 2094. II. p. 1843. IV. p. 599. 600. Opus eius, clavis sanationis inscriptum, iam a. 1474. Patavii per Petrum Maujer Normannum, in fol. prodidisse, testatur Segu. p. 268. a) Meum exemplar non aliud habet frontispicium, quam hanc ipsius tractationis inscriptionem: Incipit clavis sanationis elaborata per venerabilem virum, Magistrum SIMONEM IANVENSEM Domini Pape subdiaconum et capellanum medicum quondam felicitis recordationis Domini Nicolai Pape quarti qui fuit primus de ordine minorum. Ad calcem: Venetiis per Guilielmum de Tridino ex Monteferrato 1486. die 13. Nouembris fol. in columnis diuisis sine paginarum numeris foliis 98. b) Alteri hic praefixus est titulus: SIMONIS IANVENSIS opusculum, cui nomen clavis sanationis simplicia medicinalia latina greca et arabica ordine alphabetico mirifice elucidans recognitum ac mendis purgatum: et quotationibus Plinii maxime ac aliorum in marginibus ornatum: et quam diligentius ac correctius id fieri potuit impressum. Ad calcem: finis Simonis Ianuensis additis auctoritatibus Plinii locis propriis per GEORGIVM DE FERRARIIS de Varolengo montisferrati, artium et medicinae Doctorem. Impressum Venetiis per Gregorium de Gregoriis 1514. die 22. mensis Maii. fol. pagg. 65. auersis non numeratis. Inscriptio tractationis eadem est, ac prioris editionis, cuius frontispicium forte deficit. Est autem opus hoc nil aliud quam lexicon litterarum ordine non solum stirpium, verum etiam aliarum rerum, in scriptis medicis occurrentium nominum artisque terminorum tum per synonyma tum per breuem descriptionem expositio. Quousque differant vel conueniant synonyma SIMONIS GENVENSIS: impress. per Anton. Zarotum die Martis III. Augusti Mediolani 1473. in fol. (quae indicat Maitt. Annal. T. I. f. IV. p. 329.) iudicent alii. Ceterum conf. super. num. 1. a. et seq. num. 3. a. c. 3) MATTHAEVM SYLVATICVM medicum Mantuanum, (vid. Castell. p. 158. Merckl. p. 794. b. Tourn. Isag. p. 19. Segu. 303. Kestn. p. 58. Joeh. T. IV. p. 960.) sec. XIV. opus suum composuisse, testatur ipsa eius inscriptio: prodit autem a sine titulo hac tractationis inscriptione: LIBER. PANDECTARVM. MEDICINAE. OMNIA. MEDICINE SIMPLICIA. CONTINENS. QVEM. EX. OMNIBVS. ANTIQVORVM. LIBRIS. AGREGAVIT. EXIMIVS. ARTIVM. ET. MEDICINAE. DOCTOR. MATTHEVS. SYLVATICVS. AD. SERENISSIMVM. SICILIE. REGEM. ROBERTVM. Ad calcem: Opus pandectarum medicinae emendatum per eximium artium et medicinae doctorem dominum et magistrum MATTHEVM MORETVM brixianum Bononie in medicina et astronomia legentem. Et impressum per magistrum Iohannem Vurster de Kampidona 1474. fol. regal. charta firmis. et typo elegantiss. splendide excusum. in columnis diuisis sine pagin. numeris, sine litteris initialibus (vbique tamen eleganter vel rubro vel caeruleo pigmento adscriptis) et sine custode foliis 348., sequitur vnicum folium cum quibusdam addendis, et deinde MORETI praefatio atque index alphabeticus nominum latinorum fol. 5. quae forte bibliopegi errore post posita sunt. Praefatio indicat inter auctores, ex quibus conscriptum est hoc opus, etiam SIM. IANVENSEM, et addit: Huius autem auctoris nomen litteris sit ambiguum; ipsum tamen a fide dignis MATTHEVM SYLVATICVM nuncupatum fuisse accepti. Constat

stat autem capp. 720, quibus totidem vocabula explicantur obscura per aequae obscurum, uti *Kestn. p. 58. §. IV.* recte iam annotavit. Ceterum de hac et alia eodem anno Neapolis excusa editione vid. *Maitt. annal. T. I. p. 106. I. §. IV. p. 333.* ubi titulo: liber cibalis et medicinalis pandectarum MATTH. SYLVATICI, citatur, et conf. *id. T. V. P. II. p. 270.* b) Tituli loco solum exhibet nomen *Pandecte*, deinde sequitur index latinus cum eadem MORETI praefatione fol. 3. porro opus ipsum hac inscriptione: *Opus pandectarum, quod aggregavit eximius artium et medicine doctor MATHEVS SYLVATICVS ad sereniss. Sicilie regem Robertum, qui fuerunt anno mundi 6516. anno vero Chr. 1317. coeui PETRO DE ABANO, DINO DE GARBO, GENTILI, BONAVENTURE, FRANCISCO MAYRONI, et NICOLAO DE LYRA. pagg. 192. auersis non numer. ad calcem: Opus pandectarum medicine ordinatum secundum litteras alphabeti ita, ut facillime et quam primum reperiat, quicquid inest, per GEORGIVM DE FERRARIIS de monte ferato artium et medicine doctorem. Impressum Venetiis per Philippum Pinzium Mantuanum 1492. d. 16. Iunii, sumptibus et expensis Domini Bernardini Fontana. Sequuntur denique p. 193. additamenta. Haec editio capp. 702. constat in fol. ord. sine litt. initialibus. c) *Pandectae medicinae.* Opus *Pandectarum medicinae* clarissimi viri MATTHAEI SYLVATICI, tam aromatariis, quam medicis omnibus necessarium, nuperrime castigatius reditum, et non inuenustis characteribus in gratiam studiosorum excusum, ac plurimis celeberr. auctorum, inprimisque SIMONIS NB. GENVENSIS, adnotationibus decenter illustratum, nec non Variis capitibus simplicium medicinarum, quae in perquam multis codicibus non comperiuntur, adauctum: cum tractatu quoque declarante quantum ex solutivis laboriosis ingrediatur pro singula drachma pilularum et electuariorum solutiuorum. Tabula simplicium proxime sequentem paginam voluenti sese offert. Subiecta quoque est in fine operis tabula omnium capitum per elementorum alphabeti seriem digesta. Adiecta item fuere Adnotamenta pleraque studiosis lectoribus haud dubie profutura per eximium medicae facultatis Professore DOMINICVM MARTINVM DE SOSPITELLO, qui non pauca quae deprauata fuerant integritati suae non indiligenter restituit. Lugduni apud Hugonem a Porta, 1541. Ad calcem: Explicit opus *Pandectarum medicinae* MATTH. SYLVATICI SYMONISQUE NB. IANVENSIS cum tabula et additionibus ac dosi solutiuorum Magistri BAPTISTAE SARDI, ac insuper annotationibus capitulorum et autorum nuper additis per Dom. Magistrum DOMINICVM MARTINVM DE SOSPITELLO. Lugduni nunc demum exactissime per inclytum probumque virum Theobaldum Paganum chalcographum excusum 1541. d. 6. mensis Aprilis. fol. pagg. 172. auers. non numeratis, praemiss. pagg. 8. ind. pagg. 6. Haec editio constat capp. 716. quae sequuntur alia 36. quasdam stirpes omittas fusius describentia. 4) AVICENNA filius HALI, Persa, cuius integrum nomen est ABVALI (ABVHALI aut ABVVALI) ALHASEN (ELHVSEIN) EBENHALI, IBN ADALLA, IBNVSINA (IBNTSINA, ABENSINA aut EBENSINA) corrupte AVICENNA, vixit sec. XII. vel rectius sub finem sec. X. et initium XI. vid. *Castell. p. 136. Merckl. p. 98. a. Tourn. Isag. p. 17. Segu. p. 225. Joach. T. I. p. 647.* Huius auctoris primum opus vocatur Canon medicinae et constat V. libris, accedunt tres alii libri et sic dicta cantica. Ex his canonis libri II. tractatus secundus capitibus vel 758. vel 756. vel his 4. ex lectione hebraica additis exponit simplicia remedia, quae maximam partem sunt vegetabilia. Canonem, per GERHARDVM Carmonensem Hispanum latine versum, per Ioh. Hebert Paduae a. 1476. iam excusum esse, indicat *Maitt. T. I. §. IV. p. 360. Segu. p. 225.* Mea exemplaria sunt a) *Liber AVICENNA.* Sola haec verba continet tituli pagina: sequentibus libris singulis propriae suae praefixae sunt inscriptiones. Ad calcem: *Venetiis per Simonem Papiensem dictum Biuilaquam 1500. die XI. Nouembris, 4.* sine paginarum numeris constat foliis 625. Huius editionis canonis liber VI, est tractatus de vi cordis, reliqui nondum additi sunt. b) *Liber canonis totius medicine ab AVICENNA arabum doctissimo excussus a GERARDO Cremonensi ab arabica lingua in latinam reductus, et a PETRO ANTONIO RVSTICO Placentino in philosophia non mediocriter erudito ad limam ex omni parte ab erroribus et omni barbarie castigatus. Nec non a Dom. SYMPHORIANO CAMPERIO Lugdunensi secundis annotationibus terminisque arabicis et eorum expositionibus nuper illustratus: unacum eius Vita a Dom. FRANCISCO CALPHVRNIO non minus vere quam eleganter excerpta 1522.* Ad calcem: *Liber Avicenne Lugduni finem sortitus est optatum opera Iacobi Myi diligentissimi calcographi 1527. nouembris 4. pagg. 450. auers. non numeratis.* Haec editio distinguit librum de vi cordis a reliquis, instructa est indice et continet etiam cantica; sed reliqui tractatus adhuc desunt. Haec etiam et antecedens continet 758. simplicium capita. c) *AVICENNE liber canonis medicine. Cum Castigationibus ANDRAE BELLVNENSIS.* Ad calcem: *Venetiis in edibus Lucae Antonii Iunta Florentini mense iunio 1527. fol. maior. in column. diuisis pagg. 445. auers. non numeratis. praemiss. pagg. 8.* Ex PAVLI ALPAGI dedicatione et praefatione patet, eum hoc opus patris sui ANDR. BELLVNENSIS posthumum in lucem edidisse ubique secundum varia arabica exemplaria emendatum et auctum. Hac in editione simplicium capita sunt 756. et praeter tract. de viribus cordis (seu rectius de medicinis cordialibus) et cantica nil accessit. d) *AVICENNAE medicorum Arabum principis liber canonis, de medicinis cordialibus et cantica. Tam olim quidem a GERARDO CARMONENSI ex Arabico sermone in Latinum conuersa. Postea vero ab ANDR. ALPAGO Bellunensi, philosopho et medico egregio, infinitis pene correctionibus ad veterum exemplarium Arabicorum fidem in margine factis, locupletissimoque nominum Arabicorum ab ipso interpretatorum indice (hic priori editioni c. nondum additus est) decorata. Nunc autem demum a BENEDICTO RINIO Veneto, philosopho et medico eminentissimo, eruditissimis accuratissimisque lucubrationibus illustrata. Qui et castigationes ab ALPAGO factas, suis quasque locis aptissime inseruit: Et quam plurimas alias deprauatas lectiones in margine ingeniosissime emendauit. Et locos, in quibus autor ipse vel eandem sententiam, eandemue medicamenti vnius compositionem iterat, vel oppositas inter se sententias ponit, vel aliquid denique ab Hippocrate, Aristotele, Dioscoride, Galeno, Paulo, Aetio, Alexandro, Serapione, Rasi, Halyabate, Alfarabio mutuatur, diligentissime indicauit. Plurimis etiam Arabicis vocibus nunquam antea expositis, Latinum nomen inuenit: Indicemque latinum medicamentorum simplicium in secundum librum composuit. His accesserunt AVICENNAE libellus de remouendis nocumentis, quae accidunt in regimine sanitatis: Eiusdem tractatus de Syrupis acetoso.**

Ab eodem ALPAGO ex Arabico in Latinum sermonem translatus. Cum indice rerum ac verborum notatu dignorum copioso. Basileae per Ioannes Heruagios 1556. fol. maior. pagg. 204. Praemiss. et index pagg. 44. ad calcem arabicor. nominum interpretatio pagg. 27. et eorundem antiqua expositio pagg. 11. Haec editio omnes continet auctoris libros, et tractatus de simpl. medicinis capita 758. ubi nominibus arabicis maximam partem addita sunt latina. e) Huc etiam pertinet opus hoc titulo: *Hic merito inscribi potes vite liber corporalis ABOHALI ABYNSCENI Canonis libros quinque duplici fere per totum commento munitos nuperque translato: de viribus cordis. Ac Canticam eiusdem expositam. Aliae quamplura diligenti patefacienda lectori luculentissime apprehendit. Doctores circa textum positi ut locus suis apparebit hi sunt v. z. GENTILIS DE FVLGINEO. IACOBVS DE PARTIBVS. VGO SENENSIS. DINVS FLORENTINVS. MATTHEVS DE GRADIBVS. THADEVSque FLORENTINVS. fol. regali sine paginar. numeris. Sed hoc meum exemplar incompletum est. Primum Volumen, quod possideo, praefixam habet breuem editoris, HIER. SVRIANI, praefationem, comprehendit tantum primi canonis fen I. II. III. et constat foliis 290. locus et annus ad calcem non additus est. Maximam spatii partem occupant commentarii in columnis diuisis, quibus in distinctis areolis insertus est Avicennae textus. Alias editiones a recentioribus denuo emendatas et auctas praetereo. 5) PEDACIVS vel rectius PEDANIUS (a nobilissima Pedania prosapia) DIOSCORIDES, ab Anazerba Ciliciae ciuitate, postea Caesarea Augusta dicta, Anazerbeus nominatus, vir militaris et medicus, vixit secundum nonnullos 56. annis ante aeram christianam, potius vero secundum plurimos seculi primi priori dimidio Neronis et Vespasiani aetate. Opera eius non solum omnibus antea compositis (quot quidem eorum conseruata fuere) palmam praeripuerunt, verum etiam ad XVI. vsque seculum in scholis medicorum stirpium earumque virium docendarum normam suppeditarunt et litterarum barbarie superata omnium frequentissime emendata commentariisque illustrata comparuerunt, quorum vero defectus, tum quoad stirpium descriptionem tum quoad earum vsum, postea satis superque manifestarunt perspicaciores accuratioresque: vid. *Castell. p. 85. Merckl. p. 874. a. Tournes. Isagog. p. 6. Fabr. Bibl. Gr. L. IV. c. 3. p. 88. seqq. Segu. p. 51. Kestn. p. 525. §. 1. Ioech. T. II. p. 147.* Pertinent autem huc eius libri de materia medica, et quidem liber I. II. (exceptis primis 77. capitibus, quae de animalibus agunt) III. IV. et cap. I. libri V. Opus hoc primum latine produsse 1478. in fol. indicat *Maitt. T. V. p. 346.* sed nec loci nec interpretis nomine addito: an eadem editio? quam *Segu. ex Spic. Vet. Edit. p. 51.* hoc titulo indicat: DIOSCORIDIS Opera, latine, interprete et expositore PETRO Paduanensi. Colle, *Ioh. Alemannus, 1478.* in fol. Meum exemplar hunc prae se fert titulum: a) *Index librorum in presenti volumine contentorum. DYOSCORIDIS exactissimi indagatoris fidelissimique scriptoris virtutum simplicium medicinarum Liber CCCCCCXVI continens capitula: cum nonnullis additionibus PETRI Paduanensis in margine libri notatis. Eiusdem Dyoscoridis de naturis et virtutibus aquarum tractatus vnus. Ad calcem: explicit liber Dyoscoridis de natura simplicium quem Petrus paduanensis padue legendo correxit et exponendo que vtiliora sunt in lucem deduxit: impressus Lugduni per Gilbertum de villiers expensis honestissimi viri Barthol. trot 1512. die vero XXIV. mensis martii. in fol. minor. vel potius 4. maior. fol. 120. (i. e. pagg. 240.) tit. et index praemissus foliis 16. ad calcem index capitulor. fol. 3. Tituli paginae auersae appressa est praefatio ANTONII DE TOLEDO Lugdunensis, omnium medicinae Professorum (vt addit) minimuli, vnde recensiois loco pauca haec transcribere liceat: in qua (operum serie) Galienum, Plinium aliosue Dioscoride postea iores alegando: translatores non parum apocryzare, insipienti luce clarius elucescet. Volens igitur librum hunc omnibus peculiarem fieri — cum tersum: limpidum: ac mendis emendatum: calcographis imprimendum tradidi. Ceterum autem neque interpretis neque prioris editionis mentionem facit vllam. Quae postea horum operum versio cura HERMOLAI BARBARI non amplius barbara prodiit, primum excusa est hoc titulo: DIOSCORIDIS Anazarbei, de medicinali materia Libri V. latinitate primum donati ex versione HERM. BARBARI, cum corollariis eiusdem et cum notis IO. BAPT. EGNATII in folio sine temporis et loci mentione: vid. *Giornale de letterati d'Italia T. XXVIII. p. 197. n. 3.* Eandem indicat *Segu. p. 53. ex Eibl. Maz.* et addit: *foran Romae 1492.* sed corollariorum tantum titulum exhibet, totius vero operis aliam editionem *Venet. 1516. in fol.* (cuius et iam meminit diarium Ital. l. c.) adducit *p. 52. n. 3.* Mea collectio hanc corollar. editionem asseruat b) HERMOLAI BARBARI, Patricii Veneti et Aquileiensis Patriarchae in DIOSCORIDEM Corollariorum Libri V. Adiectus est Index eorum, quae hisce libris explicantur, quem post Dioscoridis indices consulto locauimus. *Coloniae ap. Io. Soterem 1530. mens. Febr. fol. pagg. 78. auers. non numeratis. conf. quae sequ. lit. k. l. adduntur.* Egnatii praefatio sine anno et die tituli paginae auersae adpressa docet, eum hoc opus post auctoris obitum in lucem edidisse. Pauca ex his excerpta reperiuntur apud Brunfelsium. vid. art. XVI. n. 7. c. Graecum exemplar primum excusum est hoc titulo c) ΠΕΔΑΚΙΟΥ ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥ ἀναζαρβέως περί ὕλης ἰατρικῆς λότοι ἐξ ἑπὶ περί ἰσθλῶν ἐν ᾧ καὶ περί λυσσῶν τοῦ κυνός σημείωσις τε τῶν ὑπ' αὐτῶν δεινυμένων καὶ θεραπεία. ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ τοῦ κολλοσωνίου ποιητοῦ θηριακά, μετὰ χορίων. Τοῦ αὐτοῦ Ἀλεξίφάρμακα. Ad calcem Nicandri alexiph. *Venetis apud Aldum mense Iulio 1499. fol. sine paginarum numeris Diosc. opera pagg. 268. Nicandri pagg. 76. scholia pagg. 20. Secunda Aldina editio prodit 1518. 4. (vid. Fabr. biblioth. Gr. L. IV. p. 96. Kestn. p. 94. not. o. Maitt. T. I. f. IV. p. 87. et p. 687. T. II. p. 313. ubi vero secundae forma in 8. indicatur) et tertia Cornarii cura vid. artic. XIV. n. 2. His addit *Merckl. p. 874. b.* aliam *Venet. apud Aldum 1506. in fol.* quam vero reliqui tacent. Nouam versionem, quam deinde RVELLIVS suscepit, primum produsse Parisiis apud Henr. Stephanum 1516. in fol. vid. *Tournes. Isagog. p. 22. seq. Maitt. T. II. p. 282. Segu. 52. Kestn. p. 94. nota r.* Meae editiones sunt d) PED. DIOSCORIDIS Anazarbei de medica materia libri sex, IOANNE RVELLIO Sueffionensi interprete, nunc primum ab ipso Ruellio recogniti et suo nitori restituti. Parisiis ap. Simon Colinaeum 1537. 8. pagg. 246. auers. non numeratis, praemiss. fol. 20. f. pagg. 40. ad calcem annexa folia totidem. e) Eodem titulo, his tamen mutatis et additis: postremum ab ipso Ruellio recogniti et suo nitori restituti. His accessit, praeter pharmacorum simplicium catalogum, copiosus omnium fere medelarum suae curationum index. *Basl. ap. Mich. Ising. 1542. 8. pagg. 479. praemiss. pagg. 43. annexa pagg. 144.* f) Eodem titulo, his additis: nunc primum studio cuiusdam viri doctissimi ad graecum exemplar recogniti:***

ac eadem opera in curiosorum gratiam vulgatis officinarum nominib. passim aspersis. Vnacum duplici indice, quorum primus quidem stirpium nomenclaturas Dioscoridi: alter Sepalsiariorum et Herbariis usitatas continet. Ad calcem: Lugduni excudebant Io. et Francisc. Frellonii fratres 1543, in 12. pagg. 617. praemiss. pagg. 32. annexa pagg. 46. g) Eodem titulo ac lit. e. (omissis tamen: postremum ab ipso Ruellio recogniti et suo nitori restituti) Lugduni ap. Io. Frellonium 1547. in 12. pagg. 543. tit. &c. pagg. 4. annexa pagg. 156. h) Eodem titulo eodemque paginarum numero ac lit. g. Lugd. ap. Io. Franc. de Gabiano 1554. in 12. Singulae hae editiones continent, praeter indices in rubro indicatos, alium hac inscriptione: *notha et Dioscoridi falso adscripta quae ut facile, si quis ita velit, suis singula locis applicentur, numeris notantur* &c. Editio lit. d. e. praeterea continet DIONYSII CORRONII praefationem, quae docet, Ruellio, dum primam adornauit editionem, vnicum tantum, idque corruptum et mutilum, exemplar ad manus fuisse, in hac vero (lit. d. e) eundem correxisse suam priorem interpretationem, hocque in labore, uti etiam in condenda stirpium historia, (vid. Cat. I. sub nomine Ruellii) vsum fuisse CORRONII auxilio, et ambos eo praecipue collaborasse, ut multa Dioscoridi falso adscripta sollicite distinguerent eaque sigillatim exhiberent. Paulo post noua sequuta est interpretatio MARCELLI VIRGILII, cuius primam editionem cum eius notis prodidisse Florentiae per haeredes Phil. Iuntae 1518., testatur Maitt. T. II. p. 313. ex hoc Segu. p. 52. Kestn. p. 95. nota s. Apud me asseruantur i) PED. DIOSCORIDAE Anazarbei: de medica materia: libri sex. A MARCELLO VIRGILIO Secretario Florentino latinitate donati: cum eiusdem commentationibus: nuper quam diligentissime ex secunda interpretis recognitione excusi. Accedit insuper in Dioscoridem index latine graecique excusus: alius praeterea in commentationes quam copiosissimus eorum, quae tum graece tum latine notatu digna visa sunt. Ad calcem - Florentiae per haered. Phil. Iuntae 1523. idib. Febr. fol. pag. 352. auers. non numeratis, praemiss. cum indicib. pagg. 20. k) ΠΕΔΑΚΙΟΥ ΔΙΑΣΚΟΡΙΔΟΥ Αναζαρβειος, περὶ ἑλάνης καὶ ἰατρικῆς βιβλία Ε. &c. PEDACII DIOSCORIDAE Anazarbei de medica materia L. V. de letalibus venenis eorumque praecautione et curatione. De cane rabido: deque notis, quae morsus ictusue animalium venenum relinquentium sequuntur: deque eorum curatione liber vnus. Interprete MARCELLO VERGILIO, Secr. Flor. Eiusd. Marc. Vergelii in hosce Dioscoridis libros commentarii doctissimi, in quibus praeter omnigenam variamque eruditionem, collatis aliorum interpretum versionibus, suae translationis ex utriusque linguae auctoribus certissima adferuntur documenta, morborum praeterea atque humani corporis vitiorum genus omne, quorum subinde meminit Dioscorides, diligentissime explicatur. Coloniae opera et impensa Io. Soteris 1529. fol. pagg. 753. praemiss. cum indicib. pagg. 20. Haec editio a praecedenti differt Graeco textu (sed cuius exemplaris, non indicatur) columnis diuisis addito et typographi dedicatione praefixa, ex qua patet, eum HERM. BARBARI corollaria (quae anno sequenti separatim edidit, vid. super. lit. b) in hac editione ob temporis angustiam omisisse. Praefatio eadem utriusque editionis monet, interpretem consuluisse non solum quinque exemplaria graeca varia, verum etiam plures in linguam latinam translationes, et inter has, praeter Ruellii et Barbari versiones, antiquissimam Longobardis litteris scriptam. Ex eadem satis etiam intelligitur, quam curam adhibuerit Vergilius, ut plusquam grammaticum interpretem agat. l) P. DIOSCORIDAE pharmacorum simplicium reiue medicae L. VIII. IO. RVELLIO interprete. Vnacum HERM. BARBARI Corollariis, et MARC. VERGILII in singula capita censuris siue annotationibus. Adiecto indice duplici singulorum simplicium et difficultum terminorum. Praeter alia multa, quae in praefatione indicantur, quaeque in prioribus aeditionibus desiderabantur. Argentor. ap. Io. Schottum 1529. fol. pagg. 362. auers. non numeratis, praemiss. pagg. 8. ind. pagg. 23. Titulus singularibus figuris et emblematis ornatus est. Praemissa continent praefationem OTTHON. BRVNfelsii, RVELLI ipsiusque DIOSCORIDIS. Prima docet, quantis conuitiis obnoxii fuerint, qui, relictis Arabibus et Barbaris, Graecorum auctorum opera in vsum communem edere coeperunt; deinde, cur Ruelli interpretationem elegerit, nempe quia purior, suauior atque familiarior ipsi videbatur; tandem, quam curam adhibuerit in adornanda hac editione, qua praecipue vtrumque commentarium, Barbari et Vergilii, relectis superfluis, emunctiorem luculentiorumque reddidit. m) DIOSCORIDIS libri octo Graece et Latine. Castigationes in eosdem libros. Parisiis impensis viduae Arnoldi Birckmanni 1549. Ad calcem: excudebat Benedictus Pre-vost mens. Aug. 1549. 8. pagg. 392. auers. non numeratis. Praemiss. cum indice vocabulorum Graeco et Latino pagg. 40. Ex typographi et FRANCISCI FONTANONI Monspeffulensis praefatione patet, huius editionis emendationem adornasse IACOBVM GOVPYLV. Graeco textui, ubi emendationes signo * notantur, in columnis diuisis addita est IO. RVELLII interpretatio a p. 1. ad 316. a. quibus comprehenduntur libri V; sequitur ap. 316. b. ad 352. b. Liber VI. VII. VIII. quorum interpretationi auctor non additur; deinde a p. 353. a. ad p. 382. a. quae inter Dioscoridis verba falso adscripta in quibusdam codicibus erant; denique a p. 382. b. ad 391. a. castigationes cum breui praefatione sine auctoris nomine. His annectuntur p. 391. b. et 392. a. pauca adhuc hac inscriptione: *quae sequuntur, ab ipso Ruellio ex veteri aliquo codice, quo ille usus erat, addita fuerunt prioribus codicibus, quae, cum Graeca eis respondentia non haberemus, in hunc locum reiecimus.* Praeter has latinas interpretationes et DANTZII germanicam (vid. art. XII. n. 1.) prostant etiam Italicae, ex quibus ad manus est n) DIOSCORIDE Anazarbeo della materia medicinale. Tradotto per M. MARCANTONIO MONTIGIANO da S. Ginignano Medico. In Lingua Fiorentina. In Firenze 1547. ad calcem: stampato in Fiorenza, appresso Bernardo di Giunti di Genao. 1546. in 8. pagg. 302. auers. non numeratis. ind. nom. italic. pagg. 14. o) SERAPIO secundum nonnullos iam sec. VIII. secundum alios XI. demum vixit: quidam inter vtrumque distinguunt et illum simpliciter SERAPIONEM Arabem, hunc vero IOANNEM filium SERAPIONIS nominant: vid. Castell. p. 75. Merckl. p. 681. b. Tournes. Isagog. p. 16. Segu. p. 268. Kestn. p. 127. §. 3. p. 355. §. 3. Joach. T. IV. p. 513. Operum eius prima editio a Maitt. T. I. f. IV. p. 404. indicatur hoc titulo: SERAPIONIS liber aggregatus de medicinis simplicibus; translatio SYMONIS IANNOENSIS, interprete ABRAAM Iudaeco Tortuosense, de Arabico in Latin. Completa sunt haec opera IO. filii SERAPIONIS; et impressa Kal. Aug. per Rynaldum de Nouimagio Venet. 1479. fol. conf. Segu. p. 268. ubi titulo paullulum mutato recensetur. In mea collectione prostant a) Practica IO. SERAPIONIS dicta Breuiarium. Liber SERAPIONIS

PIONIS de simplici medicina. Liber de simplici medicina dictus circa instans. Practica PLATEA
RIL. Ad calcem: *Impressum Venetiis mandato et expensis nobilis viri Domini Octauiani Scoti ciuis Modoe*
tienfis per Bonetum Locatellum Bergomensen 17. Kal. Ianuarias 1497. fol. pagg. 211. auers. non numera
tis. Tractatus I. inscribitur Breuiarium Ioannis filii Serapionis medici: ad calcem: et hunc librum transtu
lis Magister GERARDVS CREMONENSIS in collecto de Arabico in latinum. p. 2. — 86. cui accedunt p. 86.
b. 90. a. synonyma Serapionis. Sequitur p. 91. a. b. tabula seu index tractatus II. qui inscribitur liber Serapio
nis aggregatus in medicinis simplicibus secundum translationem SYMONIS IANVENSIS interprete ABRAAM in
deo tortuosienfi de arabico in latinum, p. 92. — 168. et quidem de simplicibus ex plantis p. 98. b. — 154. ex mineral.
et animal. p. 154. — 168. tertius tractatus inscribitur IO. PLATEARII Salernitani medici excellentissimi practica
breuis p. 169-185. quartus denique est liber de simplici medicina secundum Platearium dictus circa instans p. 186-
211. b) Eodem titulo. Ad calcem: Impressum Venetiis mandato et expensis nobilis viri Domini Andr. Tore
sani de Asula per Bernardinum Vercellensem 29. Kal. Nouemb. 1503. fol. Haec editio ad priorem recusa
tantum est, paginis etiam illi respondet. c) Practica IO. SERAP. Necessarium ac perutile opus totius medi
cine Practice, profundissimi ac antiquissimi Arabis Domini IOANNIS filii SERAPIONIS, in quo non solum ha
betur Breuiarium totam practicam sub breuitate continens, verum etiam librum copiosum de simplici medi
cina, diligenti ac nouo examine correctum, pulchrisque ac vtilibus annotationibus exornatum, unacum pluri
mis huc spectantibus nouissime additis. Practica etiam breuis Dni IO. PLATEARII Salernitani vtilissima
1530. ad calcem: Impressum Venetiis mandato et expensis heredum quondam nobilis viri domini Octauiani
Scoti ciuis Modoe tienfis, ac sociorum. 1530. die XXVII. Februarii fol. Et haec editio, nonnisi recusa,
contentis et paginis prioribus respondet. d) In hoc volumine continentur insignium medicorum IOAN. SERA
PIONIS Arabis de simplicibus medicinis opus praeclarum et ingens. AVERROIS Arabis de iisdem liber
eximius. RASIS filii ZACHARIAE de iisdem opusculum perutile. Incerti item auctoris de centaureo libellus
hactenus GALENO inscriptus. Dictionum Arabicarum iuxta atque latinarum index valde necessarius. In
quorum emendata excusione, ne quid omnino desideraretur, OTTHONIS BRUNFELSII singulari fide et diligen
tia cautum est. Ad calcem: Argentorati excudebat Georg. Vricher Andlanus 1531. mense Septembri.
fol. pagg. 399. praemiss. et ind. vocabulor. arabic. latinorumque pagg. 20. Serap. p. 1. — 308. de centaureo p.
309. — 312. Auer. p. 313. — 372. Rasis p. 373. — 399. Brunfelsii praefatio explicat, quare Arabes et Barbari
non penitus negligendi sint. e) IO. SERAPIONIS de simplicium medicamentorum historia libri septem. Ex
Arabum, ac Graecorum, praesertim Pauli Aeginetae, Dioscoridis et Galeni commentarius quam accuratissime ex
cerpti. Interprete NICOLAO MUTONO Medico Mediolanensi. Accesserunt insuper Nomenclationum
omnium, quae hisce de simplicium medicamentorum Historia commentariis continentur, multiplices sane ac co
piosi indices, Arabibus nimirum, Graecis, Latinis, Barbaris, Officinis, Italis, Gallis, Germanis ac Hispanis (eor
um inscripti. Venetiis apud Andream Arriuabenium 1552. fol. pagg. 167. auers. non numeratis. Prae
miss. cum indicib. pagg. 48. Hoc opus plane aliud est a Mutono potius conscriptum; neque etiam noua
proprie interpretatio est (liquidem in dedicatione auctor se ipsum Mauritaniae linguae prorsus rudem ac
expertem proficitur) sed ex sola autorum et locorum collatione deriuata. 7) IACOBI de DONDIS, qui et
Aggregator Patauinus cognominatur, liber aggregationis in medicina, alicubi in Italia, vt videtur, impres
sus in folio magno, chartis 142. recensetur a Gesnero biblioth. p. 352. b. estque procul dubio idem, qui titulo
promptuarii medicinae Venet. 1481. aliaque eius editio ibid. ap. Iuntas 1576. in fol. indicatur a Merckl. p.
480. b. vbi integer titulus reperitur, conf. Segu. p. 245. Kestn. p. 71. §. XVIII. Ioeh. T. II. p. 181. et titulo
promptuarii sanitatis repetitur, a Kestn. p. 527. §. 2. Exemplar, quod ego possideo, in columnis diuisis
charta regia excusum, titulo, loco et anno, itemque paginarum numeris, custode et litteris initialibus caret
chartisque 284. constat, est sine dubio idem, quod in Biblioth. Riun. p. 497. no. 5678. indicatur hoc titulo:
IAC. de DONDIS Aggregator Paduanus de medicinis simplicibus, editio antiquissima sine mentione loci
et anni fol. reg. In meo exemplari hoc auctoris nomen equidem nondum inuenire potui. Incipit absque
vlla inscriptione a praefatione pag. 1. a. vbi haec leguntur: et quia opus hoc ex pluribus autoribus aggrega
tur, liber aggregationis nomen acquirat, quibus verbis tituli quasi loco subiiciuntur haec: Aggregator Pa
duanus de medicinis simplicibus; finitur autem haec praefatio his verbis: Opus quidem hoc longis retro
temporibus inchoatum completum est per me artium et medicine Doctorem Magistrum IACOBVM PADVA
NVM a. Domini 1385. ex quo simul patet, perperam eius obitum a. 1385. vel saltem 1350. aut 1330. apud
Merckl. Segu. et Ioeh. annotari. Praefationem sequuntur rubricae tractatum et singulorum horum capi
tum a p. 1. b. ad pag. 8. a. vbi in fine columnae 1. incipit tractatus primus, quorum sunt decem: priores nouem me
dicamenta recensent nudis nominibus secundum vires suas ita, vt omnino, quemadmodum Kestn. l. c. iam mo
nuit, auctor magis de indicandis simplicium virtutibus, quam de ipsarum indole et natura describenda atque
elucidanda sollicitus fuerit. Hoc vero peculiare habet, quod auctores, qui hanc vel illam cuiusvis remedii virtu
tem praedicarunt, vbique sigillatim nominat. Decimus tractatus a p. 268. a. ad 278. b. col. 1. catalogum
omnium simplicium et deinde vsque ad finem compositarum medicinarum litterarum ordine indicat. Apud
CONR. GESNERVM de chirurgiae scriptoribus Tig. 1555. in fol. p. 359. — 391. vt et apud PETR. VFFEN
BACHIVM in thesauro chirurgiae Francof. 1610. fol. p. 1019. — 1062. reperitur IACOBI DONDI Patauini
medici et philosophi praecleari, quem Aggregatorem cognominant, enumeratio remediorum simplicium et
compositorum ad affectus omnes qui a chirurgo curantur, ex vetustissimis et optimis quibusque authoribus;
quae vero est idem tractatus, qui in meo exemplari a p. 227. b. ad p. 231. a. continetur et inscribitur: tra
ctatus septimus de dispositionibus parti chirurgie pertinentibus. Haec omnia cum recensione huius operis Ges
neri supra citata collata, nullum relinquunt dubium, meum exemplar esse idem opus, quod alii promptuarii titu
lo indicant. Denique silentio praeterire haud possum, huius auctoris nomine a Segu. l. c. indicari Herbola
rio volgare, nei quale si dimostra a conoscer le herbe e le sue virtu, del latino in volgar tradotto. In Vine
gia per Francisco Bindone, e Mapheo Pasini 1536. in 8. et cum iconibus aeri incis. Ibid. Giovanni Pa
lamide

lamide 1540. in 8. quibus additur: *in hac editione desunt plantarum descriptiones XIX. quae in prima reperiuntur*; quot autem haec contineat, non indicatur. Notandae namque sunt figurae eo tempore iam aeri incisae, et deinde, quum iam a. 1485. et 1486. Pataviae latino sermone impressus sit *aggregator practicus de simplicibus* (vid. Artic. III.), quaeritur, num inter se conueniant, quo in casu hic liber ad Dondum certe non pertinet. 8) RHASIS, RASIS, RAZIS, RAZY, ALRASI et ARRASI a Rai Persiae ciuitate ita dictus, alias ABVBECHER, ABVCHARE, ALBVBECHAR, ALVBETER, ABETER (quae nomina nonnisi ob linguam Arabicam male intellectam vel varie pronunciatam differunt) filius RASI filii ZACHARIAE nominatus, vixit sec. X. vel XI. vid. *Castell. p. 142. Merckl. p. 3. b. Segu. p. 295. Kest. p. 128. Ioeh. T. I. p. 40.* Huius A. operis primam editionem indicat Maith. T. I. f. IV. p. 451. hoc titulo: ABVBETVR RHASIS Mahometani medici libri *correcti per HIERONYMVM SVRIANVM medicum Vol. 2. Brix. 1483. fol.* Meae editiones sunt a) *Continens RASIS ordinatus et correctus per clarissimum artium et medicine doctorem magistrum HIERONYMVM SVRIANVM: nunc in Camaldulensi ordine Deo dicatum. Vltimo impressus.* Diuinitum est hoc opus in 3. vol. quorum I. constat foliis 298. et continet libros XXVI. Praemiss. foliis 8. ind. fol. 1. Vol. II. inscribitur *Secunda pars continentis Rasis* et comprehendit a folio 299. ad 512. libros a XXVII. ad XXXVI. Vol. III. peculiari titulo caret, constat foliis 100. sigillatim numeratis. Ad calcem: *impressum Venetiis per Bernardinum Benalium 1509. 5 kal. Aprilis. folio regali chartis firmis et elegantissimis.* Prostant vero etiam exemplaria charta paullo minori excusa, cuius Vol. I. possideo separatim a reliquis. Vltimum volumen hanc praefixam habet inscriptionem: *incipit liber vltimus praefati continentis Rasis: et continet tractatus quatuor, quorum primus est de simplicibus: et continet capitula 766. tractat. 2: constat capit 764., tractat. 3. capit. 118. qui vt et 4. et vlt. agunt pariter de simplicibus et sunt priorum expositiones.* Ad calcem porro docetur, editum esse hoc opus per PAVLVM SVRIANVM, qui, antequam monachus fieret, erat HIERONIMVS SVRIANVS, physicus, Domini Magistri IACOBI SVRIANI de Ariminio physici quondam filius. Annektitur porro catalogus operum, quae antea ab eodem Hieronymo in lucem edita sunt. Opuscula huius auctoris varia cum aliis aliorum auctorum iunctim per Bonetum Locatellum 1497. in folio edita, non agunt de simplicibus, si excipias tractatum de synonymis, qui est quartus libri vltimi editionis anni 1509. Neque etiam eiusdem auctoris opera exquisitiora Basileae in officina Henr. Petri 1544. in fol. excusa huc pertinentia continent. Tractatum de simplicibus sigillatim editum vid. super num. 6. d. 8) TYRTAMVS, Aristotelis discipulus et ab hoc propter eloquentiam primum EVRASTVS deinde vero THEOPHRASTVS vocatus, alias a patria, Ereso insulae Lesbi ciuitate, ERESIVS cognominatus, vixit ante Chr. natum annis 310. vid. *Castell. p. 27. Merckl. p. 1001. a. Tournes. Isag. p. 4. Fabric. Bibl. Graec. L. III. c. XI. p. 234. sequ. Kestn. p. 525. f. 1. Segu. p. 191. Ioeh. T. IV. p. 1123.* Operum eius conseruatorum et deperditorum prolixa recensio reperitur apud Fabricium; eorum vero, quae ad botanicam pertinent, apud Tournesfortium I. c. Primam eius operum editionem indicat Maith. T. I. f. IV. p. 441. hoc titulo: THEOPHRAST. *de plantis latine, THEODORO GAZA interprete, Tarvisi per Barthol. Confalonierum de Saladio 20. Febr. 1483. fol.* Apud me asseruantur a) THEOPHRASTI *de suffruticibus, herbisque ac frugibus libri quatuor, THEODORO GAZA interprete.* Ad calcem: *Argentor. per Henr. Sybold mense August. 8. sine anno (meo exemplari manu adscriptus est a. 1528.) et sine paginar. numeris, foliis 96.* Praefatio HENR. SYBOLDI, artis medicae professoris, indicat, se auctorem fuisse, vt hi quatuor libri ex Theophrasti operibus separatim excuderentur. b) THEOPHRASTI *de historia et causis plantarum libri quindecim THEOD. GAZA interprete.* Eiusdem *Tabulas duas capita librorum complectentes: quarum vnam libris de historia, alteram de causis plantarum, vnacum vocabulis quibusdam Graecorum et Latinorum nominum, praefixas inuenies lector.* THEOD. GAZA interprete. *Vaenit Parisiis, apud Christian. Wechel 1529. ad calcem: excusum Lutetiae in aedibus Chr. Wechel idibus Nouembris 1529. 8. Libri priores pagg. 343. praemiss. pag. 30. ind. pagg. 22. reliqui 6. libri pagg. 354. praemiss. pagg. 18. ind. pag. 23.* Huic editioni praefixa est interpretis dedicatio ad Nicolaum V. Pontificem max. cuius iussu hanc versionem suscepit, vt et praefatio, in qua docet translationis difficultatem et conqueritur de textu graeco, (cuius vnum tantum exemplar nactus est) mendoso et temporis iniuria deprauato. c) THEOPHRASTI *de historia plantarum Libri VIII. et decimi principium. De causis sive generatione plantarum libri VI. TH. GAZA interprete.* Cum eorum omnium, quae his Theophrasti libris continentur, indice. Ad calc. Basileae apud Andr. Cratandrum mense martio 1534. fol. pagg. 264. tit. et index praemissus pagg. 28. Differt haec editio ab antecedente b. solo indice addito et omisiss tabulis capitum. d) *Iisdem ferme tituli verbis cum hoc additamento: quantum diligentiae huic editioni IOANNES IORDANVS medicus doctissimus adhibuerit in restituendis, quae corrupta erant ex Graeco, docebit te siquens epistola ad lectorem.* Lugduni apud Theobaldum Paganum 1552. 8. pagg. 399. praemiss. pagg. 56. ind. vocab. pagg. 14. Huic editioni accessit praefatio IORDANI Cal. April 1550. scripta, qua indicat, se ex collatione meliorum exemplarium, praecipue Graeci in Germania typis excusi (procul dubio illius, de quo mox lit. f.) textus emendationem suscepisse, aliqua etiam nomina latina mutasse. e) *Eodem titulo Lugduni ap. Guil. Rouillium 1552. 8. a praecedenti editione non differt, nisi noua tituli plagula: utrique etiam ad calcem adpressum est: Lugduni excudebat Nic. Bacquenoius 1552.* Ceterum adhuc monendum, editionem c. d. prodiisse vnacum ARISTOTELIS *de historia animalium L. IX. de partibus animalium et earum causis L. iij. de generatione animalium L. V. eodem GAZA interprete, vt et de communi animalium gressu L. i. de communi anim. motu L. I. PETRO ALCIONIO interprete, quibus in edit. c. tituli communis forma praefixa est haec praefatio: Andr. Cratander lectori S. En tibi candide lector ARISTOTELIS et THEOPHRASTI historias, quibus cuncta fere quae D. O. M. homini contemplanda et usurpanda exhibuit, ad amussim complectuntur: creaturas inquam omnes et sensu praeditas, quae animalia dicuntur, et sensus expertes, quas appellant plantas &c. &c. multo quam ante hac diligentius emendatiusque &c. Basileae 1534. fol.* Prior pars pagg. 320. tit. et ind. pag. 40. ad calc. vocabula latina et graeca ex libris Aristot. pagg. 9. Editio vero d. hoc peculiari titulo instructa est: ARISTOTELIS et THEOPHRASTI *historiae, cum de natura animalium, tum de plantis et earum causis, cuncta fere, quae Deus opt. max. homini contemplanda exhibuit, ad amussim complectentes: nunciam suo restituae nitore et mendis omnibus, quoad fieri potuit, repurgatae. Cum indice*

indice copiosissimo : ex quo superfluum quod erat, decerpimus : quod vero necessarium nobis visum est, super addidimus. Lugd. ap. Theob. Paganum 1552. 8. pagg. 495. tit. praef. (quae est eadem, quam Cratander tituli loco posuit, cum eius nomine praefixo) pagg. 4. ind. pagg. 76. ad calc. voc. lat. et graec. etc. pagg. 15. THEODORVS Graecus de Gaza seu Gazinus, in ciuitate Thessalonica natus et sacerdos citatur a Ioech. T. IV. p. 1105. medicus vero nominatur a Iordano in praef. edit. lit. d., elegantiae latini sermonis quam herbarum peritior videtur Tournefortio Ifag. p. 4. conf. p. 21. Graecum Theophrasti de plantis earumque causis exemplar primum excusum esse Venetiis sine anno, ex Biblioth. Maz. indicat Segu. p. 191. ibid. apud Aldum Manutium 1479. fol. Mercklin. p. 1001. b. ibidemque 1495. in fol. et 1497. Maitt. T. I. f. IV. p. 79. 634. nec non 1498. Fabric. Bibl. Gr. L. III. c. 9. p. 236. et Kestn. p. 91. nota c. Meum exemplar est f) ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ Του Πλάτωνος μὲν πρώτον, ἅτα δὲ Ἀριστοτέλους μαθητοῦ καὶ διαδόχου, τὰ μεχρὶ οὗν σωζόμενα ἅπαντα. THEOPHRASTI primum quidem Platonis, mox Aristotelis quoque discipuli et in Philosophiae professione successoris, omnium vero philosophorum, M. Tullii quoque testimonio, elegantissimi atque eruditissimi, Opera, quae quidem a tot saeculis adhuc restant, omnia: summo studio partim hinc inde conquisita, atque in unum veluti corpus nunc primum redacta: partim a multis, quibus etiam haecenus scatebant mendis, doctorum virorum industria ac meliorum exemplarium ope repurgata. Eorum tum praestantiam, tum singulorum rationem ac ordinem, ex praefatione et subiecto eidem catalogo abunde cognoscet. Basileae. Ad calc. typis Io. Oporini 1541. fol. pagg. 291. praemiss. pagg. 7. quae continent titulum, praefationem et librorum catalogum, quo indicantur: Theophrasti vita secundum Diogenem. De plantarum historia L. X. de plantarum causis L. VI. Aristotelis de plantis L. II. Theophr. de lapidibus L. I. De piscibus L. I. De igne L. I. De Ventis L. I. De signis aquarum et ventorum L. I. De vertigine oculorum L. I. De laboribus L. I. De odoribus L. I. De sudoribus L. I. Characteres morales siue de notis L. I. Metaphysicorum L. I. PRISCIANI philosophi Lydi expositio Theophrasti de sensu. Eiusdem expositio Theophrasti de phantasia. Totum opus graece excusum est et praefatio latina HIER. GEMVSAEI nihil ad commendationem huius editionis indicat, quod non ex contentorum catalogo patet. Prostat haec eadem editio etiam cum praefatione IOACH. CAMERARII, vid. Fabric. l. c. g) ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ περὶ Φυτῶν ἰστορίαν, καὶ περὶ Φυτῶν αἰσθησέων, καὶ τινὰ ἄλλα αὐτοῦ βιβλία περιέχων τόμος VI. THEOPHRASTI historiam de plantis, et de causis plantarum, et quosdam alios ipsius libros continens tomus VI. Ad calcem: Venetiis apud Aldi filios. Expensis vero Nobilis viri Dom. Federici de Turrifanis eorum auunculi 1552. 8. p. 652. praemiss. cum vita Theophr. pagg. 14. Ex breui Turrifani praefatione constat, hunc tomum operibus Aristotelis vltimo additum esse, et ex contentis indicatis patet, eum eadem ac editio f. continere, si excipias Aristotelis libros de plantis, Theophr. librum de laboribus et de phantasia, quae hic omissa sunt, et PHILONIS de mundo L. I. qui hic accessit. Optimam hanc esse editionem monet Kest. p. 91. not. c. 9) BARTHOLOMAEVS ANGLICVS, seu secundum alios BARTHOLOMAEVS GLANVIL vel GLANVYLE, Anglus, ex prosapia Comitum Suffolciensium Angliae, ordinis Minorum, floruit circa medium seculi XIV. vid. Segu. p. 257. Ioech. T. II. p. 1015. Opus eius de rerum proprietatibus ex libris veterum (quod auctor ipse in praefatione fatetur) sed sine iudicio et sine eruditione collectum stiloque barbaro expositum esse, monuit iam Gesner. in Catal. saepius cit. Illud nihilominus in pretio fuisse, affirmat non solum idem ibid. et Biblioth. p. 131. b: verum etiam testantur id repetitae editiones, quarum Maitt. T. V. p. 112. tredecim latinas (inter quas prima Coloniae per Io. Koelhoff de Lubeck 1470. conf. T. I. f. IV. p. 296.) tres Batauas, tres Gallicas et vnam Anglicam, omnes in folio, indicat, et quibus addendae sunt ex Segu. l. c. vna alia adhuc latina vnaque Anglica pariter in fol. et ex Merckl. p. 113. a. alia a. 1601. demum Francofurti in 8. recusa, cui librum 19. accessisse monet, quum tamen omnium tituli iique, quibus ipse 18. tantum adscribit, testantibus aliis, libros 19. indicent. Ex his de stirpibus agere librum 12. addit Segu. l. c.; sed illius, editionis a. 1488. quam Gesn. biblioth. l. c. recenset, vt et illarum, quas ego possideo, liber 17. inscribitur de arboribus et herbis et earum proprietatibus, et constat capp. 197. a) Liber de proprietatibus rerum BARTHOLOMEI ANGLICI. Ad calcem: Impressus Argentine 1485. finitus in die S. Valentini fol. sine biblioplae aut typographi nomine et paginar. numeris, chart. 299. b) Venerandi patris BARTHOLOMEI ANGLICI, ordinis minorum: viri eruditissimi: opus: de rerum proprietatibus inscriptum: ad communem studiosorum utilitatem iam denuo: summa cura: labore: ac industria recognitum: chalcographieque demandatum: atque adfabre politum. Ad calcem: Opus de proprietatibus rerum: editum a patre Barthol. Anglico ordinis fratrum minorum: studiosissime reuissum, correctum et emendatum: ac per Frideric Peypus civem Nurembergensem. impressum: expensis prouidi viri Ioannis Koberger eiusdem ciuitatis incole feliciter explicit. 1519. Id. III. Maitt. fol. sine paginar. numeris, chart. 192. 10) CLAVDIVS GALENVS, Pergami in Asia minori natus, et sec. II. Athenis, Alexandriae et Romae medicus clarissimus vid. Castell. p. 113. Merckl. 183. b. Fabr. Bibl. Gr. L. IV. c. 17. p. 510. Tournef. Ifag. p. 11. Segu. p. 255. Ioech. T. II. p. 832.) immo medicorum principis titulo per plura secula condecoratus, multos variosque composuit tractatus, quorum plurimi (circiter 170.) pedetentim typis exscripti et tandem in aliquot volumina collecti sunt, sed totidem ferme (circiter 140.) inter deperditos recensentur, quorum omnium amplissimum et stupendo labore conquisitum catalogum exhibuit Fabricius l. c. p. 528. sequ. sollicite simul notatis illis, quorum latina tantum interpretatio prostat ut et quae pro supposititiis et spuris habentur. Ex his huc praecipue pertinent de simplicium medicamentorum facultatibus Libri XI. ex quibus liber VI. VII. et VIII. de plantis litterarum ordine agunt, sed secundum monitum Gesneri supra §. XV. iam allegatum ea ratione, vt illarum cognitio exinde nullum plane augmentum ceperit. His ita omnino se habentibus, facilis coniectura est de reliquis libris, similis argumenti, scilicet de euphoristis, de compositione medicamentorum secundum genera itemque per singula loca, vbi etiam simplicium vegetabilium frequens fit mentio, nec non de simplicibus medicamentis ad Paternianum et de plantis sigillatim, qui duo vltimi libri praeterea spuris accensentur, (conf. Merckl. p. 197. b. Segu. p. 256.) quos ergo omnes, exceptis primo loco indicatis, breuitatis studio praetereo. Omnia GALENI opera Latine Venetiis per Philipp. Pincium de Caneto iam 1490. in fol. edita esse, ex Orlando Orig. del Stamp indicat Segu. p. 255. quod fidem superat; Maittaire vero T. V. p. 416. hanc editionem ad quaedam tantum restrinxit. Num illa citatos libros de simpl. medic. facult. iam contineant, me latet: sufficiat indicasse, in quibus editio-

editionibus, quas ego possideo, et quo earum loco reperiantur. a) Rarissimae et paucis visae editionis, cuius *Kestn. p. 99. nota n.* meminit, secundum tantum volumen possideo, cuius titulum pauca haec verba constituunt: *Pars secunda operum GALENI. Impressione secunda.* Sequitur statim auersa pagina *liber quomodo oportet redarguere simulantes egritudinem*; ad calcem libri de *dinamidiis* leguntur haec: *Explicit liber G. de Dinamidiis: correctus atque emendatus per excellentissimum artium ac medicine doctorem dominum magistrum HIERONYMUM SVRIANVM Clarissimi quondam physici domini magistri IACOBI SVRIANI de ARIO omnium etate sua primarii filium. Venetiis per Bernardinum Benalium ciuem Bergomensem impressus: ducante serenissimo Principe Leonardo Lauretano 1502.* Excipit hunc liber de incantatione: adiuratione: et colli suspensione: Galieno adscriptus, et tandem *Tabula secunde partis operum Galieni secunda impressione continentis opera 37.* In fol. reg. column. diuiliis cum litteris custodis et initialibus paruis, sed sine paginarum numeris, chartis 316. Libros huc pertinentes non continet hocce volumen. b) *Primum GALENI Volumen.* *Quarta impressio ornatissima: continens omnes GALENI libros alias impressos: melius quam prius ordinatos: et magis quam antea emendatos.* Emittensque alios eiusdem libros nunquam cum aliis impressos: impressione tamen dignos, doctrinam ipsius decorantes atque perfectientes: in tertio volumine nouiter imprimendo contentos. Ad calcem: *Habes humanissime lector hoc primum volumen operum Galeni artium ac medicinae Doc. perfulgentissimi, quam plurimis erroribus emendatum: ac omni fere menda, (ut humanitus fieri potuit) purgatum: Papiasque summo cum studio elaboratum per Iacob. Paucidrapium de Burgo franco 1515. pridie calend. Oct. fol. reg. pagg. 226. auers. non numerat. praemiss. chart. 9. cum praefat. RVSTICI PLACENTINI, qui curam huius editionis habuit.* Secundum volumen eodem titulo. Ad calc. editor, locus, annus idem, Idibus Octobris, chartis 296. Index libror. et contentor. chart. 10. Hic tomus continet libros de virtute simplicis medicinae et quidem a p. 121. b. — ad 136. b. tres libros huc pertinentes, nempe sextum hac inscriptione peculiari: *Liber VI. de virtute medicinar. simpl. translatione HVMAIN filii YSAAC, continens cap. 144. sequitur L. VII. capp. 119. et VIII. capp. 179.* Tertium volumen eodem titulo sub finem tamen ita mutato: *in hoc tertio volumine aureo superrime impresso contentos: ad calcem: Habetis sacre philosophiae ac medicine cultores candidissimi in hoc tertio praeclaro volumine diuersa collectanea oper. Galeni medicorum monarche, variis versionibus dilucidata exactissimaque cura per solertem virum Iacob. Paucidrapensem: de Burgo franco: Papias absoluta 1516. pridie idus Iun. chart. 188. accedunt adhuc aliquot libri chart. 13. Et huic et antecedenti volumini praefixa est peculiaris RVSTICI PLACENTINI artium et medicinae cultoris lectorisque praefatio. Huius editionis nullus auctorum hactenus citatorum mentionem facit.* c) A. 1525. prima prodiit exemplaris Graeci editio Venetiis apud Aldum et Andr. Assulanum in fol. V. volum. (*vid. Merckl. p. 184. a. Fabr. l. c. p. 558. Maitt. T. II. p. 663. Cat. Bibl. Lugd. Bat. p. 136. b. et ex hoc Segu. p. 255. Kestn. p. 99. f. X. Ioech. T. II. p. 832. a. 1500. procul dubio typographico vitio*) altera vero melior et emendatior ab omnibus tamen mendis nondum purgata post tredecim annos, quae haec est: ΓΑΛΗΝΟΥ ἅπαντα. GALENI Pergameni summi semper viri, quique primus artem medicinae vniuersam, apud priores homines obscuram et veluti errantem, in perspicuam quandam et propriam expositionem traduxit, opera omnia, ad fidem complurium et perquam vetustorum exemplariorum ita emendata atque restituta, ut nunc primum nata atque in lucem aedita videri possint Basil. 1538. ad calcem: ἐτυπώθη ἐν βασιλείᾳ τῆς γερμανίας παρ' Ἀνδρέᾳ τῷ Κρατάνδρῳ, ἔπει ἀπὸ τῆς θεωρονίας ἀφ' ἧς. fol. pagg. 567. praemiss. HIER. GEMVSAEI praefatio cum tit. plag. pagg. 16. *Pars secunda ibid. a. eod. ad calc. ἐτυπώθη ἐν βασιλείᾳ ἐπιμελείᾳ καὶ πόνῳ Ἰωάννου Βεβελίου ἀφ' ἧς. pagg. 491.* Huic tomo, qui primo loco continet de temperatura medicaminum simplicium libros XI. et a p. 67. ad 115. librum VI. VII. et VIII., praefixa est praefatio LEON. FVCHSII. In hac editione capita numeris non distinguuntur; numerantur autem in L. VI. §§. 175. VII. 125. VIII. 183. *Pars tertia ibid. anno eodem sine subscriptione ad calcem pagg. 487.* Praemiss. cum typographi praefatione pagg. 5. *Pars quarta ibid. a. eod. ad calcem: Basileae apud Io. Heruagium et Io. Erasmi. Frobenium 1538. pagg. 480.* Post tit. sequitur praef. IOACH. CAMERARII pagg. 2. et ΙΗΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ὁρκος. *Pars quinta ibid. a. eod. ad calcem: οὗτος ὁ πέμπτος τόμος μετὰ πρώτου καὶ δευτέρου, ἐτυπώθη ἐν βασιλείᾳ πόνῳ καὶ δεξιότητι καὶ ἐπιμελείᾳ Μιχαὴλ Ἰσιγγρινίου, ἀναλάματι δὲ Ἀνδρέου Κρατάνδρου καὶ Ἰωάννου Βεβελίου, ἔπει τῷ ἀπὸ τῆς ἐνστέκου οἰκονομίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, χιλιοσῶ πεντακοσιοσῶ τριακοσῶ ὀγδὼν, ὑπέμνη ἑλαφοβηλιδῶντος ἱσαμένου. pagg. 719.* Quibus accedit ad p. 737. liber de ossibus latine cum caluariae partis inferioris et sceleti ab anteriori et posteriori facie imaginibus. Tit. et noua GEMVSAEI praefatio pagg. 8. d) CLAVDII GALENI Pergameni, medicorum omnium fere principis Opera, nunc demum a clarissimis iuxta et eruditis viris latinitate donata, iam vero ordine iusto, et studio exquisitiore in lucem recens edita &c. Basil. 1529. ad calc. Basil. per Andr. Cratandrum mense Martio 1529. fol. pagg. 553. auers. non numeratis, praemiss. cum indice chart. 32. Tituli pagina auersa indicat 27. tractatus hoc vol. contentos eorumque interpretes, et ANDR. LEENNII praefatio III. cal. Martias 1529. scripta docet, eum huius editionis curam gessisse, pro hoc volumine autem elegisse non omnia huius auctoris opera, sed ea tantum, quae per viros clarissimos latinitate donata sunt et quidem selectiora. Sequebantur autem partitis vicibus plura in eadem officina excusa, nempe a) de compositione medicament. κατὰ γένν Lib. VII. per IO. GVINTHER. Andern. iam primum latinitate donati &c. 1730. chart. 101. praemiss. 4. b) Opera iam recens versa &c. 1531. ch. 172. praem. 6. γ) historiales campi per D. SYMPHORIANVM CAMPEGIVM &c. eiusd. CAMPEGII clysteriorum camporum libellus &c. eiusd. de phlebotomia L. II. 1532. ch. 77. praem. 4. δ) de usu partium corporis humani L. XVII. magna cura ad exempl. graeci veritatem castigati NIC. REGIO Calab. interprete cum 7. aliis tractatibus in titulo indicatis, 1533. ch. 199. praem. 6., quorum singulorum titulos plenos breuitatis studio praetereo, idque tantum indico, ea in collectione, quae 1531. cum praefatione IO. STVRMII prodiit, primo loco contineri de simplicium medicamentorum facultatibus libr. XI. THEODORICO GERARDO Gaudano interprete, ex quibus liber VI. VII. et VIII. a p. 54. a. ad 88. a. simplicia, sed iterum sine capitulorum numeris recenset ita, ut L. VI. §§. 170. L. VII. 124. et VIII. 183. eorum expositiones comprehendat. Et huius editionis mentionem factam non inueni. e) Omnia CL. GALENI Pergameni summi in arte medica viri opera quotquot apud Graecos in hunc usque diem

diem extiterunt tum olim, tum non ita pridem, hominum doctissimorum diligentia, in latinam linguam conuersa, deinde recognita et pristinae incolumitati restituta. Quibus praemissa est praefatio dedicatoria (HIER. GEMVSAEI) medicinae primam inuentionem, eiusque incrementa, tum ipsam quoque Galeni vitam, ex eius operibus passim decerptam, prolixè depingens. Duplex praeterea adiectus est index totius operis &c. Basil. 1542. Ad calc. Basil. per Hier. Frobenium et Nic. Episcopium 1542. fol. Haec operum Galeni collectio constat ex libris Ifagogicis, reliquorum VIII. tomis et indice vniuersali, sed mole inaequalibus, facile autem in IV. vol. colligandis. Singulis tomis peculiaris praefixus est titulus omnibus vero idem locus et annus adpressus. Ipsa tractatio impressa est in columnis diuisis singulis numeratis. Lib. Ifag. col. 367. praem. chart. 16. T. I. col. 1228. praem. ch. 6. T. II. col. 382. praem. ch. 4. T. III. col. 724. IV. 844. V. 1116. VI. 1084. VII. 294. VIII. 428. Index vterque ch. 202. Tomus V. continet libros huc pertinentes ex eiusd. GERHARDI interpretatione, et quidem L. VI.—VIII. a col. 150. ad 239. qui totidem §§phis ac praecedens editio distinguuntur, sed adhuc absque numeris. Et hanc editionem praetereunt auctores, si excipias Kestn. p. 101. not. vv. ubi affirmat, esse hanc eandem, quam alii ad a. 1541. referunt. f) Cl. GALENI Pergameni Asiatici, excellentissimi semper, post unicum Hippocratem, medici ab omnibus habiti Opera quae ad nos extant omnia, partim iam pridem, partim penitus recens, a viris doctissimis in latinam linguam conuersa, et nunc multis recentissimis translationibus per IANVM CORNARIVM Medicum Physicum exornata: ab eodemque recognita ex toto et innumeris locis restitutis absolutissima. Accesserunt etiam nunc primum, capitum numeri et argumenta per CONR. GESNERVM Medicum in omnes libros, quae cum in alios multos, tum illos plerosque omnes, qui medicinae candidatis apprime necessarii lectu sunt, ita copiose ac methodice tractantur, ut legitimae epitomes instar haberi possint. His omnibus subiectus est index foecundissimus, ab artis medicae peritissimo conscriptus. Basil. 1549. Ad calcem: Basileae per Hieron. Frobenium et Nic. Episcopium 1549. fol. Diuisio in libros ifagogicos et reliquorum in VIII. tomos indicemque, itemque impressio in columnis diuisis et singulis numeratis eadem est, ac in priori editione, et tomis singulis iterum adpressus est idem locus et annus. Libr. ifag. col. 280. praemissa, inter quae Cornarii et Gesneri praefatio, chart. 10. T. I. col. 1316. tit. et IO. BAPT. MONTANI praefat. ch. 5. T. II. col. 430. III. 756. IV. 844. V. 1124. VI. 1100. VII. 294. VIII. 430. Ind. chart. 174. seu col. 696. Libros huc pertinentes iterum continet T. V. a col. 153. ad 244. quorum VI. constat ex capp. 155. VII. 124. VIII. 179, numeris nunc additis. His addo, neque GALENI libros aliquot Graecos &c. per IO. CAIVM Britannum medicum annotationibus illustratos et Basil. ap. Hier. Frobenium et Nic. Episcopium 1544. in 4. pagg. 156. et 79. editos; neque etiam GALENI opera a LEONH. FVCHSIO latinitate donata et commentariis illustrata, Parisiis ap. Arn. Birckmann 1550. in fol. chart. 293. et praemiss. ch. 26. excusa, libros huc pertinentes continere, ut taceam reliqua tria vol. eiusdem cura ibid. 1554. edita, utpote quorum peculiare tituli hoc iam indicant. Ceterum hi libri hactenus citati sigillatim etiam excusi sunt, et quidem, quantum inuenire potui, primum secundum versionem GERARDI Parisi, apud Simon. Colinaeum 1530. fol. vid. Maitt. T. II. p. 733. Apud me asseruantur g) Cl. GALENI de simplicium medicamentorum facultatibus libri XI. THEOD. GERARDO Gaudono interprete. Qui nunc tibi prioribus editionibus emendatiores exeunt, locis compluribus suo nitori restitutis, ex Graeci exemplaris collatione. Scholiis insuper utilibus, iidem passim illustrantur. Parisiis ap. Jacob. Bogardum 1543. 8. pagg. 228. auers. non numeratis. tit. index pagg. 16. Pagg. 226. seqq. annexus est Gal. liber de facultatum naturalium substantia, GVINTHER IO. ANDERNACO interprete. h) eodem titulo, omisis iis quae de scholiis memorantur, Lugduni apud Guill. Rouillium 1551. et i) 1552. in 12. ad calcem vtriusque: Lugd. excudebat Philibertus Rolletius, pagg. 734. praemiss. pagg. 32. Et his editionibus, quae non nisi tituli anno adpresso differunt, annexus est liber de facultatum nat. substantia eodem interprete, sed praefixa est PHILIBERTI SARACENI praefatio III. Idus Ianuarii 1547. data, ex qua patet, eius cura et collatione cum graeco exemplari Aldiniano et Germanico hanc editionem emendatam et subinde annotationibus illustratam esse, quibus typographus in breui monito addit, ea, quae non Galeno visa sunt esse, his [] notis includi. Notandum adhuc, in omnibus editionibus hactenus recensitis libros citatos exponere non solum stirpes, verum etiam quasdam ex iis productas res. 11) PLINII historiae naturalis (vid. §. XIV. 23.) vetustissima editio 1469. Venetiis a Io. Spira excusa indicatur a Maitt. T. I. f. IV. p. 282. illa vero Veronae 1468. a Beughemio citata negatur ab eodem ibid. p. 280. nota b. Quo pretio semper omnes habuerint hoc opus, testantur repetitae eius editiones, quarum solus Maittaire T. V. P. II. p. 155. vsque ada. 1499. viginti, et ab a. 1507. ad 1543. quindecim, praeter tres in Italicam linguam versas, indicat. Primus autem, qui hoc opus ex variis causis contaminatum purgare ausus est, fuit LEONICENVS, cuius librum de Plinii et aliorum medicorum erroribus primum 1491. in 4. prodixisse annotat Fabric. Biblioth. Lat. Vol. alt. p. 612. nota ** et ex hoc Segu. p. 105. sed secundum Orland. orig. del stamp. a Segu. ibid. citatum, ut et Maitt. T. I. f. IV. p. 554. Ferrariae per Laur. Rubeum de Valentia 1492. in 4. Mea exemplaria haec sunt a) NICOLAI LEONICENI Vicentini de Plinii et plurium aliorum medicorum in medicina erroribus opus primum ANGELO POLITIANO dedicatum Eiusdem NICOLAI epistola ad HERMOLAVM BARBARVM in primi operis defensionem. Eiusdem NICOLAI de PLINII et plurium aliorum medicorum erroribus nouum opus ad FRANCISCVM TOTIVM medicum Lucensem. Eiusdem NICOLAI ad HIERO. NYMV MENOCHIVM epistola, in qua eadem materia de multis simplicibus medicamentis pertractatur, et quaedam Plinii, atque aliorum medicorum errata continentur. Ad calcem: Impressum Ferrariae per Io. Maciochium 1509. IV. Cal. Maitt. 4. angustior. sine paginar. numeris, chart. 96. f. pagg. 199. index errator. pagg. 3. Primae epistolae praefixa est LVDOVICI BONACIOLI medici Ferrariensis praefatio, qua indicat, eius cura et sumtu nouum hoc opus editum esse, et deinde monet, Leonicum potius contra barbarorum deprauationes quam Plinii errores calamum strinxisse. Hanc excipit epistola ANGEL. POLITIANI ad Leonicum Florentiae die III. Ianuar. 1491. scripta, quae continet quasdam obiectiones contra errores Plinio a Leonico imputatos, ad quas Leonicens in sua epistola simul respondet, ex quibus patet, vel Leonicum suas animaduersiones cum Politiano, antequam typis excuderentur, communicasse, vel easdem iam anno 1491. in publicum editas fuisse: ipsi Diarii litt. Italiae auctores hunc editionis annum ex coniectura tantum indicant: vid. T. XXIV. p. 274. Opus nouum a pag. 57. ad 152. Tutto dicatum excipit Totti epistola responsoria: (Q) 2

foria a p. 152. ad 154. Venetiis idibus Martii 1509. signata. Sequitur p. 155. sequ. epistola Menochii ad Leonicum Cal. Decembr. 1503. data, et deinde a p. 154. ad 198. Leonici responsio Ferrariae Calendis Febr. 1504. scripta. Colophonem imponit IO. MARIAE TRICAEII epilogus, qua curam Bonacioli in his edendis laudat. b) NICOLAI LEONICENI viri doctissimi de Plinii et aliorum medicorum erroribus liber. Cui addita sunt quaedam eiusdem auctoris de herbis et fruticibus, animalibus, metallis, serpentibus, Tiro seu vipera. Excudebat Henr. Petrus Basileae mense Iunio 1529. 4. pagg. 318. praemiss. et ind. pagg. 16. Quae de additamentis huius editionis memorantur, prioris editionis opus nouum iam continet. c) NIC. LEONICE. NI Vicentini, Philosophi et Medici clarissimi, Opuscula, quorum catalogum versa pagina indicabit. Per D. ANDREAM LEENNIVM medicum, a multis, quibus scatebant vitiis, repurgata atque annotatiunculis illustrata. Basil. 1532. Ad calc. Basil. apud Cratandrum et Io. Bebelium 1532. fol. pagg. 175. auers. non numeratis, praemiss. et ind. pagg. 6. Tituli auersa pagina haec indicat contenta: De Plinii et plurium aliorum medicorum in medicina erroribus L. IV. de tribus doctrinis ordinatis, secundum Galeni sententiam L. I. De virtute formativa L. I. De dipsade et pluribus aliis serpentibus L. I. De Tiro seu Vipera L. I. De morbo Gallico sive Neapolitano L. I. Contra suarum translationum obtrectatores apologia. Medici Romani, Nicolai Leonici discipuli, Antisophista. Excerpta ex hoc autore reperiuntur in Brunf. Herbar. T. II. app. Edit. I. p. 44. — 89. II. p. 140. — 205. vid. §. XIV. 7. e. 12) Eodem tempore idem argumentum pari laudabili studio tractauit HERMOLAVS BARBARVS (conf. superior. numerum 5. b.) quem Leonicens in epistola modo citata Pontificem Aquilegiensem salutatur. Huius castigationes Plinianas primum editas Cremonae a. 1485. ex Caille indicat Maitt. T. I. f. IV. p. 462, sed in nota 3. recte monet, eas ante a. 1492. vbi Romae apud Euchar. Argenteum in folio excusae sunt (conf. id. ibid. p. 545.) publicatas haud esse, quod assertum extra dubium ponit Giornale de' letterati d' Italia P. XXVIII. p. 184. 186. 202. vt et praefatio ipsius BARBARI octauo Calendas Septembris a. 1492. scripta et huic meo exemplari praefixa: a) HERMOLAI BARBARI, Patricii Veneti in C. PLINII naturalis historiae libros castigationes. Syllabus, sive index omnium quae in hoc opere tractantur, accuratissimus, quo quos scriptores minime ambitiosus corrector secutus sit, quos item locos ex illis emendarit, ac hercle innumera alia, cum eruditione admiranda, tum usu studiosis maxime necessaria quae tradiderit, plane cognoscas licebit. Basileae ap. Io. Valderum mense Martio 1534. 4. pagg. 523. Praemissa (inter quae etiam Io. Oporini epistola de hac editione emendata) pagg. 8. ind. pagg. 72. Anno 1496. easdem castigationes vnacum PLINII ipsa historia Venetiis per Bernardin. Benalium in fol. recusae esse, colligere licet ex Maitt. l. c. p. 614: ita sane prodiit hoc meum exemplar b) C. PLYNII SECVNDI naturae historiarum libri XXXVII. e castigationibus HERMOLAI BARBARI quam emendatissime editi. Additus est ad maiorem studiosorum commoditatem, Index IOANNIS CAMMERTIS minoritani, quo Plinius ipse totus breui mora temporis edisci potest. Ad calcem: Editum est hoc Plynianum elegantissimum opus, sumptibus ornatissimor. virorum Io. Kobergii ac Lucae Alantsee, impressum Hagenoae opera industriae Thomae Anselmi Badensis mense Nouembri 1518. Max. Aemiliano imperatore regnante, sex castigationibus Herm. Barbari quam accuratissime emendatum. fol. maior. pagg. 286. auersis non numeratis. Praefixa est p. 2. praefatio IO. BAPT. PALMARII, qua docet, quae ipse ad huius editionis emendationem contulerit, quaeque adhuc emendanda supersint. Accedit peculiari titulo Prima pars Plyniani indicis editi per IO. CAMERTEM Minoritanum, S. Theologiae Doct. in qua (tabellae pictae instar) mira literarum connexione dicuntur ea omnia Geographiam praeter (nam hanc complectitur pars altera) quae toto Plyniano volumine continentur. pagg. 192. Vtrique parti praefixa est Camertis praefatio: prior Viennae Pannoniae Prid. cal. Sempt. posterior sexto Calendas August. 1514. scripta, quibus brevis Pliniani operis recensio et commendatio continetur. Pertinent huc etiam c) C. PLINII SECVNDI Historiae mundi libri XXXVII. ex postrema ad vetustos codices collatione cum annotationibus et indice. Basileae in officina Frobeniana 1539. fol. mai. pagg. 671. praemiss. pagg. 36. Continent haec praeter titulum, Plinii praefationes et libr. I. seu librorum omnium elenchum, dedicationem D. ERASMI Roterod. qua, a. 1525. sexto Idus Februar. scripta, praemissa Plinii commendatione laudat praecipue HERM. BARBARI, GVILHELMII BVDAEI, NIC. BERALDI et IO. CAESARII studium in Plinium emendandum collocatum, et denique indicat, quae sua cura huic editioni accesserint. Accedunt SIGISM. GELENII castigationes ex vetustorum archetyporum collatione, in aliqua multa Pliniani operis loca, ab aliis antea parum animaduersa, cum eiusdem praefatione Basileae calend. Ianuarii 1535. data, qua docet, has tertium nunc emendatas et correctas prodire. Sine paginar. numeris chartis 26. f. pagg. 52. Sequitur denique peculiari titulo Index in C. Plinii Secundi naturalem historiam ad exemplum IO. CAMERTIS, mutatis quibusdam, quae ad hanc aeditionem non congruebant, nonnullis etiam adiectis, chartis 88. f. pagg. 175. cuius pars secunda etiam geographica sigillatim comprehendit. 13) HALI (HALY vel ALI) ben (filius) ABBAS, cognomine Magus, discipulus ABIMEHER MOYSI filii SEYAR (SERAR) floruit sub finem sec. X. (perperam traditur XII.) Arabum medicorum doctissimus et auctor laudabilis systematis medicinae (conf. Castell. p. 145. Merckl. p. 387. 4. Io. Freindii Hist. med. edit. gallic. p. 141. Kest. p. 130. §. V. Joeh. T. II. p. 1337.) quod vero nonnulli ex STEPHANI Antiocheni versione prostat (posterioris partis seu practicae codicem MStum in tribus vol. titulo The-sauri artis medicae asseruat bibliotheca Acad. Leydenis, vid. eiusd. catal. p. 441. a.) et, quantum scio, bis impressum, nempe a) sine titulo: ad calcem p. 186. finit tractatus decimus secundae partis simulque totus liber regalis dispositio nominatus in arte medicinae completus: Quem sapientissimus HALI filius ABBAS, discipulus ABIMEHER MOYSI filii SEIAR composuit: regique inscripsit: unde et regalis dispositionis nomen assumpsit. Et quia omnia medico necessaria continet ideo artis medicinae liber completus nuncupatur. Ipsum autem ex Arabico in latinum ornatissime traduxit sermonem STEPHANVS philosophiae discipulus in Antiochia, Anno dominice passionis 1127. 26. Ianuarii (confer. inscriptio serm. octauo P. II. p. 152. b. vbi eiusd. anni mensis Nou. indicatur) feria quarta. Qui quum scriptorum negligentia et imperitia valde deprauatus esset vitiosissimisque effectus. Excellentissimi artium et medicinae doctoris ANTONII VITALIS pyrraensis opera summaque diligentia emendatissimus redditus est. Ita vt nil in eo fere castigatione dignum compertas nisi quod impressorum incuria praetermissum diligens inspector facile emendaret. Textus autem quosdam corruptos, quosdam vero suspectos, ab antiqua quandoque dissentientes translatione, quum imprimendum importunitate corrigendi tempus concessum non esset Tibi lectori studiosissimo emendandos reliquit: vt se plurimi laboris sui participem esset.

ceret. Quos ne totum hunc librum perquirens oberrares hic subscribi iussit. Sequuntur p. sequ. haec monita, quibus subscriptum legitur: *Impressum Venetiis d. 25. Sept. 1492. opera Bernardini Riccii de nouaria. impensa vero excellentissimi artium et medicine doctoris domini magistri Ioannis Dominici de Nigro &c.* cum extractu priuilegii. Vltima pagina indicat plagularum custodem et typographi insigne. fol. regal. chart. firma et nitidiss. p. 186. auers. non numeratis. Praemissa tabula omnium librorum, quae p. 1. auersa incipit, chart. 4. Totum opus excusum est in columnis diuisis, distinctum in partem theoreticam et practicam, quarum vtraque praefixam habet STEPHANI praefationem et constat libris seu sermonibus decem: prioris partis sermo seu liber V. C. 15 — 20. de cibis ex plantis et earum partibus, C. 32. de natura odoriferor. florum et herbarum et C. 33. de aromatum iucundorum naturis agit; posterioris vero sermo seu liber II. medicaminum simplicium scientias eorumque utilitatem sigillatim exponit et quidem post generalia agit C. 34. de herbis numeris 87., C. 35. de seminibus n. 88.—177. C. 36. de foliis n. 178.—217. C. 37. de floribus no. 218.—246. C. 38. de fructibus n. 247.—312. C. 40. de succis n. 313.—338. C. 41. de gummis n. 339.—368. C. 42. de lignis n. 369.—404. C. 43. de radicibus plantarum n. 405.—447. Sequuntur deinde mineralia et animalia n. 448.—533. C. 53. de laxatiuis in genere, C. 54. de diuersitate laxatiuorum, inter quae plura vegetabilia eorumque partes n. 554.—591. recensentur, nonnulla etiam C. 55. de medicinis prouocantibus vomitum nominantur. Vtut autem haec pertractatio quoad qualitates et vires laude sua non omni priuanda sit, de ipsis tamen stirpibus vix plura, quam nuda nomina arabica, quandoque latina et graeca a Stephano addita, et subinde circa quasdam species leues notae reperiuntur. b) *Liber totius medicine necessaria continens quem sapientissimus HALI filius ABBAS discipulus ABIMEHER MOYSI filii SEIAR edidit: regique inscripsit. Inde et regalis dispositionis nomen assumpsit. Et a STEPHANO philosophiae discipulo ex Arabica lingua in latinam satis ornata redu-ctus. Nec non a Domino MICHAELE DE CAPELLA artium et medicine doctore fecundis sinonimis a multis et diuersis Autoribus ab eo collectis illustratus summaque cum diligentia impressus 1523.* Ad calcem: *hoc preclarum opus multo maiori quam prius cura recognitum mendis omnibus exclusis. Lugduni typis Jacobi myt exacte impressum fuit 1523. die vero 18. mensis Martii. 4. pagg. 319. auersis non numeratis, praemiss. chartis 8. quae continent titulum figuris ligno incisis, Hippocratis, Galeni Halique imagines referentibus, ornatum, et Mich. de Capella breuem praefationem tituli paginae auers. adpressam, nec non eiusdem synonyma litterarum ordine conscripta. Ceterum haec editio, pariter columnis diuisis excusa, a priori non differt, nisi forma et typo multo minori, vnde in angustius spatium redacta est. Plurade Haly Abbatis opere vide num. 18. sequentem. 13.** SANTES (SANCTES) ARDOINVS (ARDOYNVS) seu DE ARDVINIS de Pesauro seu ex Pisarenfi vrbe natus medicus (vid. Gesn. Biblioth. p. 590. b. Merckl. p. 960. b. Segu. p. 224. Ioech. T. I. p. 515.) et sec. XV. (non XVI. vt legitur apud Ioech. l. c.) clarus silentio penitus praeter-eundus haud est, quia opus eius non solum cum prima Hali Abbatis operis editione, distincte quidem, simul tamen prodiit, verum etiam integer tractatus III. de plantis venenatis agit. Tituli plagula caret; primo vero tractatui haec praefiguntur: *Incipit liber de Venenis quem magister SANTES DE ARDOYNIS de Pensauro phisicus saluatoris nostri confusus auxilio edere cepit venetiis die octauo nouembris 1424. Et ipsum ibidem diuino mediante fauore finiuit die 14. Mady 1426. ad honorem et laudem Domini nostri Iesu Christi ac ejus gloriosissime genitricis Virginis Marie et totius curiae paradisi.* Ad calcem: *Impressum Venetiis opera Bernardini Riccii de nouaria: emendatumque per Excellentiss. artium et Medicine Doctorem dnm magi-strum DOMINICVM DE CANALI Feltrensem. Impensa vero Excellentiss. art. et Med. Doctoris Dni Ma-gistri Joannis Dominici de Nigro: qui obtinuit ex speciali gratia a Serenissimo Domino venetiar. &c.* (sequuntur priuilegii verba) 1492. die XIX. Mensis Iulii Regnante D. Augustino Barbado Inclito Vene-torum Principe. Fol. regal. p. 101. auers. non numeratis, in columnis diuisis. Tertius tractatus p. 26. b. — 41. b. his inscribitur: *incipit tractatus tertius Libri de venenis in quo tractatu determinatur in speciali de vene-nis ac mortiferis Medicinis sumptis ex vegetabilibus et plantis.* Sistit autem hic tractatus 63. capitibus to-tidem plantarum noxiarum historiam medicam satis docte, sed ipsae plantae nonnisi nominantur, et quidem nominibus barbaris sine vlla explicatione vel descriptione: reliqui tractatus (sunt enim eorum VIII.) agunt de venenis in genere et de illis ex mineralibus animalibusque interne sumtis, vt et horum laesionibus exter-nae accedentibus sigillatim. Recusum est hoc opus post 70. annos hoc titulo: b) SANTS ARDOYNI Pisu-rensis Medici et Philosophi praestantissimi opus de Venenis a multis haecenus desideratum et nunc tandem castigatissime editum. In quo naturalis primum historia &c. (quae verbotenus leguntur apud Merckl. l. c.) cum praefatione luculenta, in qua methodus venenorum cognoscendorum atque curandorum, summa arte, breuitate et facilitate docetur. Adiunximus eiusdem generis commentarium doctiss. FERDINANDI PONZETTI Cardinalis. Indicem praeterea rerum atque verborum copiosissimum. Ad calcem indicis: Basileae per Henr. Petri et Petrum Pennam 1562. fol. pagg. 573. titulus, praefatio THEODORI ZWINGERI, et index chart. 15. Ponzetti tractatus p. 515. hoc peculiari titulo sequitur: FERD. PONZETTI, tituli S. Pancratii Presbyteri Cardin. Melfitensis de Venenis lib. tres, ante annos XL. editi: nunc vero multo emendatiores quam antea typis excusi, cum indice locupletissimo, quem tamen nec sigillatim additum nec priori insertum reperi. In hoc tractatu vix 20. nominantur eiusmodi plantae, quarum iterum vires tantum indicantur. Saepius excusum esse hoc opus, me latet. 14) JOANNES (vel vt alii monent MATTHAEVS) PLATEARIVS, a S. Paulo, pa-tria sua Galliae civitate, cognominatus, medicus Salernitanus, quem alii sec. XII. vel XIII. alii initio XIV. demum vixisse tradunt (vid. Merckl. p. 662. a. Tournes. Isag. p. 19. Segu. p. 292. Ioech. T. III. p. 1622.) duo composuit opera, quorum vnum practica, alterum de simplici medicina dictum circa instans, saepius cum aliorum auctorum operibus, nunquam vero, quantum scio, sigillatim (nisi forte Parisiis 1582. 4to. teste Segu. l. c.) excusa sunt. Quod ad posterius, solum huc pertinens, attinet, prodiit primum cum Serapionis Operibus Venetiis 1497. et deinde ibid. 1503. et 1530. excusis, vid. numerum super. 6. a. b. c., interea vero etiam cum Nicolai Praepositi dispensatorio, de quo no. seq. 20. g. conf. etiam Mesue huius artic. no. 1. a. seqq. Ipsum vero Platearii hoc opus nil continet, quam catalogum simplicium medicinalium, quae ex tri-bus regnis petuntur, secundum litterarum ordinem more aliorum barbarorum ita explicatorum, vt, prae-missis

missis nudis nominibus, reliquum de qualitatibus et viribus solummodo agat: 15) GEORG. VALLA Placentinus, medicus et professor humaniorum venetiis, latinae et graecae linguae peritissimus, vixit circa medium saec. XV. vid. Merckl. p. 342. a. Joach. T. IV. p. 1423. Inter varia eius opera occurrunt quoque de medicina libri VII. ubi de simplicium natura per ordinem litterarum; num vero hos iam comprehendant eius aliorumque authorum opera per Anthon. Strata Venet. iam 1488. in fol. (teste Maitt. T. I. seu IV. p. 504.) excusa, iudicent illi, quibus ad manus sunt. Eiusdem autem opus de rebus expetendis et fugiendis, quod apud Aldum Venetiis 1497. (Maitt. T. I. seu IV. p. 544.) prodiit et procul dubio haud differt ab illo, quod ibid. impensa ac studio IO. PETRI VALLAE filii 1501. mense decembr. in fol. excusum est (vid. Maitt. T. II. p. 153.) libros indicatos omnino continet (vid. Maitt. L. c. nota d et conf. Gesn. Biblioth. p. 272. b. ubi vero editionis annus non indicatur) cuius editionis primum tantum possideo volumen hoc titulo: GE. VALLAE Placentini viri clariss. de expetendis et fugiendis rebus opus, in quo haec continentur De Arithmetica L. III. ubi quaedam a Boetio praetermissa tractantur. De Musica L. V. sed primo de inuentione et commoditate eius. De Geometria L. VI. in quibus elementor. Euclidis difficultates omnes fere exponuntur, ubi etiam de mechanicis spiritalibus, catoptricis, ac opticis, deque quadrato circuli habetur tractatus. De tota Astrologia L. IV. in qua fabrica vsusque Astrolabi exaratur, et quae signorum in exhibendis medicaminibus sit habenda observatio. De physiologia L. III. ubi et metaphysices quaedam lectu qm. digniss. vtilissimaeque. De Medicina L. VII. ubi de simplicium natura per ordinem litterarum. &c. &c. quae ad scopum praefixum haud pertinent, sine loco et anno in primo hoc volumine saltem non reperiundo, fol. reg. chart. nitida, sine paginar. numeris et sine litt. initialibus maioribus, minoribus tamen areis vacuis impressis, cum multis figuris ligno incis. chart. 298. praemiss. chart. seu foliis 14. Desinit autem hoc volumen, ubi ea, quae ad medicinam pertinent, incipiunt. Ex praefixo autem elencho omnium librorum, quorum 49. et horum capitum singulorum inscriptiones indicantur, patet, ea, quae de vegetabilibus agunt, non vna serie recenseri. b) GEORGII VALLAE Placentini viri clariss. de simplicium natura liber vnus. Argentinae per HENRICVM SYBOLD. Ad calcem: 1528. mense Augusto. in 8. sine paginar. numeris. plagg. 13. f. pagg. 208. Syboldus, artis medicae Professor, in praefatione indicat, se ex Auctoris voluminibus selegisse librum, cui titulum fecit, de natura simplicium; huius autem editionis capitum secundum litteras ordinem in elencho superioris editionis indicatae haud reperi. Ceterum nec haec tractatio ipsas plantas definit, vnum vel alterum tamen earum synonymum plerumque addit. 16) Sub finem saeculi XV. ROBERTVS DE VALLE, Rothomagensis et Canonicus Carnutensis (Chartres) Plinii historiam mundi in compendium reduxit eiusque vocabula explicavit his libris a) Compendium memorandorum vires naturales et commoda comprehendens a Plinio data: valens nedum, ad secreta nature noscenda: sed ad vsus quoque necessarios: corporisque et ingenii conseruationem. Ad calcem: impressum parisiis per felicem baligault impensa magistri durandi gerlier, alme vniuersitatis librarii. Anno M. V. C. (1500.) 4. sine paginar. numeris, pagg. 220. praemiss. pagg. 24. b) ROB. DE VALLE Rothomagensis Prologus in sequentem difficilium plinii explanationem eiusdem formae sine loco et anno et sine paginar. numeris pagg. 174. Tituli paginae adpressum est insigne M. Durand. Gerlier et procul dubio simul cum priori tractatu prodiit. Quod ad prius opusculum attinet, ipsa praefatio docet, missis illis, quae nostris in terris vix in conspectum veniunt, vtilissima tantum excerptandi scopum auctoris fuisse; omnia ergo, quae in libris XII. — XIX. de vegetabilibus occurrunt, comprehendunt paginae 48. Posterius opusculum est index, litterarum ordine vocabula a Plinio usurpata explicans et ad plurium auctorum, quos saepius citat et in praefatione sigillatim nominat, mentem illustrans: in fronte gerit hanc peculiarem inscriptionem: sequitur plinianorum difficilium in naturalis historie libris expositio a Roberto de Valle rothomagensi que multas poeetrie philosophiae medicineque obscuritates exquisitè elucida. Hoc posterius opusculum ergo praestet priori, nec adeo vsque vilipendendum est, ut censuit HARDVINVS sua in Plinium praefatione, (conf. Fabr. bibl. lat. p. 410.) licet ex propriis observationibus parum accesserit. 17) RAPHAELIS VOLATERRANI, seu potius RAPH. MAFFEI cognomine VOLATERRANI i. e. Volae terrae ducatus Florentini a. 1451. nati (vid. Segu. p. 113. Joach. T. III. p. 27.) Opera primum prodierunt Romae per Besicken 1506. fol. vid. Maitt. T. II. p. 181: num differant a sequenti opere, iudicent illi, quibus vtraque ad manus sunt: Commentariorum Urbanorum RAPHAELIS VOLATERRANI octo et triginta libri cum duplici eorundem indice secundum tomos collecto. Item Oeconomicus XENOPHONTIS ab eodem latine donatus, venduntur Parrhisii ab Io. Paruo et Iodoco Badio Ascen. Ad calcem: in aedibus ascensianis ad XII. Kal. oct. 1515. fol. pagg. 422. auers. non numeratis, praemiss. pagg. 38. Recusum esse hoc opus ibid. a. 1526. et Basil. 1530. 1534. (Gesn. bibl. p. 538. a. ann. 1544.) et 1559. vid. Segu. l. c. Agitur autem in hoc opere de plantis libro XXVI. fol. 280 — 291. ubi vero iterum excerpta potius ex aliis, quam ex propriis observationibus reperiuntur: accedit, quod Gesnerus l. c. iam annotauit, hunc auctorem non pauca a graecis non intellecta perperam transtulisse. 18) Semel tantum, quantum scio, excusum est opus hoc titulo: Omnia opera YSAAC in hoc volumine contenta: cum quibusdam aliis opusculis: Liber de definitionibus. Liber de elementis. Liber dietarum vniuersalium: cum commento PETRI HISPANI. Liber dietarum particularium cum commento eiusdem. Liber de urinis cum commento eiusdem. Liber de febribus. Pantegni decem libri theorices: et decem practices: cum tractatu de gradibus medicinarum CONSTANTINI. Viaticum YSAAC quod CONSTANTINVS sibi attribuit. Liber de oculis CONSTANTINI. Liber de stomacho Constantini. Liber Virtutum de simplici medicina Constantini. Compendium megatechni GALENI a Constantino compositum. Cum tabula et repertorio omnium operum et questionum in commentis contentarum. Ad calcem: Habes in hoc volumine artis Apollineae studiosissime indagator: Ysaac israelite Salomonis regis arabie filii adoptiui: coaceruata opera: — Curauit ea imprimi honestus vir Bartholomeus trot bibliopola Lugdunenn. Extrema manus apposita fuit A. Dni XV. supra M. mense Decembri in Lugdunenn. emporio in officina probi viri Iohannis de platea chalcographi. Fol. pars prior pagg. 226. auers. non numeratis. Pars posterior, quae hac inscriptione incipit: Liber Pantegni Ysaac israelite filii adoptiui Salomonis regis arabie: quem Constantinus

tinus apfricanus monachus montis cassinensis sibi vendicauit, pagg. 210. auers. non numeratis. Repertorium (quod peculiari titulo instructum est et contenta voluminis repetit) chart. 15. cum hac inscriptione: Liber definitionum *Tjaac heben amaran philosophi &c. Liber elementorum Tjaac israelite medici &c.* ad calcem: in calce voluminis ponitur tractatus quidam de obliuione a Constantino (ut perhibent) compositus &c. Tituli plagae medium occupat figura ligno incisa, quae *Haly Abbatis, Tjaaci et Constantini* mensae affidentium effigies repraesentat. Auersae paginae adpressa est 1) dedicatio ANTON. de TOLEDO med. Doct. Lugd. 15. Dec. 1515. scripta, quae indicat, eius cura excusa esse haec opera aetate ferme consumta et corrota, per ANDR. TVRINVM Pesciensem vero correctâ. 2) SIMPHORIANI CAMPERII Duc. Lothar. et Barri primarii medici epistola ad TVRINVM vltima Iulii 1515. exarata, vbi ex ipsius operis citatis probare conatur, duos fuisse YSAAC, alterum HEBEN AMARAN, philosophum, qui definitiones conscripsit: alterum Israelitam medicum, qui plura opera composuit, praesertim *Pantechnen* sic dictam, hocque opus titulo *complementi medicinae HALY ABBATI* a STEIHANO falso adscriptum esse. Conf. num. 13. superior. 3.) ANDR. TVRINI epistola IV. Kal. Dec. 1515. data, vbi ex horum operum et ex RASIS atque MESVE citatis *Pantechnen* ut et *Viaticum* non solum iterum YSAACO vindicatur, verum etiam additur, haec opera CONSTANTINVM quoque furto sibi adscripsisse. Ceterum menda excusat ob codices tum mendis plenos tum cariosos. Addo his, *Petr. Castellum* p. 144. quoque *Isaac* Israelitam medicum et *Heben Amaran* philosophum distinxisse, *Conr. Gesnero biblioth.* p. 467. a. vero probabile fuisse, ISAACH BEIMIRAM et EBEN AMRAM vel HEBEN AMARAN eundem fuisse: sic enim citatum legi in libris IO. SERAPIONIS et IO. MESVE. Quo tempore ISAAC vixerit, valde dissentiant auctores. Medium seculi VII. ipsi assignat *Morreau de V.S.* in pleuritide; seculi XII. vero *Iust. chron. med.* a Merckl. p. 714. a. citati; seculi X. *Ioech. T. II.* p. 1988. et seculi XI. *Gesn. biblioth.* l. c. Quod ad *Pantechnen* attinet, hoc opus et *Haly Abbatis complementum medicinae* omnino vnum idemque est, non solum quoad diuisionem itemque capitulorum et paragraphorum numerum, verum etiam ipsorum contentorum expositionem, et si vel alicubi differentia in verbis occurrat, nonnisi interpreti tribuenda erit. His non obstantibus, *Io. Freind Hist. med. edit. gall.* p. 141. lat. a *Io. Wigano* adornata p. 214. plura haud concedit, quam quod *Haly Abbas* quaedam ex *Isaaco* mutuatus sit. Vtut autem haec se habeant, facile ex adductis patet, opus hoc circa plantarum expositionem illo magis haud praestare. Aliam horum operum editionem non inueni in *Merckl. l. c. Catal. biblioth. Ac. L. B.* p. 136. a. *Bradlei.* p. 273. a. *Maibom.* P. III. p. 153. n. 1885. *Riui.* p. 413. n. 4873. *Ioech. l. c.* qui tamen annum 1516. indicat. Quoddam ex his antea iam sigillatim excusum indicatur ex bibl. Menars. a Maittaire, T. I. l. IV. p. 489. nempe b) *Eximij ISAAC medicine monarce de particular. dictis libellus, impress. per Magistr. Mattheum Cerdonis de Windischgretz Paduae* 1487. 4. quem titulum vero auctor nota 16. T. V. P. I. p. 523. ex *Simlero* ita corrigit: *Isaaci Beimiram medici Iudaei de diaetis vniuersalibus et particularibus Libri 2.* CONSTANTINVS AFRICANVS, cuius iam mentio facta est, vixit sub finem sec. XI. Monachus ordinis D. Benedicti in monte Cassinensi: laudatur quidem medicinae et philosophiae aequae, ac graeci, latini et arabici sermonis peritissimus, sed etiam plagii simul accusatur ferme ab omnibus: *vid. Gesn. biblioth.* p. 185. b. *Castell.* p. 161. *Merckl.* p. 223. b. *Freind.* l. c. p. 218. *seqq. lat. edit.* p. 324. *Ioech. T. I.* p. 2067. Opera eius sunt c) CONSTANTINI AFRICANI post Hippocratem et Galenum quorundam, Graecae linguae doctus, sedulus fuit lector, medicorum nulli prorsus, multis doctissimis testibus, posthabendi opera (reliqua tituli verba et contentorum elenchum vid. apud Merckl. l. c.) ad calcem: *Basileae excudebat Henr. Petrus mense Augusto 1536.* fol. pagg. 387. praemiss. cum ind. pagg. 16. Hoc volumen nihil huc pertinens continet, si excipias vltimum tractatum, qui inscribitur *de gradibus simplicium* liber a p. 342. ad finem, qui vero et ordinis et expositionis ratione plane differt ab illis, quae in *Haly Abbatis* et *Isaaci* operibus reperiuntur, neque vero praeter nuda simplicium vocabula et eorum virium secundum gradus recensionem plura quam illi profert. d) *Summi in omni philosophia viri* CONSTANTINI AFRICANI medici operum reliqua, haecenus desiderata, nuncque primum impressa ex venerandae antiquitatis exemplari, quod nunc demum est inuentum. In quibus &c. vid. Merckl. l. c. Ad calcem *Basl.* apud *Henr. Petrum mense Augusto 1539.* fol. pagg. 361. Praemiss. cum ind. pagg. 16. Hoc volumen, praeter *Ant. Gaizonis* dissertationem de somno a p. 347. ad finem, solummodo continet *Constantini* tractatum de communibus medico cognitu necessariis, qui est ille omnino ad verba ferme conueniens cum *Isaaci* *pantechnes* parte prima seu theoricâ: alteram seu practicam partem pariter immutatam reperire haud potui. Quaedam *Constantini* opusculorum antea iam sigillatim excusa *Gesnerus* l. c. et *biblioth. Riui.* p. 235. n. 2215. indicant. 19.) Sub initium seculi XVI. ex recentioribus nouus in publicum prodiit barbariei debellator eruditissimus et *Leonici* discipulus, IOANNES MANARDVS Ferrariæ a. 1462. natus atque ibidem a. 1536. mortuus, vir ab omnibus laudatus: *vid. Gesn. bibl.* p. 435. a. *Castell.* p. 180. *Merckl.* p. 632. b. *Tournes.* *Isag.* p. 24. *Ioech. T. III.* p. 92. De vegetabilibus sigillatim equidem haud scripsit; plurima tamen, quae ad eorundem cognitionem et vsum legitimum pertinent, pertractauit tum in notis ad *Mesuen* (conf. art. huius XVI. n. 1. m. et litt. *seqq. b. c. d.*) tum in epistolis varii argumenti medici ad amicos datis. Harum epistolarum primum prodierunt L. VI. Ferrariæ 1541. nonis Nouembr. formis *Bernardini de Odonino* in 4., *vid. Maitt. T. V. P. II.* p. 47. et Lutetiae apud *Christian. Wechel* mens. Nov. typis *Simon. Siluii* 1528. in 8. *vid. idem ibid.* et *Merckl. l. c. Kestn. bibl. med.* p. 292. nota e. Meum exemplar hunc prae se fert titulum: a) *Medicinales epistolae IO. MANARDI Medici Ferrarienn. doctiss. Recentiorum errata et antiquorum decreta penitissime reserantes. Epistola HVBERTI BARLANDI ad Medicinae apud Louanienses studiosam iuuentutem. Index operi adiectus, quo prudens lector vel primo gustu olfacit auctoris studium. Argentorati apud Io. Schottum 1529.* 8. minori, pagg. 130. auers. non numeratis. Praemiss. cum ind. pagg. 32. Continet liber I. epistolas 5. (quarum prima scripta est pridie idus Sextil. 1418. enormi errore typographico loco 1518. in sequentibus editionibus correcto) L. II. 3. L. III. 4. L. IV. 5. L. V. 5. L. VI. 6. ordine, quo scriptae sunt, haud locatas, siquidem L. II. epist. 1. anno 1500. et L. VI. epist. 2. a. 1504. scripta est, reliquae serius; neque etiam omni-

bus annus, quo datae sunt, additur. Ex BARLANDI epistola patet, hanc editionem recusam esse ad exemplar, quod cum ipso ERASMVVS Basileae communicauit; num vero Ferrariense an Parisiense fuerit, non addit, hoc vero affirmat, eam ab infinitis fere iisque monstrosis mendis veteris editionis se vindicasse. Denique post indicem in spatii fugam paucas addit *Barlandus* annotationes, stirpium nomenclaturas potissimum illustrantes. Parisiensis editionis titulum exhibens *Mercklinus*, huius epistolae Barlandi iam mentionem facit; sed huic non solum contradicere videtur praefatio Barlandi erratis ad calcem meae editionis additis praefixa, verum etiam *Maittaire*, qui l. c. eiusdem haud meminit. b) Postea vnacum his alios libros XII., adeoque XVIII. vnacum annotationibus in Mesuen Basileae a. 1535. in fol. chart. 124. apud *Bebelium* excusos esse, docet *Gesner. biblioth. l. c. et Catal. Bibl. Meibom. P. III. p. 305. n. 3776*. Tandem duo libri adhuc accesserunt hoc titulo: c) *En postremum tibi damus, candide lector*, IO. MANARDI, *Medici Ferrariensis, sua tempestate omnium Medicinae Professorum per vniuersam Italiam in Galeni doctrina et Arabum censura celeberrimi et optime meriti*, *Epistolarum medicinalium libros XX.*, e quibus ultimi duo in hac editione primum accesserunt, vnacum epistola iam dudum desiderata de morbis interioribus, quam vtinam immatura morte non praeventus totam absolvere potuisset. Eiusdem in IO. MESVE simplicia et composita annotationes et censurae omnibus practicae studiosis adeo necessariae, vt sine harum cognitione aegrotantibus recte consulere nemo possit. Adiecto indice latino et graeco, vtroque copiosissimo. *Basil. apud Mich. Isingrinium 1540. fol. pagg. 603. praemiss. cum ind. pagg. 22.* d) IO. MANARDI &c. *Epistolarum medicinalium libri viginti*, denuo nunc ad autographum haud sine fructu collati et editi. Eiusd. in IO. MESVE simplicia et composita annotationes &c. *ibid. apud eundem 1549. fol. pagg. totidem.* e) IO. MANARDI *Medici Ferrariensis, omnium sua tempestate medicorum, citra controuersiam, Doctoris eminentissimi, Epistolarum libri XX.* Eiusdem in Io. Mesue simplicia et composita annotationes &c. &c. *Lugdunex officina Godefredi et Marcelli Beringorum fratrum 1549. 8. mai. pagg. 653. praemiss. cum ind. pagg. 37.* Vltima pagina ita inscribitur: *castigationes aliquot, quas post obitum Manardi ab ipsius haeredibus habuimus; ad calcem: reliquas castigationes inter excudendum suis locis reposuimus.* Hae tres editiones (c. d. e.) praefixam habent vnā eandemque praefationem COELII CALCAGNINI, Ferrariae ad XXII. Cal. Nou. 1529. scriptam, vbi haec leguntur: *emissit (Manardus) annis proximis libros sex epistolarum medicinalium &c. sex alios mihi nuper ostendit: num hae XII. libri sigillatim, vel etiam XVIII. ante Basiliensem editionem (vid. supra b) alibi excusi fuerint, a nemine annotatum legi.* Vnam adhuc editionem addere liceat sequenti demum seculo recusam, quia ex titulo et auctoris nomine mutato conicere aliquis posset, esse illam aliud prorsus opus: est autem f) *ΙΑΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ* sine Curia medica IO. IAC. MANARDI, *medici Ferrariensis, omnium medicinae Professorum per vniuersum orbem in Galeni doctrina Arabumque censura nobilissimi viginti libris epistolarum ac consultationum medicinalium adumbrata, nec non annotationibus et censuris locupletissimis in IO. MESVE simplicia et composita adornata &c.* *Hanoviae typis Wecheliani apud heredes Io Aubrii 1611. fol. pagg. 432. praemiss. pagg. 12. index ad calcem pagg. 21.* Secundum Mercklin. p. 633. titulo et anno eodem eademque forma prodiit Venetiis ap. haered. Io. Aubrii, quem erroris arguit *Kestner. l. c. p. 202. nota **. Accessit huic editioni praefatio PETRI VFFENBACHII, seruata simul illa CALCAGNINI; quo iure vero auctor nominetur IO. IACOBVS, non indicatur, nec ex aliis patet. Ceterum neque in hac, neque in antecedentibus (c. d.) mutata sunt emendanda, quae editionis e. pagina vltima indicat, neque etiam vlla praefationem BARLANDI eiusque additamenta edit. a. exhibet. Continet autem opus hoc semper celebratum maximam partem medica, multa tamen etiam botanica argumenta. Botanica sex priorum librorum iam recensuit BRVNPELSIUS (*vid. artic. super. XIV. n. 7. d.*) reliqua vero etiam neruose exhibet *Gesner. biblioth. p. 435. a. seqq.* (in eiusd. biblioth. editione *Ios. Simleri Tig. 1574. et Iac. Frisli ibid. 1583.* haec recensio omissa est) vnde patet, botanica tractari L. I. Ep. 3. 4. 5. II. 2. III. 4. IV. 3. V. 5. VI. 2. 3. 5. VII. 4. VIII. 1. 2. 3. IX. 3. 4. 5. X. 1. XI. 3. 4. XII. 1. 4. 6. XV. 3. 5. XVIII. 3. Adde, omnes quidem reliquorum librorum epistolas non nisi consilia pro aegrotis continere, subinde tamen, praecipue L. XIX. ep. 1. 3. 5. quaedam occurrere, quae nomenclaturas plantarum illustrant, id quod etiam de notis in Mesuem intelligendum est. 20) NICOLAVS ALEXANDRINVS, NICOLAVS MYREPSVS, et NICOLAVS PRAEPOSITVS a plerisque pro vno eodemque habetur: *vid. Castell. p. 134. Merckl. p. 840. b. et 842. b. Segu. p. 284.* ab aliis tamen ita distinguuntur, vt primus Medicus graecus vetustissimus ante *Aeginetam* (qui certe sec. VII. iam floruit) circa sec. XII. claruerit (*vid. Merckl. p. 829. b. Ioech. T. III. p. 915.*) secundus vltimis Graecis adscribatur et ad sec. XIII. referatur (*vid. Ioech. l. c. p. 795.*) tertius vero Medicus Salernitanus sec. XVI. demum floruerit, *vid. Ioech. l. c. p. 1743.* vbi tamen vtriusque opera confunduntur. His nominibus mihi ad manus sunt a) NICOLAI ALEXANDRINI *liber de compositione medicamentorum &c. cum annotationibus IO. AGRICOLAE AMMONII &c.* *vid. artic. super. XIV. n. 16. b.* vbi brevis eius recensio. b) NICOLAI ALEXANDRINI *Medici Graeci vetustissimi liber de compositione medicamentorum secundum loca, translatus e graeco in latinum a NIC. RHEGINO Calabro, nuper post germanicam editionem impressus et quam plurimis in locis castigatus* (si verus est titulus, addit *Gesner. bibl. p. 517. a;* est autem omnino verbotenus recusum ita, vt etiam *Agricolae* praefatio, quam hic ipsius tituli paginae subiecit, auersae paginae addatur, epistola nuncupatoria vero et poemata praemissa omittantur) cum breuissimis annotationibus locorum difficultum IO. AGRICOLAE AMMONII. *Venetis apud Andr. Arriabenum 1543. 8. pagg. 241. auers. non numeratis, praemiss. cum ind. pagg. 24.* inter quae 24. indicantur vocabula ab *Agricola* non exposita neque vero hic illustrata. c) NIC. MYREPSI *Alexandrini medicamentorum opus in sectiones quadraginta octo digestum haecenus in germania non visum, omnibus tum medicis tum seplasiariis mirum in modum utile a LEONHARTO FVCHSIO Medico et Scholae Tubingensis Professore publico, e graeco in latinum recens conuersum luculentissimisque annotationibus illustratum. Accessit non solum rerum et verborum, sed et medicaminum singulis morbis destinatum locupletissimus index. Basileae per Io. Oporinum 1549. mense Martio. fol. columnis diuisis singulis numeratis 586. Praemiss. fol. 8. index ad calc. fol. 4. d) Eodem titulo inter *Medicae artis Principes* ab Henr. Stephano editos T. II. 337—834. column.*

columna proffat. et e) sigillatim recufum est *Lugduni ap. Balthaz. Arnoletum 1550. 8. pagg. 712. praemiff. pagg. 24. ind. pagg. 15. f) NICOLAI antidotarium prodiit primum cum Mesue: vid. n. 1. a. huius XVI. articuli. g) Dispensarium Magistri NICOLAI PREPOSITI ad aromatarios. fol. pagg. 97. auerfis non numeratis. Ad calcem pag. 93. b. Finit Nicolai prepositi Doctoris medici clarissimi Isagogarum siue introductionum in artem apotecariatus opusculum, sine loco et anno et sine litteris initialibus maioribus, minoribus tamen subinde et custodis litteris adpressis. h) Presenti volumine hec continentur. Dispensarium Magistri NICOLAI PREPOSITI ad aromatarios nuper diligentissime recognitum. Item compluribus additionibus et notabilibus: et multiplicium confectionum siue antidotorum quae in secundo, serie alphabetica libro: descriptionibus: adauctum. Item modus debite dispensandi tyriacam, ex solennium medice facultatis autorum voluminibus excerptus. Item errores, qui circa eiusdem dispensationem sepe numero committuntur: his annectuntur. PLATEARIUS vulgo circa instans nuncupatus, de simplici medicina, nouis exornatus additionibus. Ad calcem: Nicolai prepositi doctoris medici clarissimi Isagogicum siue introductorium in artem apothecariam opusculum: accuratissima lucubratione doctissimi viri Michaelis de Capella artium et medice facultatum doctoris prestantissimi, variis et multis tum additionibus, tum notabilibus apprime ad eam rem conducibilibus adauctum: nec non compluribus in locis, ubi aut deprauatum aut mancum extitit, pristinae (absit vero inuidia) restitutum veritati: hic optatum sortitur finem. Impressum in famatissimo Lugdunenn. emporio impensis honestissimi viri Constantini Fradin bibliopole. A. 1512. III. idus Augusti (Merckl. p. 842. b. indicat editionem ibid. 1505.) in 4. oblongo seu folio minimo, pagg. 90. auers. non numeratis. Platearii opusculum pagg. 40. auers. non numeratis cum eiusdem loci, bibliopole et anni ad calcem subscriptione. De hoc Platearii opusculo conf. num. superior 14; videtur autem, illud excerpta tantum litterarum ordine disposita sistere ex eiusdem simplicium expositionibus, quas singulis subiecit compositis pharmacis Nicolai antidotarii, quod cum Mesue (vid. numerum anteced. lit. f) excusum est. Qui horum Nicolaorum opera inter se confert, omnino deprehendit, quod Fuchsius in sua praefatione monuit, nempe Nicolai Alexandrini opus ab Agricola editum ab illo Myrepsi, quod ipse euulgauit, diuersissimum adeoque non Nicolai, sed alterius cuiusdam opus esse, qui nonnulla medicamenta ex Nicolao et diuersis aliis autoribus in vnum congeffit librum; Nicolai Praepositi vero opus multo magis adhuc mancum et ex hoc aliisque compilatum deprehendi, id quod Agricola etiam in sua praefatione iam annotauit. Graecum exemplar typis nunquam excusum est; illud vero oratione parum concinna conscriptum multisque barbaris vocibus graecis tantum litteris scriptis contaminatum esse, iterum testatur Fuchsius, ex quibus facile probari potest, eum minus recte vetustis Graecis accenseri posse. Ceterum, quicquid ex his operibus ad stirpium cognitionem hauriri potest, ad Agricolae et Fuchsii annotationes redit: in Praepositi opere cap. 3. radicum, cap. 4. herbarum, cap. 5. florum, cap. 7. feminum, cap. 8. fructuum, cap. 9. corticum &c. catalogus nudis nominibus cum notis de eorum collectione et conseruatione praemittitur. 21.) HVBERTVS BARLANDVS (vid. Ioeh. I. p. 792.) cuius supra n. 19. a. mentio facta est, sequentem edidit librum: HVBERTI BARLANDI philatri Medici Namurcensis Velitatio cum ARNOLDO NOOTZ Medicinae apud Louanienses doctore, qua docetur, non paucis abuti nos vulgo medicaminibus simplicibus, ut Capillo Veneris, Xylaloe, Xylobalsamo, Spodio, hisque similibus. Deque Auicennae in plerisque horum hallucinatione. Deinde obiter agitur de venae in pleuritide sectione. Postremo Auicennae locis aliquot aliis adhuc dormitatio ostenditur, simul Galenus ab hominis moribus aliquot defenditur. Ad calcem: Antverpiae ex aedibus Henr. Petri Middelbur 1532. 8. pagg. 196. sine numeris. Continet non solum nominatorum, verum etiam aliorum vegetabilium nomenclaturas correctas. 22.) Ex veteribus Graecis celebrioribus restat recensendus ORIBASIVS sec. IV. clarus, quem nonnulli Sardianum, alii vero rectius Pergamenum vocant. vid. Gesn. biblioth. 527. b. Castell. p. 124. Merckl. p. 857. b. Tournes. Is. p. 14. Fabr. biblioth. Graec. Vol. XII. p. 639. Segu. p. 288. Ioeh. T. III. p. 1094. Opera, quae composuit, quaeque ex his adhuc supersunt, recenset Fabric. Bibl. Graec. Vol. IX. p. 451. et Vol. XII. p. 641. conf. Kestn. p. 103. §. XII, quibus merito mirum videtur, eorum exemplar graecum nunquam excusum, neque etiam omnium operum adhuc superstitum versiones latinas in publicum editas, neque vllum eorum commentario illustratum esse. Codices graeci, qui Vindobonae in bibliotheca Caesarea prostant, indicat Dan. de Nessel in eorundum Catalogo P. III. p. 31. cod. XIX. n. 16. p. 37. cod. XXVI. n. 9. et cod. XXVII. n. 1. p. 44. cod. XXXII. n. 8. p. 49. cod. XLII. Gesnerus vidit eiusmodi codicem Venetiis in bibliotheca Diegi Hurtadi a Mendoza, Caesarei oratoris, in quo inspexit librum, qui simplicium medicaminum descriptiones continet, et deprehendit, eas solas ex Dioscoride per ordinem litterarum digestas esse, vid. eius bibl. p. 181. a. 528. a. quod repetit in Catalogo auctorum Trago praefixo. Operum huius auctoris latine editorum et huc pertinentium sequentia possideo a) CAELII AVRELIANI Siccensis tardarum passionum libri V. D. ORIBASII Sardi, Iuliani Caesaris Archiatri, Euporiston libr. III. Medicinae compen. lib. I. Curationum lib. I. Trochiscorum confect. lib. I. Excudebat Henricus Petrus Basileae mense Augusto 1529. fol. pagg. 345. praemiss. cum ind. pagg. 16. Dedicatio docet. IO. SICHARDVM curam huius editionis habuisse. Oribasii opuscula continentur a pag. 243. et liber II. Euporiston inscribitur de virtute simplicium medicamentorum ad EVNAPIVM, p. 255. — 266. vbi vero, praeter recensionem virium plantarum, non nisi nuda earum nomina occurrunt raro per synonyma exposita. b) Alterum exemplar exstat eo in volumine, quod HILDEGARDIS physicam comprehendit, cuius iam Art. II. mentio facta est, cuiusque voluminis integrum titulum prolixum exhibuit Mercklinus p. 332. ad quem iterum breuitatis causa curiosos remitto, et hic solummodo indico, illud a p. 122. ad 233. continere ORIBASII de simplicium, quae medicis praecipue in usu sunt, virtutibus lib. quinque. Quanquam autem haec editio ab illa SICHARDI multum differat, plantarum tamen, quarum vires recenset, iterum non nisi nomina nuda proponit. c) ORIBASII Sardiani Collectorum medicinalium Libri XVII, qui ex magno septuaginta librorum volumine ad nostram aetatem soli peruenerunt. IO. BAPTISTA RASARIO, Medico Nouariensi, (italo) interprete. Venetiis apud Paulum Manutium, Aldi F. s. sine anno. pagg. 750. praemiss. pagg. 8. Continet haec editio*

editio libros priores XV. et libr. XXIII. XXIV. inter quos liber XI. p. 413. ad 463. inscribitur: *Ex Dioscoride de simplicium medicamentorum facultate per ordinem literarum ab A. usque M. et eorundem apparatus*, et liber XII. a p. 463. ad 502. ab N. litera usque ad O. ex quo facile patet, esse hos libros eosdem, quos Gesnerus inspexit, neque vero iisdem ad plantarum cognitionem illustrandam quicquam ab Oribasio additum fuisse; et licet libro I. II. III. IV. VII. VIII. XIV. et XV. plurium vegetabilium pariter mentionem faciat, nulla tamen ex his quoque eorum cognitio hauriri potest. d) Haec et alia adhuc Oribasii Opera a Rasario pariter latine reddita continentur inter *artis medicae principes T. I. n. VI. columnis 683.* ubi etiam col. 592. ad 617. occurrit *liber de virtute simplicium medicamentorum*, quibus a col. 677. ad 683. iunguntur Rasarii annotationes. 23) Silentio praetereundae haud sunt *Annotatiunculae aliquot CORNELII PETRI Leyden. Physici, in quatuor libros Dioscoridis Anazarbei. Experimenta et antidota contra varios morbos. De rebus occultis in natura mirandis, et alia quaedam lectu digna.* Ad calcem: Ioan. Grapheus excudebat, a. 1533. mense Ianuar. Antuerpiae. 8. pagg. 86. sine numeris, praemiss. p. 12. Eundem librum ibidem anno eodem in 12. (error forsitan in forma) excusum ex Falcon. indicat *Segu. p. 54. et 139.* Citatur hic autor quoque a *Kestn. p. 93. §. VI.* et graecae linguae peritus medicus vocatur a *Ioeh. T. III. p. 1474.* Praefatio, Leydae Kal. Dec. 1532. scripta, docet, auctorem hunc codicillum, ut ait, de simplicibus medicamentis ex diuersis veterum et recentiorum voluminibus in compendium retulisse; deinde conqueritur de difficultate descriptiones horum auctorum conciliandi et de medicorum nec non pharmacopolorum praefectorum eo tempore incitia, quam aliquot exemplis probat. Annotatiunculae in Dioscoridem circa synonyma plantarum exponenda versantur, et quamuis haud ubique acu rem tetigerit, legi tamen merentur, quae protulit. Additamenta reliqua nil continent huc pertinens. 24) SYMPHORIVS vel SYMPHORIANVS CAMPEGIVS, CHAMPEGIVS, CAMPERIVS, CHAMPERIVS, CAMPIER et CHAMPIER, Lugdunensis Gallus, Eques auratus seu S. Georgii, Favergiae Dominus et Ducis Lotharingiae Archiater, floruit circa initium sec. XVI. *vid. Gesn. bibl. p. 606. a. Castell. p. 167. Merckl. p. 986. a. Ioeh. T. I. p. 1606.* Ad manus est *Hortus Gallicus, pro Gallis in Gallia scriptus, veruntamen non minus Italis, Germanis et Hispanis, quam Gallis necessarius SYMPHORIANO CAMPEGIO Equite aurato ac Lotharingorum Archiatro Auctore, in quo Gallos in Gallia omnium aegritudinum remedia reperire docet, nec medicaminibus egere peregrinis, quum Deus et natura de necessariis unicuique regioni provideat. Lugduni in aedibus Melchior. et Gasparis Trechsel fratrum 1533. 8. pagg. 83. praemiss. cum ind. pagg. 12.* Huic annexus est *Campus Elysus Galliae amoenitate refertus: in quo sunt medicinae compositae, herbae et plantae virentes: in quo quicquid apud Indos, Arabes et Poenos reperitur, apud Gallos reperiri posse demonstratur: a Dom. SYMPHOR. CAMPEGIO &c. compositus ibid. anno eodem pagg. 135. tit. et ind. p. 8.* In priori libello nonnullae exponuntur plantae officinales ita, ut de earum synonymis, historia et viribus quaedam adducantur; in posteriori vero, (in quo alia adhuc argumenta pertractantur, quae indicat *Merckl. p. 986. b.*) nihil, ut quis ex titulo coniecere posset, huc pertinens reperitur. Quatenam contineant eiusdem *Castigationes seu emendationes pharmacopolarum &c.* (quarum titulum plenum indicat *Merckl. p. 987. b.* et breuem argumentorum recensitionem sinit *Gesn. biblioth. p. 606. a.*) inquirant alii: in mea collectione nondum prostant. 25) CAROLVS STEPHANVS, vel secundum alios STEPHANI, ROBERTI frater, inclaruit primo seculi XVI. dimidio, Medicus Parisiensis simulque Typographus Regius, et non solum plantarum cognitionem, sed et linguae latinae usum illustravit *vid. Gesn. Biblioth. p. 162. b. eiusd. Catal. Maitt. T. III. p. 115. segg. Segu. p. 394. Ioeh. T. IV. p. 815.* Licet opuscula sua botanica, ut ipse monet, puerorum tantum in gratiam conscripserit, plurimarum tamen stirpium non solum nomenclaturas verum etiam descriptiones docte exposuit. Nomen suum nulli eorum praefixit auctor, in omnium vero praefatione professus est. Prodierunt ea, quae possideo, hoc ordine: a) *De re hortensi libellus, vulgaria herbarum, florum ac fruticum, qui in hortis conseri solent, nomina latinis vocibus efferre docens ex probatis authoribus. In puerorum gratiam atque utilitatem Parisiis ex officina Roberti Stephani 1535. 8. pagg. 99. ind. pagg. 13.* b) Eodem titulo, cum hoc additamento: *multo quam antea locupletior factus. Cui nuper additus est alius libellus de cultu et satione hortorum, ex antiquorum sententia. Ibid. 1545. 8. pagg. 125. index a p. 126. ad 141.* c) *Seminarium siue plantarium earum arborum, quae post hortos conseri solent: quarum nomina, fructus, item etiam conferendi vocabula apud authores bene recepta hoc libello declarantur. In puerorum gratiam atque utilitatem, ut post ipsas herbas, etiam arbores cognoscere facile possint. Ad calcem: Excudebat Rob. Stephanus Parisiis 1536. XII. Cal. Iul. 8. pagg. 107. ind. pagg. 17.* d) *Seminarium et plantarium fructiferarum praesertim arborum, quae post hortos conseri solent, denuo auctum et locupletatum. Huic accessit alter libellus de conferendis arboribus in seminario: deque iis in plantarium transferendis atque inserendis, Parisiis ex officina Rob. Stephani typographi Regii 1540. 8. pagg. 193. ind. pagg. 11.* e) Eodem titulo *ibid. 1548. 8. pagg. 180. ind. pagg. 20.* f) *Vinetum. In quo varia vitium, vuarum, vinorum antiqua, latina vulgariaque nomina, item ea, quae ad vitium consitionem ac culturam ab antiquis rei rusticae scriptoribus expressa sunt, ac bene recepta vocabula, nostrae consuetudini praesertim commoda, breui ratione continentur. In adolescentulorum gratiam ac fauorem. Parisiis apud Francisc. Stephanum 1537. 8. pagg. 73. auers. non numeratis. Ind. pagg. 28.* g) *Sylva. Frutetum. Collis. ibid. 1538. 8. pagg. 56. auers. non numeratis. Ind. pagg. 16.* h) *Arbustum. Fonticulus. Spinetum. Ibid. 1438. 8. pagg. 37. ind. pagg. 3.* i) *Pratum. Lacus. Arundinetum. Ibid. apud Sim. Colinaeum et Franc. Stephanum 1543. 8. vid. Segu. p. 395.* hunc enim libellum sigillatim excusum nondum possideo. Prodierunt autem singula haec opuscula iunctim hoc titulo: k) *Praedium rusticum, in quo cuiusvis soli vel culti vel inculti, plantarum vocabula ac descriptiones, earumque conferendarum atque excolendarum instrumenta suo ordine describuntur. In adolescentulorum, bonarum literarum studiosorum, gratiam. Lutetiae apud Carol. Stephanum Typographum regium. 1554. 8. pagg. 648. index vocabulorum latinorum et gallicorum pagg. 48.* Haec editio tum ordine tum copia reliquis praestat. l) Cum praefixo auctoris nomine eodem titulo et his sub finem mutatis: *Opus Medicis, Pharmacopolis, Agricolis, caeterisque germanae latinitatis studiosis perutile. Indice triplici ad maiorem facilitatem locupletatum. Parisiis apud Francisc.*

Francisc. Pelicanum 1629. 8. pagg. 599. index illo prioris edit. copiosior pagg. 82. m) Praeter hoc opus prostat adhuc alius in eo non contentus de latinis et graecis nominibus arborum, fruticum, herbarum, piscium et avium liber, quem nondum vidi, licet ab a. 1536. saepius recusum fuerit: vid. Maint. T. II. p. 837. III. p. 380. 402. 637. 711. V. P. II. p. 258. Segu. p. 187. n) Praedium rusticum, quod Stephani gener, IO. LIEBAULT, Med. Dr., gallico sermone tituloque *Agriculture et Maison rustique* in publicum saepius que auctius edidit, quodque etiam in germanicam linguam traductum prostat, silentio praetereo: quia non solum altero demum seculi XVI. dimidio comparuit, verum etiam penitus mutatum fuit. 26) Quae in AETIO interpretando praestitit IO. BAPT. MONTANVS, Veronensis et Paduae Medicinae Professor, data occasione iam indicata sunt Art. XIV. n. 19. b. 27) IO. RVELLII de natura stirpium libri II, qui a. 1536. primum prodierunt et quorum aliquot editiones in Catalogo I. indicatae sunt, rei herbariae cognitionem largissime emendarunt. Ceterum conf. huius articuli numerum 5. h. 28) Post varias PAVLLI AETIIque operum interpretationes iisdem operam suam quoque adhibuit OROSCIVS seu de HOROZCO vel HOROSCO aut OROSCO, Graecae linguae peritus criticus et in Gymnasio Salamanticensi Medicinae Professor celeberrimus, qui floruit primo seculi XVI. dimidio, vid. Gesn. biblioth. p. 167. b. Merckl. p. 178. b. (vbi secundum Wolff. Iusti chronol. Med. perperam affirmatur, eum iam a. 1456. inclavisse) Kestn. p. 105. Ioech. T. II. p. 1715. conf. art. XIV. n. 22. Primum comparuerunt a) Annotationes in interpretes PAVLI AEGINETAE, CHRISTOPHORO OROSCIO Authore. Nunc primum in lucem editae ac summa diligentia excusae. Venetiis in officina Lucae Antonii Iuntae 1536. fol. pagg. 88. praemissa pagg. 6; inter quae dedicatio Salmanticae calendis Martii et praef. ibid. XVI. Cal. Nov. 1533. scripta. Posteriores annotationes in interpretes PAVLI AEGINETAE, CHRIST. OROSCIO Authore. Additis castigationibus in sextum librum. Ad calcem: ibid. 1536. mense Aprili. pagg. 16. Praefatio docet, his annotationibus occasionem dedisse Alb. Torini et Io. Guntherii Andernaci interpretationes (vid. art. XIV. n. 4. 5. 6.) emendationes vero factas esse ex collatione vetustissimorum tum Pauli tum Oribasii codicum graecorum a praeceptore suo Pinciano communicatorum, consultis simul Galeni operibus. Deinde rationem reddit, cur eas alibi, Venetiis nempe, excudendas curauerit, ob prelorum nempe in Hispania tunc temporis adhuc inopiam. Quum Paulus, quicquid de stirpibus Libro VII. retulit, vel ex Galeno vel ex Oribasio mutuatus est, Oroscius vero aequae, ac reliqui interpretes, de genuina tantum eius translatione sollicitus fuit: facile patet, ex his plura, quam ex ipso fonte, ad earum cognitionem pertinentia hauriri non posse. Omne ergo, quod hac ratione praestitit Oroscius, eo redit, ut saepius stirpis nomen, cuius vires laudantur, corrigat. b) Sequutae sunt Annotationes in interpretes AETII medici praeclearissimi: D. CHRISTOPH. OROSCIO authore. Vnatum latinarum et graecarum dictionum ac rerum, quae in iis annotationibus continentur, locupletissimo indice. Ad calc. Basileae in officina Roberti Winter, mense Martio 1540. 4. pagg. 341. Praemiss. pagg. 12, inter quae dedicatio Salmanticae XII. Cal. Martii et praef. ibid. a. 1538. data. In dedicatione A. ipse indicat, se iuuenem vix vigesimum primum annum egressum, castigationes in interpretes Pauli Aeginetae composuisse (conf. Ioech. T. II. p. 1715.) ex quo, cum praefatione eiusdem operis a. 1533. data collato, dubio caret, eum a. 1512. natum esse. Praefatio monet, has Aetii correctiones oppositas esse Io. Bapt. Montani et Iani Cornarii interpretationibus (vid. art. XIV. n. 19. a. b. c.) idque potissimum ope vetustissimi codicis graeci iterum a Pinciano communicati. Ceterum de hoc auctore idem valet, quod de Paulo monui, nempe omnes interpretes pariter nonnisi in fidam eius translationem operam posuisse. 29) IO. RODRIGVEZ DE CASTEL BLANCO Lusitanus, circa seculi XVI. medium Ferrariae medicinam professus nomine AMATI LVSITANI magnam consequutus est famam, vid. Castell. p. 245. Merckl. p. 34. b. Tournes. Isag. p. 27. (vbi homo temerarius et indoctus inanis gloriae avidus audit) Segu. p. 3. 33. 54. Ioech. T. I. p. 330. Quae huc pertinentia edidit, sunt a) Index DIOSCORIDIS. Eiusdem historiales campi cum expositione IO. RODERICI CASTELLI ALBI Lusitani. Antverpiae apud viduam Martini Caesaris 1536. fol. vid. Gesner. in praefat. ad Valer. Cordum: vbi etiam indicat, hoc opus continere commentarios in duos tantum priores Dioscoridis libros: conf. Segu. p. 54. Ipse hanc editionem non possideo. b) In DIOSCORIDIS Anazarbei de medica materia libros quinque enarrationes eruditissimae doctoris AMATI Lusitani, Medici ac Philosophi celeberrimi, quibus non solum officinarum seplasiarum, sed bonarum etiam litterarum studiosis utilitas adfertur, quum passim simplicia graece, latine, italice, hispanice, germanice et gallice proponantur. Venetiis ap. Gualth. Scotum 1553. 4. pagg. 514. praemiss. pagg. 12. ind. graec. et latin. pagg. 30. c) Eodem titulo Argentorati excud. Wend. Ribelius 1554. 4. pagg. 536. praemiss. pagg. 12. ind. graec. lat. et germ. pagg. 56. d) AMATI Lusitani Medici ac Philosophi celeberrimi in DIOSCORIDIS Anazarbei de medica materia libros quinque enarrationes eruditissimae. Quibus etiam tum simplicium medicamentorum nomenclaturae graecae, Latinae, italicae, hispanicae, germanicae et gallicae proponuntur: tum errores aliorum omnium, qui ad hunc usque diem de hac materia scripserunt, improbantur. Cum rerum ac vocum memorabilium indice locupletissimo. Venet. ex officina Iordani Zilleti 1557. 4. Haec editio primae (b) paginis respondet. e) In DIOSCORIDIS Anazarbei de medica materia libros quinque AMATI Lusitani Doctoris Medici ac Philosophi celeberrimi enarrationes eruditissimae. Accesserunt huic operi, praeter correctiones lemmatum, etiam adnotationes R. CONSTANTINI, nec non simplicium picturae ex Leonharto Fuchsio, Iacobo Dalechampio, atque aliis. Lugduni apud Matthiam Bonhomme, excud. bat vidua Balthazaris Arnoletti 1558. 8. pagg. 807. praemiss. cum indice latino pagg. 76. figg. plant. 363. animal. 15. Ad calcem annexae sunt icones, numero triginta, stirpium nondum delineatarum, quarum vires in hoc Dioscoridis libro expressae sunt, ut ex libris et enarrationibus annotatis patebit. Praefatio brevis his iconibus praefixa monet, eas ad exemplar a DALECHAMPIO acceptum caelatas esse. Sunt autem harum nonnisi octo, quae inter praecedentes non reperiuntur, omnes autem exiguae et viles Fuchsianaeque illae ipsae, quae art. X. n. 9. notatae sunt. CONSTANTINI annotationes sunt raras, eiusdem vero nomenclaturae auctae frequentiores. Epistola, quam adiecit et DALECHAMPIO inscripsit, annotationes, quas extemporales dicit, ob temporis

a typographo concessi angustiam excusat. Ceterum omnibus his editionibus (b. c. d. e.) eadem praemittitur praefatio AMATI Romae d. XV. Maii 1551. scripta, qua ipse monet, se iam annis ab hinc quindecim Antverpiae commentaria in primum et secundum Dioscoridis librum edidisse. Quod ad plantarum descriptiones attinet, sunt illae valde ieiunae. 30) ANTONIVS MVSA BRASAVOLVS Ferrariensis et Ferrariae Ducis Medicus, ab ANTONIO MVSA veteri illo Romano (vid. artic. XIV. n. 14. a. b.) probe distinguendus, a. 1500. natus et omnium facultatum Doctor a. 1555. mortuus, variis opusculis, quibus errores circa pharmaca tum simplicia tum composita tunc adhuc communes corrigere allaboravit (vid. Merckl. p. 77. b. Tournes. Isag. p. 25. Segu. p. 232. Kestn. p. 311. nota q. p. 536. §. VIII. p. 643. §. 10. Ioach. T. I. p. 1338. inclauit et hodie adhuc in pretio habetur (conf. Gesn. bibl. p. 62. b. Kestn. locis cit.): obtinebat tamen iam synchronum censorem, Aloys. Mundellam (de quo mox. no. 32. plura) et Ioseph. Scaliger eum appellare solebat ineptae plebis medicorum cymbalum: vid. Tournes. l. c. Ex suis operibus huc praecipue pertinet *Examen omnium simplicium medicamentorum* &c. quod primum prodit Romae apud Ant. Bladum de Asula 1536. fol. vid. Gesn. Biblioth. p. 62. a. (vbi brevis iam additur recensio) Segu. et Kestn. l. c. postea vero saepius recusum est vid. Merckl. et Segu. l. c. Editiones, quas ego possideo, sunt a) ANTONII MVSAE BRASAVOLI Ferrariensis, *Examen omnium simplicium medicamentorum, quorum in officinis usus est. Additae sunt insuper ARISTOTELIS Problemata, quae ad stirpium genus et oleracea pertinent. Lugduni apud Io. et Francisc. Frellaeos fratres. 1537. 8. pagg. 529. Aristot. probl. p. 530 — 542. praemiss. pagg. 24. ind. pagg. 13.* Auctoris dedicationi praefigitur alia IO. ARGENTERII, cuius cura opus hoc secundum exemplar Romanum recusum est, et, ut typographi praefatio indici praefixa monet, castigatum et marginalibus annotationibus auctum. b) Eodem titulo, omittis Aristot. probl. his vero additis: *Opus perinsigne et medicinam facientibus perutile ab ipso authore recognitum et auctum. Cum indice locupletissimo. Ad calcem: Lugduni excudebant Io. et Franc. Frellonii fratres 1546. 12. pagg. 862. ind. pagg. 57.* Est hoc opusculum colloquium inter Brassauolum, pharmacopolam senem, et herbarium, quos ille de erroribus, quos committunt, instruit. Praeter hoc opus idem auctor composuit *Examen omnium syruporum* ut et *Examen omnium catapotiorum vel pilularum*, vbi ut Gesner, l. c. iam obseruauit, et de simplicibus pharmacis quaedam differuntur, quae in libro de examine simplicium non satis discusserat; sed breuitatis causa haec et reliqua (nempe *examen omnium lochi. e. linctuum, suffus. i. e. puluerum, aquarum, decoctionum, oleorum; omnium electuariorum, puluerum et confectionum cathartorum; omnium trochiscorum, unguentorum, ceratorum, emplastrorum cataplasmatumque et collyriorum; de medicamentis tam simplicibus quam compositis catharticis*) praetereo, licet vna et altera eorum editio ad manus sit: quas Merclin. l. c. indicat. 31) FRANCISCVS MASSARIVS (MASSARIA Ioach. T. III. p. 265.) Venetus, Philosophus et Medicus eruditissimus floruit primo seculi XVI. dimidio (vid. Merckl. p. 290. a. Ioach. l. c.) ingenii sui acumen ut et multae lectionis propriaeque experientiae vires (conf. Gesn. biblioth. p. 251. b.) satis probauit hoc libro: a) FRANCISCI MASSARII Veneti in nonum PLINII de naturali historia librum *Castigationes et Annotationes. Quisquis de natura Aquatiliū ac remotiore piscium cognitione edoceri cupis, hunc Massarii Commentarium eme et lege. Admiraberis laborem et ingenium hominis candidissimi, qui longe maximam operam in his indagandis, ut studiosi iuuarentur, insumpsit. Ad calcem: Basileae ap. Hier. Frobenium et Nic. Episcopium a. 1537. mense Martio, 4. pagg. 367. Praemiss. pagg. 16. ind. pagg. 15.* b) Eodem titulo Parisiis ex officina Mich. Vascosani 1542. 4. pagg. 136. ob typum minorem, praemiss. pagg. 8. sed sine indice, quem Episcopus conficiendum curauit. Vtrique editioni praefixa est praefatio Beati Rhenani sub calendas Februarias 1537. data, atque auctoris sine die et consule. Ex inscriptione eundem haud patet, cur huic catalogo inferendus veniat hic liber; sed non solum Gagner l. c. iam obseruauit, auctorem cap. 39. multa erudite de plantis nonnullis differuisse, verum etiam eiusmodi specimina subinde aliis locis intersperfit ex indice facile reperiunda, ob quae Gesnerus merito dolet, eum, morte praeuentum immatura, absolueri haud potuisse suos in reliqua Plinii volumina commentarios, ad quos se accincturum esse ipse auctor in sua praefatione his indicat verbis: — *in reliqua Plinii volumina eodem modo et accuratiori fortasse studio ac diligentia, si diuina fauerint, persequemur, praesertim in simplicium materia, in qua magis quam in reliquis laborandum esse censemus, tum in plantis ipsis notificandis, tum etiam in aliorum erroribus confutandis, qui pene innumerabiles esse videntur.* Ceterum Seguerius non solum p. 147. has indicat editiones, verum etiam ab eodem p. 145. ex biblioth. Reg. Paris. citantur Plinii libri II. de Piscibus a FRANC. MASSARIO Veneto explanati: quibus accessit OPIANI Poetae Halieuticon &c. Argentinae ap. Iacob Camerarium Camerlande 1534. in 4. quae editio antiquior quousque differat ab indicatis, indicent alii. 32) Eodem tempore inclauit ALOYSIVS MVNDELLA primum Medicus Brixienis, deinde Romae botanices Professor, tandem Paduae Praefectus horti medici recens fundati (Ioach. T. III. p. 754.) vir doctissimus: vid. Gesn. biblioth. p. 30. a. Merckl. p. 30. b. Tournes. Isag. p. 45. Kestn. p. 292. §. II. Hic edidit Epistolas medicinales &c. et annotationes in Ant. Musae Brassauolae simplicium medicamentorum. examen Basileae ap. Mich. Isingrinium 1538. 8. et ibid. ap. eund. 1543. in 4. vid. Merckl. p. 31. a. Kestn. l. c. (qui titulum plenum exhibent) Segu. p. 283., quae editiones nondum ad meas peruenerunt manus; adest vero alia hac inscriptione: ALOISII MVNDELLAE Brixienis Medici clarissimi et acutissimi Epistolae medicinales, nunc ab ipso autore auctae et recognitae: in quibus variae et difficiles quaestiones utiliter tractantur: Galeni atque aliorum medicorum loci obscuri et implicati illustrantur et explicantur: quae quidem omnia omnibus verae et incorruptae medicinae studiosis tum utilissima tum necessaria sunt. Eiusdem annotationes in ANTONII MVSAE BRASAVOLAE simplicium medicamentorum examen. Basileae apud Mich. Ising. sine anno. 8. pagg. 655. Examen simplic. apag. 504. ad finem, praemiss. cum ind. pagg. 32. Hanc editionem auctam non inueni citatam, nisi in Catal. bibl. Ruin. p. 248. n. 2272. vbi vero annus 1538. ei adscribitur, procul dubio ex eo, quia ad calcem examinis simpl. subscriptus est annus 1538; sed hic indicat tantum illum, quo haecce appendix epistolae formae ad Brassauolum (quem Illustriss. Principis Herculis Estensis Ferrariae Ducis Medicum salutatur) Brixia tertio Cal. Ianuarii scripta est: quum enim singulis epistolis subscriptus sit dies et annus, quo exaratae sunt, patet inde, hanc editio-

editionem multo ferius recusam esse: ipsae epistolae tamen ordine chronologico haud locatae sunt. Secundum hanc notam scripta est epist. 11. 15. anno 1537. Ep. 1. 2. 3. 7. 8. 9. 10. anno 1538. Ep. 21. 22. anno 1539. Ep. 5. 6. 12. 13. 14. anno 1540. Ep. 16. 17. 18. 19. 23. anno 1541. Ep. 20. anno 1542. Ep. 26. 34. anno 1543. Ep. 25. 28. 29. anno 1544. Ep. 27. 30. anno 1545. Ep. 31. 33. anno 1546. Ep. 32. anno 1547. Ep. 35. 36. anno 1548. Ep. 4. 24. anno 1549. Ad primam ergo editionem anni 1538. praeter examen simplicium nonnisi nouem harum epistolarum referri possunt, et secunda a. 1543. recusa (quam Gesnerus l. c. indicat et singularum epistolarum argumenta recenset) viginti duas tantum continet, huic vero tertiae decem et quatuor reliquae (sunt enim earum 36.) ab anno 1543. ad annum 1549. scriptae accesserunt. Num editio a. 1556. in 4. iterum recusa, cuius Segn. l. c. mentionem facit, contentorum ratione ab hac differat, aliis indicandum relinquo. Addo his, ipsas epistolas etiam continere argumenta botanica, quae varia illustrant tunc temporis obscura, praecipue in designandis plantis, quibus vires et nomina a veteribus tradita competunt, licet, ex Tournefortii l. c. sententia, ad rem herbariam hodie parum conferant. 33) SYMEON (SIMEON et SIMON) SETHVS Antiochenus et Antiochiae Magister, barbaris graecis accensendus, vixit altero seculi XI. dimidio, vid. Merckl. p. 970. a. Ioech. T. IV. p. 536. Duos composuit libros graece scriptos: vnus est *Lexicon botanicum graeco-barbarum*, quod vero nondum typis excusum est; eius tamen aliquot exemplaria manuscripta asseruantur Vindobonae in bibliotheca Caesarea vid. Dan. de Nessel Catal. P. III. p. 35. Codex XXV. n. 1. p. 37. Cod. XXVII. n. 3. et p. 44. Cod. XXXII. n. 4. Alter liber (cuius codex graecus prostat ibid. p. 46. XXVI. n. 2. p. 51. XLV. n. 4. et P. IV. p. 109. Cod. CXCII. n. 6.) de cibariorum facultate graece et latine interprete GIRALDO prodiit ap. Mich. Isingrinium Basil. 1538. 8. vid. Gesn. biblioth. p. 605. b. Merckl. l. c. ubi plenus titulus, et conf. Maith. T. V. P. II. p. 243. Meum exemplar omisso textu graeco longe ferius impressum prodiit hoc titulo: SIMEONIS SETHI Magistri Antiochiae *Syntagma per elementorum ordinem, de alimentorum facultate ad Michaellem Ducam Imperatorem a LILIO GREGORIO GIRALDO Ferrariense olim latinitate donatum: nunc vero per DOMINICVM MONTESAVRVM Veronensem correctum et pene reformatum*. Basileae ap. Petr. Pernam 1561. 8. pagg. 144. index pagg. 14. Aliam adhuc editionem graeco-latinam a MARTINO BOGDANO emendatam et Parisiis 1658. 8. impressam indicat Merckl. l. c. et Norffel p. 51. qui addit, operae pretium adhuc esse, has editiones cum codice MSto Caesareo diligenter conferre. Huius libri mentio hic propterea facta est, quia 95. circiter capita agunt de vegetabilibus, sed adeo frigide, ut semper in paruo pretio fuerit hoc opusculum. vid. Freind. hist. med. edit. Gall. p. 105. latin. p. 157. Kestn. p. 711. nota a. et p. 721. nota c. Annotauit Gesnerus biblioth. p. 513. a. occasione Mich. Pselli ex Giralaldi praefatione in suam Sethi editionem (quae praefatio in mea editione omissa est) sequentia: *de eadem ferme re et facultate ad Constantinum, huius, ut puto, Mich. Ducae parentem, Michael Psellus libellum ante scripserat, cuius est exemplum apud Meletium Graecum totius Medicinae scriptorem, non eodem modo argumento, sed iisdem interdum pene verbis. Hunc ergo Symeonem, multis licet in locis deprauatum et mancum, latine quoquo modo verti, adiutus imprimis ipsius Pselli libello, tum eiusdem altero a Georgio Valla pessime conuerso. conf. Freind. et Ioech. l. c.* Prostat haec quoque Pselli (qui Setho paucis annis senior fuit vid. Freind l. c. et cuius codex graecus MStus etiam in bibliotheca Caesarea prostat vid. Nessel. P. III. p. 46. P. IV. p. 109.) editio in mea collectione hoc titulo: PSELLI de victus ratione ad Constantinum Imperatorem libri II. RHAZAE, cognomento Experimentatoris, de Pestilentia liber. GEORGIO VALLA Placentino interprete. IO. MANARDI Ferrariensis medici, in artem GALENI medicinalem luculenta expositio. Ad calcem: Basileae in aedibus Andreae Cratandri mense Iulio 1529. 8. pagg. 171. praemiss. p. 8. sed Pselli opusculum ad pagg. 37. tantum se extendit. Hoc cum illo Sethi collato, conuenientiam memoratam neque in ordine neque in ipsa expositione deprehendi: Sethus enim non solum longe plura simplicia nominat, verum etiam multo prolixius de eorundem vsu differit, id quod iam ipsa vtriusque libelli moles diuersa indicat. Quae inter se conueniunt, procul dubio vterque nonnisi compilator ex iisdem fontibus hausit. Addit his Gesner. l. c. p. 605. b. Sethum vocabulis quibusdam cibariorum sui temporis vsu esse, quae apud veteres graecos non reperiuntur. 34) REMACLVS FVSCH et FVSCHIVS (ita legitur in quibusdam eius opusculis, quae ad manus sunt, nonnullis tamen praefigitur tantum. REMACLVS F. alii scribunt FVCHS vid. Merckl. p. 934. b. Kestn. p. 28. §. III. Ioech. T. II. p. 792.) Lymburgensis seu Leodicensis, Canonicus et Medicus ibidem obiit a. 1587. vid. Merckl. l. c. Segn. p. 70. Ioech. l. c. Plura eius opuscula eorumque varias editiones indicat Merckl. l. c. et quae huc pertinent Segn. l. c. Ex his autem tantum possideo illud, quod inscribitur *Plantarum omnium quarum hodie apud pharmacopolas vsus est magis frequens Nomenclaturae iuxta Graecorum, Latinorum, Gallo. Ital. Hispan. et German. sententiam, per REMACL. FVSCH a Lymborch iam nouiter collectae*. Parisiis ex officina Dionysii Ianotii 1544. in 12°. pagg. 68. sine numeris. Cl. Seguierius indicat ex biblioth. Maz. editionem ibidem apud eundem 1541. in 8. Mercklinus vero anno eodem ibid. apud Gorbinum in 4. et duas alias. Addit Gesnerus biblioth. p. 581. a. aliam Venetiis 1542. in 16°. ubi haec huius libelli censura: *libellus refertus plurimis mendis quod ad orthographiam, et interpretationibus falsis, ut cum Pedem columbinum herbam speciem Anagyris arboris dicit, et alia multa absurdissima. Videntur esse collectanea ex Ant. Brassauoli opere de simplicibus pharmacis vsitatis, quod ad variarum nationum nomina. Est omnino nil aliud, quam catalogus aliquot nominum absque iudicio collectorum, et germanicorum corruptio docet, hunc auctorem Germanis, ut plerumque fit, non esse accensendum.* 35) IACOBVS SYLVIVS vel DV BOIS, natus Ambiani in Picardia a. 1478. (non anno 1492. secundum Mercklin. p. 496. et Segn. p. 304.) Parisiis magni medici famam consequutus est et obiit ibidem a. 1555. vid. Gesn. bibl. p. 363. b. Renati Moraei vita Syluii huius operibus Geneuae 1635. in fol. editis praefixa, Kestn. p. 219. §. X. p. 640. §. VIII. Ioech. T. IV. p. 965. Ex scriptis eius (praeter Commentarium in Mesuen, vid. huius artic. XVI. n. 1. f. g. k. l.) huc pertinent a) *Methodus medicamenta componendi, ex simplicibus iudicio summo delectis, et arte certa paratis: quatuor libris distributa. Authore D. IACOBO SYLVIO medico. Indice adiecto copiosissimo. Parisiis ap. Christian. Wechelum 1541. fol. p. 206. praemiss. cum ind. pagg. 22. Mercklinus p. 498. b. omittit hanc editionem et indicat aliam eodem titulo ibid. anno eodem ap.*

Andr. Wechelium in 8. an ex errore formae? b) *Eodem titulo Lugd. ap. Io. Tornaesium et Guil. Gazeium* 1548. 8. pagg. 372. ind. pagg. 22. Hanc quoque editionem omittit *Merckl. l. c.* et aliam *ibid. ap. eund.* sed a. 1584. in 8. citat, an ex numerorum transpositione? c) *Eodem titulo Lugd. ap. Guil. Rouil* 1549. in 12. pagg. 680. ind. pagg. 38. quam editionem *Merckl. l. c.* pariter non indicat. Huius operis Lib. I. ad p. 47. agit de medicamentorum simplicium natura et explicat circiter 228. genera radicum, herbarum, florum, seminum, fructuum, lignorum, corticum, succorum aliorumque ex vegetabilibus productorum; plurima autem ex Galeno ceterisque veteribus congesta, simul tamen bene digesta, nonnullaque ex propria observatione addita sunt, omnia autem parum ad ipsarum plantarum cognitionem conferunt, in synonymis tamen legitimis eruendis et speciebus distinguendis multum desudauit. d) *De medicamentorum simplicium delectu, praeparationibus, missionis modo, libri tres*, IACOBO SYLVIO medico auctore. Parisiis per Iac. Gasellum 1542. fol. pagg. 60. auers. non numeratis, praemiss. pagg. 8. Huic editioni formam 8. iterum adscribit *Merckl. l. c.* In hoc quoque opere recensio simplicium quasdam distinctionis notas subinde docet.

XVII. Sed vela nunc contraho forsitan nimis diu expansa. Pauca tamen haecenus allatis addenda habeo. 1) Opera, quae Germani in rei herbariae emolumentum ad annum 1550. usque publicarunt, conquiesci et articulis XIV. prioribus enumeravi omnia, quotquot in tumultuaria hac disquisitione vel abs me collecta reperire vel ab aliis annotata obseruare potui, adeoque et illa, quae nondum ad manus meas peruenerunt; quaedam tamen, e. gr. GEMVSAEI, CORNARII, GESNERI &c: articulo XVI, qui aliarum nationum lucubrationes eidem studio dicatas exponit, propter nexum cum illis inserta reperiuntur. Nonnulla me omisisse, facile concedo; mihi ipsi postea occurrerunt sequentia: a) PAVLI AEGINETAE *pharmaca simplicia*, OTT. BRUNFEL. SIO interprete. *Idem de ratione victus* GVIL. COPO Basiliensi interprete. Argentor. apud Ge. Vltricher Andlanum 1531. 8. vid. *Merckl. p. 861. b. et 866. a. Segu. p. 290.* Paris. apud Chr. Wechel 1532. 8. vid. *Bibl. Riv. Cat. no. 5676.* ipsum autem librum nondum vidi. b) *Apparatus et delectus simplicium medicamentorum. De compositione medicamentorum secundum genera, ex PAVLO AEGINETA. De compositione medicamentorum secundum genera uniuersalis methodus, ex GALENO.* Omnia nunc primum aedita, cum Medicis tum Pharmacopolis omnib. apprime necessaria, auctore CONRADO GESNERO Tigurino. Lugduni apud Jo. et Francisc. Frellonios fratres 1542. 8. pagg. 275. praemiss. cum ind. pagg. 20. Epistola dedicat. scripta est Lugduni in peregrinatione 1541. Idib. Ian. Simplicium medicamentorum, tum vegetabilium tum aliorum, catalogum literarum ordine scriptum et ex *Dioscoride ac Mesuae* ea parte, quam *Io. Tagautius* (vel *Tagaultius* vid. *Merckl. p. 690. a*) edidit, collectum comprehendunt p. 3. — 116. c) *Enumeratio medicamentorum purgantium, vomitoriorum et alium bonam facientium, iuxta ordinem alphabeti* CONR. GESNERO auctore. Hac inscriptione peculiari primum prodierunt paginae 28. sine numeris annexae *examine omnium catapotiorum vel pilularum Antonii Musae Brasauoli*, quod *ibid.* apud eosdem a. 1544. in 8. excusum est; sed haec enumeratio nuda tantum continet remediorum nomina, addita eorum virium recensione. 2) In exterorum operibus articulo XVI. recensitis, ne praeter necessitatem nimis prolixus fierem, silentio praeterii opera omnia, quorum nullam hucusque possideo editionem: barbarorum quoque plura consulto omisi, e. gr. ARNOLDI VILLANOVANI, IO. MICH. SAVANAROLAE &c, quia in his nil nisi nuda simplicium nomina reperiuntur: forsitan nec in reliquis, quae nondum vidi, laudabiliora extant: certe praecipue celebratum *Speculum quadruplex, naturale, doctrinale, morale, historiale* &c. IV. et VI. Voluminibus in folio saepius excusum VINCENTII Galli, quem alii *Belluacensem* alii *Burgundum* cognominant (cuius quatuor editiones a. 1473. 1481. 1484. et 1494. pluresque partium eius sigillatim reculsarum indicat *Mart. T. V. P. II. p. 324.* contentorum vero recensione exhibet *Gesn. Biblioth. p. 624. b. seqq.*, et eorum, quae ad medicinam spectant, vnicuique titulo pleno *Merckl. p. 1043. seqq.* vbi editio aucta et illustrata a. 1624. citatur, ad rem herbariam vero sigillatim pertinentium *Segu. p. 203.* vbi editio a. 1476. additur) ex aliis auctoribus tantum compilatum est, quod auctor ipse in praefatione (cuius particulam excerpfit *Gesn. l. c.*) fatetur. Quum Celeberr. D. D. IO. GESNERVS haud ita pridem primam MATTHIOLI operis editionem cum CONR. GESNERI manu adscriptis notis alium in finem Tiguro beneuole mecum communicauit, eam silentio praeterire nequeo. In Tituli plagula mutilata haec tantum supersunt: *Il DIOSCORIDE dell' excellentissimo medico M. P. ANDREA MATTHIOLO coi suoi discorsi — con l'aggiunta del Sesto libro* — qui titulus apud Cl. SEGVIERIVM p. 120. sub *Matthioli* nomine ex *Biblioth. Reg. Par.* paucis verbis mutatis, ita legitur, *Il DIOSCORIDE con li suoi discorsi, aggiuntovi il sesto libro de gli antidoti contra tutti i veleni. In Vinezia. Valgrisi 1548. et 1549.* in 4. sine iconibus. Exemplar, quod ad manus est, figuris omnino caret. Quinque libri constant pagg. 755. cum praemiss. epist. dedic. d. X. Aug. 1548. scripta, indice et reliquis pagg. 60. Sexto autem libro hic peculiaris titulus praefixus est: *Il Sesto libro di Pedacio Dioscoride Anazarbeo, in cui si tratta de i rimedi de i ueleni mortiferi, tanto preseruatiui, quanto curatiui; tradotto, et commentato in lingua uolgare Italiana da M. PIETRO ANDREA MATTHIOLO Sanese Medico. In Vinegia alla bottega d' Erasmo, appresso Vincenzo Valgrisi 1548.* pagg. 128. ind. pagg. 6. Editiones plures iconibus illustratas et ab a. 1554. repetitis vicibus auctas indicaui in catalogo I. antecedente. Huic viro multum debet studium botanicum emendatum, licet copiosis grauibisque naeuis haud careat. 3) Editiones operum varias, quotquot earum ipse possideo, propterea addidi et plerumque notauit, quae inter se vel conueniunt vel differunt, ut unusquisque certior fieret, num illa, quam possidet, auctior aut emendatior proset, ob quam causam interdum adieci eas quoque, quae post terminum praefixum in publicum prodierunt. Omnium recensione atque collationem eadem ratione, qua illas articulis XII. prioribus suscepi, lubens quidem continuassem, nisi tempus opportunum defecisset. Qui de meritis horum auctorum plura scire desiderat, adeat Ill. D. de HALLER opus praeclarum, quod anno superiori Amstelodami sumptibus *Jacobi a Wetstein* prodit hoc titulo: *HERMANNI BOERHAAVI viri summi suae Praeceptoris Methodus studii medici emaculata et accessionibus locupletata ab ALBERTO AB HALLER. Med. et Ph. D. Anat. Chir. Bot. in Georg. Aug. P. P. O. Consiliario Aul. et Archiatro Reg. et Elect. Praeside Regiae Societ. Scientiar. Gotting. Acad. Caes. Natur. Curios. nec non Regg. Soc. et Acad. Britann. Boruss. Suecic. et Ipsal. Sodali, Reip. Bern. in Supr. Senatu CCviro. Tomus primus: si citius ad me peruenisset, haud neglexissem, ubique*

que eius mentionem facere. 4) Ut ordinem chronologicum profequi potuerim, primam semper omnium operum editionem ex aliis autoribus nominatis indicare studui, ubi mea collectio deficiebat; articulo III — VI. vero reliquas quoque editiones, quibus adhuc careo ex laudato SEGVIERIO praecipue collegi, hanc sigillatim ob rationem, in praefatione iam indicatam, ut palam fieret, quoties opera ibidem recensita botanica primum in Germania excusa, quae nunc merito exhibantur, ob meliorum defectum, recusa fuerint. Eandem ob rationem hic addere liceat sequentem librum, qui interea ad me peruenit: *Plantarum, arborum, fruticum et herbarum effigies, numero octingentae, ad viuum depictae, cum earundem propriis sex linguarum, videlicet Graecis, Latinis, Italicis, Gallicis, Hispanicis, et Germanicis nomenclaturis.* Baeume, Stauden, Kreuter, Frucht, in die acht hundert, eygentliche Conterfeytung, Samt derselbigen in sechserley Sprachen rechte Namen, letzt von neuem gantz fleissig und ordentlich zusammen gelesen und beschrieben. Cum indice sex-tuplici accurato. Franc. apud haered. Chr. Egen. 1562. 4. pagg. 391. index pagg. 27. Continet eodem ferme ordine easdem icones absque vlla descriptione, quas Herbarii Germanici editio artic. IV. no. 17. et 18. recensita sistit, additis quibusdam eiusdem plantae figuris in prioribus editionibus exhibitis, Accesserunt *Animalium terrestrium, Volatilium, et aquatiliu effigies ad viuum depictae unacum eorundem Latinis et Germanicis nomenclaturis.* Gethier, Fisch, und Geflügels allerhandt, sam und vildt, in Lust, Wasser und Erdrich wvonnende, mit sampt iren mancherley Nomenclaturen und Namen, Latein und Teutsch, gar artlich abconterfeyt und fergemaler. *ibid.* 1562. pagg. 19. Vbi iterum nonnisi figurae illae vilissimae et maximam partem valde exiguae Herbarii Germanici editionis citatae denuo exhibentur. Hae et illae stirpium icones pigmentis perquam rudi penicillo obductae sunt. 5) Articulo XIV. et XVI. omnium editionum, quas ipse possideo, titulos plenos descripsi (in antecedentibus non ubique idem obseruavi tempori et spatio tunc magis parcens) quia plerumque de pretio, quo editionis tempore erant, testantur, atque interdum brevis recensitionis vices praestant, nec non de editionum differentiis curiosos reddunt certiores. Propterea vero saepius occurrunt tituli operum et eiusdem et alius auctoris vno volumine editorum, quae huc non pertinent; iis tamen in operibus, quae in aliquot tomos vel sectiones peculiaribus titulis distinguuntur, e. gr. Galeni Auicennae &c., eos, qui de alienis tractant, consulto praeterii. 6) Molem seu paginarum numerum cuiusvis libri pariter indicaui, quia hanc notam nonnulli etiam desiderant. Iis in libris, qui paginarum numeris carent, folium et charta mihi vnum idemque est et duas formae paginas indicat. Hoc ut moneam necesse est, quia haud raro ex Gesneri bibliotheca quasdam editiones citavi chartarum numero definitas, postea vero animaduerti, ipsi chartam idem esse, quod vulgo plagula vocatur et formae in folio sic dicto quatuor, in quarto octo &c. paginas comprehendit: ergo e. g. art. XVI. no. 7. Jac. de Dondis operis exemplar chartarum 142. a Gesnero indicatum et meum chartarum 284. vnius eiusdemque est molis, forteque vna et eadem quoque editio. 7) Quum saepius citavi *Gesneri Catalogum Auctorum botanicorum* cum Tragi herbario (art. IX. n. 3.) excusum: addo hic, eundem recusum extare in PASCHALIS GALLI Bibliotheca medica Basileae 1590. in 8vo edita p. 369. ad p. 449. 8) Vtinam pro commodiori vsu harum phylarum paginis numerus adpressus et singulorum operum eorumque editionum tituli separatis paragraphis distincti fuissent, quod ab initio, ubi huic instituto paucae tantum paginae destinatae erant, minus necessarium videbatur. Cui ergo hac opella vti lubet, calamo adscribat paginis numerum incipiendo a prioris Catalogi pagina prima, et simul addat Catalogi posterioris marginibus superioribus articulo, lateralibus vero operum singulorum vt et editionum numerum vel litteram, et denique corrigat errata addatque addenda sequentia: p. 16. l. 2. 6) lege 10). *ibid.* l. 23. a. 1632. lege 1532. p. 18. l. 10. lege *imitatione*. *ibid.* l. 29. Pock lege Bock. p. 19. l. 58. lege opus ipsum pagg. 554 p. 21. l. 4. 2) lege 3). p. 22. l. 26. 1629. lege 1529. *ib.* l. 27. pagg. 10. adde conf. artic. XVI. 5. c. p. 23. l. 21. lege conf. 5. b. artic. 1eq. XVI. *ibid.* l. 24. lege artic. XVI. 19. a. *ibid.* l. 25. lege artic. XVI. 11. a. b. c. *ibid.* l. 48. Editus, adde est. p. 24. l. 9. distinguunt. adde conf. artic. XVI. 1. m. p. 29. l. 43. SETHI lege SETHVS. p. 31. l. 35. GENVENSIS, adde (Ianua enim et Genua, eius patria, sunt synonyma) p. 32. l. 46. 1527. lege 1522. p. 34. l. 59. lege *Gimignano*. p. 36. l. 5. pertineret. adde: Aggregator namque hic practicus anonymi, et ille Patauinus DONDI, in expositione plantarum virium penitus differunt, ideoque diuerfos auctores indicant. *ibid.* l. 27. 8) lege 8*) p. 38. l. 58. 1730. lege 1530. p. 41. l. antepenult. 20. g. lege 20. h. p. 43. l. 57. 1541. lege 1521. p. 46. l. 59. 1438. lege 1538.

INDEX AVCTORVM, QVORVM IN POSTERIORI CATALOGO MENTIO FIT.

Litterae erectae indicant auctores, quorum opera recensentur; obliquae eos, qui tantum citantur, vel aliorum opera ediderunt, vel praefationibus commendarunt, vel in aliam linguam transtulerunt vel commentariis aut notis illustrarunt. Maior numerus ad articulum, minor ad eius diuisiones remittit.

| | | | |
|--|---|--|---|
| <i>Abensina</i> XVI. 4. | <i>Aetius</i> XIV. 13. XV. XVI. 26. 28. | <i>Alconius (Petr.)</i> XVI. 8*. e. | <i>Andernacus</i> vid. <i>Guintherius</i> . |
| <i>Abeter</i> XVI. 8. | <i>Aggregator Patauinus</i> XVI. 7. | <i>Alexandrinus (Nic.)</i> vid. Nicolaus Alexandrinus. | <i>Anglicus (Barth.)</i> vide Bartholomaeus. |
| <i>Abimeher Moyse</i> XVI. 13. b. | <i>Aggregator practicus &c.</i> III. 6. XVI. 7. | <i>Alhafen</i> XVI. 4. | <i>Appollinaris (Quintus)</i> XII 4. 5. 6. |
| <i>Aboali</i> XVI. 4. | <i>Agricola (Io.) Ammonius</i> XIV. 16. a. | <i>Ali ben Abbas</i> XVI. 13. | <i>Appollinaris (2.)</i> XII. 2. 3. |
| <i>Abobali</i> XVI. 4. e. | <i>Agricola (Io.) Ammonius</i> XIV. 16. b. XVI. 20. a. b. | <i>Alpagus (Andr.)</i> XVI. 4. d. | <i>Apponus (Petr.)</i> XVI. 1. a. b. c. |
| <i>Abraam Iudaeus</i> XVI. 1. a. b. c. 6. a. | <i>Albertus magnus</i> XII. 2. 3. | <i>Alpagus (Paul.)</i> XVI. 4. c. | <i>Apuleius (L.)</i> XIV. 14. |
| <i>Abubecher Abubetur Abuchare</i> XVI. 8. | <i>Albubecar. Albubeter</i> XVI. 8. | <i>Alrafi</i> XVI. 8. | <i>Apuleius</i> XVI. 1. d. |
| <i>Abuhali. Abuvali</i> XVI. 4. | <i>Albucasis</i> II. 2. | <i>Amando (Io. de Sancto)</i> vid. de Sancto Amando. | <i>Aquilanus (Sebastian)</i> XIV. 7. l. |
| <i>Abynscenus</i> XVI. 4. e. | <i>Alchindus</i> XVI. 1. d. | <i>Amatus Lusitanus</i> XVI. 29. b. c. d. e. | <i>Arbustum. Fenticulus &c.</i> XVI. 25. h. |
| <i>Aegineta (Paulus)</i> vid. Paulus. | | <i>Ammonius</i> vid. <i>Agricola</i> . | |
| <i>Aetius</i> XIV. 19. a. b. c. XVI. 28. b. | | (R) 2 | Ar- |

- Archignaneus* (Dominic. Vinc.) XVI. 1. e.
Ardoinus vid. Santes.
Aretius (Benedict.) XIV. 28. b.
Argentarius (Io.) XVI. 30. a.
Aristoteles XV. XVI. 8*. e. f. 30. a.
Arrast XVI. 8.
Artzneybuch von allen Gepraechten &c. II.
Astarius (Blasius) XIV. 7. l.
Atrocianus (Io.) XIV. 3.
Auerrhois XIV. 6. d. XV.
Auicenna XVI. 4. a. b. c. d.
Auicenna XV. XVI. 21.
Barbarus (Hermolaus) XVI. 12. a. b. c.
Barbarus (Hermolaus) XIV. 7. c. XVI. 5. a. b. k. l. XVI. 11. a.
Barlandus (Hubertus) XVI. 21.
Barlandus (Hubert.) XVI. 19. a. f.
Bartholomaeus Anglicus XVI. 9. a. b.
Bayerland (Ortolff von) vid. Heydenberger.
Beimiram, vid. Isaac.
Belluacensis (Vincentius) vid. Vincentius.
Bellunensis (Andr.) XVI. 4. c. d.
Beniuensis (Anton) XIV. 7. b.
Beraldus (Nic.) XVI. 12. c.
Boack IX.
Bock (Hier.) IX. 1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Bogdanus (Martin.) XVI. 133.
Bois (du) vid. Syluius.
Bonaciolus (Ludon.) XVI. 11. a.
Boscho (Io. Iac. de Manliis de) vid. Manliis.
Brassauola (Anton. Musa) XVI. 32.
Brassauolus (Anton. Musa) XVI. 30. a. b. XVII. 1. c.
Bransellius (Ortho) VIII. 1. — 10. XIV. 7. a. 8.
Brunfelsius (Ortho) XI. 16. XVI. 5. l. 6. d. XVII. 1. a.
Brünfchwylg (Hieron.) VI. 1. — 6.
Budeus (Guil.) XVI. 12. c.
Bulchafis XVI. 1. a. b. c.
Burgundus (Vincent.) vid. Vincentius.
Caetius Aurelianus XVI. 22. a.
Caesarius (Io.) XVI. 12. c.
Caesarius (Iul.) XIV. 23.
Caius (Io.) XVI. 10. f.
Calcagninus (Coelius) XVI. 19. e. f.
Calphurnius (Francisc.) XVI. 4. b.
Cammerarius (Ioach.) XVI. 8* f. 10. c.
Cammertis (Io.) XVI. 12. b. c.
Campegius (Symphor.) XVI. 24.
Campegius (Symphor.) XVI. 4. b. XVI. 10. d. 7. XVI. 18. a.
Camperius. Campier. vid. Campegius.
Canali (Dominicus de) XVI. 13* a.
Capella (Mich. de) XVI. 1. e. 13. b. 20. g.
Castel blanco et Castellus albus (Io. Rod.) XVI. 29. a.
Cato XV.
Celsus (Corn.) XV.
Champegius. Champerius. vid. Campegius.
Cogollus (Vincent.) XVI. 1. l.
Collinutius (Pandulph.) XIV. 7. f.
Columella XV.
Constantinus Africanus XVI. 18. c. d.
Constantinus Africanus XVI. 18. a.
Constantinus (R.) XVI. 29. e.
Copho XVI. 1. e.
Copus (Guil.) XVII. 1. a.
Cordo (Simeon a) XVI. 2.
Cordus (Euric.) XVI. 10. a. b.
Cordus (Eur.) XI. 5. XIV. 22. a.
Cordus (Valer.) XI. 5. XIV. 10. b. 28. b.
Cornarius (Io.) XIV. 21. b. c.
Cornarius (Ian. et Io.) XIV. 2. 6. b. 13. 18. 19. a. b. c. 22. XVI. 10. f. 28. b.
Corronius (Dionys.) XVI. 5. h.
Costaeus (Io.) XVI. 1. l.
Crescentius (Petr. de) VII. 1. — 10.
Cuba (Io.) IV. 13.
Dalechampsius (Iacob.) XIV. 6. b. XVI. 29. e.
Damascenus vid. Ianus et Iohannes.
Danzius (Io.) XIV. 24.
Danzius (Io.) VI. 6. XII. 1.
Dinus Florentinus XVI. 4. c.
Dioscorides XI. 4. 5. XII. 1. XIV. 2. XVI. 5. a. — n. XVII. 2.
Dioscorides VI. 6. IX. 3. XIV. 8. 10. b. 25. 28. XV. XVI. 22. a. c. 23. 29. a. — e. XVII. 1. b.
Dioscoridis in historiam herbar. adaptatio VIII. 10.
Dondis (Iac. de) XVI. 7. XVII. 6.
Dorstenius (Theodor.) XI. 3.
Ebenhali. Ebenfina. XVI. 4.
Egenolphus (Christian) XI. 1.
Egnatius (Io. Bapt.) XVI. 5. a. b.
Ehrhartus Balzh. XI. 16.
Elchusein XVI. 4.
Eppendorff (Heinr. von) XIV. 23.
Erasmus Roterod. XVI. 12. c.
Erastus XVI. 8*.
Esculapius II. 2.
F. (Remaclus) vid. Fusch.
Felicianus (Io. Bern.) XIV. 5.
Ferrariis (Ge. de) XVI. 2. b. 3. b.
Ficinus (Marsilius) VI. 2. 3. 4.
Figulus (Carol.) XIV. 17.
Florentinus (Dinus) vid. Dinus.
Florentinus (Thadeus) vid. Thadeus.
Fontanonus (Franciscus) XVI. 5. m.
Fousch (Leon.) X. 10.
Fuchsius (Leonh.) X. 1. — 10. XIV. 21. a.
Fuchsius (Leonh.) VIII. 10. XI. 16. XIV. 7. g. XVI. 10. c. f. 20. c. g.
Fuchs (Remaclus) vid. Fusch.
Fulginitis (Gentilis) XVI. 1. e.
Fulgineo (Gentilis de) XVI. 4. c.
Fusch (Remaclus) XVI. 34.
Gaizon (Anton.) XVI. 18. d.
Galenus XVI. 10. a. — i.
Galenus I. XIV. 4. 13. XV. XVI. 6. d. 18. a. 21. 28. a. XVI. 33. XVII. 1. b.
Gallus (Strabus) XIV. 3.
Gart der Gesundheit IV. 1. 8.
Gatinaria (Marc.) XIV. 7. l.
Gaza (Theod.) XVI. 8*. a. — c.
Gelenius (Sigism.) XVI. 12. c.
Gemusaeus (Hier.) XIV. 15. 22. XVI. 8* f. 10. c. e.
Geniates (Simon) XVI. 2.
Gentilis de Fulgineo XVI. 1. e. 4. e.
Genuensis (Simon) vid. Simon Genuensis.
Gerardus Iatrus XVI. 1. n.
Gerhardus Carmonensis vel Cremonensis XVI. 4. a. b. d. 6. a.
Gerhardus (Theodor.) XVI. 10. d. g.
Geschmaus XIV. 15.
Gesnerus (Conr.) XIV. 20. a. b. 28. XVII. 1. b. c.
Gesnerus (Conr.) IX. 3. XI. 5. XIII. XIV. 28. b. c. XVI. 10. f. XVII. 7.
Gesner (Io.) X. 5. XVII. 2.
Giraldus (Lilius Gregor.) XVI. 33.
Glanvil. Glanvyle XVI. 9. a.
Goclenius (Rud.) XIV. 23.
Goupilus (Iacob.) XIV. 6. a. b. XVI. 5. m.
Gradibus (Matth. de) XVI. 4. e.
Guintherius (Io.) Ander-nacus XIV. 6. a. b. 7. b. 22. XVI. 10. d. g. 28. a.
Habenguesit XVI. 1. d.
Hagenbus XIV. 2.
Hali vel Haly Abbas XVI. 13. a. b.
Hali XV. XVI. 4. 18. a.
Haynol XIV. 2.
Heben Amaran vid. Isaac.
Herbarius latinus III. 1 — 7. VII. 3.
Herbarius germanicus IV. 1 — 12. XVII. 4.
Herbarius Hieronymi VI. XIV. 7. n.
Herbarum imagines XI. 1. 2.
Hermolaus Barbarus vid. Barbarus.
Herr (Mich.) VIII. 9.
Hessus (Fobanus) XIV. 27.
Heyden (Io.) XIV. 23.
Heydenberger (Orthol-phus) von Bayerland II.
Hieronymi herbarius vid. Herbarius Hieron.
Hildegardis II.
Hippocrates II. 2. XIV. 16. XV.
Honestus (Christoph. de) XVI. 1. a. — d. l.
Horatianus (Octau.) II. 2.
Horosco I. Horosco (Chri-stopth. de) vid. Oroscius.
Hortensi de re libellus XVI. 25. a. b.
Humain filius Isaac XVI. 10. b.
Humelbergius (Gabriel) XIV. 14. b.
Iacobus Paduanus XVI. 7.
Iannoensis (Simon) vid. Simon Iannoensis.
Ianuenis (Simon) vid. Si-mon Ianuenis.
Ianus Damascenus XVI. 1. a. n.
Iatrus (Gerardus) vid. Gerardus.
Ibn Adalla. Ibntfina. Ibnu-fina XVI. 4.
Ioannes Damascenus XVI. 1.

Iohanna filius Mesuach XVI. 1.
Jordanus (Io.) XVI. 8*. d. e.
Isaac Heben Amaran XVI. 18. a.
Isaach Beimiram vid. *Ysaac*
Kentmannus XIV. 28.
Kraut (Ge.) II.
Kreuterbuch IV. 8. 9. 10. 12-18. 20.
Kyberus (David) IX. 3.
Landolphus (Caesar) XIV. 7. 1.
Leennius (Andr.) XVI. 10. d. 11. c.
Leoniceus (Nicol.) XVI. 11. a. b. c.
Leoniceus (Nic.) XIV. 7. e.
Leydenfis (Cornel. Petr.) vid. *Petrus* (Corn.)
Libault (Io.) XVI. 25. m.
Lonizerus (Adam.) XI. 7-16.
Lonizerus (Adam) IV. 18.
Lonizerus (Io.) XIV. 25.
Lonizerus (Io.) XI. 4. XIV. 28.
Luminare maius XIV. 7. m.
Macer (Amilius) XIV. 3. 18.
Maffeus (Raph.) Volateranus XVI. 17.
Maignan (Eloy) X. 10.
Mainardus (Ioann.) XIV. 7. d.
Manliis (Io. Iac. de) XIV. 7. m.
Manliis (Io. Iac. de) XVI. 1. m.
Manardus (Io.) XVI. 19. 2. - f.
Manardus (Io.) XIV. 7. d. XVI. 1. l. m. 33.
Manardus (Io. Iac.) XVI. 19. f.
Marcellus XIV. 13.
Marcellus Virgilius vid. *Virgilius* (Marcellus.)
Maffaria. *Maffarius* (Francisc.) XVI. 31. a. b.
Matthaeus (Petr. Andr.) XVII. 2.
Meletius XVI. 33.
Menochius (Hier.) XVI. 11. a.
Mesuach vid. *Iohanna*.
Mesue XVI. 1. a - l.
Mesue XV. XVI. 19. b - f. XVII. 1. b.
Mesue (Io.) XIV. 7. m. XVI. 1.
Milichius (Iac.) XIV. 11. 23.
Mondinus XVI. 1. a. b. c. l.
Monhemius (Io.) XIV. 27.
Montanus (Io. Bapt.) XIV. 19. b. XVI. 10. f. 26. 28. b.
Montesaurus (Dominicus) XVI. 33.
Montigiano (Marcantonio) XVI. 5. n.
Moretus (Matth.) XVI. 3. a. b.
Muller (Io.) XIV. 12.
Mundella (Aloyf.) XVI. 32.
Mundinus vid. *Mondinus*.
Mundinus de Lentiis XVI. 1. e.
Musa (Anton.) XIV. 14. a. b.
Mutonius (Nic.) XIV. 7. m. XVI. 6. e.
Myrepus XV. vid. *Nicolaus Myrepus*.
Nicander XIV. 25. XVI. 5. c.
Nicolas (Io. Bapt. de) XVI. e. d.
Nicolaus XVI. 1. a - d.
Nicolaus Alexandrinus XIV. 16. b. XVI. 20. a. b. f.
Nicolaus Myrepus XVI. 20. c. d. e.
Nicolaus Praepositus XVI. 20. g. h. conf. *Nicolaus*.
Nootz (Arnold.) XVI. 21.
Nuenar (Hermann. a) XIV. 7. h.
Ocyorus (Tarquin.) XII. 7. 8.
Ocyorus (Tarqu.) XII. 6. 7.
Odobonus XIV. 3.
Oppianus XVI. 31.
Oribasius II. 2. XVI. 22. a - d. 28. a.
Oribasius XIV. 14. XV.
Orosius (Christoph.) XIV. 22. XVI. 28. a. b.
Orosio (Christoph. de) vid. *Orosius*.
Ortolff von Bayerlandt vid. *Heydenberger*.
Ortus sanitatis V. 1 - 6.
Ortus sanitatis IV. 1.
Paduanensis (Petr.) vid. *Petrus Paduanensis*.
Paduanus (Iac.) vid. *Iacobus Paduanus*.
Palea (Angelus) XVI. 1. h.
Palladius XV.
Palmarius (Io. Bapt.) XVI. 12. b.
Partibus (Iacob de) XVI. 1. k. 4. e.
Paulus Aegineta XIV. 4. 5. 6. a. b. 15. 22. XVI. 28. a. XVII. 1. a.
Paulus Aegineta XIV. 19. a. XV. XVI. 28. a. XVII. 1. b.
Pedemontium (Francisc. de) XVI. 1. a. b. c.
Petrus Hispanus XVI. 18. a.
Petrus (Corn.) *Leydenfis* XVI. 23.
Petrus Paduanensis XVI. 5.
Philo XVI. 8*. g.
Pincianus XVI. 28. a. b.
Placentinus (Rusticus) vid. *Rusticus Placentinus*.
Plantarum, *arborum* &c. *effigies* XVII. 4.
Platearius (Io. l. Matth.) XVI. 6. a. b. c. 14. 20. h.
Platearius (Io.) XV. XVI. 1. a. b. c. 6. a. b. c.
Plinius XIV. 23. XVI. 11. 12. a. b. c.
Plinius XIV. 11. 14. XVI. 16. a. b. 31. a. b.
Politianus (Angelus) XVI. 11. a.
Polybus XIV. 7. b.
Ponzettus (Ferd.) XVI. 13*.
Praedium rusticum XVI. 25. k.
Praepositus (Nicol.) vid. *Nicolaus Praepositus*.
Pratum, *lucus* &c. XVI. 25. i.
Priscianus XVI. 8*. f.
Promptuarium medicinae XVI. 7.
Pfellus (Mich.) XVI. 33.
Puch der Natur I.
Rasarius (Io. Bapt.) XVI. 22. c. d.
Rasis XVI. 6. d. 8.
Razy XVI. 8.
Regius (Nic.) XVI. 10. d. 8. conf. *Rheginus*.
Rhazis XV. XVI. 8.
Rhaza XVI. 33.
Rheginus (Nic.) XIV. 16. b. XV. 20. b. conf. *Regius*.
Rhellicanus (Io.) XIV. 12.
Rhenanus (Beatus) XIV. 23. XVI. 31. a. b.
Rhodion (Euch.) IV. 13.
Riffus vid. *Ryff*.
Rintus (Bend.) XVI. 4. d.
Rinius (Gualth. H.) XI. 5.
Rodius (Io.) XIV. 7. b.
Rodriguez (Io.) XVI. 29. a.
Roeslin (Euch.) IV. 13.
Ruellius (Io.) XVI. 27.
Ruellius (Io.) XI. 4. XIV. 7. b. XVI. 5. c - h. l. m.
Rusticus (Petr. Anton.) XVI. 4. b.
Rusticus Placentinus XVI. 10. b.
Ryff (Gualth. Herm.) XI. 4. 5. 16. XIV. 26.
Salentinus XVI. 1. a. b. c.
Salern vid. *Brunschwyg*.
Sanctes Ardoinus vid. *Sanctes Ardoinus*.
Sancto Amando (Io. de) XVI. 1. a. b. c.
Santes l. *Sanctes Ardoinus* seu *de Arduinis* XVI. 13*. a. b.
Saracenus (Philibert) XVI. 10. h. i.
Sardus (Baptist.) XVI. 3. c.
Savonarola (Io. Mich.) XVII. 2.
Schnellenbergius XII. 7. 8.
Schrick XIV. 1.
Schyllerus (Ioach. falso Bernh.) XIV. 7. 1.
Scribonius Largus XIV. 7. b.
Scribonius Largus XIV. 13.
Sebizius (Melch.) IX. 8. 9.
Seiar, *seyar*, *Serar*, XVI. 13.
Seminarium &c. XVI. 25. c. d. e.
Senensis (Vgo) vid. *Vgo*.
Serapio (Io.) XVI. 6. a - e.
Serapio XV.
Serar vid. *Seiar*.
Servitor XVI. 1. a. b. c.
Sethus (Symeon) vid. *Symeon Sethus*.
Sezar vid. *Seiar*.
Sichardus (Io.) XVI. 22. a.
Silvaticus (Matth.) XVI. 3. a. b. c.
Silvaticus (Matth.) XV.
Simon Genuensis XVI. 2. 3. c.
Simon Iannoensis XVI. 6. a.
Simon Ianuensis XVI. 2. a. b.
Simon Ianuensis XV. XVI. 1. a. b. c. 3. a. c. 6. a.
Simon l. Symeon Sethus vid. *Symeon Sethus*.
Soranus Ephesus XIV. 14.
Sospitello (Dominic. Martin. de) XVI. 3. c.
Stephanus Antiochen XVI. 13. a. b. 18. a.
Stephanus (Car.) XVI. 25. a. - m.
Strabus Gallus XIV. 3.
Sturmius (Io.) XVI. 10. d.
Surianus (Hier.) XVI. 4. e. 8. 10. a.
Surianus (Iac.) XVI. 8. a. 10. a.
Surianus (Paul.) XVI. 8. a.
Syboldus (Henr.) XVI. 8*. a. 15. b.
Sylva frutetum &c. XVI. 25. g.
Sylvaticus vid. *Silvaticus*.
Sylvius (Iac.) XVI. 35. a. - d.
Sylvius (Iac.) XIV. 9. XVI. 1. f. g. k. l.
Symeon Sethus XVI. 33.
Symeon Sethus XV.
Tagaultius l. *Tagautius* (Io.) XVII. 1. b.
Textor (Bened.) XIV. 9.
Textor (Bened.) IX. 3.
Thadeus Florentinus XVI. 4. c.
Theodorus II. 2.
Theophrastus Eresius XVI. 8*. a. - g.
Theophrastus Eresius XV.
Toledo (Anton. de) XVI. 5. a. 18. a.
Tollat (Ioann.) XIV. 1.
Torinus (Alban.) XIV. 4. 5. 14. XVI. 1. n. 28. a.
Tottus (Francisc.) XVI. 11. a.
Tragus (Hier.) IX. 3. 9.
Tragus (Hier.) XI. 16. XIV. 7. k.
Tricacellius (Io. Maria) XVI. 11. a.
Trotula II. 1. 2.
Turinus (Andr.) XVI. 18. a.
Tyrtamus XVI. 8*.
Valla (Georg.) XVI. 15. a. b.
Valla (Georg.) XVI. 33.
Valla (Io. Petr.) XVI. 15. a.
Valle (Rob. de) XVI. 16. a. b.
Varro XV.
Vffenbachius (Petr.) VI. 6. XI. 13. XVI. 19. f.
Vgo Senensis XVI. 4. e.
Villanovanus (Arnold.) XVII. 2.

Vincentius Belluacensis 1.
Burgundus XVII. 2.
Vinetum XVI. 25. f.
Virgilius (Marcellus) XIV.
25. XVI. 5. h. i. k. l.

Virgilius Maro XV.
Vitalis (Anton.) XVI.
13. a.
Volaterranus (Raph.) vid.
Maffeus.

Vrbanus (Henric.) XIV.
10.
Vrbetanus (Barthol.)
XVI. 1. h.
Ysaac. XVI. 18. a. b.

Xenophon. XVI. 17.
Zieglerus (Iac.) XIV.
23.
Zwingerus (Theod.) XVI.
13. b.

In spatii fugam sequitur adhuc alius index, quo annorum ordine opera recensita, tum primum excusa et recusa, tum emendata vel aucta, edita sunt.

1469. Plinii historia mundi XVI. 11. conf. 1491.
1470. 1485. 1519. Barthol. Anglicus. XVI. 9. a. b.
1471. 1475. 1488. 1495. 1497. 1508 Meue XVI. 1. a. b. conf. 1519
1471. Nicol. Antidotar. XVI. 20. f. conf. 1505. et 1541.
1471. 1474. 1486. 1538. 1505. P. de Crescentis sine figuris VII. 6. -- 10. antiquior forte sine anno ibid. 5. conf. 1494.
1473. 1476. 1481. 1484. 1494. 1624 Vincentius Belluacensis XVII. 1.
1474. 1492. Matchi. Syluaticus XVI. 3. a. b. c.
1474. 1486. 1514. Simon Ianuensis XVI. 2.
1475. 1478. Pach der Natur I.
1476. 1500. 1522. 1527. 1536. Avicenna VI. 4. a. -- d.
1477. 1488. Ortholophus Heydenberger aus Bayersland II.
1478. 1512. Dioscorides interprete Petr. Paduanensi XVI. 5. a. conf. 1499.
1479. 1497. 1503. 1530. 1531. 1535. 1552. Io. Serapio. XVI. 6. a. -- c.
1479. 1495. 1497. 1498. 1541. 1552. Theophrastus Eref. graece XVI. 8. e. f. g. antiquior forsan sine anno ibid. e. conf. 1481.
1481. Iac. de Dondis XVI. 7.
1483. 1509. 1531. Rafis XVI. 6. d. 8.
1483. 1528. 1529. 1534. 1552. Theophrastus Eref. graece Th. Gaza XVI. 8. a. -- e. conf. 1479.
1484. 1485. 1486. Herbarius latinus II. 4. 5. 6. antiquiores forsan ibid. 1. 2. 3.
1484. idem in linguam belgico-germanicam versus III. 7.
1485. 1486. 1487. 1488. 1496. 1507 1515. 1527. 1530. Herbarius Germanicus et Gart de Gesundheit IV. 1. -- 4. 9. -- 12. conf. 1507. 1533. 1535. et 1538.
1487. 1515. Ysaac XVI. 18.
1490. 1502. 1515. 1529. -- 1533. 1542 1543. 1551. 1552. Galenus latine XVI. 10. a. b. e. -- i. conf. 1525.
1491. 1511. 1517. Ortus (hortus) ianitatilis V. 4. 5. 6. aliae antiquae f. a. ibid. 1. 2. 3.
1491. vel 1492. 1509. 1529. 1532. Plinius a Leoniceo correctus XVI. 11. a. b. c. conf. 1469. & auct. sequi.
1492. 1496. 1518. 1534. Plinius ab Herm. Barbaro castigatus XVI. 12. a. b. c. conf. auct. antec. & 1534.
1492. 1523. Hali abbas XVI. 13. a. b.
1492. 1568. Sanctus Ardoinus XVI. 13. a. b.
1494. 1512. 1518. 1548. P. de Crescentis cum figuris V. 1. -- 4. conf. 1471.
1497. 1503. 1505. 1512. 1530. Placitarius XVI. 14. 6. a. b. c. 20. h.
1497. 1501. Ge. Valla XVI. 15. a. b.
1499. 1518. 1529. Dioscorides graeco XVI. 5. c. d. XIV. 2. conf. 1478. & 1516. bis
1500. 1505. 1515. 1521. Brunchwyyg. VI. 1. 4. conf. 1512.
1500. Rob de Valle XVI. 16. a. b.
1501. Luminare maius XIV. 7. m.
1505. 1512. Nic. Praepos. Dispensator. XVI. 20. p. h. conf. 1471.
1506. 1517. Gatinaris XIV. 7. l.
1506. 1515. 1526. & c. Volaterranus XVI. 17.
1507. 1515. 1527. 1530. Kreuterb. IV. 9. 10. 11. 12. conf. 1485. & 1533.
1511. Collinatus XIV. 7. f.
1512. 1519. 1532. Brunchwyyg Pars II. sine fig. VI. post 6. conf. 1500.
1516. 1530. Dioscorides latiae ab Herm. Barbaro emend. XVI. 5. a. b.

antiquior sine a. ibid. conf. 1499. & proxime sequentem.
1516. 1529. 1537. 1542. 1543. 1547. 1554. idem ex versione Ruellii XVI. 5. c. -- h. conf. auct. antec. & 1518.
1517. Io. Tollat XIV. 1.
1518. 1523. 1529. Dioscorides ex versione Marc. Virgillii XVI. 5. i. -- l. conf. 1516. & 1543. ter.
1519. 1527. 1533. Mesue cum nouis accessibus & castigationibus XVI. 1. c. d. e. conf. 1471. & 1542.
1521. 1528. 1529. Manardi Epist. libri sex. XVI. 19. a. conf. 1535.
1525. 1538. Galenus graeco XVI. 10. c. d. conf. 1490. & 1540.
1528. 1537. L. Apuleius & Ant. Musa XIV. 14.
1528. Paulus Aegineta graeco. XIV. 4. conf. 1531.
1529. Scribonius Largus XIV. 7. b.
1529. Mich. Pfellus XVI. 33.
1529. 1533. 1544. Oribasius latine II. 2. XVI. 22. a. b. d.
1530. Macer cura Atrociani XIV. 3. conf. 1540.
1530. Leonh. Fuchsi Annotationes X. 1530. 1532. 1539. Brunfelsii herbarum icon. T. Primus VIII. 1. 4. 6. 7. conf. 1531.
1531. Hier. Tragi Epist. IX.
1531. Pauli Aeginetae simplisia XVII. 1. a. conf. 1528. et 1532.
1531. Nicandri theriaca cum Jo. Loniceri scholiis & interpretatione XIV. 25.
1531. vel 1532. 1536. Brunfelsii icon. T. secundus VIII. 2. 5. conf. 1530. & 1536.
1532. 1536. Eiusd. commentarii XIV. 7. a.
1532. Eiusd. Kreuterbuch T. primus VIII. 8. conf. 1537.
1532. Hub. Barianus XVI. 21.
1532. 1533. Paulus Aegin. cura Torini XIV. 4. 5. conf. 1531. & auct. seq.
1532. 1534. 1546. 1551. 1567. Paulus Aegin. cura Guntherii Andernaci XIV. 6. conf. auct. antec. & 1536.
1533. 1544. Hildegardis. II.
1533. Corn. Petrus Leydenis XVI. 23.
1533. Symphor. Campegius XVI. 24.
1533. 1535. 1542. Aetius latine cura Cornarii XIV. 19. a. b. c. conf. 1534.
1533. 1535. 1536. 1550. 1557. 1560. Herbarius Germanicus auctus & cum figuris emendatus IV. 13. -- 19. conf. 1507. d. 1551. & 1562.
1533. 1545. Leon. Fuchsius contra Cornarium XIV. 21. a.
1534. Aetius graeco XIV. 19. conf. 1533 et 1540.
1534. 1543. Brunfelsii opusculum XIV. 8.
1534. 1537. 1552. Bened. Textor XIV. 9.
1534. 1551. Euric. Cordus XIV. 10. a. b.
1534. 1553. Iac. Milichii Commentar. in Plinii Libr. secundum XIV. 11. 23. conf. 1492. & auctorem seq.
1534. 1537. 1542. Franc. Massarii Castigation. et annotationes in Plinii L. nonum XVI. 31. a. b. conf. auctor. antec. et 1539.
1535. Io. Manadi Epistolar. Libri octodecim XVI. 19. b. conf. a. 1521 et 1540.
1535. 1545. de re hortensi libellus Car. Stephani XVI. 25. a. b. conf. 1554.
1535. 1538. Herbarum imagines P. prima XI. 1.
1536. eandem P. secunda XI. 2.
1536. 1539. Brunfelsii icon. T. tertius VIII. 3. 6. 7. conf. 1531.
1536. Marcellus XIV. 13.
1536. Constantini Africani opera XVI. 18. c. conf. 1539.
1536. 1540. 1548. Seminarium & c.

Car. Stephani XVI. 25. c. d. e. conf. 1554.
1536. Eiusd. de latinis et graecis nominibus arborum & c. XVI. 25. m.
1536. Io. Ruellius de natura stirpium XVI. 27.
1536. Paulus Aegin. ab. Orosio emendatus XVI. 28. a. conf. 1532. et 1538.
1536. Io. Rod. Castelli albi f. Amati Lusitani commentarius in duos priores libros Dioscoridis XVI. 29. a. conf. 1553.
1536. Anton. Musa Brasauolus XVI. 30. a. b.
1536. vel 1537. 1555. Io. Rhellicanus XIV. 12.
1537. Brunfelsii Kreuterbuch T. secundus VIII. 9. conf. 1532.
1537. Vinetum Car. Stephani XVI. 25. f. conf. 1554.
1538. Sylua. Frutetum & c. Car. Stephani XVI. 25. g. conf. 1554.
1538. Arbustum. Fonticulus & c. eiusd. XVI. 25. h. conf. 1554.
1538. Paulus Aegineta graeco cura Gemusaei. XIV. 15. conf. 1536. et 1543. bis.
1538. Herbarius germanicus batava lingua expositus IV. 20. conf. a. 1485.
1538. Aloysi Mundellae epistolae nouem XVI. 32. conf. 1543.
1538. 1561. Symeon S. thus XVI. 33.
1539. Plinii historia mundi emendata XVI. 12. c. conf. 1534. et 1543.
1539. Constantini Africani operum reliqua XVI. 18. d. conf. 1536.
1539. Hier. Boek Kreuterbuch sine figuris IX. 1. conf. 1546.
1539. Io. Agricola Ammonius XIV. 16. a.
1540. 1549. 1611. Io. Manardi Epistolar. libri viginti XVI. 19. c. -- f. conf. 1535.
1540. Theodoric. Dorstenius XI. 3.
1540. Carol. Figulus XIV. 17.
1540. Macer a Cornario editus et emendatus XIV. 28. conf. 1530.
1540. Aetius ab Orosio emendatus XVI. 28. b. conf. 1534.
1541. 1543. Nicolaus Alexandrinus XIV. 16. b. XVI. 20. b. conf. 1471.
1541. 1548. 1549. Iac. Syluii method. medicamenta componendi XVI. 35. a. b. c.
1541. 1544. Remael. Fusch XVI. 34.
1541. Contr. Gesneri H. stor. plantar. XIV. 20. a.
1542. Eiusd. Catal. plantar. XIV. 20. b.
1542. Iac. Syluii medicamentor. simpl. defectus XVI. 35. d.
1542. 1543. 1549. Mesue ex interpret. Iac. Syluii XVI. 1. f. g. i. k. conf. 1519. et 1543.
1542. Contr. Gesneri Apparatus et defectus simplic. medicamentor. XVII. 1. b.
1542. 1549. Leonh. Fuchsi Commentarii cum fig. X. 1. 9. conf. 1545. et 1549.
1543. Eiusd. Kreuterbuch. X. 2.
1543. Dioscoridis in historiam herbar. adaptatio VIII. 10. conf. 1518. et auct. sequi.
1543. Dioscori les interprete Ruellio cum annotat. G. H. Ryff et scholiis Io. Lonizeri XI. 4. conf. auct. antec. 1546. bis. et 1549.
1543. Io. Lonizeri scholia in Dioscoridem XI. 4. XIV. 25.
1543. Paulus Aegineta graeco cura Gemusaei XIV. 15. conf. 1538. et auct. sequi.
1543. in Paulum Aegin. annotationes

Gemusaei XIV. 22. vid. auct. antec. et 1556.
1543. 1545. Io. Cornarius contra L. Fuchsum XIV. 21. b. c.
1543. Plinii liber VII. -- XI germanice per H. von Eppendorff. XIV. 23. conf. 1539.
1543. Io. Danzii tabulae simplicium medicamentor. XIV. 24.
1543. 1546. Mesue per Barth. Vrbetanus et Angel. Paleam XVI. 1. h. i. conf. 1542. et 1623.
1543. Aloysi Mundellae epistolae viginti duae XVI. 32. conf. 1538. et 1549.
1543. Pratum lacus & c. Carol. Stephani XVI. 25. i. conf. 1554.
1544. Contr. Gesneri enumeratio medicamentor. purg. & c. XVII. 1. c.
1544. Io. Monhemius XIV. 27.
1545. 1595. Leonh. Fuchsi stirpium imagines sine commentariis X. 3. 4. 5. conf. 1542. et 1547.
1546. Dioscorides germanice per Io. Danzium XII. 1. conf. 1543. et auct. seq.
1546. Idem italice per Montigianum XVI. 5. n. conf. auct. antec. et 1548.
1546. 1552. Tarqu. Ocyorus XII. 7. 8.
1546. 1560. 1565. 1572. Hier. Boek Kreuterbuch. cum augmento et figuris IX. 2. 5. 6. 7. conf. 1539. 1552. et 1580.
1547. 1555. Leonh. Fuchsi de stirp. commentar. sine figur. X. 6. 7. 8. conf. 1542. et 1549.
1548. 1549. Dioscorides italice cum commentar. P. A. Martholi XVII. 2. conf. 1546. et auct. seq.
1549. Idem latine ex interpret. Ruellii cum notis G. H. Ryff. itemque Valler. et Euric. Cordi et Contr. Gesneri additamentis auctus XI. 5. vid. 1543. conf. auct. antec. et 1549.
1549. Idem cura Goupyli editus XVI. 4. m. conf. auct. antec.
1549. Leonh. Fuchsi Commentar. gallice cum fig. X. 10. conf. 1542.
1549. 1551. Albertus Magnus XII. 2. 3.
1549. 1556. 1561. Io. Iac. de Manlius XIV. 7. m.
1549. Galenus emendatus per Cornarium XVI. 10. l. conf. 1525.
1549. Nicolaus Myrepsus XVI. 20. c. d. e.
1549. vel 1550. Aloysi Mundellae Epistolae triginta sex. XVI. 32. conf. 1543.
1550. 1570. 1594. Quint. Apollinaris XII. 4. 5. 6.
1551. 1558. 1598. 1604. 630. 1678. 1679. 1737. Ad. Lonizeri Kreuterbuch. XI. 7. conf. Herbarius germanicus 1533. & 1562.
1552. Hier. Tragi seu Boek Herbarium latine IX. 3. conf. 1546.
1553. eiusd. herbarii imagines sine commentariis IX. 4.
1553. 1554. 1557. 1558. Amati Lusitani commentar. in libros V. Dioscoridis XVI. 29. b. -- c. conf. Ca. Bellus albus 1536.
1554. 1629. Praedium rusticum Car. Stephani XVI. 25. k. l. quod continet eius edita a. 1535. 1536. 1537. 1538. 1543.
1556. Paulus Aegin. a Cornario editus XIV. 22. conf. 1543.
1562. Plantarum arborum effigies herbarii germanici XVII. 4. conf. 1533.
1580. 1630. Hier. Boek herbarium a Sibizio auctum IX. 8. 9. conf. 1546.
1623. Mesue cum Syllii & Manardi interpret. cura Costaei editus & figuris illustratus XVI. 1. l. conf. 1542. 1543.

TABVLARVM EXPLICATIO Erklärung der Kupfer-Platten.

TAB. 1. *Lat.* Taraxacum, Dens Leonis. *Germ.* Zuffröhrlein, Münche-Kopff, Pfaffen-Blat, Rühblumen. *Græc.* ΑΦΩΝΑ.
Angl. Dandelion, Piss a bed. *Hisp.* Diente de Leon. *Ital.* Dente di Leone, Tarasfaco, Piscia al letto. *Gall.*
Dente de Lion, Piss en lit. *Belg.* Papenkruyt.

1. Folia hujus plantæ solo incumbunt; caules seu canaliculi florigeri sex vel octo digitorum habent altitudinem. Flores luteo colore sunt tincti; radix unum ferme digitum crassa, octo digitos longa, albo atque amaro lacte plena est.

2. Ubivis fere crescit in agris novalibus, perque plurimos anni menses efflorescit.

3. Radix & folia virtute gaudent refrigerandi atque aperienti, urinam ciendi, & stomachum confortandi: In Anglia verno tempore multis hominibus lactuæ vicem præstat.

4. NOMEN GENERICVM: Dens Leonis *Rai. I. 234. Synops. 170. Tournes. 468. Rupp. 197. Dill. 50. Boerb. I. 188. Vaill. 46. Taraxacum Heuch. Ind. 51. Heist. I. 30. Hall. 739. Kram. 75. Ludvv. no. 339. Leontodon Linn. G. no. 747. Roy. 122. Taraxaconoides Vaill. Mem. de l'Acad. Roy. a. 1721. edit. Paris p. 187.*

Nota. Descriptio hæc convenit quidem notissimæ & in Europa ubique ferme crescenti inque officinarum usum receptæ speciei, sed non figura. Caulis præcipue & calyx indicant, hæc pertinere ad illas species, quarum nomen genericum quondam fuit *Hieracium*, postea vero a *VAILLANT* l. c. tam ab hoc, quam a *Taraxaco*, distinctum & *Taraxaconoides* dictum est, ubi vero inter novem species & tres varietates, quas indicat, hæc non reperitur. Si ergo vera est figura (de quo tamen eo magis dubitandum, quia nec accuratissimus *DILLENIUS* in novissima editione synopsis methodicæ stirpium Britannicæ. *Raii*, nec *J. BLACKSTONE* in specimine botanico, quo plantarum plurimum rarior. Angliæ indigenar. loci natales illustrantur, Londini 1746. 8. edito, similis speciei mentionem facit) peculiariter etiam nomine appellanda, sed & aliter describenda esset.

1. Die Blätter dieser Pflanze liegen an der Erde, die Stengel oder Röhrlin, auf welchen die Blumen wachsen, sind ohngefähr 6. oder 8. Zoll hoch, die Blumen gelb: die Wurzel ist ohngefähr einen Finger dick und 8. Zoll lang voll weißer bitterer Milch.

2. Es wächst fast überall auf brachliegenden Fleckern, und blühet die mehresten Monate des Jahres.

3. Die Wurzeln und Blätter werden gebraucht zum kühlen und eröffnen, den Urin zutreiben, wie auch den Magen zu stärken: viele essen sie in Engelland als einen Salat zur Frühlingszeit.

Anmerkung. Die Beschreibung kommt mit der gemeinen fast allenthalben in Europa wachsenden und in den Apotheken gebräuchlichen Art überein, aber nicht die Figur: absonderlich zeigen die Stengel und Blumen-Hülsen, daß sie unter diejenigen Arten gehöre, deren Geschlechts-Nahme ehemals *Hieracium* gewesen ist, nachmals aber sowohl von diesem als dem *Taraxaco* von *VAILLANT* l. c. unterschieden und *Taraxaconoides* genennet worden, also aber unter den 9. Arten und 3. Varietäten, die er anzeigt, diese sich nicht befindet. Wann demnach die Figur richtig ist, woran aber desto mehr zu zweifeln, weil weder der alles genau beobachtende *DILLENIUS* in der neuesten Ausgabe der Synops. methodicæ stirp. Britannicæ. *Raii*, noch auch *J. BLACKSTONE* in specim. botan. quo plant. rarior. Angl. indigenar. loci natales illustrantur, Lond. 1746. 8. edito, einer dieser ähnlichen Art Meldung thut, so verdienet sie einen besondern Namen, aber auch eine andere Beschreibung.

TAB. 2. *Lat.* Papaver erraticum, Papaver rhoeas, Papaver rubrum. *Germ.* Klapper-Rosen, Korn-Rosen, Flitsch-Rosen, wilber Mohn. *Gr.* μίχων ροίας. *Angl.* Red-Wild- or Corn-Poppy. *Hisp.* Amapollis, Papoulla. *Ital.* Papavero salvatico, Rosolaccio. *Gall.* Pavot sauvage, Confanons, Coquelicoc. *Belg.* Rooden-Huel.

1. Hæc planta 2. pedum altitudinem attingit, folia pallide virent, & flores ex scarlatino rubent.

2. Crescit in plurimis agris frumento oblitis & mense Junio Julioque floret.

3. Flores refrigerant, conciliant somnum & contra febres inflammatorias adhibentur. Præparata in officinis pharmaceuticis reperiunda sunt aqua destillata, syrupus, conserva & tinctura florum.

1. Diese Pflanze steigt bis 2. Schuh hoch; die Blätter sind bleich grün und die Blumen scharlach roth.

2. Es wächst in den meisten Korn-Feldern und blühet im Junio und Julio.

3. Die Blumen dieses Mohns kühlen, befördern den Schlaf und man bedient sich derselben öftters in Entzündungs-Fiebern. Die in den Apotheken befindliche Præparata davon sind das destillierte Wasser, der Syrup, die Conserva der Blumen und die Tinctur.

4. NOM. GEN. Papaver *Rai. I. 853. Syn. 308. Tourn. 237. Heuch. Ind. 12. Pr. I. 29. Rupp. 70. Dill. 98. Boerb. I. 278. Vaill. 156. Linn. G. no. 495. Roy. 479. Haller. 303. Kram. 19. Ludvv. no. 446.*

5. NOM SPECIF. Papaver rubrum *Brunf. III. 526. Papaver rhoeas Ger. 371. Rai. I. 855. Kram. 19. Papaver erraticum Dod. 447. Papaver erraticum flore simplici rubro Heuch. Pr. I. 29. Papaver erraticum rubrum campestre L. B. III. 395. Dill. 98. Papaver erraticum maius ροίας Dioscoridi, Theophrasto, Plinio C. B. pin. 171. Tourn. 238. Rupp. 70. Boerb. I. 279. Vaill. 156. Papaver laciniato folio, capitulo brevioris glabro annum Rhoeas dictum *Rai. Syn. 308. Papaver foliis pinnatifidis hispidis fructu subrotundo Linn. H. 201. Roy. 479. Hall. 303.**

Nota. Hæc species in agris aridis crescens folia pallidius viridia & minus divisa gerit, magis autem divisa & saturatius viridia ostendit, quando in agris pinguibus aut hortis provenit. Ratione floris præterea varietatem quandam observant *RAIUS* & *VAILLANT* locis citatis, nempe 1. flores majores, saturatius rubentes, & maculis nigris ad fundum; 2. minores, pallidiores & absque maculis: Priorem varietatem *VAILLANT* appellat *Papaver erraticum unguibus petalorum nigris*; alteram *Papaver erraticum majus floribus minoribus absque maculis*. Et hanc posteriorem præfens tabula exhibet. Utraque varietas in Germania promiscue sæpius uno in loco reperitur, fortasse ex vno quoque semine, quanquam prior maiori copia. Utriusque etiam idem est usus.

Am. Die Blätter sind mehr bleich-grün und weniger zertheilet, wann diese Art auf einem dürrer Acker wächst; hingegen mehr dunkelgrün und mehr zertheilet, wenn sie auf einem fetten Acker oder in Gärten gefunden wird. Über dieses hat *RAIUS* und *VAILLANT* an angezeigten Orten vornehmlich in Ansehung der Blumen zweyerley Varietäten bemercket: 1. größer, mehr dunkelroth und mit schwarzen Spitzen oder Flecken am Grunde; 2. kleiner, bleicher und ohne Flecken: *VAILLANT* nennet die erste *Papaver erraticum unguibus petalorum nigris*; die andere *Papaver erraticum majus floribus minoribus absque maculis*, und diese ist diejenige, welche die Figur vorstellet. In Deutschland wachsen beyde oft untereinander, vielleicht aus einem Saamen, doch die erste häufiger, werden auch ohne Unterschied gebrauchet.

TAB. 3. *Lat.* Verbascum, Tapfus barbatus. *Germ.* Wollenkraut, Königs-Kerzen. *Gr.* φλόμος. *Angl.* Mullein, Hig. D. Taper. *Hisp.* Gordolobo, Verbasco. *Ital.* Barbasso. *Gall.* Molène, Bouillon. *Belg.* Wollekruyt.

1. Ad altitudinem 6. pedum assurgit, folia pallide virent, flores sublutei sunt.

2. Crescit in viis publicis & mense Julio floret.

3. Foliorum usus contra tullim dolores pectoris & colicos, ut & exterius in fomentationibus: præcipue laudantur tanquam specificum in hæmorrhoidibus. Radicis decoctum a DIOSCORIDE in odontalgia præscribitur.

4. NOM. GEN. Verbascum *Rai.* II. 1094. *Syn.* 287. *Tourn.* 146. *Heuch.* Ind. 28. *Rupp.* 247. *Dill.* 107. *Boerb.* I. 227. *Vaill.* 199. *Heist.* I. 31. *Linn. G.* no. 132. *Roy.* 429. *Hall.* 507. *Kram.* 13. *Ludvv.* no. 274.

5. NOM. SPEC. An Verbascum altissimum, pulverulentum latifolium, caule foliis creberrimis obsito, flore pallido minore *Rai.* *Syn.* edit. II. p. 225. *Hl.* 287. n. 2. secundum descriptionem. *Conf. Hist.* II. 109. n. 3.

Nota. Hæc figura Blackwelliana cum nulla specie nota penitus convenit. *Verbascum mas latifolium luteum* C. B. pin. 239. illa indicare nequit, quia huius flores sunt multo maiores. Propter folia profunde ferrata primum nobis videbatur *Verbascum nigrum flore parvo apicibus purpureis* J. B. III. 873.; sed huius exemplar naturale collatum nimiam manifestabat differentiam. Nec magis pro *Verbascum pulverulentum flore luteo parvo* J. B. III. 871. seu *mare foliis angustioribus floribus pallidis* C. B. pin. 239. illam agnoscere possumus, quia, prouti describitur & etiam apud nos reperitur, nec flores nec folia adeo dense congesta offert, hæcque minora atque angustiora sunt. Quum ergo hanc speciem in Anglia crescentem RAIUS l. c. aliter, & quidem ita, prouti hic depingitur, describat, eandem varietatem hæc figura indicari suspicamur.

1. Es wächst bis 6. Schuh hoch; die Blätter sind bleich grün und die Blumen blaß gelb.

2. Man findet es an den Landstraßen, und blühet im Julio.

3. Die Blätter braucht man wider den Husten, Schmerzen der Brust, und in der Colic, auch äußerlich zu Bähungen; man hält sie vor ein specificum in der gulbenen Aber. DIOSCORIDES recommendirt das decoctum der Wurzel im Zahn-Weh.

4. NOM. GEN. Verbascum *Rai.* II. 1094. *Syn.* 287. *Tourn.* 146. *Heuch.* Ind. 28. *Rupp.* 247. *Dill.* 107. *Boerb.* I. 227. *Vaill.* 199. *Heist.* I. 31. *Linn. G.* no. 132. *Roy.* 429. *Hall.* 507. *Kram.* 13. *Ludvv.* no. 274.

5. NOM. SPEC. An Verbascum altissimum, pulverulentum latifolium, caule foliis creberrimis obsito, flore pallido minore *Rai.* *Syn.* edit. II. p. 225. *Hl.* 287. n. 2. secundum descriptionem. *Conf. Hist.* II. 109. n. 3.

Anm. Diese Blackwellische Figur kommt mit keiner bekannten Art völlig überein. Verbascum mas latifolium luteum C. B. pin. 239. kan sie nicht anzeigen, weil dieses viel grössere Blumen hat. Anfangs hielten wir es wegen der tief eingekerbten Blätter für das Verbascum nigrum flore parvo apicibus purpureis J. B. III. 873.; die Gegenhaltung der Natur aber zeigte den Unterschied gar zu groß. Eben so wenig können wir es für das Verbascum pulverulentum flore luteo parvo J. B. III. 871. oder mas foliis angustioribus floribus pallidis C. B. pin. 239. erkennen, weil, wie es beschrieben und auch bey uns gefunden wird, weder die Blumen noch Blätter desselben so dichte beisammen stehen, auch diese kleiner und schmähler sind. Da nun RAIUS am angezogenen Ort eben diese in Engelland wachsende Art anders, und zwar so, wie diese Figur zeigt, beschreibt, so vermuthen wir, daß diese Varietät dadurch mögte angezeigt seyn.

TAB. 4. *Lat.* Cucumis, Cucumis sativus, Cucumis sativus vulgaris. *Germ.* Cucumern, Gurken. *Gr.* Σίρκος ἡνυπό. *Angl.* Garden Cucumber. *Hisp.* Cogombro. *Ital.* Cocomero. *Gall.* Concombre. *Belg.* Concomeren.

1. Hæc planta serpit humi, folia ex viridi & flores ex luteo pallent.

2. Propagatur quotannis ex semine, floret atque fructum fert per aliquot æstatis menses.

3. Semen adhibetur contra calculi & stranguriæ dolores, urinæ ardorem, febres ardentes atque pleuritides. Fructum huius plantæ excitare spiritus animales, ac folia vino cocta & melle permista morbum capis sanare, DIOSCORIDES affirmat.

4. NOM. GEN. Cucumis *Rai.* I. 645. *Tourn.* 104. *Linn. G.* no. 286. *Roy.* 263. *Kram.* 15. *Ludvv.* no. 254.

5. NOM. SPEC. Cucumis vulgaris *Ger.* 910. *Rai.* I. 645. *Heist.* II. 10. Cucumis fructu brevi subluteo & albo non villoso *Kram.* 15. Cucumis sativus vulgaris maturo fructu subluteo & albo C. B. pin. 310. *Tourn.* 104. *Rupp.* 46. *Boerb.* II. 77. Cucumis foliorum angulis rectis *Linn. H.* 451. *Roy.* 263.

Nota. Flores in una eademque planta huius generis reperiuntur masculini sive steriles 1., & feminini sive fecundi 2.

1. Diese Pflanze laufft auf der Erden, die Blätter sind gelb grün, und die Blume bleich gelb.

2. Es wird jährlich aus dem Saamen gezogen, blüht und trägt Früchte verschiedene Monate des Sommers.

3. Der Saame wird gebraucht im Steinschmerzen, Strangurie, Brennen des Urins, hitzigen Fiebern und Seitenstechen. DIOSCORIDES schreibt, die Frucht ermuntere die matten Lebens-Geister, und recommendirt die Blätter in Wein gesotten und mit Honig gemischt als ein Mittel wider den Hunds-Biß.

4. NOM. GEN. Cucumis *Rai.* I. 645. *Tourn.* 104. *Linn. G.* no. 286. *Roy.* 263. *Kram.* 15. *Ludvv.* no. 254.

5. NOM. SPEC. Cucumis vulgaris *Ger.* 910. *Rai.* I. 645. *Heist.* II. 10. Cucumis fructu brevi subluteo & albo non villoso *Kram.* 15. Cucumis sativus vulgaris maturo fructu subluteo & albo C. B. pin. 310. *Tourn.* 104. *Rupp.* 46. *Boerb.* II. 77. Cucumis foliorum angulis rectis *Linn. H.* 451. *Roy.* 263.

Anm. An einer Pflanze dieses Geschlechts findet man zweyerley Blumen, nemlich männliche oder unfruchtbare 1., und weibliche oder fruchtbare 2.

TAB. 5. *Lat.* Bursa Pastoris, Thlaspi fatuum. *Germ.* Fäschel- oder Fäschleins-Kraut. *Angl.* Shepherds Purse. *It.* Bursa Pastoris. *Gall.* Bourse à Pasteur ou de Bergers, Tabouret. *Belg.* Porfekenskruyt.

1. Folia inferiora super terra expanduntur, caulis pedem ferme altitudine æquat, flores albi sunt.

2. Crescit inter murorum rudera & lapides, totoque æstatis tempore floret.

3. Hæc planta refrigerat, adstringit, condensat, sanguinis spatium, narium hæmorrhagiam, immoderatum menses atque lochiorum profluvium itemque cruentum mictum sedat.

4. NOM. GEN. Bursa *Heuch.* Ind. 14 *Pr.* I. 32. Bursa pastoria *Rai.* *Syn.* 306. *Dill.* 45. Bursa pastoris *Tourn.* 216. *Rupp.* 87. *Boerb.* II. 9. *Vaill.* 24. *Heist.* III. 4. *Kram.* 21. *Ludvv.* no. 419. Thlaspi *Rai.* I. 838. *Linn. G.* no. 648. Nasturtium *Hall.* 543.

5. NOM. SPEC. Bursa vulgo Bursa pastoris *Heuch.* Ind. 14 Bursa pastoria I B. II. 936 D II 45. *Rai.* *Syn.* 306 Bursa pastoris maior folio sinuato C. B. pin. 108. *Tourn.* 216. *Rupp.* 87. *Boerb.* II. 9. *Vaill.* 24. *Heist.* III. 4. Thlaspi fatuum *Gesn. Hort.* 284. Thlaspi fatuum, Bursa pastoris dictum *Rai.* I. 838. Thlaspi siliquis verticaliter cordatis *Linn. H.* 330. *Roy.* 334. Nasturtii siliquis verticaliter cordatis varietas maior foliis semipinnatis *Hall.* 545.

1. Die untersten Blätter liegen platt auf der Erden, der Stengel steigt ohngefehr einen Schuh hoch, die Blumen sind weiß.

2. Es wächst zwischen eingefallenen Mauer, Werd und Steinen und blühet den ganzen Sommer.

3. Diese Pflanze ist kühlend, zusammen ziehend, verdischend, und wird gebraucht, wo Geblüt ausgeworffen wird, in heftigen Nasenbluten, allzustarcker monatlicher und Kindbetter Reinigung, wie auch blutigen Urin.

4. NOM. GEN. Bursa *Heuch.* Ind. 14 *Pr.* I. 32. Bursa pastoria *Rai.* *Syn.* 306. *Dill.* 45. Bursa pastoris *Tourn.* 216. *Rupp.* 87. *Boerb.* II. 9. *Vaill.* 24. *Heist.* III. 4. *Kram.* 21. *Ludvv.* no. 419. Thlaspi *Rai.* I. 838. *Linn. G.* no. 648. Nasturtium *Hall.* 543.

5. NOM. SPEC. Bursa vulgo Bursa pastoris *Heuch.* Ind. 14 Bursa pastoria I B. II. 936 D II 45. *Rai.* *Syn.* 306 Bursa pastoris maior folio sinuato C. B. pin. 108. *Tourn.* 216. *Rupp.* 87. *Boerb.* II. 9. *Vaill.* 24. *Heist.* III. 4. Thlaspi fatuum *Gesn. Hort.* 284. Thlaspi fatuum, Bursa pastoris dictum *Rai.* I. 838. Thlaspi siliquis verticaliter cordatis *Linn. H.* 330. *Roy.* 334. Nasturtii siliquis verticaliter cordatis varietas maior foliis semipinnatis *Hall.* 545.

TAB. 6. *Lat.* Anserina, Argentina, Potentilla, Tanacetum agreste. *Germ.* Gänserich, Brensch, Grunfig. *Angl.* Wild
 © Tanfie, Silver Weed. *Ital.* Potentilla. *Gall.* Argentine sauvage, Tanefie sauvage. *Beig.* Silverkruyt.

1. Hæc planta serpendo humum radit, & ope tenuium fibrarum ex articulis ortarum radices agendo latius se diffundit. Folia dilute viridia, & a parte inferiori quasi subtilissimo argento obducta, flores autem lutei sunt.

2. Crescit in solo tam macro quam humido, præcipue in locis hyberno tempore inundatis, mense Maio vel Junio plerumque florens.

3. Folia adstringunt & consolidant, sedant omnes fluxus & evacuationes præternaturales, resolvunt sanguinem coagulatum & conducunt in contusionibus ex lapsu. Cosmesticum insuper contra lentigines, solis adustiones & vitiliginis esse dicuntur; ad Gargarismata adstringentia quoque utiliter adhibentur.

4. NOM. GEN. Pentaphylloides *Rai. I. 617. Tourn. 298. Rupp. 107. Boerb. I. 41. Dill. 84. Heist. I. 24. Anserina Heuch. Ind. 15. Potentilla Linn. G. n. 487. Roy. 275. Hall. 338. Ludvv. n. 621.*

5. NOM. SPECIF. Argentina *Ruell. 625. Potentilla Brunf. III. 45. Anserina, Argentina, Potentilla Tab. 118. Anserina flore luteo Heuch. Ind. 15. Pentaphylloides Argentina dictum Rai. I. 617. Syn. 256. Pentaphylloides argenteum alatum seu Potentilla Tourn. 298. Rupp. 107. Dill. 84. Boerb. I. 41. Vaill. 158. Pentaphylloides folio subtus argenteo, vulgo Potentilla live Anserina Heist. I. 24. Potentilla foliis pinnatis caule repente Linn. 193. Roy. 275. Potentilla repens, scapo nudo unifloro, pinnis plurimis confertis, minoribus intermistis Hall. 338.*

Nota. Hæc planta in pingui & humido solo crescens folia parit superiori parte saturate viridia, & parte inferiori parum coloris argentei representantia. VAILLANT l. c. tanquam varietatem recenset Pentaphylloides viride alatum, cuius etiam meminit FABREGOU T. VI. p. 26. TOURNEF. autem hift. des plantes aux environs de Paris, ut & BERN. de JUSSIEU in ipsius editione secunda de hoc silet. DILLENIVS in Rai. Syn. l. c. aliam adhuc varietatem indicat, foliis nempe infra suproque argenteis: An varietates constantes?

1. Diese Pflanze kriecht auf der Erde, und treibt kleine Fasern aus den Gelenken, durch welche es Wurzeln schlägt und sich weiters ausbreitet. Die Blätter sind lichtgrün und unten wie mit dem zärtesten Silber bedeckt, die Blume ist gelb.

2. Es wächst auf mageren und feuchten Boden, wo Wasser den Winter über gestanden hat, und blühet gemeinlich im Maio oder Junio.

3. Die Blätter sind zusammen ziehend und heilend, gut alle Arten widernatürlicher Evacuationen zu stillen; sie zertheilen das geronnene Geblüt und dienen denenjenigen, die durch einen Fall sich gequetschet; äußerlich werden sie als ein cosmeticum gebraucht wider die Sonnenflecken, Sonnen Brand und Mehl-Flecken; sie sind gut zu adstringirenden Gurgel-Wässern.

Ann. Wann diese Pflanze an fetten und feuchten Orten wächst, ist die obere Seite der Blätter ganz dunkel grün und hingegen an der untern Seite wenig Silberfarbes zu sehen. Als eine Varietät wird von VAILLANT l. c. angezeigt Pentaphylloides viride alatum, dessen auch FABREGOU T. VI. p. 26. gedenket; TOURNEF. aber in seiner hift. des plantes aux environs de Paris, wie auch BERN. de JUSSIEU in derselben zweyten edition hat nichts davon: DILLENIVS in Rai. Syn. l. c. gedenket noch einer andern Varietät, nemlich foliis infra supraque argenteis. An varietates constantes?

Ann. Wann diese Pflanze an fetten und feuchten Orten wächst, ist die obere Seite der Blätter ganz dunkel grün und hingegen an der untern Seite wenig Silberfarbes zu sehen. Als eine Varietät wird von VAILLANT l. c. angezeigt Pentaphylloides viride alatum, dessen auch FABREGOU T. VI. p. 26. gedenket; TOURNEF. aber in seiner hift. des plantes aux environs de Paris, wie auch BERN. de JUSSIEU in derselben zweyten edition hat nichts davon: DILLENIVS in Rai. Syn. l. c. gedenket noch einer andern Varietät, nemlich foliis infra supraque argenteis. An varietates constantes?

TAB. 7. *Lat.* Ruta, Ruta hortensis maior. *Germ.* Raute, Weinraute. *Gr.* ῥύγανον. *Angl.* Rue. *Hisp.* Aruda. *Ital.* Ruta. *Gall.* Rüe. *Belg.* Ruyte.

1. Folia pallide virent, flos flavus, caulis duos pedes altus.

2. Colitur in hortis & mense Junio atque Julio floret.

3. Folia atque semen in usum trahuntur ac inter alexipharmaca numerantur, unde horum usus in morbis contagiosis, imo pestilentialibus, omnibusque febrium speciebus: Prosumt in affectionibus capitis, nervorum, uteri; in convulsionibus atque passionibus hysteris: sistunt dolores colicos; confortant stomachum atque intestina: medentur quoque animalium venenosorum atque canum rabiosorum moribus. Præterea ingrediuntur compositionem Aquæ Bryoniæ compos. & Aquæ Theriacalis. Præparantur ex illis in Officinis Aqua destillata, Conserva foliorum atque Oleum coctum.

4. NOM. GENER. Ruta *Rai. I. 874. Tourn. 257. Heuch. Ind. 14. Rupp. 89. Boerb. I. 260. Heist. I. 27. Linn. G. n. 374. Roy. 461. Kram. 25. 39. Ludvv. no. 436.*

5. NOM. SPEC. Ruta officinarum *Heist. I. 27. Ruta flore ex viridi luteo Heuch. Ind. 14. Ruta hortensis latifolia C. B. pin. 336. Tourn. 257. Rupp. 89. Vaill. 174. Ruta hortensis latifolia herbacea floribus glabris Kram. 25. Ruta sativa vel hortensis I. B. III. 197. Rai. I. 874. Ruta maior hortensis latifolia Moris. II. 507. Boerb. I. 260. Ruta foliis decompositis Linn. H. 145.*

1. Die Blätter sind bleichgrün, und die Blume gelb, der Stängel wächst bey 2. Fuß hoch.

2. Es wird in den Gärten gezogen und blüht im Junio, und Julio.

3. Man braucht die Blätter und Saamen, sie gehören unter die alexipharmaca, sind gut wider alle ansteckende ia pestilentialische Krankheiten und alle Arten der Fieber; sie nützen in Beschwernissen des Haupts, der Nerven, der Mutter, in convulsionen und hysterischen Paroxysmis, in der Colic, Schwachheit des Magens und der Gedärme; sie vertreiben und curiren den Biß giftiger Thiere und rasender Hunde. Sie sind ein Ingrediens der Aquæ Bryoniæ compos. und Aquæ theriacalis. Die Praeparata in der Officin sind das destillirte Wasser, Conserva der Blätter und gekochtes Del.

TAB. 8. *Lat.* Rosa canina, Rosa sylvestris, Cynosbatus, *Germ.* Wilde Rose, Heck-Rose, Hüsen. *Gr.* κυνόςβατος, κυνόςροσος, ῥόδον αγριον. *Angl.* Wild Rose, Briar Rose, Dogs Rose, the Hep-tree. *Ital.* Rosa. *Gall.* le Rosier, l'Eglantier sauvage. *Beig.* Wild-Rosen, Veld Rosen, Eglantier.

1. Folia saturatius viridia sunt foliis rosarum in hortis crescentium: flores interdum albi, ut plurimum subrubri.

2. Crescit in fenticetis, & mense Junio atque Julio floret. Exeunte mense Septembri fructus, cynosbati fructus dicti, colliguntur. Rami hujus fruticis progenerant substantiam quandam spongiosam atque pilosam cum viriditate rubentem, & a muscarum punctationibus, ut dicitur, ortum trahentem. Vocatur Spongia Cynosbati. Vid. RAI catal. Plantar. circa Cantabrigiam nasc. p. 140.

1. Die Blätter sind dunkler grün als die Garten-Rosen haben, die Blumen zuweilen weiß, iasgemein aber bleich roth.

2. Es wächst in Hecken und blüht im Junio und Julio die Frucht, Hiesen oder Hagebutten genannt, sind einzusammeln gegen das Ende des Septembers. Aus den Zweigen dieser Stauden wächst der Schwamme, Schlafkum, Schlaf Apfel, Lat. Spongia cynosbati genannt, so eine röthlicht grüne schwammichte und haarige Substantz, welche der Stich kleiner Fliegen verursacht. v. RAI catal. Plantar. circa Cantabrigiam nasc. p. 140.

3. Flores harum rosarum magis adstringentem virtutem, quam earum quæ in hortis aluntur, habere creduntur. Quidam tanquam specificum laudant in fluxu mensium immoderato. Pulpa fructuum confortat stomachum, lenit ardorem febrium, demulcet pectus in tussi & hæmoptysi, estque contra scorbutum remedium. Semen in calculi & sabuli passionibus adhibetur, sicut & spongia his mederi dicitur. Præparatum in officinis est Conserva Cynosbati.

4. NOM. GENER. Rosa Rai. II. 1467. Syn. 454. Tourn. 636. Heuch. Ind. 18. Rupp. 138. Dill. 90. Boerb. II. 251. Vaill. 172. Linn. G. no. 484. Roy. 272. Hall. 347. Ludvv. no. 623.

5. NOM. SPEC. Rosa canina vulgo dicta Dod. 187. Rosa sylvestris inodora (i. e. foliis inodoris) five canina Park. Th. 1017. Raii II. 1470. Syn. 454. Rosa sylvestris incarnato flore H. Eyst. vern. O. 6. fol. 6. fig. 1. Boerb. II. 252. Rosa sylvestris vulgaris flore odorato incarnato C. B. pin. 483. Tourn. 638. Rupp. 138. Dill. 90. Vaill. 172. Rosa foliis & fructu rotundo laevibus, calycis foliolis divisis Hall. 349.

Nota. In Germania hujus speciei fructus paulo sunt majores, & color florum pallidior, quemadmodum etiam descriptio indicat. Neque varietas, floribus intensiori rubeidine tinctis, ab auctoribus plantarum indigenarum Angliæ recensetur, nisi forsitan hic referendum, quod PARKINSON l. c. n. 1. & 2. indicavit. Interim eo colore, quo in Tabula sunt depicti, cosetiam in Anglia reperiri, ex ELEAZ. ALBINI insectorum Angliæ naturali historia Lond. 1731. edita tab. XLIX. apparet, propterea nos quoque eundem retinere volumus.

3. Die Blumen dieser Rose sollen mehr zusammen stehen als die in denen Gärten; einige halten sie für ein Specificum in allzustarcken Monatst Fluß der Weiber; das Marck oder Pulpa der Hagenbutten stärckt den Magen, kühllet in der Fieber-Hitze, lindert die Brust im Husten und Blut auswerfen, und ist gut im Scharbock. Der Saame wird wider den Stein und Gries gebraucht. Der Schwamm soll eben diese Kraft haben. Das Präparatum der officinen ist die Conserva cynosbati.

Anm. Die Früchte dieser Art sind in Deutschland etwas grösser und die Farbe der Blume bleich, wie die Beschreibung selbst meldet. Es wird auch die Varietät mit so stark rothen Blumen von den Auctoribus plantarum indigenarum Angliæ nicht angemercket, es sey dann, daß hieher gehöre, was PARKINSON l. c. n. 1. & 2. anzeigt; daß aber in Engelland die Farbe also auch, wie die Figur zeigt, vorkommt, ist aus ELEAZ. ALBINI insectorum Angliæ naturali historia Lond. 1731. edita tab. XLIX. zu ersehen, deswegen man billig angestanden, solche zu ändern.

✠ TAB. 9. *Lat.* Salvia agrestis, Scorodonia, Scordium.

Reliqua aliarum linguarum nomina in exemplari Anglico addita non huic plantæ, sed scordio proprie sic dicto, conveniunt hincque illius occasione tab. 475. repetuntur propterea vero hic omittuntur.

1. Alta est duos pedes; folia viridiora sunt & latiora quam salviæ hortensis, flores flavi, stamina purpurea.

2. Reperitur in fruticetis & vepretis, & mense Julio atque Augusto floret.

3. Commendatur in Podagra, Rheumatismis, Scorbuto & Hydrope; promovet urinam atque menses, refertur in numerum herbarum vulnerariarum, & resistit gangrænæ & sphacelo.

4. NOM. GENER. Scorodonia Rai. I. 576. Riv. I. pag. 8. Rupp. 220. Dill. 156. Heist. I. 28. Kram. 49. Scordium Boerb. I. 183. Chamaedrys Tourn. 204. Vaill. 33. Hall. 630. Teucrium Linn. G. no. 558. Roy. 306. Ludvv. no. 190.

5. NOM. SPEC. Salvia agrestis, seu Sphacelus Dod. 29. Scorodonia Cord. hist. 91. Riv. I. tab. 12. Rupp. 220. Dill. 156. Heist. I. 28. Kram. 49. Scorodonia five Salvia agrestis Ger. 662. Rai. I. 576. Syn. 245. Vaill. 180. Scordium alterum five Salvia agrestis C. B. pin. 247. Boerb. I. 183. Chamaedrys fruticosa, sylvestris, melissæ folio Tourn. 205. Vaill. 33. Chamaedrys foliis cordatis, scapis florigeris nudis, spicatis, longissimis Hall. 632. Teucrium foliis cordatis, crenatis, petiolatis, spicis laxis secundis Linn. H. 301. Roy. 306.

TAB. 10. *Lat.* Salvia, Salvia hortensis maior, Salvia latifolia. *Germ.* Salbey, breiter Salbey. *Gr.* ἑλεῖο φανός. *Angl.* Sage. *Hisp.* Salvia, Salva. *Ital.* Salvia. *Gall.* Sauge. *Belg.* Savie.

1. Alitur in hortis. Folia interdum ex viriditate albescent, interdum purpurascunt: In floribus color e rubro cæruleus est: altitudo præterpropter decem & octo digitorum.

2. Libenter crescit in solo aspero atque sicco, & mense Majo atque Junio floret.

3. Folia & flores cum fructu adhibentur in omnibus capitis atque nervorum morbis: Urinam retentam promovent, & tanquam Infusum Thee forme pota in omnibus febrium speciebus præscribuntur.

4. NOM. GENER. Salvia Rai. I. 509. Tourn. 180. Riv. I. pag. 13. Rupp. 222. Boerb. I. 166. Linn. G. no. 30. Roy. 307. Kram. 53. Ludvv. no. 176.

5. NOM. SPEC. Salvia officinarum Dale Pharmac. 330. Salvia latifolia I. B. III. 304. Rai. I. 509. Riv. I. tab. 102. Rupp. 222. Salvia maior, an Spacelus Theophrasti C. B. pin. 237. Tourn. 180. Boerb. I. 166. Salvia flore coeruleo latifolia Heuch. Ind. 26. Salvia foliis lanceolato-ovatis integris, crenulatis, floribus spicatis, calycibus acutis Linn. H. 12.

Nota. Exemplar pingit flores cæruleos, quod tamen contra ipsam descriptionem: foliis autem dat colorem ex viridi obfcurè purpurascens.

1. Wird in Gärten gepflanzt, die Blätter sind manchmal weißlich grün, manchmal aber röthlich purpurfarb; die Blume sind röthlich blau; wächst ohngefehr 8. Zoll hoch.

2. Es kommt am besten fort in trockenen rauen Boden, und blüht im Maio und Junio.

3. Die Blätter und Blumen werden mit Nutzen gebraucht in allen Krankheiten des Haupts und der Nerven, sie treiben den verhaltenen Urin, man bedient sich ihrer in allen Arten der Fieber als Thee oder als ein infusum getrunken.

4. NOM. GENER. Salvia Rai. I. 509. Tourn. 180. Riv. I. pag. 13. Rupp. 222. Boerb. I. 166. Linn. G. no. 30. Roy. 307. Kram. 53. Ludvv. no. 176.

5. NOM. SPEC. Salvia officinarum Dale Pharmac. 330. Salvia latifolia I. B. III. 304. Rai. I. 509. Riv. I. tab. 102. Rupp. 222. Salvia maior, an Spacelus Theophrasti C. B. pin. 237. Tourn. 180. Boerb. I. 166. Salvia flore coeruleo latifolia Heuch. Ind. 26. Salvia foliis lanceolato-ovatis integris, crenulatis, floribus spicatis, calycibus acutis Linn. H. 12.

Anm. Im Original sind die Blumen himmelblau, welches selbst wider die Beschreibung ist, und die Blätter aus dem grünen braunroth.

TAB. 11. *Lat.* Liliū album, Liliū album flore erecto. *Germ.* Weiße Lilien oder Lilien. *Gr.* κίον, λείον. *Angl.* White Lilly. *Hisp.* Azucena, Lirio blanco. *Ital.* Giglio bianco. *Gall.* Lis. *Belg.* Lillie.

1. Surgit in altitudinem quatuor pedum: flores albi sunt, e quorum medio flavi apices prominent.

2. Colitur in hortis, & mense Junio atque Julio floret.

3. Radicum & florum externus præcipue usus est. Leniunt & mitigant dolores, emolliunt tumores eorumque suppurationem promovent. MATTHIOLVS oleum liliorum floribus infusum contra paralyfin & nervorum constrictionem commendat. In officinis prostat oleum liliorum alborum.

4. NOM. GENER. Liliū *Rai.* II. 1109. *Tourn.* 369. *Heuch.* Ind. 20. *Rupp.* 147. *Boerh.* II. 135. *Heist.* I. 18. *Linn.* G. no. 320. *Kram.* 43. *Ludov.* no. 715. *Lirium* *Roy.* 30.

5. NOM. SPEC. Liliū officinarum *Heuch.* Ind. 20. Liliū flore albo officinarum *Heist.* I. 18. Liliū album *Ger.* 190. *Rai.* I. 1109. Liliū album vulgare I. B. II. 685. *Tourn.* 369. *Rupp.* 147. Liliū album flore erecto vulgare C. B. pin. 76. *Boerh.* II. 135. Liliū foliis sparsis, corollis campanulatis, intus glabris *Linn.* H. 120. Lirium foliis sparsis, corollis campanulatis, intus glabris *Roy.* 30.

TAB. 12. *Lat.* Urtica, Urtia urens, Urtica urens maxima. *Germ.* Nessel, große Brenn-Nessel. *Gr.* Καλύνη Ακκλήφη. *Angl.* Stinging Nettle. *Hisp.* Ortiga. *Ital.* Ortica. *Gall.* Ortie. *Belg.* Grootte Nettelen.

1. Alta est duos pedes: color foliorum dilutius viridis est, quam in urtica Romana. Flores pallide flavent.

2. Copiose crescit in omnibus locis, floretque mensibus æstivis.

3. Radix, folia & semen refrigerant & adstringunt: Succus in omnibus Sanguinis profusionibus internis, hæmorrhagiis & fluxibus medelam affert: Linteolum, hoc succo madefactum & naribus vel vulnere applicatum, sanguinem sistit. Radix virtutem habet diureticam, & in ictero specificum præstatum. Semen in tussi, asthma & obstructionibus pulmonis vim suam exserit.

4. NOM. GENER. Urtica *Rai.* I. 159. *Syn.* 139. *Tourn.* 534. *Heuch.* Ind. 4. *Pr.* I. 2. *Rupp.* 327. *Dill.* 91. *Pontederac Anthol.* 210. *Boerh.* II. 105. *Vaill.* 205. *Heist.* III. 22. *Linn.* G. no. 853. *Roy.* 210. *Hall.* 177. *Kram.* 20. 86. 87. *Ludov.* no. 874.

5. NOM. SPEC. Urtica vulgaris maior I. B. III. 445. *Rai.* I. 160. Urtica racemifera *Heuch.* Pr. I. 2. Urtica racemifera major perennis *Rai.* *Syn.* 139. Urtica vulgaris latifolia *Heist.* III. 22. Urtica urens maxima C. B. pin. 232. *Tourn.* 534. *Rupp.* 327. *Boerh.* II. 195. *Vaill.* 205. Urtica foliis oblongo-cordatis *Linn.* H. 440. *Roy.* 210. *Hall.* 177. Urtica maior folio mucronato *Kram.* 20. Urtica florida maxima nostras caule virente *Eiusd.* 86. Urtica racemosa mas *Slevogt. diff. de urticis* pag. 7. seq. Urtica urens maxima sterilis *Pontederac Anthol.* 210.

Nota. Reperiuntur flores hujus plantæ duplicis generis plerumque ita, ut alia planta masculinos seu steriles flores & nullum semen; altera ceterum plane similis planta vero femininos seu fecundos flores & semen proferat. Interdum tamen flores utriusque generis in una eademque planta reperiri, etiam observatum est, vid. *RAIVS* *Synops.* p. 139. *RVD.* *JAC. CAMERARIUS* *Eph.* N. C. Dec. III. Ann. V. & VI. obs. CCXI. p. 415.; num vero pauciores masculini inter plures femininos, an pauciores feminini inter plures masculinos, non additur. Tabulæ hujus figura primaria repræsentat plantam floribus masculinis sed adhuc clausis, hosque accuratius no. 1. in particula racemi florigeri separati, utrimque in magnitudine naturali, & no. 2. lente optica auctos, no. 3. quosdam eorundem sed apertos itidem in magnitudine aucta, a. a facie antica, ubi apices integri contractis adhuc filamentis in floris sinu latent, b. postquam filamenta sese extenderunt & apices pollen suum exploserunt, c. a facie postica, d. a latere; no. 4. vero sistit particulam racemi florigeri floribus femininis onusti in magnitudine naturali & no. 5. in magnitudine aucta, ubi e. recens apertus flos, f. semen nondum maturum intra calycem bifariam dehiscens apparet.

1. Diese Nessel wächst bis 2. Schuh hoch, die Blätter sind heller grün als bey der Römischen Nessel, die Blumen sind salb-gelbe.

2. Die Nessel wächst überall nur in allzu großer Menge und blüht verschiedene Monate des Sommers.

3. Die Wurzel, Blätter und Saamen werden zum Köhlen und zusammen ziehen gebraucht; der Saft davon ist gut in allen Arten innerlicher Verblutungen, Hæmorrhagien und Fluxionen. Leinwand darmit benetzt und aufgelegt, stillt das Bluten der Nase und der Wunden. Die Wurzel davon hält man für diuretisch und für ein specificum in der Gelbsucht. Der Saame wird gerühmt in der Husten, kurzen Odem und Verstopfung der Lunge.

Anm. In diesem Gewächse findet man Blumen von zweyerley Art insgemein dergestalt, daß eine Pflanze lauter männliche oder unfruchtbare Blumen und gar keinen Saamen hervor bringet; eine andere und im übrigen ganz ähnliche Pflanze aber lauter weibliche oder fruchtbare Blumen und Saamen trägt; doch sollen auch zuweilen Blumen von beyderley Geschlecht in einer Pflanze gefunden worden seyn, vid. *JO. RAIVS.* *Synops.* p. 139. *RVD.* *JAC. CAMERARIUS* *Eph.* N. C. Dec. III. Ann. V. & VI. obs. CCXI. p. 415. Ob aber wenige männliche unter vielen weiblichen, oder wenige weibliche unter vielen männlichen, ist nicht angemerkt. Diese Platte zeigt in der Haupt-Figur eine Pflanze mit lauter männlichen aber annoch geschlossenen Blumen, und diese noch deutlicher no. 1. an einem Theil eines Blumen-Nestleins besonders, beyvertheils in natürlicher Größe, no. 2. einige nach dem Vergrößerungs-Glas und no. 3. eben dergleichen, aber geöffnete, Blumen auch vergrößert, a. von vornen in welcher die apices noch ganz mit zusammen gezogenen filamentis liegen, b. nachdem sich die filamenta gespreizet und die apices sich ausgeleeret haben, c. von hinten, d. von einer Seite; no. 4. hingegen zeigt einen Theil eines Blumen-Nestleins mit weiblichen Blumen in natürlicher Größe und no. 5. vergrößert, dabey e. eine frisch aufgegangene Blume, f. einen noch nicht reifen Saamen innerhalb des in 2. Theile gespaltenen calycis zu sehen.

TAB. 13. *Lat.* Iasminum, Iasminum album, Gelseminum. *Germ.* Weisser Jasmin oder Jesmin, Weistreiben. *Gr.* Ιάσμιον. *Angl.* Iasmine, Iessamine. *Ital.* Gelsimino. *Gall.* Iasmin. *Belg.* Iesmin, Iesemin.

1. Sarmenta hujus fruticis longa sunt, tenuia atque viridia, quæ, nisi suffulcirentur, ad humum se sternunt, nec in altum surgere possunt. Flores hujus Iasmini communis albi sunt.

2. Co-

1. Dieses Stauden gewächse treibet lange, dünne, und grüne Zweige, welche an der Erden blieben, wenn sie nicht unterstützt würden; die Blumen dieses gemeinen Jasmins sind weiß.

2. Es

2. Colitur apud nos in hortis, & per aliquot æstatis menses floret.

3. Præter flores nihil ad usum reservatur. SCHROEDERVS de illis prædicat, quod calefaciant & uterum emolliant, eius scirrhus quoque sanare & partum promovere, asthmaticis item & qui tussilaborant, prodesse perhibentur. Oleum florum infusorum boni odoris causa præparatur. Antiquorum unguentum Iasmini ex hodierno Iasmino confectum fuisse, negat MATTHIOLVS.

4. NOM. GENER. Iasminum *Rai. II. 1509. Tourn. 597. Heuch. Ind. 8. Rupp. 43. Boerh. II. 216. Heist. I. 16. Linn. G. no. 13. Roy. 397. Kram. 132. Luduv. no. 4.*

5. NOM. SPEC. Gelfeminum vulgatus *Caesalp. 153. Lob. Hist. 542. Iasminum Dod. 409. Iasminum album Ger. 892. Rai. II. 1509. Iasminum flore albo Heuch. Ind. 8. Iasminum vulgare flore albo Heist. I. 16. Iasminum vulgatus flore albo C. B. pin. 397. Tourn. 597. Rupp. 43. Boerh. II. 216. Iasminum foliis oppositis pinnatis H. Cliff. 5. Roy. 397. Iasminum folio pinnato cum impare, flore toto albo Kram. 132.*

Nota. Hanc Speciem eandem esse cum Iasmino Hispanico flore majore externe rubente I. B. II. 101. in Malabar & Surinama sylvestri, atque ex hujus ramis, non infitis sed tantum depactis, a loco natali coacto illam præternaturalem produci, asseverat LINNAEVS l. c.

2. Es wird bey uns in Gärten gepflanzt, und blüht verschiedene Monate des Sommers.

3. Die Blumen davon sind das einzige Stuck, dessen man sich bedienet. SCHROEDER rühmet, daß sie erwärmen, und den uterum erweichen, sie sollen dessen Scirrhus oder Verhärtungen heilen, und die Geburt befördern; ingleichen sollen sie in Husten und schwehren Odem gut seyn. Das Del der infundirten Blumen wird des Geruchs halben gebraucht. MATTHIOLVS glaubt, der Alten Jasmin-Salbe seye nicht von unserm heutigen Iasmin gemacht worden.

Ann. LINNAEVS behauptet l. c. daß diese Art einerley seye mit dem Catalonischen oder Spanischen Jasmin, welcher in Malabar und Surinam wild wächst, und aus dessen Zweigen, die nicht durch einpfropfen sondern nur durch einlegen fortgepflanzt werden, jener aus Zwang widernatürlich entspringe.

TAB. 14. *Lat.* Plantago minor, Plantago angustifolia seu quinquenervia, *Germ.* Spiziger Wegerich oder Wegbreit. *Gr.* Ἀπὸ γῆς ὡσπορ. *Angl.* Narrow-leaved Plantain, Ribwort. *Ital.* Piantagine longa, Lanciola. *Gall.* Plantain. *Belg.* Wegbree.

1. Alta est octo vel novem digitos: Foliis insunt quinque nervi, ab ima radice totam longitudinem percurrentes. Flores colore dilute brunno atque albis apicibus præditi sunt.

2. Reperitur in agris & pratis; floret potissimum mense Majo & Junio, quædam etiam tota æstate.

3. Qualitatem habet frigidam, siccam & adstringentem, unde in omnibus fluxionibus & sanguinis profusionibus, v. g. in vomitu cruento, hæmoptysi, hæmorrhagiâ narium, nimino mensium atque lochiorum fluore utiliter adhiberi potest. Præterea continentiam urinæ sedat, ipsiusque ardorem atque acrimoniam lenit, gonorrhæam & vulnorum cruentationes sistit. Præparatur ex hac planta in officinis aqua destillata.

4. NOM. GEN. Plantago *Rai. I. 876. Syn. 313. Tourn. 126. Heuch. Ind. 4. Pr. I. 9. Rupp. 88. Dill. 55. Boerh. II. 100. Vaill. 160. Heist. I. 25. Linn. G. no. 106. Roy. 401. Hall. 470. Kram. 19. 20. Luduv. no. 22.*

5. NOM. SPEC. Plantago minor *Dod. 107. Plantago quinquenervia Lob. 305. Ger. 422. Rai. I. 877. Syn. 314. Plantago angustifolia Heist. I. 25. Kram. 19. Plantago folio angusto lanceolato Einsd. 20. Plantago angustifolia maior C. B. pin. 189. Tourn. 127. Rupp. 89. Dill. 55. Boerh. II. 100. Vaill. 160. Plantago foliis lanceolatis, spica subovata Linn. H. 36. Roy. 401. Hall. 471.*

1. Es wächst 8. oder 9. Zoll hoch, die Blätter haben 5. Nerven oder Sennen, welche von ihrer Wurzel nach der Länge ganz durchlaufen. Die Blumen sind einer hell-bräunen Farbe mit weißen Spitzen oder apicibus.

2. Man findet es in Feldern und Wiesen, und blüht meistens im Maio und Junio, ob man gleich einige fast den ganzen Sommer durch blühend antrifft.

3. Es ist kalt, trocken und anhaltend, gut in allen Arten der Fluxionen und Blutflüsse, als Blutbrechen und Auswurf, Nasenbluten, übermäßiger monatlicher und Kindbetter-Reinigung. Es dient wenn der Urin wider Willen fortgeht, lindert dessen Brennen und Schärfe, stopft den Saamen Fluß und das Bluten der Wunden. Das Praeparatum in der Apotheke ist das destillierte Wasser.

TAB. 15. *Lat.* Hypericum, Hypericum vulgare. *Germ.* Johannes-Kraut. *Gr.* Ὑπερικόν. *Angl.* St. John's Wort. *Hisp.* Corajoncillo. *Ital.* Hyperico, Perforata, Herba di S. Giovanni. *Gall.* Millepertuis, Trucheran. *Belg.* St. Ians-kruyt.

1. Assurgit ad altitudinem duorum pedum: folia luci opposita foraminulis plena esse apparent: Flores sunt dilute lutei & multis apicibus atque staminibus ornati, qui digitis contriti, succum sanguineum emittunt.

2. Reperitur in spinetis atque fruticetis; mense Junio atque Julio floret.

3. Hypericum refertur ad aperientia, purificantia, urinam cientia & alexipharmaca: prodest in febris tertiana & quartana, expellit vermes, & insigne vulnerarium est remedium. Tinctura florum cum spiritu vini medicina est contra melancholiam atque maniam. Externè non sine fructu applicatur vulneribus atque contusionibus, partium præcipuè nervosarum. Præparata in officinis sunt Oleum Hyperici simplex & compositum.

4. NOM. GEN. Hypericum *Rai. II. 1017. Syn. 342. Tourn. 254. Heuch. Ind. 17. Rupp. 123. Dill. 103. Boerh. I. 241. Vaill. 106. Heist. I. 15. Linn. G. no. 706. Roy. 474. Hall. 360. Kram. 31. 32. 39. 137. Luduv. no. 610.*

5. NOM. SPEC. Hypericum *Brunfels. III. 81. Ger. 539. Rai. II. 1018. Syn. 342. Hypericum officinarum Heist. I. 15. Hypericum flore luteo Heuch. Ind. 17. Hypericum vulgare C. B. pin. 279. Tourn. 254. Rupp. 123. Dill. 103. Boerh. I. 241. Vaill. 106. Hypericum vulgare petalis subtilissime crenatis varians Kram. 39. Hypericum floribus trigynis, caule annuo, foliis punctatis obtusis Linn. H. 380. Roy. 374. Hall. 360.*

1. Diese Pflanze wächst bis 2. Fuß hoch, die Blätter, wenn man sie gegen das Licht hält, scheinen voll kleiner Löchlein, die Blumen sind hell gelb mit vielen apicibus und staminibus, welche, wenn sie zwischen den Fingern zerdrückt werden, einen blutrothen Saft geben.

2. Es wächst in Hecken und Gebüsch, und blüht im Junio und Julio.

3. Johannes-Kraut rechnet man unter die eröffnenden, reinigenden, Urin und Gift treibenden Kräuter, ist gut in 3. und 4. tägigen Fiebern, vertreibt die Wärme, und ist ein herrliches Wund-Kraut; die Tinctur der Blumen mit spir. vini wird wider die melancholie und Raserey gebraucht. Neuerlich ist es von grossen Kräften in Zerquetschungen, Contusionen, und Wunden, besonders an den nervösen Theilen. Die Praeparata davon in der Officin sind das Oleum simplex und compositum.

✱ TAB. 16. *Lat.* Digitalis. *Germ.* Fingerhut. *Angl.* Fox Glove. *Gall.* la Digitale.

1. Altitudines tres pedes æquat: Folia tenuissimis & lanuginosis villis sunt vestita: Flores rubri albis maculis distincti, qui omnes vnum idemque caulis latus versus excresecunt.

2. Crescit in Anglia ad vias sepimentis cinctas & mense Junio atque Julio floret.

3. Interne raro hujus plantæ usus; siquidem vomitum excitat, & supra atque infra vehementer evacuat. PARKINSON laudat eius & radicis polypodii, cum cerevisia dulci seu non lupulata (Anglis Ale) decoctum tanquam remedium contra Epilepsiam approbatum. D. HVLSE commendat unguentum e floribus & butyro majali paratum ad ulcera scrophulosa manantia, si scilicet hoc obligentur, & singulis hebdomadibus remediis convenientibus bis terve corpus purgetur. Londini hoc unguentum Digitalis in officinis prostat.

4. NOM. GENER. Digitalis *Rai.* I. 767. *Tourn.* 165. *Riv.* I. 103. *Heuch.* Ind. 28. *Rupp.* 243. *Dill.* 145. *Boerb.* I. 228. *Vaill.* 47. *Heist.* I. 11. *Linn.* G. no. 614. *Roy.* 292. *Hall.* 616. *Kram.* 45. 51. *Ludvv.* no. 249.

5. NOM. SPEC. Digitalis *Riv.* I. 103. *Rupp.* 243. *Dill.* 145. Digitalis purpurea I. B. II. 812. *Rai.* I. 767. *Syn.* 283. *Tourn.* 165. *Vaill.* 47. Digitalis purpurea folio aspero C. B. pin. 243. *Boerb.* I. 228. Digitalis flore rubro *Heist.* I. 11. Digitalis foliolis calycinis ovatis *Linn.* H. 318. Digitalis foliolis calycinis ovatis acuminatis *Roy.* 292. *Hall.* 616.

1. Es wird 1. Schuh hoch. Die Blätter sind mit etwas subtilen wolligen Fäsergen belegt; die Blumen sind roth mit Weiss besprenzt, und wachsen alle auf einer Seite des Stengels.

2. Es wächst in Engelland an umzäunten Wegen, blühet im Junio und Julio.

3. Diese Pflanze wird selten innerlich gebraucht, weil sie ein starkes Brech-Mittel ist, und sowohl ober sich als unter sich mit Heftigkeit wirckt. PARKINSON erhebt das hiervon und der rad. polypodii mit süßem oder ungehopftem Bier (Englisch Ale) gemachte Decoctum als ein approbirtes Mittel wider die fallende Sucht. Der verstorbene Doctor HVLSE recommendirt die Salbe, so von Blumen und May-Butter gemacht worden, in scrophulösen Ulceribus, die stark fließen, wenn man solche darmit verbindet, und darbey den Leib die Woche 2. oder 3mahl mit schließlichen Arzeneyen purgirt. Diese Salbe, nemlich das Unguentum Digitalis, ist in London officinal.

TAB. 17. *Lat.* Absinthium vulgare. *Germ.* Wermut. *Gr.* Ἀψινθιον. *Angl.* Wormwood. *Hisp.* Asentios, Alosna.

© *Ital.* Assenzo, Assentia. *Gall.* Absinte. *Belg.* Allen.

1. Ad trium pedum altitudinem excresecit; caules cinerei coloris pleni sunt alba quadam & lanuginosa substantia; folia a facie superiori diluta seu saligna viriditate c., a facie inferiori diluta canitie d., visuntur; flores sunt lutei.

2. Crescit ad vias angustas sepitas & in locis incultis; floret mense Julio atque Augusto.

3. Usu sunt folia & summitates, evacuant humores melancholicos, provocant urinam, deperditum ex nimio potu appetitum restituunt, medentur stomacho vitiato & debili, vomitionibus & nausæ, roborant viscera, necant lumbricos, profunt in hydropo, ictero & febri tertiana quartanave. Sub omnibus memoratis circumstantiis infunduntur aqua, cerevisia vel vino. Cataplasma ex foliis recentibus cum axungia porcina contulis laudabat D. HVLSE D. RAO tanquam remedium in tonsillarum tumoribus atque angina: *vid. Rai. catal. plant.* Preparata officinarum anglicarum sunt aqua destillata simplex & magis minusque composita, syrupus simplex & compositus, oleum per infusionem & coctionem paratum itemque destillatum, extractum & sal fixum.

4. NOM. GEN. Absinthium *Rai.* I. 366. *Syn.* 188. *Tourn.* 457. *Heuch.* Ind. 45. *Rupp.* 196. *Dill.* 157. *Boerb.* I. 126. *Heist.* I. 1. *Kram.* 73. *Artemisia* *Linn.* Gen. no. 779. *Roy.* 153. *Hall.* 694. *Ludvv.* n. 296.

5. NOM. SPEC. Absinthium flore luteo officinarum *Heuch.* Ind. 45. Absinthium vulgare *Parck.* 98. *Rai.* I. 366. *Syn.* 188. *Heist.* I. 1. Absinthium vulgare maius *J. B.* III. P. I. 168. Absinthium Ponticum seu Romanum officinarum seu Dioscoridis C. B. pin. 138. *Tourn.* 457. *Rupp.* 196. *Dill.* 157. *Boerb.* I. 126. *Artemisia* foliis compositis multifidis, floribus subglobosis pendulis, receptaculo papposo *Linn.* H. 404. *Roy.* 153. *Artemisia* foliis incanis, pinnatis, pinnis bilobis latioribus, floribus ex alis pendulis in spicis heteromallis *Hall.* 694.

Nota. Planta hæc ex classe est earum, quæ florem habent compositum ex plurimis flosculis hermaphroditis calyce communi inclusis. Eiusmodi florem lente optica auctum sistit fig. 1. eiusque calycem squamosum a; fig. 2. flosculum solitarium eiusque germen b.; fig. 3. semen in naturali magnitudine & fig. 4. in magnitudine aucta. In exemplari Anglico exhibetur icon cum Absinthio vulgari nec foliis nec florum situ bene conveniens, nec aliam, nobis saltem notam, representans. Forlan tamen est Absinthium maritimum album *Ger.* 1099. *Rai.* *Syn.* 188.; quoniam vero hæc suspicio dubio haud caret, & descriptio ad vulgare absinthium pertinet, aliam iconem ad naturæ exemplar substituiamus.

1. Es wird bis 3. Schuh hoch, die Stengel sind grau voll weissen wolligten Wesens; die Blätter sind bleich oder weyßengrün oberhalbs c., und licht-graulich unterhalbs d., die Blumen gelb.

2. Es wächst an engen verzaunten Wegen und wüsten Orten; blühet im Julio und Augusto.

3. Man brauchet die Blätter und Gipfel, sie führen die melancholischen Feuchtigkeiten aus, treiben den Urin, bringen den durch Trincken verlohrenen Appetit wieder, sind gut in verdorbenen und schwachen Mägen, Brechen und Eckel, stärken die Eingeweyde, tödten die Würmer, nützen in der Wassersucht, Gelbsucht, drey- und viertägigen Fiebern. Bey allen obbemeldten Umständen werden sie mit Wasser, Bier oder Wein angestellt. Ein Uberschlag von den frischen Blättern mit schweinen Schmeer abgestossen wurde dem Herrn RAY von Dr. HVLSE gerühmt als ein Mittel wider das Schwellen der Mandeln und die Bräune. *vid. Raii Catal. Plant.* Preparata der Englischen Officinen sind aqua destillata simplex, magis & minus composita, syrupus simplex & compositus, oleum per infusionem & coctionem, ein destillirtes Oel, ein extractum und ein Sal fixum.

Anm. Dieses Gewächs gehöret in die Classe derjenigen, die eine aus vielen und in einer gemeinen Blumen-Hülse enthaltenen flosculis hermaphroditis zusammen gesetzte Blume habet. Eine solche nach einem Vergrößerungs-Glase vorgestellte Blume zeigt fig. 1. und seine Blumen-Hülse a.; ein einiges Blümlein fig. 2. nebst seinen Raimen b.; den Saamen in natürlicher Größe fig. 3. nach dem Vergrößerungs-Glase fig. 4. In dem Englischen Exemplar befindet sich eine Figur, die weder in den Blättern noch auch in der Lage der Blumen mit dem gemeinen Wermut wohl überein kommet, noch auch eine andere wenigstens uns bekannte Art vorstellet. Vielleicht ist es aber doch Absinthium maritimum album *Ger.* 1099. *Rai.* *Syn.* 188.; weil aber dieses Wermuthen nicht ohne Zweifel ist, und die Beschreibung zu dem gemeinen Wermut gehöret, so haben wir eine andere nach der Natur gemachte Figur dafür gesetzt.

TAB. 18. *Lat.* Millefolium. *Germ.* Garb-Kraut, Schaaf-Garbe. *Gr.* Στρατιώτης χιλιόφυλλος, χιλιόφυλλον, χιλιόφυλλον. *Angl.* Yarrow, Milfoil. *Hisp.* Millhogas yerva. *Ital.* Millefoglio. *Gall.* Millefeuille. *Belg.* Duyfend bladt.

1. Cau- B 2

1. Die

1. Caulis fere 18. digitos alti & aliquantulum pilosi, flores albi coloris in summitate ramorum dense congesti sunt in formam umbellæ.

2. In agris fere omnibus provenit mensæque Junio atque Julio fert flores.

3. Foliis attribuitur vis siccandi, refrigerandi & adstringendi; proficua in omnibus hæmorrhagiis, scilicet hæmoptysi, vomitu cruento, narium hæmorrhagiis; in dysenteria, mensibus & lochiis nimium fluentibus, calorem & nimiam acrimoniam temperando; præstant quoque usum in gonorrhœa, stranguria atque urinæ ardore externe applicata, itemque in herniis; sistunt quoque vulnerum recentiorum cruentationes.

4. NOM. GEN. Millefolium Rai. I. 345. Syn. 182. Tourn. 495. Heuch. Ind. 48. Rupp. 174. Dill. 140. Boerh. I. 112. Vaill. 127. Heist. I. 21. Kram. 85. Achillea Vaill. Mem. de l'Ac. de Sc. a. 1720. edit. Paris. 320. Linn. Gen. n. 794. Roy. 175. Hall. 712. Ludov. n. 358.

5. NOM. SPEC. Stratiotes millefolia Fuchs. 727. Millefolium stratiotes, pennatum, terrestre I. Bauh. III. 136. Millefolium flore albo Heuch. Ind. 48. Millefolium album Brunf. III. 171. Heist. I. 21. Millefolium vulgare Park. 693. Rai. I. 345. Syn. 183. Millefolium vulgare album C. B. pin. 140. Tourn. 495. Rupp. 174. Dill. 140. Boerh. I. 112. Vaill. 127. Millefolium vulgare foliorum laciniis brevibus odore tenui Kram. 85. Achillea vulgaris flore albo Vaill. Mem. de l'Ac. de Sc. l. c. Achillea foliis duplicato pinnatis, glabris, laciniis linearibus acute laciniatis Linn. H. 413. Roy. 175. Achillea pinnis foliorum plurimis, longe æqualibus, pinnatis, pinnulis trifidis & quinquefidis Hall. 715.

Nota. Folia huius plantæ ima seu radicalia a. longe magis divisa sunt, quam superiora seu caulina b. Flores, fig. 7. in magnitudine naturali & fig. 2. 3. paululum aucta, ex duplici flosculorum genere compositi sunt: qui in medio congesti sunt & discum formant, flosculi hermaphroditi regulares appellantur & minores sunt, ex quibus unum fig. 4. eiusque germen e. lente optica auctum representat; qui vero hos circumdant & radium constituunt, semiflosculi irregulares seu flosculi ligulati feminini vocantur & maiores sunt, quorum unum fig. 5. eiusque germen f. sistit pariter in magnitudine aucta. Hi omnes continentur calyce communi squamato fig. 3. d. adeoque florem ita dictum compositum constituunt. Fructus seu calyx cum seminibus inclusis remanens & siccus exhibetur fig. 6., semen maturum in naturali magnitudine fig. 7. aucta fig. 8. Flores speciei depictæ dicuntur albi atque omnino & semiflosculi & flosculi fig. 4. 5. albi sunt; quum vero flosculorum staminum apices seu vagina, qua includitur stylus, flaveant & multum prominent, radius hinc solus albus, discus vero flavus apparet fig. 1. 2. 3. Ejusdem speciei flores haud raro reperiuntur rubentes c., quæ varietas propterea vocatur Millefolium purpureum maius C. B. pin. 140. Nos flores ejusmodi albos & rubros in una eademque planta interdum reperimus.

1. Die Stengel werden ohngefähr 18. Zoll hoch und sind etwas haarig; die Blumen sind weiß und wachsen an dem Gipfel der Zweige nahe beisammen in der Gestalt eines Sonnen Schirms.

2. Es wächst auf den meisten Feldern und blühet im Junio und Julio.

3. Die Blätter hält man für trocknend, kühlend und zusammen ziehend, nützlich in allen Arten der Verblutungen, als Blut, Ausspenen und Brechen, Nasen-Bluten, in der Ruhr, wie auch allzuhäufigem Monat- und Kindbetter-Fluß, indeme es kühlet, und die allzugroße Schärfe mildert; sie sind auch gut in dem Saamen Fluß, Hararwinde und Brennen des Urins äußerlich aufgelegt, ingleichen in Brüchen; sie stillen auch das Bluten der frischen Wunden.

Anm. Die unterste Blätter an der Wurzel a. sind viel mehr zertheilt als die oben an dem Stengel b. Die Blumen in natürlicher Größe fig. 1. und etwas vergrößert fig. 2. 3. sind von zweyerley Art zusammen gesetzt: diese, welche in der Mitte dicht beisammen stehen, und den so genannten discum ausmachen, werden flosculi regulares hermaphroditi genennet und sind kleiner, davon eines fig. 4. und dessen Raimen e. vergrößert vorstellet; die aber diese umgeben und den so genannten Radium ausmachen, werden semiflosculi oder ligulati feminini genandt und sind größer, davon eines fig. 5. und dessen Raimen f. ebenfalls vergrößert vorstellet. Diese alle zusammen sind in einer gemeinschaftlichen schuppichten Blumen-Hülse fig. 3. d. eingeschlossen, und machen also eine so genannete zusammengesetzte Blume aus. Die Frucht oder die überbleibende ausgedrocknete Blumen-Hülse stellet fig. 6., einen zeitigen Saamen in natürlicher Größe fig. 7. und vergrößert fig. 8. vor. Die Blumen der vorgestellten Art werden weiß genennet, und es sind auch sowohl die flosculi als semiflosculi fig. 4. 5. wirklich weiß; weil aber die apices der staminum oder die vagina, worinnen der stylus eingeschlossen, gelb sind und weit hervor ragen, so scheint der radius allein weiß, der discus hingegen gelb zu seyn fig. 1. 2. 3. Von eben dieser Art werden auch nicht selten röthliche Blumen c. gefunden, welche Varietät deswegen genennet wird Millefolium purpureum majus C. Bauh. pin. 140. Wir haben zuweilen dergleichen röthe und weisse Blumen auf einer Pflanze gefunden.

TAB. 19. Lat. Faba major hortensis. Germ. Garten Bohnen, groſſe Bohnen. Gr. Κυαυός. Angl. the Garden Bean. Hisp. Havas. Ital. Fava. Gall. Feves. Belg. Roomse Boonen, Boere Boonen.

1. Ad tres vel quatuor pedes assurgit hæc planta. Folia pallide virent, flos est albus, sed interius duabus maculis nigris notatus.

2. Colitur in hortis, mensæ Maji floret, ipsæ autem fabæ mensæ Junio atque Julio matureſcunt.

3. Aqua e floribus destillata a quibusdam ad faciẽ fucandam adhiberi solet, quæ verò e siliquis præparatur, contra tormina & flatulentiam infantum præscribitur. Cataplasma e farina fabarum confectum tumorem mammarum in mulieribus a lacte exortum sanare, ait DIOSCORIDES. Idem autor asseverat, eandem farinam rosas, thymo atque albo ovi gallinacii permixtam prodesse in defluxionibus oculorum serosis, cum vino vero mixtam, maculas eorundem atque ruborem delere. Intrinsecus sumpta hæc farina utilis dicitur in hæmorrhagiis. In Officinis prostant aqua florum & siliquarum Fabarum.

4. NOM. GEN. Faba Rai. I. 909. Syn. 323. Tourn. 391. Riv. II. p. 12. Heuch. Ind. 32. Pr. I. 64. Rupp. 253. Boerh. II. 45. Vaill. 52. Heist. II. 12. Kram. 60. Vicia Linn. G. no. 708. Roy. 366. Ludov. n. 486.

5. NOM. SPEC. Bona sive Phascolus major Dod. 513. Faba C. B. pin. 338. Rai. I. 909. Syn. 323. Riv. II. Tab. 23. Heuch. Ind. 32. Rupp. 263. Boerh. II. 45. Faba, Cyamus leguminosa I. B. II. 279. Faba fructu albo majore Heist. II. 12. Faba flore candido, lituris nigris conspicuo Tourn. 391. Faba major hortensis Ger. 1209. Faba major vulgaris Lob. adv. 392. Vaill. 52. Vicia caule erecto, petiolis absque cirrhis Linn. H. 360. Roy. 366.

Nota. Quoniam Exemplaris anglici figuram imperfectam deprehendimus, aliam ad naturam ductum paratam sistimus. Folia plerumque ovata terminantur mucrone a.; interdum summitas sinuata est & mucro ex sinu medio surgit b. Flores in magnitudine naturali integros, a latere & a facie antica, sistit

1. Die Garten-Bohne wächst bis 3. oder 4. Schuh hoch, die Blätter sind bleichgrün, die Blumen weiß mit zwei schwarzen Flecken inwendig.

2. Es wird in Gärten gesteckt und blühet im May, die Bohnen sind zeitig im Junio und Julio.

3. Das aus den Blumen destillirte Wasser wird von einigen zur Schmincke gebraucht, dessen von den Schotten bedienet man sich in Blähungen und Grimmen der Kinder. DIOSCORIDES sagt, das Bohnen-Mehl zu einem cataplasma gemacht, curet die Geschwulst der Brüste an Weibern, die von der Milch herkommet. Er recommendiret auch dasselbe vermischt mit Rosen, Thymian und dem weissen von einem Ey, als sehr gut alle wässrige Flüsse von den Augen wegzubringen; mit Wein vermischt aber, soll es in den Flecken und Rörthe der Augen nützlich zu gebrauchen seyn. Das Mehl innerlich gegeben hält man für gut in hæmorrhagiis, die præparata in der Officin sind aqua florum & siliquarum Fabarum.

Anm. Weilen wir die Figur des Originals unvollkommen gefunden, haben wir eine andere nach der Natur vorgestellet. Die Blätter sind insgemein länglicht rund und endigen sich mit einer Spitze a.; zuweilen ist das oberste Ende ausgeschweift, und stehet die Spitze in der mitte derselben b. Die Blumen werden in ih-

Fig. 1. cum calyce e.; floris pars maxima, superior & sinuata, vocatur vexillum; duæ mediæ laterales singulæ nigra macula notata, quarum una repræsentat fig. 2., appellantur alæ; tertia fig. 3. sub his latens, nominatur carina, quæ continet stamina & pistillum fig. 4. Siliqua matura a facie externa depingitur fig. 5., a facie interna fig. 6., unacum fructu maturo seu semine. Floris vexillum interdum purpurascens colore tingitur, annotante RAIUS Hist. l. c., qualis flos a C. BAUHINO l. c. ex purpura nigrescens vocatur, apud TOURNEFORTIUM autem 192. peculiarem speciem constituit & *Faba flore ex purpura nigrescente* appellatur. Fructus color, notante jam C. BAUHINO l. c., pariter variat, estque vel candidus, vel in candido pallens (qualem nostra pictura in siliqua aperta sistit) vel ex rubicundo colore purpurascens, qualis fig. 6. extra siliquam conspicitur; hanc vero coloris mutationem accidentalem esse varietatem, vel a solo vel a cultura dependentem, hincque fabas rubras satas interdum, imo sæpius, albas producere, propria experientia edoctus affirmat RAIUS l. c.

rer natürlichen Größe vorgestellt ganz von der Seite und von voren fig. 1. nebst dem calyce e.; der Blume größter, oberster, und in der mitte ausgeschweiffter Theil wird genennet vexillum; die zwey mittlere Seiten Theile, deren jeder einen schwarzen Flecken hat und einer davon fig. 2. abgebildet ist, heißen alæ; der dritte fig. 3. unter diesen verborgene wird genennet carina, welcher die stamina und das pistillum fig. 4. verschlossen hält. Eine zeitige Frucht oder Schotte zeigt fig. 5. von außen, fig. 6. von innen, und zugleich den Saamen. Das vexillum ist zuweilen purpurfarbig, wie RAIUS Hist. l. c. angemercket, dergleichen Blume von C. BAUHINO l. c. flos ex purpura nigrescens genennet wird, bey dem TOURNEFORT aber p. 392. eine besondere Art ausmachet, *Faba flore ex purpura nigrescente* genant. Die Farb des Saamens, wie C. BAUHINUS l. c. schon angemercket, ist ebenfalls unterschiedlich, nemlich weiß, aus dem weißen gelbliht (dergleichen unsere Figur in der offenen Schotte zeigt) oder aus dem röthlichten purpurfarbig, wie fig. 6. außer der Schotte zu sehen; daß aber diese unterschiedliche Farbe nur zufällig seye, und entweder von dem Erdreich oder der cultur abhänge, mithin die gesteckte röthlichte Bohnen zuweilen, ja öfters, weiß hervortringen, bezeuget RAIUS l. c. aus eigener Erfahrung.

TAB. 20. Lat. Trifolium vulgare. Germ. Klee, gemeiner Klee. Gr. Τρίφυλλον, Angl. Meadow Trefoil, Glo-
 * ver Grass. Ital. Trifoglio. Gall. Troisfeuille, Triolet, Trefle. Belg. Roode Klaveren.

1. Folia pallide virent; Flos purpureo colore, albis maculis inspersis, pictus est; Caulis ad octodecim digitos extenditur.

2. Reperitur copiose in agris quam plurimis atque pratis & mense Majo atque Junio floret.

3. Folia atque flores, tanquam siccantia atque adstringentia, utiliter adhibentur in omnis generis fluxionibus, in stranguria & ardore urinæ. Ex his cum adipe suilla confectum cataplasma medetur tumoribus atque inflammationibus. Decoctum totius plantæ, dum floret, album mulierum fluorem sistere, scribit MATTHIOLVS.

4. NOM. GEN. Trifolium Rai. l. 941. Syn. 327. Tourn. 404. Riv. II. p. 11. Heuch. Ind. 31. Rupp. 206. Boerh. II. 30. Vaill. 194. Heist. I. 31. Linn. G. n. 713. Roy. 377. Hall. 580. 585. Kram. 46. Ludov. n. 473. Trifolioides Knaut. meth. 84. Triphylloides Ponted. Anth. 241.

5. NOM. SPEC. Trifolium Riv. II. Tab. 11. Heuch. Ind. 31. Dill. 78. Trifolium rubrum Kram. 46. Trifolium pratense purpureum Fuchs. 817. C. B. pin. 327. Rai. l. 943. Syn. 328. Rupp. 206. Vaill. 194. Trifolium pratense flore rubro Heist. I. 31. Trifolium pratense flore monopetalo Tourn. 404. Boerh. II. 31. Trifolium spicis villosis, caule diffuso, foliis integerrimis Linn. H. 375. Roy. 380. Trifolium spicis villosis foliis insidentibus, vaginarum caudis capillaribus Hall. 585. Trifolioides Knaut. meth. 84. Triphylloides pratensis flore purpureo Ponted. Anth. 241.

Nota. In nostris regionibus hæc species eodem modo, quo illam figura a. b. sistit, reperitur in locis incultis seu aridioribus; in pratis vero seu locis cultis & pinguibus spicæ deprehenduntur majores & laxiores c., floresitem ex rubro & albo magis variegati nec non folia d. saturatius virentia, utroque extremo magis acuta & albente macula angulosa variegata, quales variationes C. B. pin. 327. aliique jam annotarunt. Num Trifolium pratense purpureum majus Rai. l. 944. Trifolium purpureum majus sativum pratense simile Rai. Syn. 328. conf. Hall. p. 586. varietas constans sit, an a cultura dependeat, disquisitione adhuc opus habet. Floris partes in hac specie inter se coalitæ deprehenduntur: integer unacum calyce e. in magnitudine naturali sistitur Fig. 1., aucta Fig. 2., carina cum binis alis Fig. 3., vexillum Fig. 4., stamina cum pistillo Fig. 5., fructus seu calyx maturus cum semine incluso magnitudine naturali Fig. 6., aucta Fig. 7., calyx apertus a facie interna Fig. 8. 9., semen siliculæ inclusum & nudum Fig. 10., magnitudine aucta Fig. 11.

Ann. In unsern Gegenden wächst diese Art nach der Figur a. b. auf ungebauten und trockenen Boden; auf angebauten Wiesen aber oder fetten Boden sind die Blumen Büschel größer und weitächeriger, die rothe Blümlein auch mehr mit weiß vermengt, nicht weniger die Blätter d. dunklergrün, an beiden Enden mehr zugespitzt und mit einem weißen edigten Flecken bezeichnet, dergleichen Veränderungen schon C. B. pin. 327. und andere mehr angemercket haben. Ob das Trifolium pratense purpureum majus Rai. l. 944. Trifolium purpureum majus sativum pratense simile Rai. Syn. 328. conf. Hall. 586. eine beständige varietät seye, oder nur von der cultur herkomme, ist annoch zu untersuchen. Der Blume ihre Theile sind in dieser Art miteinander verwachsen: eine ganze Blume, nebst seinem calyce e. wird vorgestellt in natürlicher Größe Fig. 1., vergrößert Fig. 2., die carina mit den beyden alis Fig. 3., das vexillum Fig. 4., die stamina mit dem pistillo Fig. 5., die Frucht oder der zeitige calyx mit dem verschlossenen Saamen in natürlicher Größe Fig. 6., vergrößert Fig. 7., ein geöffneter calyx von der innwendigen Seite Fig. 8. 9., der annoch in der Hülse eingeschlossene und der bloße Saame in natürlicher Größe Fig. 10., vergrößert Fig. 11.

TAB. 21. Lat. Agrimonia. Germ. ODERMENGHE Gr. εὐπατόριον, Angl. Agrimony, Greeks Eupatory. Hisp. Agramonia. Ital. Agrimonia. Gall. Agrimoine. Belg. Agremonie.

1. Hæc planta eadem est cum illa, quam DIOSCORIDES, GALENVS aliique Græcorum antiquorum vocant Eupatorium. Altitudinem habet duorum pedum; folia sunt alata seu pinnata & pilosa, color pallide viridis, flos flavus.

2. Crescit ad sepes & agrorum margines, mense Junio atque Julio flores agit.

3. Purificat sanguinem, confortat jecur, adeoque ad omnes morbos ex hujus infirmitate ortos, quales sunt hydrops, icterus &c. utilis est. Hanc, cum vino albo coctam, commendat MATTHIOLVS tanquam egregium contra stranguriam atque mictionem cruentam remedium. Eadem herba siccata atque pulverata a RIVERO in urinæ incontinentia laudatur. Refertur quoque ad herbas vulnerarias, & ad ejusmodi

1. Dieses ist das Eupatorium DIOSCORIDIS, GALENI und der alten Griechen; es wächst bey zwey Schuh hoch, hat so genannte gestülpte und haarigte Blätter, einer bleichgrünen Farbe, und gelbe Blüthe.

2. Es wächst an Hecken, und an den Randen der Felder; blühet im Junio und Julio.

3. Die Agrimonia braucht man zur Geblüths-Reinigung, es stärcket die Leber und ist mithin gut in allen denjenigen Krankheiten, welche aus derselben Schwachheit entstehen, als Wassersucht, Gelbsucht &c. MATTHIOLVS recommendirt es mit weissen Wein, als ein herrliches Mittel wider die Harnwinde und den blutigen Urin. RIVERO erhebt das Pulver von dem getrockneten Kraut in der incontinentia urinæ. Es ist gleichfalls ein Wund-Kraut und wird zu solchen Träncken

di potiones adhibetur, sicut etiam extrinsecus in balneis atque fomentationibus.

4. NOM. GEN. Agrimonia Rai. I. 399. Syn. 202. Heuch. Ind. 16. Rupp. 100. Dill. 129. Boerb. I. 79. Vaill. 3. Heist. III. 1. Linn. G. n. 464. Roy. 240. Hall. 407. Kram. 32. Ludw. n. 606.

5. NOM. SPEC. Eupatorium Fuchf. 244. Eupatorium veterum sive Agrimonia C. B. pin. 321. Eupatorium Dioscoridis & aliorum Græcotum Gesn. hort. 258. a. Eupatorium Dioscoridis & Avicennæ Anguill. 258. Col. Emp. 139. Agrimonia seu Eupatorium I. B. II. 398. Agrimonia Ruell. 597. Ger. 712. Rai. I. 400. Syn. 202. Agrimonia inodora Kram. 32. Agrimonia flore pallide luteo Heuch. Ind. 16. Agrimonia officinarum Tourn. 301. Rupp. 100. Dill. 129. Boerb. I. 79. Vaill. 3. Agrimonia vulgaris sive officinarum flore luteo Heist. III. 1. Agrimonia foliis pinnatis fructibus hispida Roy. 240. Hall. 407. Agrimonia foliis omnibus pinnatis, fructibus hispida Linn. H. 179.

Nota. Foliorum superficies superior dilutius & saturatius vi-
ret pro soli conditione, inferior vero semper pallidior est; pin-
narum quoque extremum quandoque minus acutum deprehen-
ditur. Naturali magnitudine sistitur flos Fig. 1., fructus Fig. 2.,
idem verticaliter dissectus Fig. 3. cum loculo aperto semen con-
tinente, semen nudum Fig. 4., idemque magnitudine auda
Fig. 5. Fructus horizontaliter dissectus duos manifestat loculos,
singulos unico semine (ex quibus alterum tamen plerumque
abortit) fætos. Vulgaris hæc Agrimonia a plerisque cen-
setur inodora; CASP. HOFMANNVS de medicam. officin. I. II.
c. 88. vero jam asseruit, eandem aliquibus in locis & verno tem-
pore odoratam esse & sapore modo subdulci, modo subamaro:
radicem verno tempore odoratam esse, etiam annotat HAL-
LERVS I. c. His non obstantibus, illa tamen, quam FAB.
COLVMNA odore fragrantem & sapore aromatico jucundissi-
mo, adstringente, præstantiorem, uti etiam vulgarem inodo-
ram vel ingratam observatam, I. c. more suo accuratissime de-
scribit, distinguenda videtur, licet, ipso mōnente, tam consimi-
les sint plantæ, ut vix una ab altera, nisi naribus admota, di-
gnoscat: odoratam namque & vulgarem in uno Italia monte
(hanc tamen ad montis radicem septentrionalem, illam in syl-
va juxta flumen austrum versum) & eodem tempore perfectas
invenit. Odoratam hanc, Florentia acceptam, in horto suo
coluit quoque CAMERARIUS Hort. 7. additque, eam apud
nos ægre perdurare, quodcum consentit MILL. Dict. I. mo-
nens, hanc alia, quam vulgarem, opus habere cultura. Eadem
Camerariana inter plantas in horto medico Pisano & Chelsea-
næ cultas etiam recensetur a MICH. ANG. TIELI H. Pif. 5.
& ab IS. RAND H. Chel. 7. VAILLANT porro, I. c.
testatur, eandem omnino ita differentem reperiri in sylva de
Montmorency, quod repetit FABREGOV T. II. p. 38., &
LOBELIVS advers. 308. jam refert, Xantis Pictavæ Gallia
finitimas sylvas eandem Agrimoniam edere, quam odoratam
vocant propter odorem multo fragrantiorum, etiam in hortis
illam coluisse LAMOVREVM. Hanc denique Lobelianam
haud procul ab urbe Blefis se etiam reperisse, annotat MORI-
SONVS Hist. II. 614., sed inde constituit tertiam differentiam,
nimirum medio modo odoratam, non magis tamen externo ha-
bitu se distinguentem: tres ergo recenset species, quarum est
1.) Eupatorium veterum seu Agrimonia inodora seu minus odora; 2.)
Eupatorium odoratum Santonense seu Blefense, Agrimonia medio modo
odorata; 3.) Eupatorium maxime odoratum seu Romanum, addit-
que: has Agrimonias tres distinctas species in horto publico Univer-
satis impressariarum cultas habemus. Hanc procul dubio ob ra-
tionem & TOVRNEFORTIVS & KRAMERVS I. c. eas-
dem tanquam totidem species recensent, LINNÆVS quo-
que tanquam varietates admittit. Atque omnino tanquam tot
varietates constantes salutariter merentur, si uno eodemque in so-
lo atque sub eadem cæli plaga per aliquot annos cultæ eandem
differentiam constanter conservant. MILLERVS atque
RANDIVS I. c. hanc tertiam Morisonianam tacent.

sebe als so viele Arten angezeigt und LINNÆVS auch als varietäten angenommen. Und sie müssen auch als so viele beständige
varietäten angesehen werden, wann sie, in einem Erdrich und in einer Gegend durch etliche Jahre erzogen, eben diesen Unterschied be-
ständig behalten. MILLER und RAND melden nichts von der dritten Morisonischen Art.

cken genommen, auch äußerlich in Bädern und Bähun-
gen gebraucht.

Anm. Die Blätter sind an der obern Fläche bald lichter bald
dunkler grün, nach Beschaffenheit des Erdbodens, an der untern
aber allezeit bleicher; auch das äußerste der Blätter wird zuweilen
stumpfer befunden. In natürlicher Größe wird die Blume vorge-
stellt Fig. 1., die Frucht Fig. 2., eben dieselbe der Länge nach ent-
zwey geschnitten Fig. 3. nebst einem geöffneten Säclein, worinnen
der Saame liegt, ein bloßes Saam-Korn Fig. 4. und eben das-
selbe vergrößert Fig. 5. Wann die Frucht überquer entzwey ge-
schnitten wird, zeigen sich 2. dergleichen Säclein, deren jedes
ein Saam-Korn enthält, davon aber insgemein nur eines vollkom-
men wird. Diese gemeine Obergang wird von den meisten ohne
Geruch beschrieben; CASP. HOFMANNVS de medicam.
offic. lib. II. c. 88. aber behauptet, daß sie an einigen Orten im
Frühling einen Geruch und manchmal einen süßlichten manchma-
len einen bitterlichten Geschmack habe: daß die Wurzel im Früh-
ling einen Geruch habe, bemerkt auch Herr Hof-
Rath Haller I. c. Nichts desto weniger scheint diejenige Art, welche FAB.
COLVMNA als wohlriechend und eines höchst angenehmen Ge-
würghaften und zusammenziehenden Geschmacks, nebst dem ge-
meinen als ohne einigen oder wenigstens ohne angenehmen Geruch,
I. c. seiner Gewohnheit nach sehr genau beschreibt, unterschieden
zu seyn, obgleich, wie er selbst erinnert, beide Arten einander so
ähnlich sind, daß sie nicht anders, als durch den Geruch, zu unter-
scheiden: dann er hat beide auf einem Berg in Italien (jedoch die
ohne Geruch am Fuß des Bergs gegen Mitternacht, die wohlri-
chende hingegen in einem Wald desselben an einem Fluß gegen Mit-
tag) und zu einer Zeit in ihrer Vollkommenheit gefunden. Die
wohlriechende hat auch CAMERARIUS aus Florenz erhalten
und in seinem Garten gezogen (vid. ejusd. Hort. p. 7.) und mel-
det dabei, daß solche schwehr bey uns fortgepflanzt werde, welchen
auch MILLERVS Dict. I. bestimmet und erinnert, daß sie eine
andere Pflege, als die gemeine nötig habe. Diese Camerarische
wird auch von M. A. TIELI unter den Gewächsen des Pisani-
schen, und von IS. RAND des Chelsea Gartens angeführt. Ferner be-
zeugt VAILLANT I. c. daß sie allerdings also unterschieden in
dem Wald de Montmorency gefunden werde, welches FABRE-
GOV T. II. 38. wiederholt, und LOBELIVS advers. 308
erzählet schon, daß die Gränz-Wälder zu Santonge und Poi-
tou in Frankreich eben die Agrimoniam hervorbringen, welche
die wohlriechende genennet wird, und daß dieselbe LAMOV-
REVS in seinem Garten gezogen habe. Endlich hat auch MORI-
SON Hist. II. 614. angezeigt, daß er diese Lobelische nicht weit
von Blois gefunden habe, woraus aber dieser eine dritte Art ma-
chet, nemlich eine mittelmäßig riechende, die aber ebenfals in der
äußerlichen Gestalt nicht unterschieden seye. Er erzählet derowe-
gen 3. Arten: 1.) Eupatorium veterum seu Agrimonia inodora seu
minus odora; 2.) Eupatorium odoratum Santonense seu Blefense,
Agrimonia medio modo odorata; 3.) Eupatorium maxime odoratum
seu Romanum und setzt dazu, daß damals diese 3. unterschiedene
Arten in dem Universitäts-Garten gezogen worden. Daher hat
ohne Zweifel TOVRNEFORT und KRAMER I. c. eben die-
selben 3. Arten in dem Universitäts-Garten gezogen.

TAB. 22. Lat. Malva vulgaris. Germ. Gemeine Pappel. Gr. μάλαχη. Angl. Common Mallow. Hisp. Malvas.
Ital. Malba, Malva. Gall. Mauve. Belg. Gemeene Maluwe, Keeskenskruyt.

1. Hæc malva assequitur altitudinem trium pedum.
Caulis pilosus est, herba e flavo viridis, flos e dilutiori
rubro purpureus, & simul lineis purpureis sed paulo
obscurioribus, distinctus.

2. Crescit plerumque ad vias, & fere per omnes
æstatis menses floret.

3. Una est ex quinque herbis emollientibus, adeo-
que virtute molliendi, refrigerandi atque laxandi gau-
det. Decoctum ex hac violarum syrupo dulcesfactum
& ad heminam quandoque assumtum servat alium
apertam, temperat biliosos humores, & lenit ardorem
atque acridinem urinæ, hancque promovet, ac con-
tra calculosos affectus est remedium. Cataplasma au-
tem ex eadem præparatum sedat dolorem ex apum
atque vesparum punctationibus exortum. Althææ lo-
co adhiberi potest.

1. Diese Pappeln wachsen bis 3. Fuß hoch, die Sten-
gel sind etwas haarig, das Kraut ist gelblich grün, die
Blume hellrothlichpurpur mit dunklen purpur Streifen.

2. Es wächst gemeinlich am Weg, und blühet die
mehresten Monathe des Sommers.

3. Dieses ist eines von den 5. erweichenden Kräutern,
indem es erweicht, kühlt und laxiret. Das Decoctum
dieses Krauts mit Viole Syrup versüßet, und zuweilen
zu einer viertheils Maas gerruncken, hält den Leib offen,
lindert die gallichten Feuchtigkeiten, das Brennen und
die Schärffe des Urins, befördert denselben, und ist gut
in Stein Umständen. Ein cataplasma oder Überschlag
von diesem Kraut, stillt den Schmerzen von Bienen
oder Wespen Stich. In Ermangelung des Sibische
Krauts, kan man es an dessen Stelle brauchen.

4. NOM.

4. NOM. GEN. *Malva Rai.* I. 397. *Syn.* 251. *Tourn.* 94. *Heuch. Ind.* 3. *Pr.* I. 13. *segg.* II. 28. *Rupp.* 10. *Dill.* 106. *Boerh.* I. 267. *Vaill.* 124. *Heist.* II. 18. *Linn.* G. n. 676. *Roy.* 356. *Kram.* 14. *Ludvv.* n. 144.

5. NOM. SPEC. *Malva officinarum flore majore rubro Heist.* II. 18. *Malva vulgaris Park.* 299. *Rai.* I. 399. *Syn.* 257. *Malva vulgaris flore majore, folio sinuato I. B.* II. 949. *Tourn.* 95. *Boerh.* I. 268. *Vaill.* 124. *Malva sylvestris folio sinuato C. B. pin.* 314. *Rupp.* 10. *Dill.* 106. *Malva caule erecto, folio sinuato, flore majore purpureo Kram.* 14. *Malva caule erecto foliis fere palmatis obsolete serratis Linn.* H. 347. *Roy.* 356. *Hall.* 362.

Nota. Florum color pro soli vel tempestatis conditione rubens vel purpurascens magis, semper autem striis saturationi colore distinctis variegatus deprehenditur; recens apertus latius quoque rubet, marcescens vero magis magisque purpurascit, unde forsan illae varietates flore caeruleo & flore purpureo-rubro ex Hort. Catholico a TOVRNEFORT l. c. recensitae. Floris integri facies interna & externa silitur fig. 1. b. b., ejus calyx duplex fig. 1. 3. a., columna in medio floris erecta fig. 1. c., magnitudine aucta fig. 2., fructus immaturus in situ fig. 3. d., maturus a nexu cum receptaculo solutus fig. 4., qui constat ex plurimis capsulis fig. 5., laxae coherentibus, quarum exterior pars e. multo crassior, interior f. tenuis est. Capsula haec sponte sua non dehiscit, aperta vero unicum offert semen & naturali & aucta magnitudine fig. 6. representatum.

Ann. Die Farbe der Blume ist nach Beschaffenheit des Erdreichs und der Bitterung mehr röthlich oder purpurfarbig, allezeit aber mit dunklern Striemen unterschieden; eine frisch aufgeblühete Blume ist auch allezeit röther, als eine welkende, welche mehr und mehr purpurfarbig wird; daher kommen vielleicht diejenige varietäten flore caeruleo und purpureo-rubro, welche aus dem Horto Catholico TOVRNEFORT l. c. anführet. Einer ganzen Blume inwendige und auswendige Gestalt ist zu sehen fig. 1. b. b., calyx fig. 1. 3. a., der in der mitte der Blume aufrecht stehende cylinder fig. 1. c., vergrößert fig. 2.; eine unreife Frucht in ihrem Lager fig. 3. d., eine zeitige abgenommene fig. 4., welche besteht aus vielen schwach aneinanderhängenden Saamen-Säcklein fig. 5., deren auswendiger Theil e. viel dicker, der inwendige f. ganz dünn ist. Diese Säcklein öffnen sich nicht von selbst, wann sie aber geöffnet werden, enthält ein jedes einen einigen Saamen, der in der natürlichen und vermehrten Größe fig. 6. zu sehen.

TAB. 23. *Lat.* Nasturtium hortense. *Germ.* Garten-Kress. *Gr.* Καρδαμύς. *Angl.* Garden Cress. *Hisp.* Nasturtio, Malpica. *It.* Nasturzio, Agretto. *Gall.* Cresson domestique ou de Jardin, Nasitort. *Belg.* Tuin Kerse.

1. Altitudo octodecim digitorum. Color herbæ lucide viridis. Flos albus.

2. Seritur quotannis in hortis, & ferme per totam aestatem floret.

3. Haec planta aliis herbis frigidioris naturæ permixta temperat harum frigus, ob virtutem, qua pollet, calefaciendi, unde etiam vel sola, vel cum aliis cum lactuca comeditur. Laudatur in scorbuto, hydrope, apoplexia & lethargo cataplasma ex hac & lardo suillo sanat achores seu crustam lacteam. Semen scorbuto, hydropi atque lienis inflationibus adversatur, aperit obstructions mensium, & tandem impedit alopeciam sive capillorum defluvium.

4. NOM. GEN. *Nasturtium Rai.* I. 824. *Tourn.* 213. *Heuch. Ind.* 13. *Rupp.* 86. *Boerh.* II. 8. *Heist.* I. 22. *Hall.* 343. *Kram.* 22. *Ludvv.* no. 422. *Lepidium Linn.* G. no. 645. *Roy.* 334.

5. NOM. SPEC. *Nasturtium hortense Ger.* 250. *Rai.* I. 825. *Heuch. Ind.* 13. *Heist.* I. 22. *Nasturtium vulgare I. B.* II. 912. *Nasturtium vulgare hortense flore rubeolo Kram.* 22. *Nasturtium vulgatum C. B. pin.* 103. *Tourn.* 213. *Rupp.* 86. *Boerh.* II. 8. *Lepidium foliis oblongis varie divisis & incisis Linn.* H. 331. *Lepidium foliis oblongis multifidis Linn.* Vrid. 63. *Roy.* 335.

Nota. Flos silitur fig. 1., capsula seminalis seu fructus immaturus fig. 2., maturus fig. 3., in partes suas divisus fig. 4., ubi a. sepimentum inter duos loculos seu valvas, b. b. utraque valva, fig. 5. semen.

Ann. Die Blume stellt vor fig. 1., die Saamen-Hülse oder unreife Frucht fig. 2., die reife Frucht fig. 3., eine Saamen-Hülse in seine Theile getheilet fig. 4., a. die Scheidwand zwischen beyden Säckern b. b., fig. 5. den Saamen.

TAB. 24. *Lat.* *Prunella, Brunella, Consolida minor. Germ.* Braunellen. *Gr.* Ευκαλίσσιος. *Angl.* Self-Heal. *Hisp.* Herbe au charpentier, Brunelle. *Belg.* Bruynelle.

1. Haec planta ad pedis altitudinem ascendit: Color obscure viridis, flos autem purpureus est.

2. Crescit in pratis atque pascuis; ultimis aestatis mensibus floret.

3. Hujus vel succus vel saturatum decoctum dat remedium contra omnes linguæ, palati atque colli inflammationes & exulcerationes, nec non contra sanguinis profusiones ex interioribus corporis partibus, præcipue contra mictionem cruentam.

4. NOM. GEN. *Prunella Rai.* I. 551. *Syn.* 238. *Brunella Tourn.* 182. *Riv.* I. p. 10. *Heuch. Ind.* 24. *Rupp.* 180. *Dill.* 91. *Boerh.* I. 168. *Vaill.* 22. *Heist.* I. 6. *Linn.* G. no. 586. *Hall.* 636. *Kram.* 50. *Ludvv.* no. 201.

5. NOM. SPEC. *Consolida minor Matth.* 963. *Prunella Ger.* 632. *Rai.* I. 551. *Syn.* 238. *Prunella vulgaris Trag.* 301. *Prunella flore minore vulgaris I. B.* III. 428. *Brunella Fuchs.* 621. *Brunella officinarum Riv.* Tab. 29. *Dill.* 91. *Heist.* I. 6. *Brunella officinarum flore purpureo vel caeruleo Heuch. Ind.* 24. *Brunella major folio non dissecto C. B. pin.* 260. *Tourn.* 182. *Rupp.* 180. *Boerh.* I. 169. *Vaill.* 22. *Brunella vulgaris foliis ovalibus serratis Kram.* 50. *Brunella bracteis cordatis Linn.* H. 316. *Roy.* 314. *Brunella foliis dentatis, spica folio minore Hall.* 636.

Nota. Integer flos se silit a facie antica fig. 1. a. cum calyce b., inferius dimidium corollæ seu barba tripartita fig. 1. c. cum binis inferioribus staminibus d. d., superius corollæ dimidium seu galea integra fig. 3. e. cum binis superioribus staminibus f. f., calyx apertus fig. 4. b. cum pistillo g. & quatuor seminum rudimentis h., integer calyx fig. 5. semina matura fig. 6. Nostra figura exemplar naturale elatius fuit cum foliis parum hinc inde tantum serratis spica florum magis sparsa, ipsisque floribus majoribus, ex caeruleo late purpurascens, quo colore & calycis summitas infecta erat. In locis siccioribus hæc species humilior, spicis compactioribus & floribus minoribus reperitur, qualis propemodum est figura exemplaris Anglici, foliis tamen non magis serratis quam nostra. Nota equidem est alia species, quæ dicitur *Brunella flore majore Riv.* Tab. 29. *Brunella foliis integris vix dentatis, spica foliis majore Hall.* 637; sed huic minus adhuc respon-

Ann. Eine ganze Blume zeigt sich von vornen fig. 1. a. nebst dem calyce b., die untere Hälfte fig. 2. c. nebst den 2. untersten staminibus d. d., die obere Hälfte fig. 3. e. mit den 2. obern staminibus f. f., ein geöffneter calyx fig. 4. b. mit dem pistillo g. und 4. Saamen-Körnlein h., ein ganzer calyx fig. 5. und der zeitige Saame fig. 6. Die Figur ist gemacht nach einem Muster, das hochstenglicht war, wenig und nur hier und da leicht eingekerbte Blätter, einen mehr ausgespreiteten Blumen-Büschel und selbst größere Blumen hatte, welche aus bläulich purpurfarbig gleichwie auch das oberste des calycis selbst gewesen. An trockenen Orten wächst diese Art viel niedriger, die Blumen sind kleiner; worinnen die Figur in dem Englischen original mehr übereinkommet, doch sind die Blätter auch nicht mehr eingekerbt. Es ist zwar eine andere Art be-
laudet, die genennet wird *Brunella flore majore Riv.* Tab. 29. *Brunella foliis*

respondet nostra, quam vulgaris speciei varietatem tantum censuimus, cujus etiam folia & integra & leviter crenata annotavit C. B. l. c.

foliis integris vix dentatis, spica foliis majora Hall. 687. 3 aber mit dieser kommt die unsrige noch weniger überein, welche wir deswegen nur für eine varietät der gemeinen Art halten, als dessen Blätter ganz und leicht eingekerbt von C. B. l. c. angemerket sind.

TAB. 25. *Lat.* Caprifolium, Periclymenum. *Germ.* Geißblatt, Baum-Lilie, Speck-Lilie, Zercher-Rosen. *Gr.* \odot π - ρ - α - λ β - ν - ν v. *Angl.* Wood-Bind, Honey-Suckle. *Hisp.* Madresilva. *Ital.* Vincibosco. *Gall.* Chevre-feuille, Vincebosse. *Belg.* Geytenblad, Mammetjeskruyt.

1. Hujus plantae crassities sive circumferentia ad octo vel decem digitos accedit. Sarmenta sunt longa atque exilia, quae omnibus rebus, quas modo attingunt, sese implicant: folia sunt e caeruleo viridia, seu caesia, flos subruber, quem sequuntur baccae rubedine paulo intensiore tinctae.

2. Reperitur in sepibus plurimis, ubi tota fere aestate floret.

3. Folia interdum gargarismatibus miscentur, in laesionibus scilicet faucium. In tabe & tussi, ut & in obstructionibus epatis atque lienis referendis laudatur a quibusdam decoctum. Oleum ex infusione florum confectum dicunt consolidare, calefacere, item spasmis atque convulsionibus nervorum mederi. MATTHIOLVS folia eorumque succum ad illa praecipue unguenta commendat, quorum usus est in vulneribus capitis & pedum ulceribus.

4. NOM. GEN. Periclymenum *Rai. I. 1490. Riv. p. 22. Heuch. Ind. 29. Pr. I. 19. Rupp. 250. Kram. 142. Caprifolium Rai. Syn. 458. Tourn. 608. Dill. 109. Boerb. II. 226. Vaill. 27. Heist. I. 7. Hall. 464. Ludvv. no. 278. Lonicera Linn. G. no. 174. Roy. 237.*

5. NOM. SPEC. Caprifolium Germanicum floribus speciosius *Soc. Hortul. p. 15. Tab. VI. an Caprifolium non perfoliatum flore interius albo, rubro externe Boerb. II. 226. Caprifolium floribus racemosis Hall. 465. Lonicera floribus capitatis terminatricibus, foliis omnibus distinctis Linn. H. 58. Roy. 237.*

Nota. Tres flores sigillatim fig. 2. 3. 4. exhibiti & duo segmenta corollae inaequalia a. b., stamina c. c. & stylum d. accuratius representantes, ut & fructus fig. 5. ejusque baccae umbilicatae f. & thalamus e., fig. 6. denique bacca aperta & fig. 7. semina seu acini, desumpta sunt ab alia specie, quae vocatur *Caprifolium Germanicum flore rubello serotinum* *Bröss. 40. Tourn. 608. Soc. Hortul. p. 14. Tab. VII.*

1. Diese Staude kommt auf die Dicke von 2. bis 10. Zoll im Umfang und treibt lang und dünne Reben, welche sich um jedes Ding, so sie antreffen, herumwinden. Die Blätter sind bläulichgrün, die Blüthe bleichroth, auf welche Beeren von dunkler rothen Farbe folgen.

2. Man findet es in den meisten Hecken, wo es den größten Theil des Sommers blühet.

3. Die Blätter werden manchmal unter die Gurgelwasser genommen in Versehrung des Halses. Einige rühmen das decoctum davon in der Husten und Schwindsucht, wie auch Verstopfungen der Leber und des Milzes zu eröffnen. Das Oel so durch Infusion mit der Blüthe gemacht wird, soll heilend und erwärmend und in Krampff und Convulsionen der Nerven nützlich seyn. MATTHIOLVS recommendiret die Blätter und ihren Saft zu denen Salben, deren man sich bey Haupt-Wunden, und ofnen Schäden der Schenckel bedienet.

Ann. Die 3. insbesondere vorgestellte Blumen fig. 2. 3. 4., welche die zwey ungleiche Abtheilungen der Blume a. b., die Stamina c. c. und den stylum d. deutlicher anzeigen, wie auch die Frucht fig. 5. und dessen baccae umbilicatae f. und thalamus e., endlich ein geöffnetes Beer fig. 6. und die Saamen oder Kerne fig. 7. sind von einer andern Art genommen, welche genennet wird *Caprifolium Germanicum flore rubello serotinum* *Bröss. 40. Tourn. 608. Soc. Hortul. p. 14. Tab. VII.*

TAB. 26. *Lat.* Consolida regalis, Calcatrippa, Delphinium. *Germ.* Rittersporn. *Gr.* Δ - ϵ - λ - ϕ - ν - ν *Angl.* Larks- \odot spur. *Ital.* Consolida Reale. *Gall.* Pie d' Aloüette. *Belg.* Ridder Sporen.

1. Assurgit in unius atque dimidiae ulnae altitudinem. Herba saturate viridis est; Flores plerumque caerulei interdum purpurascens.

2. Seritur quotannis in hortis, & per totam plerumque aetatem flores fert.

3. Numeratur inter herbas vulnerarias consolidandi virtutem habentes. Laudatur a MATTHIOLO tanquam remedium in destillationibus atque inflammationibus oculorum. Melle permista & cum dulci vino pota mitigat acredinem urinæ. Vulnera quoque recentia & ulcera inveterata sanare perhibetur.

4. NOM. GEN. Delphinium *Rai. I. 708. Tourn. 426. Riv. III. p. 27. Heuch. Ind. 42. Rupp. 290. Dill. 133. Boerb. I. 301. Vaill. 46. Linn. G. no. 535. Roy. 482. Hall. 314. Kram. 67. Ludvv. no. 740. Calcatrippa Cord. Hist. 159. b. Heuch. Pr. II. 53. Heist. I. 6.*

5. NOM. SPEC. Consolida regalis hortensis flore majore & simplici caeruleo elegantissimo C. B. pin. 142. Flos regius *Dod. 252. Delphinium majus sive vulgare Park. Par. 276. no. I. 279. fig. 3. Rai. I. 708. Delphinium hortense flore majore & simplici caeruleo Tourn. 426. Boerb. I. 302. an Delphinium sativum Riv. Tab. 224. Heuch. Ind. 42. Delphinium caule simplici, nectariis monophyllis Linn. H. 213. Roy. 482. Delphinium radice fibrosa, foliis tenuissime divisis Hall. 314.*

Nota. Generis hujus species, cujus figuram ad exemplar naturale, loco figurae Blackwellianae ceterum tamen valde similis, exhibemus, in hortis tantum reperitur; ejus autem totus habitus, quem satis bene PARCKINSON & ex hoc RAIVS l. c. describit & DODONAEVS depingit, multum differt non solum a habitu illius speciei, quae in arvis sponte crescens reperitur, sed & ab illo, quem praese fert ea species, quae communiter Delphinium elatius dicitur & in hortorum ornamentum frequentius colitur. Flos ex sex componitur petalis modo plane singulari: quinque fig. 1. a. a. a. a. b. in orbem posita sunt, ex quibus supremum fig. 1. a. b. peculiari cauda c. instructa est, quae calcar appellatur & vaginam cavam constituit; sextum petalum fig. 1. d. fig. 3., quod a LINNAEO nectarium vocatur, situ, figura ut & ut plurimum colore a reliquis plane differt in medio erectum fig. 1. d., ex galea bifida fig. 3. e., labiis duobus lateralibus f. f. & pariter cauda g., quam petali supremi fig. 2. b. vagina c. excipit, compositum, stamina unacum pistillo b. continens & petiolo i. innixum. Singulis floribus succedunt singulae filiquae fig. 4., ex quibus unam maturam representat fig. 5., quae uno in latere k. dehiscit & plura semina fig. 6. continet. in sich fasset und mit dem stiel i. vereinigt ist. Auf eine jede Blume folget eine einzele Saamen-Schotte fig. 4., davon eine reife fig. 5. anzeigt, welche auf einer Seite k. sich öfnet und viele Saamen fig. 6. enthält.

1. Es wächst über anderthalb Ellen hoch, das Kraut ist dunkelgrün, die Blumen sind in gemein Blau, doch fallen sie zuweilen ins purpurfarbigte.

2. Man säet es jährlich in den Gärten, und blühet den größtentheil des Sommers.

3. Man zählet es unter die Wund Kräuter die eine heilende Eigenschaft besizen. MATTHIOLVS sagt, es seye gut in Flüßsen und Entzündungen der Augen; mit Honig gemischt und im süßen Wein getruncken, nimmt es dem Urin die Schärffe. Es schließet gleichfalls frische Wunden und heilet alte Schäden.

Ann. Dieses Geschlechtes Art, deren nach der Natur gemachte Figur wir, statt der Blackwellischen übrigens aber doch sehr ähnlichen Figur, vorstellen, wird nur in Gärten gefunden; es ist aber derselben ganze Gestalt, welche sehr wohl PARCKINSON und aus diesem RAIVS l. c. beschreibet und DODONAEVS abbildet; gar vieles unterschieden nicht alleine von der Gestalt derjenigen Art, welche in den Feldern gefunden wird, sondern auch von derselben, welchen diejenige Art zeigt, die Delphinium elatius in gemein genennet wird, und noch häufiger zur Zierde der Gärten fortgesanget wird. Die Blume ist aus 6. Blätlein auf eine ganz besondere Weise zusammen gesetzt: fünf fig. 1. a. a. a. a. b. stehen in einer reihe, unter welchen das oberste fig. 1. a. b. mit einem besondern Schweiß c. versehen ist, welcher der Sporn genennet wird und eine hohle Scheide ausmachet; das sechste Blätlein, fig. 1. d. fig. 3., welches LINNAEVS nectarium nennet, unterscheidet sich ganz durch das Lager, durch die Figur und auch insgemein durch die Farbe von den andern, indeme es in der mitte aufgerichtet ist fig. 1., aus einer galea bifida fig. 3. e., duobus labiis lateralibus f. f. und auch aus einem Schweiß g., welcher in des obersten petali b. Scheide c. steckt, bestehet, die stamina und das pistillum h.

TAB. 27. *Lat.* Melissa, Melissophyllum. *Germ.* Melissen, Mutter-Kraut. *Gr.* μελισσοφυλλον. *Angl.* Balm, Baulm, Bawme. *Hisp.* Torongil, Hierva Cidreira. *Ital.* Melissa. *Gall.* Melisse. *Pomcirade.* Belg. Melissen. *Consily de Greyn.*

1. Assequitur altitudinem trium pedum, caules sunt quadrangulares, color herbæ e flavo læte viridis est, flores albi sunt.

2. In Anglia tantum in hortis crescit, floretque Mense Julio atque Augusto.

3. Usus hujus plantæ in omnibus capitis atque nervorum symptomatibus: confortat enim caput atque cor, hujusque palpitacionem sedat. In lipothymia, affectionibus melancholicis, hypochondriacis ac hysteris, ut & in morbis malignis & contagiosis salutarem præstat medicinam: resistit etiam putredini, & extrinsecus applicata ictus apum atque vesparum mitigat. In officinis prostat aqua simplex.

4. NOM. GEN. Melissa *Rai.* I. 570. *Meth.* 65. no. 18. *Tourn.* 193. *Riv.* I. p. 11. *Heuch.* Ind. 25. *Rupp.* 232. *Boerh.* I. 167. *Vaill.* 125. *Heist.* I. 21. *Linn.* G. no. 566. *Roy* 320. *Kram.* 51. *Luduv.* no. 214.

5. NOM. SPEC. Apiastrum sive Melissophyllum *Lob.* Hist. 277. Melissa *Dod.* 91. *Ger.* 689. *Rai.* I. 570. *Riv.* Tab. 45. *Heuch.* Ind. 25. Melissa officinarum *Heist.* I. 21. Melissa hortensis *C. B. pin.* 229. *Tourn.* 193. *Rupp.* 232. *Boerh.* I. 167. *Vaill.* 125. Melissa vulgaris odore citri *I. B. III.* 232. Melissa odore citri flore albo *Kram.* 51. Melissa floribus ex alis inferioribus ferme sessilibus *Linn.* H. 307. *Roy.* 320.

1. Diese Pflanze wächst bis 3. Fuß hoch, die Stengel sind viereckigt, das Kraut licht-gelb-grün, und die Blüthen weiß.

2. Es wächst in Engeland nur blos in Gärten und blüht im Julio und Augusto.

3. Das ganze Kraut wird als eine Herz- und Hauptstärkung gebraucht in allen Krankheiten des Haupts und der Nerven, es bekräftiget das Herz und curiret dessen Klopsen, und wird wider Ohnmachten, melancholische, hypochondrische und hysterische Zufälle adhibirt, es widerstehet der Fäulung und ist von grossen Nutzen in bössartig und ansteckenden Krankheiten, äußerlich hilft es im Stich der Bienen und Wespen. In Apotheken wird præparirt das aqua simplex.

TAB. 28. *Lat.* Erysimum. *Germ.* Wegsenff, wilber Senff, Hederich. *Gr.* Ερύσιμον. *Angl.* Hedge Mustard. *Hisp.* Rinchaon. *Gall.* Velar, Tortelle. *It.* Erifimo, Irion. *Belg.* Steen-Rakette.

1. Altitudo duorum pedum, color herbæ e flavo viridis, flos subflavus.

2. Crescit plerumque juxta vias & in aggeribus, flores autem per totam fere æstatem gerit.

3. Qualitatem habet calidam atque siccam, aperientem atque attenuantem. Resolvit ob vim suam calefaciendi crassos & mucidos pulmonis humores, & ad tussim atque asthma multum prodest. Laudatur etiam in diuturna raucedine & ordinariam vocem restituere dicitur. Decoctum cum vino multum in colico dolore prodesse affirmat RIVERIUS. Syrupus de Erysimio Lobelii notissimum est hujus plantæ præparatum.

4. NOM. GEN. Eruca *Rai.* I. 810. *Syn.* 298. Erysimum *Rai.* *Meth.* 96. no. 14. *Tourn.* 228. *Heuch.* Ind. 13. *Rupp.* 82. *Dill.* 93. *Boerh.* II. 14. *Vaill.* 51. *Heist.* I. 12. *Linn.* G. no. 664. *Roy* 342. *Kram.* 23. *Luduv.* no. 409. Sifymbrium *Hall.* 547.

5. NOM. SPEC. Verbena femina *Brunf.* I. 120. Eruca siliqua cauli adpressa Erysimum dicta *Rai.* I. 810. Eruca hirsuta siliqua cauli adpressa Erysimum dicta *Rai.* *Syn.* 298. Erysimum, Irion *Ruell.* 408. Erysimum officinarum *Heist.* I. 12. Erysimum flosculis luteis *Heuch.* Ind. 13. Erysimum Tragi flosculis luteis juxta muros proveniens *J. B. II.* 863. Erysimum vulgare *C. B. pin.* 100. *Tourn.* 228. *Rupp.* 82. *Dill.* 93. *Boerh.* II. 14. *Vaill.* 51. Erysimum siliquis scapo appressis *Linn.* H. 337. *Roy.* 342. Erysimum siliquis cauli appressis vulgare minus hirsutum angustifolium *Kram.* 23. Sifymbrium foliis pinnatis, extremo lobo triangulo, siliquis erectis cauli adpressis *Hall.* 551.

Nota. Floris magnitudo *fig.* 1. exigua est, eandem auctam sistit *fig.* 2. 3. 4. ubi a. petala, b. stamina, c. pistillum, d. calycem distincte repræsentat. Ramulum cum siliquis maturis e. monstrat *fig.* 5. ejusmodi siliquam in partes suas divisam *fig.* 6. ubi f. septum, g. g. binæ valvæ. Seminis naturalem magnitudinem *fig.* 7. auctam *fig.* 8. declarat. Folia hujus plantæ ima seu radicalia b. longe aliter conformata sunt, quam caulina.

1. Es wächst 2. Fuß hoch, das Kraut ist gelb-grün, die Blüthe bleich-gelb.

2. Der Hederich wächst gemeiniglich am Weeg, und auf Wällen und Dämmen, er blühet fast den ganzen Sommer.

3. Dieses Kraut ist hitzig, trocken, eröffnend, und verdünnend. Vermöge seiner wärmenden Eigenschaft zertheilet es die dicken und schleimichten Feuchtigkeiten der Lungen, hilft im Husten und kurzen Odem. Es wird sehr gerühmt in langwähriger Heiserkeit die Stimme wieder zu bekommen. RIVERIUS rühmet das decoctum davon mit Wein als ein gutes Mittel in der Colic. Das bekandeste præparatum ist der Syrupus de Erysimio Lobelii.

Ann. Die natürliche Größe der Blume *fig.* 1. ist sehr klein, vergrößert stellt dieselbe vor *fig.* 2. 3. 4. und zwar a. seine Blätterlein oder petala, b. die stamina, c. das pistillum, d. den calycem. Ein Zweiglein mit reifen Schotten e. zeigt *fig.* 5., eine solche Schotte in seine Theile zertheilet *fig.* 6., daselbst f. die Scheidwand, g. g. die beide Deckel. Des Saamens natürliche Größe weisset *fig.* 7. und vergrößert *fig.* 8. Die unterste Blätter dieses Gewächses h. sind viel anders gestaltet, als die an dem Stengel sich befinden.

Tab. 29. *Lat.* Sinapi album, Sinapi alterum. *Germ.* Weißer Senff, gelber Senff. *Gr.* Σινάπι, Σίνπι ἑτερον. *Angl.* White Mustard. *Hisp.* Mostaxo blanco. *It.* Senope, Senauro salvatico. *Gall.* Moutarde, Seneve blanc. *Belg.* Witte Mostaert zaat.

1. Caulis pilosus est, & fere duos pedes altus, color herbæ lucide viridis, flos dilute luteus.

2. Sponte nascitur in agris & locis graminosis siccis, menseque Julio floret.

3. Semen ciet appetitum, confortat stomachum, & promovet concoctionem. Succus aqua atque melle permixtus ad gargarismos a DIOSCORIDE commendatur, qui & hunc feminino sexui malo hysterico affecto, plurimum conducere asserit. Idem auctor cataplasma ex ficibus & hujus plantæ succo capiti raso appli-

1. Der Stengel wächst bis 2. Fuß hoch, und ist haarig, das Kraut ist hell-grün, die Blüthe hell-gelb.

2. Es wächst wild auf trockenen Wäsen, und an den Feldern, und blühet im Julio.

3. Der Saame reizet den Appetit, stärket den Magen und hilft der Dauung. DIOSCORIDES recommendirt den Saft mit Wasser und Honig vermischet den Hals damit zu gurgeln, und Weibs Personen zu helfen, welche mit Mutter-Beschwehrungen behaftet sind. Ein Uberschlag von Feigen und dieses Krautes Saft ist gut in der Schlaf-

applicatum, donec cutis rubescere incipiat, lethargum depellere, quemadmodum si idem iliace regiōni inponitur, ischiadicum malum sanare dicit, semen vero ad modum emplastri capitibus ulcerosis seu achoribus affectis adhibitum, iis mederi affirmat.

4. NOM. GEN. Sinapi Rai. I. 802. Meth. 96. no. 12. Syn. 295. Tourn. 227. Heuch. Ind. 13. Rupp. 82. Boerh. II. 13. Vaill. 184. Heist. I. 28. Hall. 553. Kram. 23. Ludvv. no. 408. Sinapis Linn. G. 662. Roy. 343.

5. NOM. SPEC. I. Sinapi album Ger. 244. H. Eyf. 2ff. O. 10. fol. 8. n. 11. (figura filiquas glabras ostendit, descriptio artificis errorem corrigit). Sinapi alterum sativum Lob. adv. 68. Sinapi hortense semine albo C. B. pin. 99. an Sinapi luteum Chelidonii folio Heist. I. 28. an Sinapi vulgare semine albo filiqua hirsuta Ejusd. II. 26. Sinapis filiquis hispida, rostro obliquo longissimo Linn. H. 338. Roy. 343. Hall. 554.

II. Sinapi luteum sativum Trag. 101. Sinapi primum genus Fuchs. 538. Sinapi secundum Matth. 562. Sinapi alterum Cam. Ep. 333. Sinapi sativum alterum Dod. 707. Ger. 244. Sinapi agreste Apii aut potius Laveris folio Lob. obs. 100. ic. 203. Sinapi Apii folio C. B. pin. 99. Vaill. 184. Sinapi album filiqua hirsuta, semine albo vel rufo J. B. II. 856. Rai. I. 802. Syn. 295. Tourn. 227. Rupp. 82. Boerh. II. 13.

Nota. Fructus fig. 2. sistit ipsam filiquam seminiferam a & septum ejus ultra filiquam cornu forma longe protrahum b. Nomina specifica I. & II. indicata pro synonymis unius speciei habentur & RAIUS l. c. monet, Apii folia non habere hoc genus, cum quibus tamen figuræ omnes auctorum no. II. citatorum conveniunt atque præterea filiquæ harum figurarum cornu multo breviori pinguntur, ut taceam, apud GERARDVM l. c. utriusque differentia, tanquam specierum distinctarum figuram & descriptionem exhibitam esse: ulteriori ergo disquisitione opus habet hæc differentia.

Schlaffucht, auf den glatt geschnittenen Kopf applicirt, bis die Haut roth wird, eben dieses Pflaster auf die Hüften gelegt, hilft in der Schiatica; den Saamen recommendirt er in Form eines Pflasters, über offene und böse Köpfe zu legen.

Ann. Die Frucht fig. 2. zeigt a. die Saamen-Schotte selbst, und b. seine Scheidwand, welche in Gestalt eines Horns weit über dieselbe hervorragt. Die nomina specifica I. und II. werden vor synonyma einer Art gehalten, und RAIUS erinnert l. c. daß bey diesem Geschlecht Apii folia nicht zu finden, mit welchen doch alle figuren der no. II. angezeigten Auctorum übereinkommen, und über dieses das Horn der Schotten viel kürzer abbilden, ohne zu gedenken, daß bey GERARDO l. c. beyderley Unterscheid, als so vieler Arten, abgebildet und beschrieben wird, daher dann dieser Unterschied noch einer weitem Untersuchung bedarf.

TAB. 30. Lat. Sonchus asper. Germ. Wilder rauher Hasen-Rohl, Gans-Distel, Sau-Distel. Gr. Σίχως. Angl. Sow Thistle. ♂ ♀ le. Hisp. Serraya, Serralha. It. Sonco, Cicerbita Gall. Laiteron. Belg. Gonsle Distel.

1. Ascendit ad duos pedes; Herba lucide viridis, flos pallide luteus est.

2. Crescit plerumque in aggeribus, & Majo atque Junio mensibus florem gerit.

3. Ejusdem hæc herba cum Taraxaco est naturæ, habet enim vim aperiendi atque urinam ciendi, nec non sabulum expellendi. MATTHIOLVS refert, Italos hanc herbam recens natam simul cum radice aliis herbis immiscere, atque sic lactucæ loco comedere. Idem commendat lac e caule expressum & cum oleo coctum contra asthma & aurium affectiones. GALENVS herbæ masticatæ tribuit virtutem emendandi oris foetorem.

4. NOM. GEN. Sonchus Rai. I. 224. Meth. 29. no. 2. Syn. 126. Tourn. 474. Heuch. Ind. 51. Pr. I. 78. Pr. II. 81. Rupp. 204. Dill. 119. Boerh. I. 184. Vaill. 188. Heist. I. 29. Linn. G. no. 751. Roy. 129. Hall. 752. Kram. 76. Ludvv. no. 338.

5. NOM. SPECIF. Sonchus non aspera Fuchs. 675. Sonchus aspera Matth. 496. Sonchus asper, Cicerbita aspera Tabern. ic. 189. Sonchus asper laciniatus & non laciniatus C. B. pin. 124. Boerh. I. 85. Sonchus asper laciniatus C. B. pin. 124. Park. 804. Rai. I. 225. Syn. 163. Dill. 119. Sonchus asper laciniatus folio Dentis Leonis C. B. pin. 124. Tourn. 474. Rupp. 204. Vaill. 188. Kram. 76. Sonchus laciniatus spinosus J. B. II. 1016. Sonchus asper folio laciniato obscure viridi Vaill. Mem. a. 1721. p. 197. Sonchus folio laciniato aspero Heist. I. 29. Sonchus pedunculis tomentosis Linn. Fl. Suec. no. 643. Sonchus annuus ramosus diffusus, foliis laciniatis Linn. H. 384. 1. Sonchus caule ramosissimo diffuso, foliis summis amplexicaulibus, pedunculis inæqualibus Roy. 129. Sonchus foliis rigidiusculis ferratis (laciniatis, costa lata, semipinnata, pinnis triangulis ferratis) calycibus lævibus Hall. 752. 2.

Nota. Flos hujus generis compositus est ex meris semiflocculis seu corollulis ligulatis hermaphroditis: semiapertus sistitur fig. 1, apertus sed non expansus fig. 2. cum calyce a., expansus fig. 3., semiflocculus ex interioribus minoribus fig. 4. b., ex exterioribus majoribus fig. 6. b. cum pappo c. & germine d., omnia in magnitudine naturali, fig. 5. 7. in magnitudine aucta; calyx post floris lapsum iterum clausus fig. 9, maturante semine denuo apertus fig. 8., semen maturum fig. 10. d. cum pappo c. in magnitudine naturali, aucta fig. 11. LINNÆVS Sonchum asperum & lævem æque, ac foliis laciniatis & non laciniatis, pro varietatibus tantum agnoscit & sub uno nomine specifico comprehendit; & RAIUS Syn. l. c. postquam 1. Sonchum lævem laciniatum latifolium, 2. lævem minorem paucioribus laciniis, 3. asperum laciniatum & 4. asperum non laciniatum C. B. pin. recensuit, addit: promiscue nascuntur præcedentes omnes species Sonchi, unde eas revera specie differre non ausim affirmare, at neque negare. Cui vacat & animus est, experiatur, an ex eodem semine oriantur. Ipse C. BAVHINVS l. c. non solum no. II. & III. Soncho aspero laciniato & non laciniato subjungit eadem synonyma, verum etiam addit: Folia habet laciniosa Dentis Leonis, ubi solo squalidiori oritur: at si letiori, non laciniata Di-placi aut Lactucæ, & nihilominus TOVRNEFORTIVS & RVPPIVS has varietates ut species distinxerunt. Nos in una eademque planta & integra & laciniata folia, itemque caulem hinc viridem illinc eleganter rubentem invenimus; præcipue

Ann. Die Blume dieses Geschlechts ist zusammen gesetzt aus lauter semiflocculis oder corollulis ligulatis hermaphroditis: Eine halb aufgegangene Blume zeigt sich fig. 1., eine aufgegangene, aber nicht ausgebreitete fig. 2. nebst dem calyce a., eine ausgebreitete fig. 3., ein semiflocculus von den inneren kleineren fig. 4. b., ein derselben von den auswendigen größern fig. 6. b. nebst dem Pappo c. und dem Keimen d. alles in natürlicher Größe, vergrößert fig. 5. 7.; der calyx, wie er sich nach abgefallener Blume wieder schlieset, fig. 9., und bey Zeitigung des Saamens abermals öfnet fig. 8., ein zeitiger Same fig. 10. d., nebst dem pappo c. in natürlicher Größe, vergrößert fig. 11. Von LINNÆO wird Sonchus asper & lævis so wohl, als foliis laciniatis & non laciniatis nur für eine varietät gehalten und unter einem nomine specifico angeführet, und RAIUS Syn. l. c., nachdem von ihm 1) Sonchus lævis laciniatus latifolius, 2) lævis minor paucioribus laciniis, 3) asper laciniatus und 4) asper non laciniatus C. B. pin. angeführet wird, sehet hinzu: alle vorhergehende Arten des Sonchi wachsen untereinander, daher ich nicht getraue zu behaupten, daß solche wirklich als besondere Arten unterschieden sind, aber auch nicht solches zu verneinen. Wer Zeit und Lust dazu hat, mache die Probe, ob sie aus einem Saamen hervorkommen. Selbst bey C. BAVHINO l. c. hat nicht alleine no. II. und III. Sonchus asper laciniatus & non laciniatus einerley synonyma, sondern er sehet auch dazu, daß er folialaciniosa Dentis Leonis bekomme, wann er auf schlechten Grund wächst; hingegen auf bessern Grund wach-

apue autem observavimus, quum caulis primarius adulta aestate emarcuit, succrescentes laterales omnes foliis integris atque præterea peculiari pedunculo præditis, quale *lit. f.* pingitur, instructos fuisse. HALLERVS non solum asperum & lævem ut species distinguit, sed etiam utriusque varietatem integris & laciniatis foliis nomine proprio definit: atque omnino hac methodo non solum tyronum errores, verum etiam exercitiorum dubia præcaventur.

derer Arten, sondern auch beyder ihre varietät mit ganzen und zertheilten Blättern mit einem besondern eigenen Rahmen, auf welche Weise auch am besten nicht alleine den Irrungen der Anfänger, sondern auch dem Zweifel der geübtern, vorgebeuet wird.

den die folia non laciniata Dipsaci oder Lactucæ: nichts desto weniger führen TOURNEFORT und RUPP diese varietäten als besondere Arten an. Wir haben an einer Pflanze so wohl ganze als zertheilte Blätter gefunden, wie auch den Stengel bald grün bald schön roth; vornehmlich aber haben wir wahrgenommen, daß, wann der Haupt-Stengel zu Ende des Sommers verborret, alle nachwachsende Neben-Stengel ganze und mit eigenen Stielen versehene Blätter haben, dergleichen *fig. f.* abbildet. Herr Hof-Rath HALLER unterscheidet nicht alleine den Sonchum asperum & lævem als besondere Arten, sondern auch beyder ihre varietät mit ganzen und zertheilten Blättern mit einem besondern eigenen Rahmen, auf welche Weise auch am besten nicht alleine den Irrungen der Anfänger, sondern auch dem Zweifel der geübtern, vorgebeuet wird.

TAB. 31. *Lat.* Ranunculus pratensis repens. *Germ.* Hahnen-Fuß. *Gr.* Βαλιδάχιον, Σέλιον, ἀγριον. *Angl.* Crowfoot. *Hisp.* Yerva belida. *Ital.* Ranoncolo. *Gall.* Grenuillette. *Belg.* S. Anthonis Raapje.

1. Hujus plantæ altitudo pedem æquat; caulis & folia aliquantum pilosa sunt; flores amœna flavedine splendent.

2. Crescit in agris fere omnibus, & mense Majo efflorescit.

3. Virtute pollet caustica, unde loco cantharidum ad vesicas excitandas adhiberi potest; cavendum tamen, ne diutius, quam par est, applicetur, hoc enim casu nimiam vim corrosivam exercere certum est. Aqua destillata Ranunculi bulbosi, sive ejusdem folia spiritui vini infusa a Bavaris pro egregio contra pestem remedio habentur.

4. NOM. GEN. Ranunculus *Rai. I. 581. Meib. 67. no. 1. Syn. 247. Tourn. 285. Heuch. Ind. 15. Pr. I. 35. Rupp. 101. Dill. 68. Boerb. I. 30. Vaill. 169. Linn G. no. 554. Roy. 489. Hall. 321. Kram. 28. 29. Ludov. no. 623.*

5. NOM. SPEC. I. Ranunculus rectus foliis pallidioribus hirsutus *J. B. III. 417. Rai. I. 582. Syn. 247. Tourn. 289. Dill. 68. Boerb. I. 30. Vaill. 169. Ranunculus foliis ternatis, foliolis petiolatis trifidis incis, medio productiore, caule multifloro Linn. H. 230. Roy. 491. Ranunculus caule ex geniculis radicato, foliorum lobis petiolatis Hall. 324.*

II. Ranunculus acris pratensis *Heist. I. 26. Ranunculus rectus non repens flore simplici luteo J. B. III. 416. Ranunculus pratensis erectus acris vulgaris Park. 429. Ranunculus pratensis erectus acris C. B. pin. 178. Rai. I. 583. Syn. 248. Tourn. 289. Rupp. 102. Dill. 52. Boerb. I. 30. Vaill. 169. Kram. 29. Ranunculus foliis peltatis quinquangulibus multipartitis, laciniis linearibus Linn. H. 231. Roy. 492. Ranunculus caule erecto multifloro, folio pentagono, lobis sessilibus Hall. 324.*

Nota. Nomina specifica no. I. pertinent ad figuram Blackwellianam, cujus caulem florigerum cum flore aperto a facie antica sistit *fig. 1. a. a.*, fructum *b.*, folia caulina *d.*, radicalia *f.*, radicem *fig. 1. r.* Nomina specifica vero no. II. indicant alteram figuram a nobis adjectam, cujus flos explicatus itidem a facie antica repræsentatur *fig. 2. a. a.*, a facie postica *fig. 3.* unicum calyce quinquefolio *b.*, cum flore simul, imo quandoque ante illum, caduco, petalum solum a facie antica *fig. 4.* in magnitudine naturali, aucta *fig. 5.* cum tuberculo ad ungrem conspicuo *c.*, quod, vel etiam loco ejus foveola, notante HALLERO, ad Ranunculi characterem genericum pertinet, imo, secundum LINNÆVM, essentialis hujus generis character est, atque ab hoc vocatur nectarium, ita autem definitur, quod in aliis speciebus sit porus nudus, in aliis margine cylindraceo cinctus, in aliis squamula emarginata clausus. Fructus seu seminum variæ magnitudinis acervus aut capitulum sistitur *fig. 7.*, ejusmodi semina sigillatim immatura *fig. 8. 9.*, matura *fig. 10.* omnia folliculo suo adhuc inclusa, folium radicale *c.* Adiecit autem hujus speciei figuram, non solum ut, deficiente alterius speciei exemplare naturali, partes fructificationis omnes accuratius exhibere, verum etiam specificam utriusque differentiam, quæ a nonnullis confunditur, indicare potuerimus. Magna namque adhuc deprehenditur confusio plurium hujus generis specierum, præcipue illarum, quæ ubique ferme in Europa sponte proveniunt atque propterea ab omnibus ferme rei herbariæ scriptoribus vel describuntur vel depinguntur, impari autem accuratatione, ut taceamus, ipsum solum vel alias causas accidentales ad notabilem differentiam, sed non constantem, inducendam valere. Exempli loco abunde hoc probant species hic depictæ. Nota est species, quæ vocatur *Ranunculus repens flore luteo simplici J. B. III. 4. 9. Ranunculus pratensis repens Park. 329. Rai. I. 581. Syn. 247. Ranunculus pratensis repens hirsutus C. B. pin. 179. Tourn. 289. Rupp. 102. Dill. 65. Boerb. I. 31. Vaill. 169.* Nota est alia species, quæ appellatur *Ranunculus pratensis erectus dulcis C. B. pin. 179. Park. 327. Rai. I. 583. Tourn. 289. Rupp. 102. Dill. 52. Boerb. I. 31. Vaill. 169.* Sed hanc a priori non differre, monuit VAILLANT *l. c.* & ulterius affirmavit HALLERVS *l. c.* & nota ad Ruppii Floram Jen. 102., qui insuper etiam Blackwellianam no. I. non differre asseruit, proindeque his tribus unum nomen tantum specificum supra no. I. indicatum præfixit, quemadmodum etiam LINNÆVS, qui non solum erectum dulcem ut varietatem tantum repentis recenset, verum etiam erecti synonymon facit illum Blackwellianam no. I. Accuratori itaque examine facto, concedendum omnino est, non solum saporem minime, ut in aliis,

1. Dieses Kraut wächst einen Fuß lang, der Stengel und die Blätter sind etwas haarig, die Blumen hell glänzend gelb.

2. Es wächst in den meinsten Feldern und blühet im May.

3. Es hat eine caustische oder ägende Kraft, daß man es zum Blasen ziehen brauchen kan, wo keine Spanische Mücken zu bekommen sind; es mus aber nicht allzulange liegen bleiben, damit es nicht zu sehr unter sich fresse. Die Bayern rühmen das destillirte Wasser des Ranunculi bulbosi, oder dessen Blätter mit Brandwein infundiret, als ein herrliches Mittel wider die Pest.

Ann. Die nomina specifica no. I. gehören zu der Blackwellischen Figur, deren blühender Stengel mit offener Blume von vornen vorgestellt wird *fig. 1. a. a.*, die Frucht *b.*, die Blätter am Stengel *d.*, die unterste aus der Wurzel *f.*, die Wurzel *fig. 1. r.* Die nomina specifica no. II. aber gehören zu der von uns benigesetzten Figur, deren ausgebreitete Blume ebenmäßig von vornen vorgestellt wird *fig. 2. a. a.*, von hinten *fig. 3.*, nebst dem 5. blättrigten calyce *b.*, der mit der Blume ja oft vor derselben abfällt, ein abgelöstes Blumen-Blättlein von vornen in natürlicher Größe *fig. 4.*, vergrößert *fig. 5.*, nebst der kleinen Erhöhung am Ende desselben *c.*, welches, oder auch statt dessen ein kleines Grüblein, nach der Anmerkung HALLERI zu den characterem genericum Ranunculi gehöret, ja, nach LINNÆI Meinung, der eigentliche character dieses Geschlechts ist, und von ihm Nectarium genennet und beschrieben wird, daß es bey einigen Arten seye ein porus nudus, bey andern margine cylindraceo cinctus, noch bey andern squamula emarginata clausus. Die Frucht oder die dicht bey einander stehende Saamen von unterschiedlicher Größe zeigt *fig. 7.*, dergleichen unzeitige Saamen besonders *fig. 8. 9.*, zeitige *fig. 10.*, alle noch in ihrer Hülse eingeschlossen, ein Blatt aus der Wurzel *fig. c.* Wir haben aber die Figur von dieser Art deswegen benigesetzt, damit wir nicht allein, aus Mangel eines natürlichen exemplars der andern Art, alle Theile der Blume und Frucht deutlich vorstellen, sondern auch den eigentlichen Unterschied beyder Arten, die von einigen vermengt werden, anzeigen könnten. Dann man findet annoch eine grosse confusion in Unterscheidung vieler Arten dieses Geschlechts, besonders derjenigen, welche fast allenthalben in Europa wild wachsen, daher von allen auctoribus abgebildet oder beschrieben werden, aber nicht von allen mit der gehörigen Aufmerksamkeit, zu geschweigen, daß selbst das Erdreich oder andere zufällige Ursachen zu einen merklichen aber nicht beständigen Unterscheid vieles beitragen können. Zum Exempel dienen die hier vorgestellte Arten. Es ist eine Art bekannt, welche genennet wird, *Ranunculus repens flore luteo simplici J. B. III. 4. 9. Ranunculus pratensis repens Park. 329. Rai. I. 581. Syn. 247. Ranunculus pratensis repens hirsutus C. B. pin. 179. Tourn. 289. Rupp. 102. Dill. 65. Boerb. I. 31. Vaill. 169.* Es ist auch eine andere Art bekannt, welche heisset *Ranunculus pratensis erectus dulcis C. B. pin. 179. Park. 327. Rai. I. 583. Tourn. 289. Rupp. 102. Dill. 52. Boerb. I. 31. Vaill. 169.* Daß aber diese beyde von einander nicht unterschieden seyen, erinnert VAILLANT *l. c.* und bejahet auch solches HALLERVS *l. c.* und in den Anmerkungen zu Ruppii Flor. Jen. 102., welcher noch überdies zwischen diesen angezeigten und der Blackwellischen Art no. I. keinen Unterschied zugebet, und deswegen allen dreyen nur ein nomen specificum,

aliis, acrem, sed eousque mitigatum, ut inter olera culinaria locum habere possint, verum etiam parem foliorum dispositionem cunctis his communem esse; si vero RAIL Hist. & Syn. observatio; qua Blackwellianæ & repentis speciei differentiam inculcat, constans est, quod nempe hic, quem BLACKWEL depinxit, Ranunculus, præter foliorum colorem pallidiorem, neque radicibus, neque cauliculis, reptet, & folia multo minora sint, quam in repente vel erecto, distinctio locum adhuc obtinebit si non ut specierum, attamen ut varietatum constantium suis nominibus propriis distinguendarum, ex quibus neglectis, si quid recte judicare valeamus, major confusio metuenda est, quam ex speciebus multiplicatis. Ceterum, quando inter erectum dulcem & acrem nulla differentia, præter saporem, a quibusdam adstruitur, error manifestus est, quem foliorum c. & f. structura diversa facile declarat. Quod denique ad vires supra decantatas attinet, facile intelligitur, iis non, nisi species acres, & præcipue illas, quas Flammulas vulgo vocant, gaudere.

eine größere Confusion zu befürchten, als wann die Arten gehäuffet werden. Im übrigen wann von einigen behauptet wird, daß zwischen den erectum dulcem und erectum acrem, sonst kein Unterschied als der Geschmack seye, ist der Irrthum augenscheinlich, welchen die unterschiedliche Bildung der Blätter c. und f. leichtlich anzeigen. Was endlich die angepriesene Kräfte anlangt, ist leicht zu verstehen, daß solche nur den scharfen Arten, und insonderheit diesen, welche ehemals Flammulæ genennet worden, zukommen.

TAB. 32. Lat. *Mentha aquatica*, *Sisymbrium*. Germ. Bachmünze, Wassermünze, Krottenmünze. Gr. Σισύμβριον. * Angl. Water Mint. Hisp. Berros, Agriris. Ital. Sifembro. Gall. Pouillot. Belg. Rosse Water Munt.

1. Extenditur ad octo digitorum altitudinem; caules pilosi, flos purpureus, folia ex aliqua rubedine viridia sunt.

2. Crescit ad piscinas & in locis aquosis; Junio ac Julio mensibus floret.

3. Calidioris est naturæ *Mentha hæc aquatica*, quam hortensis. Medetur flatibus ventriculi, lenit dolores colicos, aperit obstructions uteri & mensium fluxum promovet. Succus auribus instillatus sedat earum dolores ac surditatem adimit. DIOSCORIDES herbam hanc aqua coctam ad vomendi conatum ipsumque vomitum cohibendum prodesse statuit.

4. NOM. GEN. *Mentha Rai*. I. 533. *Meth*. 61. no. I. *Syn*. 232. *Tourn*. 188. *Riv*. I. p. 11. *Heuch*. Ind. 25. *Rupp*. 229. *Dill*. 168. *Boerh*. I. 185. *Linn*. G. no. 572. *Roy*. 325. *Hall*. 657. *Kram*. 52. *Ludvv*. no. 207.

5. NOM. SPEC. *Sisymbrium Fuchsf*. 322. *Dod*. 97. *Calamintha aquatica*, *Calamentum aquaticum Tab. ic*. 353. *Mentha aquatica sive Sisymbrium J. B. III*. 223. *Ger*. 684. *Raj*. I. 533. *Syn*. 233. *Mentha aquatica rubra Park* 1243. *Mentha palustris capitata odore pulegii Kram*. 52. *Mentha palustris spicata Riv*. I. tab. 49. *Dill*. 168. *Mentha rotundifolia palustris seu aquatica major C. B. pin*. 227. *Tourn*. 189. *Rupp*. 229. *Boerh*. I. 185. *Fabreg*. T. V. 187. *Mentha floribus capitatis, foliis ovatis, ferratis, petiolatis Linn*. H. 306. *Roy*. 325. *Mentha foliis ovato-lanceolatis, verticillis paucis, supremo maximo Hall*. 658.

TAB. 33. Lat. *Lamium album*, *Urtica mortua*. Germ. Laub-Nessel. Gr. Γαλιόψις Angl. White Archangel, Deat Nettle. Hisp. Ortica muerta. It. Ortica fedida, Ortica morta. Gall. Ortie morte blanche. Belg. Dood Ntelen.

1. Caulis altitudo pedalis, foliorum viriditas saturata, flos autem albus est.

2. Crescit ad sepes & mense Majo atque Junio floret.

3. Conserva vel decoctum floris contra fluorem album tanquam specificum prædicatur, sed requiritur, ut ejusdem usus per aliquod temporis spatium continetur. Quidam hanc herbam medendis strumis omnibusque tumoribus scrophulosis adhiberi posse statuunt. In Officinis Londinensibus prostat hujus floris conserva.

4. NOM. GEN. *Lamium Rai*. I. 559. *Meth*. 63. no. 4. *Syn*. 240. *Tourn*. 183. *Boerh*. I. 157. *Vaill*. 113. *Heist*. III. 12. *Linn*. no. 577. *Hall*. 640. *Ludvv*. no. 192. *Galeopsis Riv*. I. p. 12. *Heuch*. Ind. 26. *Rupp*. 224. *Kram* 53.

5. NOM. SPEC. *Urtica mortua Gesn*. Hort. 287. a. *Lamium Ruell*. 455. *Lamium album Ger*. 702. *Raj*. I. 549. *Syn*. 240. *Lamium album non foetens, folio oblongo C. B. pin*. 231. *Boerh*. I. 157. *Lamium vulgare album seu Archangelica flore albo Park*. 604. *Tourn*. 183. *Rupp*. 225. *Dill*. 38. *Vaill*. 113. *Lamium foliis cordatis, acuminatis, ferratis, petiolatis Linn*. H. 314. *Roy*. 319. *Lamium foliis dissitis, cordatis acutis Hall*. 641. *Galeopsis Riv*. tab. 62. *Galeopsis flore albo, male Urtica mortua Heuch*. Ind. 26. *Galeopsis major Rivini flore, albo Kram*. 53. *Galeopsis seu Urtica iners floribus albis J. B. III*. 322.

Nota. Floris Corolla non tota alba seu lactea est, sed hinc inde, præcipue ejus barba b. fig. 1. 2. 3. flavescit. Integer flos sistitur a facie antica fig. 1., a facie laterali fig. 2., dempta galea fig. 3., a facie interna per tergum apertus fig. 4., ubi apparent galea concava & fornicata ad extremum obscure incisa fig. 1. 2. 4. a., barba bipartita fig. 1. 2. 3. 4. b. cum plica per medium elevata fig. 1. 2. 3. c., productio lateralis utrimque inter galeam & barbam in acutam apicem terminata fig. 1. 2. 3. 4. d., stamina quatuor cum

nehmlich das oben no. I. angezeigt, zugeeignet hat, gleichwie auch LINNÆVS l. c., welcher nicht alleine den erectum dulcem nur als eine varietät des repentis anführet, sondern auch dem erecto den Nahmen der Blackwellischen Art no. I. als ein synonymon zueignet. Wann man demnach eine genaue Untersuchung anstellet, muß man aller Dings zugeben, daß alle diese nicht nur alleine im Geschmack (der keinesweges wie bey andern scharf, sondern so milde ist, daß sie unter den Küchen-Kräutern einen Platz haben können, sondern auch in der gleichmäßigen Einrichtung der Blätter mit einander übereinkommen; wann aber des RAIL Hist. & Syn. Anmerkung, mit welchen er den Unterschied zwischen der Blackwellischen und der kriechenden Art einschärfet, daß nemlich jene, außer der gleichen Farbe der Blätter, weder mit der Wurzel noch dem Stengeln jemals krieche, und die Blätter viel kleiner seyn, als in dem repente und erecto, so wird gleichwohl noch ein Unterschied zugegeben seyn, wo nicht als besonderer Arten, doch als beständiger varietäten, die mit ihren besondern Nahmen auch zu unterscheiden sind: Dann wann man dieses nicht beobachtet, so ist noch

1. Es wächst bis 8. Zoll hoch; die Stengel sind harrig, die Blüthe Purpur roth, und die Blätter röthlich grün.

2. Es wächst an Beyhern und in wässerigten Orten; blühet im Junio und Julio.

3. Diese ist hitziger als die Garten-Münze; sie treibet die Blähungen und Winde aus dem Magen, hilft in der Colic, öffnet die Verstopfungen der Mutter und befördert die Reinigung. Der ausgepreßte Saft davon in die Ohren getropft lindert ihre Schmerzen und benimmt die Taubheit. DIOSCORIDES rühmt das Kraut in Wasser gekochet, um das Aufstossen oder auch das Brechen zu stillen.

1. Der Stengel wächst bis einen Fuß hoch, das Laub ist dunkel-grün, und die Blüthe weiß.

2. Es wächst an Hecken, und blüht im Janio und Majo.

3. Die Blüthe wird für ein Specificum im weissen Fluß gehalten, und wird öfters in einer Conserve oder Decocto wider diesen Zufall gegeben, muß aber einige Zeitlang gebraucht werden. Einige recommendiren dieses Kraut in denen Kröpfen, und allen scrophulösen Geschwulsten. Die Londnische Officinen haben die Conserve der Blüthe.

Ann. Die Blume ist nicht ganz weiß, sondern hin und wieder besonders dessen Warth b. fig. 1. 2. 3. gelblich. Sie wird ganz für gestellt von vornen fig. 1., von der Seite fig. 2. nach abgenommenen Helm fig. 3., von der inwendigen Fläche hinten aufgeschnitten fig. 4. Hieben kommen zum Vorschein der Helm fig. 1. 2. 4. a., welcher aussen gewölbet, inwendig ausgehöhlet, zu äußerst leicht eingeschnitten ist; der Warth b. fig. 1. 2. 3. 4., welcher gespalten ist und nach oben eine erhöhte Falte c. fig. 1. 2. 3. zeigt; ein

cum suis apicibus infra galeam recondita; *e. fig. 2. 2.*; eorum & styli situs demta galea conspicuus *e. fig. 3.*; staminum ortus ex corollæ tubo *fig. 4. e.*, stylus *fig. 5. f.*, calyx patulus in quinque acutas & longas spinas, inermes tamen, divisus *fig. 1. 2. 5. 8.*, semina quatuor triangularia *fig. 6.*

1. 2. 5. welcher offen oder ausgebreitet ist, und aus fünf langen und schmalen aber nicht steifen Spizen besteht; die vier dreieckigte Saamen *fig. 6.*

ein Zusatz auf beiden Seiten zwischen den Helm und Barthel. *fig. 1. 2. 3. 4.* mit einer kleinen Spitze; vier Stamina mit ihren apicibus, welche innerhalb des Helms verdeckt liegen *e. fig. 1. 2.*; derselben und des styli Lager, wie sie nach abgenommenem Helm in Vorschein kommen *e. fig. 3.*; der staminum Ursprung aus der Röhre der corollæ *e. fig. 4.*; der stylus *f. fig. 5.*; der calyx *g. fig.*

TAB. 34. *Lat.* Solanum lignosum, Dulcamara. *Germ.* Je länger je lieber, Hindsch-Kraut. *Gr.* γλυκύπικρον. *Angl.* Woody Nightshade, Bitter-sweet. *It.* Vite salvatica, Dolce-amara, Solatro. *Gall.* Morelle, Bourreau des arbres. *Belg.* Groote Winde.

1. Hæc species sarmenta agit multa atque longa, cinereo colore prædita, quibus sese proxime adstantibus stirpibus implicat, atque sic in altum ascendit: folia obscure sunt viridia, flos purpureus.

2. Crescit in omnibus ferme sepibus & mense Maio atque Junio floret.

3. Folia atque rami virtutem præstare dicuntur in hydropo, ictero atque strumis. PARKINSONVS illis tribuit vim valide purgantem. PRÆVOTIVS in Medicina pauperum ad bilem leniter egerendam conducere affirmat. DIOSCORIDES autem baccas hujus plantæ maculas cutis delere tradit.

4. NOM. GEN. Solanum *Rai. I. 672. Meth. 74. no. 8. Syn. 265. Tourn. 148. Heuch. Ind. 8. Pr. I. 21. Rupp. 48. Dill. 82. Boerh. II. 67. Vaill. 188. Heist. I. 29. Linn. G. no. 196. Roy. 423. Hall. 506. Kram. 11. Ludov. no. 87.*

5. NOM. SPEC. Vitis sylvestris *Matth. 1281. Dulcamara Dod. 402. Dulcis amara Trag. 816. Amara dulcis Cord. in Diosc. 67. Tab. 893. Ger. 350. Glycypicros seu Amara dalcis J. B. II. 109. Solanum lignosum seu Dulcamara Park. 350. Rai. I. 672. Syn. 265. Solanum scandens seu Dulcamara C. B. pin. 167. Tourn. 149. Rupp. 49. Dill. 82. Boerh. II. 67. Vaill. 188. Solanum scandens Dulcamara dictum vulgare Heist. I. 29. Solanum scandens folio viridi, flore cæruleo Kr. 11. Solanum scandens, item lignosum, alioquin Dulcamara Heuch. Ind. 8. Solanum caule inermi, perenni, flexuoso, foliis superioribus hastatis Linn. H. 60. Roy. 424. Solanum foliis aliis trifidis, aliis simplicibus Hall. 507.*

Nota. In medio floris corollæ quinquefidæ *fig. 1.* conii in formam eriguntur quinque stamina *a. fig. 1. 2.*, quorum apices seu antheræ, brevissimis filamentis suffultæ, inter se coalescunt *fig. 3.*, styli tamen extremo *b. fig. 1. 2.* per angustum orificium transitum concedunt. Ipse stylus *c. fig. 4.* insitit ovario seu germi *d. fig. 4.* & totus flos sustinetur a calyce pariter quinquefidæ *e. fig. 5.* Fructus maturus in figura Blackwelliana pingitur cum calyce persistente *e. fig. 6. 8.* formaque globosa *f. fig. 6.*, & seminum *fig. 7.* situs in orbiculum quasi circa axing. *fig. 8.* Ex aliorum vero observatione non solum calyx perit, & fructus maturus seu bacca fit ovata multoque major *fig. 9.*, verum etiam septo transverso *b. fig. 10.* dividitur in duos loculos *i. i. fig. 10.* multis seminibus refertis, quæ etiam Blackwellianis majora sunt *fig. 11.* Folia hujus stirpis sunt difformia: ima simplicia *k.*, reliqua aurata seu appendicibus distincta, & quidem inferiora interdum unica appendice *l.*, superiora plerumque binis *m.* instructa. Radix *fig. 12.* solida atque lignosa evadit.

unterscheiden nur einen *l.*, die obere meistens zweien *m.* Die Wurzel *fig. 12.* wird dicht und holzig.

Ann. In der Mitte der fünffach getheilten Blüthe *fig. 1.* sind die Stamina in der Gestalt eines Kegels aufgerichtet *a. fig. 1. 2.*, welche sehr kurze filamenta haben und mit den apicibus unter sich zusammen gewachsen sind *fig. 3.*, jedoch dem äußersten Theil des styli *b. fig. 1. 2.* durch eine enge Oeffnung einen Durchgang lassen. Der stylus selbst *c. fig. 4.* und die ganze Blüthe wird von einem ebenmäßig fünffach getheilten calyce *e. fig. 5.* unterstützt. Die reife Frucht wird in der Blackwellischen Figur dargestellt mit dem calyce *e. fig. 6. 8.* und in runder Gestalt *f. fig. 6.* auch des Saamens *fig. 7.* Lager in die Rundung gleichsam als um eine Ase *f. fig. 6.*; Aber nach anderer Anmerkung verdirbt nicht nur alleine der calyx, und die reife Frucht oder das Beer bekommt eine eiförmige und größere Gestalt *fig. 9.*; sondern es wird auch dieselbe durch eine Scheidewand *k. fig. 10.* in zwei Fächer *i. i. fig. 10.* getheilet, in welchen viele Saamen liegen, welche *fig. 11.* abermals größer sind als die Blackwellische. Die Blätter haben nicht einerley Gestalt: die untersten sind einfach *k.*, die übrigen haben Zusätze, und zwar die

TAB. 35. *Lat.* Plantago latifolia seu septinervea. *Germ.* Blatter breiter Wegerich. *Gr.* ἀνόλυσσον ἐπιαπλευρον. *Angl.* Broad leaved Plantain, Great Plantain, Waybread. *Hiff.* Plantain, Tamehagem. *It.* Piantaggine, Centinerbia. *Gall.* le grand Plantain. *Belg.* Weeg-bree.

1. Caules hujus plantæ ad octo digitos extenduntur, flos albicat.

2. Reperitur in viis publicis atque pratis, flores fert mense Maio.

3. Naturam habet frigidam atque siccam, adstringentem ac sistentem omnis generis hæmorrhagias, narium scilicet, sputum ac vomitum sanguinis, nimium itidem mensium atque lochiorum fluxum: obstat præterea urinæ incontinentiæ, ejusque ardorem atque acredinem lenit; Gonorrhææ quoque resistit, & vulnerum cruentationibus medetur, eaque conglutinat. In officinis prostat aqua destillata.

4. NOM. GEN. vid. TAB. 14. no. 4.

5. NOM. SPEC. Plantago major *Ruell. 368. Fuchs. 38. Dod. 197. Plantago major folio glabro non laciniato ut plurimum J. B. III. 502. Plantago major latifolia folio glabro Heist. IV. 12. Plantago media Matth. 479. Plantago latifolia lævis Lob. ic. 303. Plantago latifolia vulgaris Park. 493. Raj. I. 876. Syn. 314. Plantago latifolia sinuata C. B. pin. 189. Tourn. 126. Rupp. 88. Dill. 113. Boerh. II. 100. Vaill. 160. Plantago folio lato glabro sinuato virente Kram. 20. Plantago foliis ovatis Linn. H. 36. Roy. 401. Hall. 472.*

C 4

Nota.

1. Die Stengel dieser Pflanze wachsen bis 8. Zoll lang, die Blüthe hat eine weißliche Farbe.

2. Man findet sie am Weg und auf den Wiesen, sie blüht im May.

3. Der Wegerich ist kalt, trocken und zusammen ziehend, stillt alle Arten der Hæmorrhagien, als Auswerfen und Erbrechen des Geblüthes, Nasen-Bluten, und die allzustarcke Reinigung der Weibs-Personen und Kinderbetterinnen. Es dienet denen, welche den Urin nicht halten können, und lindert desselben Schärfe und Hitze, in gleichen den Saamen-Fluss, es stillt das Bluthen der Wunden, und heilet sie zusammen. In den Apotheken hat man das destillirte Wasser.

Nota. Magnitudo, præcipue foliorum, valde variat: hinc *Plantago latifolia minor glabra* C. B. pin. 189. non nisi foli vel tempeitatis inclementia differre videtur; num *Plantago latifolia glabra non sinuata* Dill. 123. & Kram. 20. magis differat, dubio quoque non caret. A RVPPIO l. c. pro synonymo porro declaratur *Plantago latifolia glabra* C. B. pin. 189. quæ est *Plantago maxima*, tota glabra Ejusd. Prodr. 97., & secundum alios *Plantago maxima Hispanica* Corn. plantar. Canad. Hist. 162., quæque a BOERHAAVIO l. c. nominatur *Plantago latifolia glabra*, pedunculo folii & spica longissimis. Qui descriptionem BAVHINI atque CORNVITI ut & iconem, quam hic adiecit, examinat, non aliam omnino differentiam deprehendit, quam magnitudinem omnium partium auctam: nam secundum BAVHINVM hujus pediculi floriferi evadunt bicubitales spicam pedalem sustinentes; foliorum pediculi palmares quoque sunt & foliorum longitudo uncias sex, latitudo quatuor æquat, quæ mensura a CORNVITO duplo adhuc major indicatur, qui addit, flores etiam majores, ceterum vero omnino similes esse. Nihilominus notatu dignum est, PETR. MAGNOLVM Bot. Monsp. p. 205. non solum hanc speciem circa Monspelium (ubi illam crescere BAVHINVS quoque annotavit) in maritimis sæpius reperisse, verum etiam ab altera, nimirum illa latifolia sinuata C. B. ibidem passim in omnibus viis humidioribus occurrente distinguisse, adeoque magnitudinis differentiam sub uno climate constantem observasse, CORNVITVM porro affirmasse, substantiam hujus laxam admodum & pinguem esse, hincque impense refrigerare, sed minus adstringere. Quæ si ita constanter reperiuntur, omni jure hæc pro varietate constante declaranda & nomine peculiari, e. gr. Boerhaaviano, distinguenda esset,

ne beständige Varietät gehalten, und mit einem besondern e. gr. dem Boerhaavischen Namen unterschieden.

Ann. Die Größe, sonderlich der Blätter, ist sehr unterschieden, daher scheint es, daß *Plantago latifolia minor glabra* C. B. pin. 189. nur wegen des Bodens oder Witterung unterschieden seyen; ob *Plantago latifolia glabra non sinuata* Dill. 123. und Kram. 20. mehrers unterschieden, ist auch nicht ohne Zweifel. Von RVPPIO wird l. c. ferner als ein Synonymum angegeben *Plantago latifolia glabra* C. B. pin. 189. welches ist *Plantago maxima* tota glabra Ejusd. Prodr. 97. und, wie andere anmerken, *Plantago maxima Hispanica* Corn. Plantar. Canad. Hist. 162., der von BOERHAAVE l. c. genennet wird *Plantago latifolia glabra*, pedunculo folii & spica longissimis. Wer die Beschreibung des BAVHINI und CORNVITI und die Figur, welche dieser hinzusetzt, untersucht, findet keinen andern Unterschied, als alle Theile viel größer: dann nach des BAVHINI Bericht werden die Blumenstengel 2. Ellen, die Blumenreihe eines Fußes, und die Stiele der Blätter einer Hand breit lang, die Blätter selbst 6. Zoll lang und 4. Zoll breit; nach CORNVITI Bericht sind alle diese Theile noch einmal so groß, als BAVHINVS beschrieben, auch die Blumen größer, jedoch im übrigen ganz ähnlich. Nichts desto weniger ist merkwürdig, daß PETRVS MAGNOL Botan. Monspel. 205. nicht alleine diese Art um Montpelier (wo selbst daß solche wachse auch BAVHINVS angemerkt hat) in der Gegend der See öfters gefunden, sondern auch von der andern, nemlich die genennet wird *Plantago latifolia sinuata* und eben daß selbst an allen feuchten Wegen wächst, unterschieden und also einen beständigen Unterschied in der Größe wahrgenommen, über dieses CORNVITVS angemerkt habe, daß die Substanz von diesem sehr locker und fett seye und daher eine sehr starke kühlende weniger aber anziehende Kraft habe. Wann demnach dieser Unterschied beständig gefunden wird, so wird diese Art mit allem Recht für eine

TAB. 36. *Lat. Borago. Germ. Borretsch, Borrage, Borrabi. Gr. Βόρραχος. Angl. Borrage. Hisp. Borraja. © Borrageres, Borrages. It. Borrachine. Gall. Bourache. Belg. Bernaasje.*

1. Erigitur in altitudinem octodecim ferme digitorum. Folia viriditate graminea imbuta sunt, flos est purpureus.

2. Copiose in hortis crescit zizaniæ instar, reperitur etiam sæpius in vicinia ædium, ut & in muris. Floret mense Junio.

3. Confortatio cordis egregia habetur, & deliquio animi atque melancholiæ obicem ponere dicitur. Summitates hujus plantæ vino & refrigerantibus potuum generibus induntur: vim veneno adimere atque febres malignas depellere statuitur. Flos inter quatuor sic dictos cordiales numeratur. MATTHIOLVS aquam e tota planta destillatam, tam interne quam externe adhibitam, contra oculorum inflammationes commendat.

4. NOM. GEN. *Borago Raii* l. 493. *Meth.* 56. no. 3. *Heist.* l. 6. *Borago Rai. Syn.* 228. *Tourn.* 133. *Heuch.* Ind. 2. *Rupp.* 13. *Dill.* 116. *Boerh.* l. 187. *Vaill.* 22. *Linn.* G. no. 137. *Roy.* 403. *Hall.* 524. *Kram.* 11. *Ludvv.* no. 31. 5. NOM. SPEC. *Buglossa urbana Cord. hist.* 73. *Buglossum Fuchs.* 142. *Buglossum verum Cord. in Diosc.* 71. *Buglossum latifolium, Borrago C. B. pin.* 256. *Borago Brunf.* 113. *Trag.* 237. *Dill.* 116. *Borago hortensis Ger.* 797. *Rai Syn.* 228. *Borago flore cæruleo Heist.* l. 6. *Borago flore cæruleo Heuch.* Ind. 2. *Borago flore cæruleo reflexo calyce non vesicario Kram.* 11. *Borago floribus cæruleis Gesn. Hort.* 250. b. *J. B. III.* 574. *Rai.* l. 493. *Tourn.* 133. *Boerh.* l. 188. *Vaill.* 22. *Borago officinarum Rupp.* 13. *Borago calycibus patentibus Linn.* H. 44. *Roy.* 403. *Hall.* 524.

Nota. Representatur flos integer a facie antica intra calycem fig. 1.; a calyce solutus a facie postica fig. 2.; eius quinque segmenta profunda a. fig. 3.; quinque prominentiæ peculiare emarginatæ, obtusæ, squamosæ b. fig. 1.; quinque stamina cum apicibus coni forma in medio erectis & coadunatis c. fig. 1.; unum ex staminibus cum apice a facie interiori fig. 3.; idem a facie laterali fig. 4., quo in situ peculiaris prominentia b. clarius & stamen bifidum c. apparet; foramen in fundo corollæ pro styli transitu d. fig. 2.; calyx profunde quinquefidus e. fig. 1. 5., stylus f. fig. 5.; fructus seu calyx adhaerens fig. 6. cum quatuor seminibus in situ g.; semen maturum fig. 7.; folii facies superior h. fig. 8., inferior i. fig. 8. Ima folia palmæ magnitudinem superant.

1. Es steigt bis 18. Zoll hoch, die Blätter sind grasgrün, die Blüthe Purpursärbig.

2. Es wächst häufig als ein Unkraut in denen Gärten, und wird öfters wild gefunden, nahe an denen Häusern und auf den Mauern, blüht im Juni.

3. Das Kraut wird als eine Herzstärkung gebraucht, und soll den Ohnmachten und der Melancholie widerstehen. Die Gipfel werden häufig in Wein und Kühl-Träncken gebraucht, sie sollen den Gift widerstehen, und werden in bössartigen Fiebern gelobet. Die Blüthe gehöret unter die 4. Herzstärkende Blumen. MATTHIOLVS recommendirt das von der ganzen Pflanze destillirte Wasser zu entzündeten Augen sowohl innerlich als äußerlich gebraucht.

Ann. Es wird vorgestellt die ganze Blume von vornen innerhalb des calycis fig. 1.; von hinten von dem calyce losgemacht fig. 2.; die 5. tiefe Einschnitte der Blume a. fig. 3.; die 5. besondere, ungleiche, stumpfe und schwammigte Erhöhungen b. fig. 1.; die 5. stamina mit ihren apicibus in der Gestalt eines Kegels in der Mitte aufgerichtet und mit einander vereinigt c. fig. 1.; eines von den staminibus mit dem apice von der innwendigen Ansicht fig. 3.; eben dasselbe von der Seite fig. 4., in welchem Lager die besondere Erhöhung b. deutlicher und daß stamen gespalten e. erscheint; daß Loch am Grunde der Blume d. fig. 2. für den Durchgang des styli; der fünflich tief gespaltene calyx e. fig. 1. 5.; der stylus f. fig. 5.; die Frucht oder der an Größe angewachsene calyx fig. 6. mit 4. Saamen-Körnern in ihrem Lager g.; ein reifer Saame fig. 7.; die obere Fläche des Blattes h. fig. 8., die untere i. fig. 8. Die unterste Blätter sind viel größer als eine flache Hand.

TAB. 37. *Lat. Bryonia alba, Vitis alba. Germ. Zaun-Rübe, Vicht-Rübe. Gr. Ἀμπύλος λευκή. Angl. White Bryony. Hisp. Neuxa, Anorca. It. Brionia, Zucca salvatica, Vite bianca. Gall. Coloubrine, Coleuvrée. Belg. Bryonie, Wilde Wyngaarde.*

1. Caulis hujus plantæ in sepibus ad eximiam altitudinem assurgit; Folia valde similia sunt illis, quæ in vitibus conspiciuntur: flos ex viridi albicat.

2. Cre-

1. Der Stengel dieser Zaunrübe steigt zu einer großen Höhe in denen Hecken, das Kraut gleichet sehr dem Wein-Laub, die Blüthe hat eine weißlicht grüne Farbe.

2. Es

2. Crescit in viarum sepibus, florem fert mense Majo atque Junio.

3. Radix vim habet fortiter sursum & deorsum evacuandi humores serofos: ejus quoque usus est in hydrope, podagra, morbo comitiali, apoplexia atque uteri affectionibus. D. SYDENHAM tanquam medicinam contra maniam valde laudat. Fæcula ejus eandem habet vim, sed paulo debiliorem.

4. NOM. GEN. Bryonia alba Raj. Meth. 72. no. 3. Bryonia Raj. I. 659. Syn. 261. Tourn. 102. Heuch. Ind. 8. Pr. II. 32. Dill. 89. Boerh. II. 61. Vaill. 23. Linn. G. no. 889. Roy. 264. Hall. 505. Kr. 4. 16. Ludvv. no. 856.

5. NOM. SPEC. Vitis alba Ruell. 660. Fuchsf. 94. J. B. II. 143. Bryonia Dorst. 52. b. Trag. 820. Bryonia bacca rubra Kr. 4. 16. Bryonia alba Dod. 400. Ger. 869. Raj. I. 659. Syn. 261. Bryonia alba vulgaris Park. 178. Bryonia aspera sive alba baccis rubris C. B. pin. 297. Tourn. 102. Dill. 89. Boerh. II. 61. Vaill. 23. Bryonia foliis palmatis utrimque callosè scabris Linn. H. 453. Roy. 264. Bryonia foliis quinquangulis scabris Hall. 506.

Nota. Flores in hoc genere & masculinos seu steriles, & femininos seu fecundos describit TOURNEFORTIUS l. c. & depingit tab. 28., cum quo consentiunt BOERHAAVIUS, PETR. MAGNOL. char. plant. p. 208. LINNÆUS, LUDWIGIUS l. c. RAIUS vero Hist. l. c. iam annotavit, hanc speciem duas offerre varietates tota planta ita differentes, ut una seu mas non nisi masculos, eosque maiores, sed steriles producat flores, altera nonnisi femininos seu fertiles. Confirmat hoc DILLENIUS l. c. PONTEREDERA Anthol. 279. seq. atque HALLERUS 506. SIGESBECKIUS vero Vaniloq. Gled. 33. omnes flores unius plantæ steriles pro rariori casu declarat. Blackwelliana hæc figura utrumque florem pingit, masculum nempe seu sterilem fig. 1., femininum seu fecundum fig. 2., ubi a. corolla, b. calyx, c. ovarium seu germen; fig. 3. monstrat baccam immaturam, fig. 4. maturam. Hæc species nostris in confiniis sponte haud provenit, nec eam in hortis cultam nunc quidem reperire & examinare potuimus. Altera species, nempe *Bryonia alba baccis nigris* C. B. pin. 297., quam vulgus apud nos frequenter colit, cuiusque radix in nostris officinis asservatur, masculos & femineos flores in una eademque planta profert: illos ex petiolis multo longioribus copiosiores & femineos antecedentes; hos pauciores & brevioribus petiolis innixos atque masculinos in superiori viminis parte sequentes, quemadmodum etiam in cucurbitis, pepionibus cucumeribus &c. flores masculini femineos antecedunt. Dieser sind weniger beyammen, haben einen kürzern Stiel und folgen auf die männliche am obern Theil der Reben, gleichwie auch bey den Kürbisen, Cucumern &c. die männliche eher erscheinen als die weibliche.

2. Es wächst an beäunten Wegen und in den Hecken; blüht im May und Juni.

3. Die Wurzel purgirt mit Heftigkeit die wässerigte Feuchtigkeiten so wohl ober sich als unter sich, und wird gebraucht in der Wassersucht, Podagra, fallenden Sucht, Schlagfluß und Mutter-Umständen. Dr. SYDENHAM rühmet es sehr in der Raserey. Die Fæcula davon hat eben diese Eigenschaft, doch etwas schwächer.

Ann. Daß bey diesem Geschlecht männliche oder unfruchtbare, und weibliche oder fruchtbare Blumen gefunden werden, beschreibet TOURNEFORT l. c. und bildet solche ab tab. 28., mit welchem auch übereinkommen BOERHAAVIUS, PETR. MAGNOLUS Charact. Plant. 208. LINNÆUS, LUDWIGIUS l. c.; Es hat aber RAIUS Hist. l. c. schon angemercket, daß bey dieser Art zweyerley Varietät gefunden wurde, welche in der ganzen Pflanze also unterschieden seye, daß eine oder die männliche lauter männliche, und zwar größere, aber unfruchtbare, die andere hingegen lauter weibliche oder fruchtbare Blumen hervorbringe. Dieses bestätiget DILLENIUS l. c., PONTEREDERA Anthol. 279. seq. und HALLERUS l. c.; SIGESBECKIUS Vaniloq. Gleditsch. 33. aber hält vor etwas seltsames, daß alle Blumen einer Pflanze unfruchtbar sind. Die Blackwellische Figur stellet beyderley Blumen vor, nemlich die männliche und unfruchtbare fig. 1., die weibliche und fruchtbare fig. 2., und an dieser a. die Blume, b. den calycem, c. den Anfang der Frucht; fig. 3. zeigt ein unzeitiges, fig. 4. ein zeitiges Beer. Diese Art wächst in unsern Gegenden nicht, und wir haben sie auch dermalen in keinem Garten finden und untersuchen können. Die andere Art, nemlich *Bryonia alba baccis nigris* C. B. pin. 297., welche der gemeine Mann bey uns vielfältig bauet, und dessen Wurzel in unsern Officinis aufbehalten wird, bringet die männliche und weibliche Blumen an einer Pflanze herfür: jene stehen häufiger auf einem viel längern Stiel beyammen und kommen eher als die weibliche zum Vorschein; diese sind weniger beyammen, haben einen kürzern Stiel und folgen auf die männliche am obern Theil der Reben, gleichwie auch bey den Kürbisen, Cucumern &c. die männliche eher erscheinen als die weibliche.

TAB. 38. Lat. Convolvulus maior albus, seu Smilax lævis. Germ. Grosse weiße Winde, grosser Windig oder Bindling, Zaunglocke. Gr. Σμυλὰξ λεία. Angl. Great white Bindweed. Hisp. Correquela maior. Ital. Vilucchio maggiore. Gall. Campanete, Lifet, Liferon. Belg. Groote Winde.

1. Hæc planta, si quid adest, cui sese implicare potest, ascendit rependo in altitudinem non exiguam: folia viriditatem saligneam ostendunt, flores albi sunt.

2. Reperitur in plurimis Angliæ sepibus, & per ultimam ætatis partem flores agit.

3. Radix aliqua purgandi vi prædita est. PRÆVOTIUS in Medicinâ pauperum eam refert ad medicamenta bilem leniter egerentia. Hanc plantam autem esse Smilacem lævem veterum, CAMERARIUS dubitat.

4. NOM. GEN. Convolvulus Raj. I. 722. Meth. 81. no. 5. Syn. 275. Tourn. 82. Heuch. Ind. 6. Rupp. 27. Dill. 133. Boerh. I. 245. Vaill. 40. Heist. II. 9. Linn. G. no. 157. Roy. 427. Hall. 488. Kram. 5. Ludvv. n. 66.

5. NOM. SPEC. Volubilis Brunf. III. 90. Volubilis maior Trag. 805. Smilax lævis Fuchsf. 270. Smilax maior Dod. 392. Convolvulus flore albo semine nigro Heuch. Ind. 6. Convolvulus maior J. B. II. 154. Rai. I. 725. Syn. 275. Dill. 133. Convolvulus maior albus C. B. pin. 294. Park. 163. Tourn. 82. Rupp. 27. Vaill. 40. Convolvulus sylvestris maior Ari folio flore albo Heist. II. 9. Convolvulus vulgaris maior Kram. 5. Convolvulus vulgaris maior albus Morisf. II. 12. Boerh. I. 246. Convolvulus foliis sagittatis postice truncatis Linn. H. 66. Convolvulus foliis sagittatis postice truncatis pedunculis simplicibus unifloris Roy. 427. Convolvulus foliis sagittatis angulosis petiolis unifloris Hall. 488.

Nota. Corolla campaniformis exterius & interius quinquangularis est: quinque anguli extrorsum plicati exiguo terminantur mucrone; quinque alii alternatim interpositi & introrsum plicati extremo suo levem relinquunt incisuram. Calyx duplex est: exterior ex duobus foliolis seu segmentis latioribus constat & ex ipso petiolo basi sinuata & utrimque aurita oritur, ideoque ab HALLERO l. c. recte spathiformis dicitur; interior ex quinque constat segmentis profundis, angustioribus & inaequalis magnitudinis, cum ipsa ovarii basi concretis & tubum corollæ arcte cingentibus. Uterque calyx ad fructus usque maturitatem persistit fig. 3. 4.: exterior a. nullum capit augmentum; interioris vero segmenta b. paullo majora sunt. Fructus seu capsula feminalis plerumque triquetra est fig. 5. 6., sed proprie trilobularis dici nequit, quia sepimentis caret & tantum in tres valvas fig. 7. dehiscit, quæ singulæ unicum in cavitate sua continent

1. Es lauft eine grosse Höhe hinauf, wenn es etwas findet, um das es sich winden kan: die Blätter sind beyden grün, die Blumen weiß.

2. Dieses Gewächs findet man in den meisten Hecken in Engelland, und blühet den ganzen letzten Theil des Sommers durch.

3. Die Wurzel dieser Winde purgirt einiger massen. PRÆVOTIUS in seiner Medicina pauperum rechnet sie unter die gelinde Gall- abführende Mittel. CAMERARIUS zweifelt, ob dieses der Smilax lævis der Alten sey.

Ann. Die Glockenförmige Blume oder Corolla ist nach außen und innen fünfseitig: fünf nach außen gefaltete Ecken endigen sich mit einer kleinen Spitze; fünf andere, wechselweis dazwischen gesetzte und nach innen gefaltete Ecken machen an ihrem Ende einen schwachen Einschnitt. Der Calyx ist doppelt: der auswendige bestehet aus zweyen breiten Blätlein oder tiefen Abtheilungen und entspringet aus dem Stiel selbst mit einer Ausschweifung, die zu beyden Seiten einen kleinen Zusatz hat, und daher von HALLERO ganz recht spathiformis genennet wird. Der inwendige bestehet aus fünf schmalen tiefen Abtheilungen von ungleicher Größe, die mit dem Grund des ovarii selbst zusammen gewachsen sind, und die Höhre der Corolla ganz genau umgeben. Beyde calyces bleiben bis zur Zeitigung der Frucht fig. 3. 4.: Der auswendige a. wird nicht größer, des innwendigen seine Abtheilungen aber b. werden etwas größer. Die Frucht, oder die Saamen-Capsel, ist insgemein dreyeckig, fig.

tenent semen nigrum *fig. 9.* Sapius quadrifida etiam reperitur capsula *fig. 7.* cum quatuor seminibus, qualem apertam cum quatuor seminibus in situ etiam sistit *fig. 3.* Fructus, quem exemplar Blackvellianum *fig. 2.* repræsentat, huic speciei minus convenit.

te mit vier Saamen auch in ihrem Lager *fig. 3.* fürstellet. Die Frucht, welche Blackwell *fig. 2.* abbildet, kommet dieser Art nicht zu.

fig. 5. 6. hat aber eigentlich nicht drey Zäher, weil keine Scheidwand zugegen und die Capsel nur in drey Deckel *fig. 8.* sich spaltet, davon ein jeder in seiner Ausholung nur ein einziges schwarzes Saam-Korn *fig. 9.* einschlieset. Dessen wird diese Capsel auch viereckigt gefunden *fig. 7.* mit vier Saamen, dergleichen geöffnete

TAB. 39. *Lat.* Aparine. *Germ.* Klebrich, Klebraut, Zaun-Reiß. *Græc.* Απαρίνη, Αμπελόκαρπον, Ομφαλόκαρπον, Φιλόθρονον. *Angl.* Clivers, Clevers, Cleavers, Goose-Grass. *Ital.* Aparine, Speronella. *Gall.* Grateron. *Belg.* Kleefkruid.

1. Repens hæc planta est, & quotannis ex semine provenit; Caulis, folia atque semen tactu sunt aspera, flos vero albus est.

2. Etiam in sepibus ferme vbique reperitur, & per aliquot æstatis menses floret.

3. Tota planta vsui est: mediocriter enim refrigerat atque siccatur; sanguinis quoque acrimoniam temperat. Adhibetur etiam tanquam herba vulneraria: quidam ceu peculiare arcanum ad strumas extirpandas præbent ejus succum. Promovet urinam, sabulum atque calculos; immiscetur quoque aliis herbis, quibus verno tempore contra scorbutum & sanitatis conservandæ causa juscula solent condiri.

4. *NOM. GEN.* Aparine *Rai. I. 484. Meth. 55. Syn. 225. Tourn. 114. Heuch. Ind. 2. Rupp. 5. Dill. 67. Boerh. I. 150. Vaill. 14. Heist. II. 3. Linn. G. no. 98. Roy. 255. Kram 11. 12. 14. Luduv. no. 10. Gallium Hall. 439.*

5. *NOM. SPEC.* Aparine *Ger. 1122. F. B. III. 713. Rai. I. 484. Syn. 225. Dill. 67. Aparine vulgaris Park. 567. C. B. pin. 334. Tourn. 114. Rupp. 5. Boerh. I. 150. Vaill. 14. Heist. II. 3. Aparine seminibus asperis lapaceis vulgaris latifolia folio viridi Kram. 11. Aparine flosculis albis vulgo Philanthropos Heuch. Ind. 2. Aparine foliis lanceolatis Linn. H. 34. Aparine foliis lanceolatis, acuminatis, scaberrimis, corollis fructu minoribus Roy. 255. Gallium caulis angulis foliisque ora & nervo ferratis, fructu hispido Hall. 459.*

1. Dieses ist eine kriechende Pflanze, welche jährlich aus dem Saamen wächst; die Stängel / Blätter und Saamen sind rauh und die Blüthe weiß.

2. Man findet es in den meisten Hecken, und blühet verschiedene Monate des Sommers.

3. Der ganzen Pflanze wird eine mäßig, kühlende und trocknende auch Blutversäufende Kraft zugeschrieben. Man braucht sie als ein Bund, Kraut und in den Kröpfen; bey diesen geben einige den Saft darvon als ein besonders Arcanum. Es treibt den Urin, Sand und Steine. Man bedienet sich auch desselben unter den Kräutern, welche als eine Frühlings-Cur zu Suppen gebraucht werden wider den Scharbock.

TAB. 40. I. III. *Lat.* Triticum *Germ.* Weizen, Winter-Weizen. *Angl.* White Wheat without awns. IV. V. *Lat.* Triticum aristatum. *Germ.* Grät-Weizen, Barth-Weizen. *Angl.* Bearded Wheat. *Græc.* Πυρρίς Ηΐστ. Trigo. *Ital.* Grano, Formento. *Gall.* Froment. *Belg.* Tarwen, Ierwe.

1. Triticum aristis carens communiter crescit in Anglia. Triticum aristatum a quibusdam vocatur Dugdale Wheat.

2. Autumno mense plerumque seritur & Julio sive Augusto mense anni sequentis metitur.

3. Hoc frumenti genus præ reliquis nutritivum censetur. Pulmentum e tritico atque lacte confectum lenit dolores tumorum atque ulcerum, eaque reddit matura. Frustum hujus panis leniter tostum atque vino intinctum, si ventriculo applicatur, reprimit vomitum. Furfur tritici sacculis inclusum & calefactum, deinde vero lateribus impositum dolores eorum mitigat. Emplastrum de crusta panis reperitur etiam in officinis.

4. *NOM. GEN.* Triticum *Rai. II. 1236. Meth. 125. no. 1. Syn. 386. Tourn. 512. Heuch Ind. 53. Rupp. 302. Boerh. II. 155. Vaill. 196. Linn. G. no. 78. Roy. 70. Hall. 207. Kram. 93. 94. Luduv. no. 87.*

NOM. SPEC. I. Triticum hibernum, spica longa, alba, mutica, locustis laxis, granis oblongis *Nobis.* Triticum spica mutica *Ger. 65. Park. 1120. Triticum spica & granis albis Rai. II. 1237. Syn. 386. Triticum hibernum aristis carens C. B. pin. 21. theatr. 352. Moris. Hist. III. 174. Sect. VIII. tab. 1. fig. 1. Tourn. 512. Rupp. 302. Boerh. II. 155. Vaill. 196. Triticum vulgare glumas trititando deponens F. B. II. 407. Triticum radice annua, spica mutica Linn. H. 24. Roy. 70.*

II. Triticum hibernum spica longa, alba, locustis laxis & aristis longis munitis, granis oblongis *Nobis.* An Triticum aristis longioribus spica alba *C. B. pin. 21. theatr. 373. Triticum hibernum spica sive gluma albicante, granis etiam albis Moris. Hist. III. 174.*

Nota. Graminum & frumentorum historia valde manca adhuc est. Frumentorum quidem characteres genericos multum iam emendarunt LINNÆUS alique eum sequuti; sed specierum distinctio legitima adhuc indiget pari investigatione accurata. Exemplum præbet ipsum Triticum. Secundum relationes quorundam nostratum agricolarum expertorum colitur in nostris regionibus 1.) Triticum spica brevi & longa, alba & rufa, mutica & aristis munita; 2.) Triticum hibernum & æstivum, seu vel autumno vel vere ferendum, & Triticum mutabile, seu & autumno & vere satum ad perfectionem perveniens. 3.) Triticum spica brevi nunquam profert spicas longas, alba rufas, mutica aristatas (si excipias supremas muticæ spicæ locustas, quæ frequentissime aristas, sed multo breviores vid. *fig. II.* alunt) & vice versa. 4.) Triticum hibernum verno tempore satum nunquam ad perfectionem pervenit, nec æstivum autumno satum hiemis iniurias perfert; Triticum mutabile vero in hisce se distinguit. Sunt tamen, qui contrariam tenent sententiam ratione tum aristarum, tum sationis tem-

Ann. Die Nachricht vom Gras und Getreyde ist noch sehr mangelhaft. Die Geschlechts-Kennzeichen des Getreydes haben zwar LINNÆUS und andere, die ihm gefolget, viel verbessert; aber eine richtige Unterscheidung der Arten hat noch eine gleichmäßige sorgfältige Untersuchung nöthig. Der Weizen selbst bietet zum Beweis. Vermög der Nachricht einiger unserer erfahrner Ackerleute wird in unsern Landen gebauet 1.) Weizen mit kurzen und langen, weissen und braunen, stumpfen und grätigten Aehren; 2.) Winter- und Sommer-Weizen, das ist, der entweder im Herbst oder im Frühjahr muß gesäet werden, und Wechsel-Weizen, das ist, der im Herbst und Frühjahr kan gesäet werden; 3.) Weizen mit kurzen Aehren bringt niemals lange, mit weissen niemals braune, mit stumpfen niemals grätigte (wann man bey den stumpfen Aehren die oberste Bollen oder Spreuen ausnimmt, welche insgemein Gräte, aber viel kürzere *fig. II.* zeugen) und so auch im Gegentheil; 4.) Winter-Weizen im Frühjahr gesäet, kommt niemals zur Vollkommenheit, und Sommer-Weizen im Herbst gesäet, verträgt die Kälte des Winters nicht; der Wechsel-

poris, quos citatos reperies apud J. BAUH. II. 1460. seqq. 407. & RAL. H. II. 1237. conf. JOSEPH. MONTI Catal. stirp. agri Bononienf. Prodr. 3. Secundum relationes supra indicatas octo apud nos reperiuntur Tritici species vel, si mavis, varietates constantes, quarum omnium specimina una æstate collegimus, nimirum I. *Triticum hibernum spica brevi, crassa, rufa, locustis laxis & aristis longis munitis*, cuius spica, vix sesqui pollicem longa, quadrata apparet, quodque nostrates Tauben-Weizen i. e. *Triticum columbarum*, & vierzeiligen Weizen i. e. tetra-stichum vocant; sed huius spica æque, ac reliquarum, non nisi disticha est: grana sunt multo minora, quam in sequentibus. II. *Triticum hibernum spica longa, rufa, locustis laxis & aristis longis munitis*. III. *Triticum hibernum spica longa, alba, locustis laxis & aristis longis munitis*, quod ab antecedente non differt, nisi spica & aristarum (neutiquam tamen granorum, quæ in omnibus dilute rufa sunt) colore pallido, & est idem, quod figura nostra V. repræsentat. IV. *Triticum æstivum spica longa, alba, locustis laxis & aristis longis munitis*, nostratibus Sommer-Weizen, quod ab hiberno no. III. se distinguit spica paullo graciliori & breviori. V. *Triticum hibernum spica longa, alba, mutica, locustis laxis, vulgo Winter-Weizen*, quod figura nostra II. & III. depingit. VI. *Triticum hibernum, spica longa, alba, mutica, locustis compactis, nostratibus Kern, Dündel & Dündel-Weizen* vocatum, quod a quinto se distinguit spica graciliori, locustis compactioribus & magis distinctis, granis quoque longioribus nec non trituratione, qua grana ex locustis non excidunt, sed coniunctim cum illis a culmo secedunt, proptereaque in molendinis peculiari encheiresi ab invicem separanda sunt. VII. *Triticum hibernum spica longa, rufa, mutica, locustis compactis*, quod a sexto solo spica colore differt. VIII. *Triticum mutabile, spica longa, rufa, mutica, locustis laxis*, quod a quinto differt spica colore & granis crassioribus magisque splendentibus. Ex eo, quod sola hæc species vel varietas æ autumnæ & vere satæ ad perfectionem pervenit, a nostratibus vocatur Wechsel-Weizen i. e. *Triticum mutabile*, seu cuius satio pro tempestatis conditione mutari potest, imo quinto vel sexto anno debet, si per tot annos semper vel autumnæ vel vere satum fuerit, alias, ex agrisolarum traditione, fecunditatem suam perdit. Has species vel varietates cum figuris atque descriptionibus aliorum quum contulimus, vix una vel altera omnibus notis conveniebat, quemadmodum etiam figuræ Blackwellianæ I. IV. nostris II. III. V. multum quidem, sed non penitus, similes sunt. Primæ speciei nostræ depictæ (cuius spicam floridam a latere, ideoque duos locustarum ordines simul fig. II. a. b., & spicam maturam a facie recta unius ordinis fig. III. repræsentat) convenire synonyma superius inter characteres específicos no. I. indicata, certiores sumus; num vero illa alteri speciei depictæ (cuius spica maturæ unum ordinem itidem a facie recta sistit fig. V.) ibidem no. II. adjecta dubio careant, aliis diiudicandum relinquimus. Characteres prioris speciei, seu in catalogo præcedente no. V. recensitæ, hi sunt. I.) Culmus, quousque ille spicam sustinet fig. 1., utrimque ex articulis dentatis c. d. alterno ordine structis constat: locustæ ergo eodem ordine dispositæ spicam formant disticham fig. II., & ultima culmi vertici insidet. II.) Locustæ sessiles sunt seu culmo immediate adhærent fig. 2. 3., conf. fig. III. (ima pars fig. 22. 23. seqq. non locustæ petiolum, sed culmi partem, cui insertæ sunt, indicat) & planam faciem obvertunt culmo, quam delineat fig. 2., quemadmodum anticam convexam fig. 3. 22. III.) Locustæ partes sunt calyx c. f. fig. 4. 22., & quatuor, quinque, sex florum fructuumque folliculi seu loculi, pro agri fertilitate. Locustæ quinque locales & pro compositionis structura clarius demonstranda, paululum explicatas longitudineque auctas repræsentant figuræ nostræ, ubi primum folliculum indicat v. fig. 4. 10. 12. 22. 23. 25. 27., secundum x. fig. 4. 10. 12. 22. 23. 25. 27., tertium y. fig. 4. 10. 12. 14. 16. 22. 23. 25. 27., quartum z. fig. 4. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 23. 25. 27., & quintum * in his iisdem figuris citatis. Observandum præterea est, ut plurimum primum folliculum unius locustæ a dextris, alterius sequentis a sinistris locatum esse, id quod ex collatione fig. 4. & 22., 10. & 23., 12. & 25., 20. & 27. patet. IV.) Folliculi alterno iterum ordine in duabus seriebus affixi sunt peculiari petiolo seu axi tenui pariter denticulato g. fig. 18. 20. 27., ideoque peculiarem quasi parvam formant spicam. Inde forsitan naturalis huius generis dispositio ad spicam multiplicem (conf. C. BAUH. pin. 21. no. VI. Theatr. Bot. 371.) & propior cognatio Graminum quorundam loliaceorum seu spica triticea (conf. MONTI l. c. 41. JO. SCHEUCHZERI Agrostogr. 2. seqq. LINN. Gen. no. 78. H. 24. ROY. 70. HALL. 207.) demonstrari potest. V. Calyx biglumis est c. f. fig. 4. 22.; utraque gluma dura & rigida, ovata, exterius convexa & per lineam acutam secundum longitudinem in duas, sed inæquales, partes divisa, anteriorem latiore, posteriorem angustiore; utraque pars superiori in extremo sinuata est, & linea acuta ab it in exiguum mucronem: conf. fig. 11., quæ faciei exterioris partem anteriorem, & fig. 24., quæ interiorem faciem, neutra tamen satis distincte delineat. VI.) Singuli folliculi, seu calyces florum proprii, quos LINNÆUS pro corollis agnoscit, ex duabus constant valvis. Hæ primi & secundi folliculi maiores sunt glumis calycis communis, præsertim longitudine, superiori

Weizen hingegen unterscheidet sich in diesem. Es sind aber einige, welche in Ansehung sowohl der Gräte als der Saats. Zeit das Gegentheil vorgeben, welche zu finden bey J. BAUH. II. 400. seqq. 407. 409., RAL. H. II. 1237. JOSEPH. MONTI Catal. stirp. agri Bonon. Prodr. p. 3. Nach den obangeführten Nachrichten werden bey uns acht Arten oder, wenn es besser gefällt, beständige Varietäten gefunden, von welchen allen wir auch die Muster in einem Sommer gesammelt haben, nemlich I. Winter-Weizen mit kurzen, dicken, braunen Aehren, lockern und mit langen Gräten versehenen Vollen, dessen Aehren kaum anderthalb Zoll lang, vier-eckigt anzusehen sind, und welcher Tauben-Weizen und vierzeiliger Weizen genannt wird; es haben aber diese Aehren eben sowohl, als der andern Arten, nicht mehr als zwey Zeilen: die Körner sind viel kleiner, als bey den folgenden. II. Winter-Weizen mit langen braunen Aehren, lockern und mit langen Gräten versehenen Vollen. III. Winter-Weizen mit langen weissen Aehren, lockern und mit langen Gräten versehenen Vollen, welcher von dem vorhergehenden nur durch die bleiche Farbe der Aehren und Gräte (doch keineswegs der Körner, welche in allen licht = braun sind) unterschieden und eben derjenige ist, welchen fig. V. fürstellet. IV. Sommer-Weizen mit langen, weissen Aehren, lockern und mit langen Gräten versehenen Vollen, insgemein Sommer-Weizen genannt, der von dem Winter-Weizen no. III. mit einer etwas schmälern und kürzern Aehre sich unterscheidet. V. Winter-Weizen, mit langen weissen Aehren, lockern und stumpfen Vollen, insgemein Winter-Weizen genannt, welchen fig. II. III. abbildet. VI. Winter-Weizen mit langen weissen Aehren, dichten und stumpfen Vollen, Kern, Dündel und Dündel-Weizen genannt, welcher von dem fünften sich unterscheidet mit schmälern Aehren, dichten und weiter voneinander stehenden Vollen, auch längern Körnern, ingleichen im Ausdreschen, wodurch die Körner nicht aus den Vollen heraus, sondern zugleich mit diesen vom Halm abfallen und daher erst in Mühlen mit einem besondern Handgrif voneinander müssen gesondert werden. VII. Winter-Weizen mit langen braunen Aehren, dichten und stumpfen Vollen, welcher von dem sechsten nur in der Farbe unterschieden ist. VIII. Wechsel-Weizen mit langen braunen Aehren, lockern und stumpfen Vollen, welcher von dem fünften in der Farbe und dichten auch mehr glänzenden Körnern unterschieden ist. Weil diese Art oder Varietät alleine so wohl im Herbst als im Frühjahr gesät zur Vollkommenheit gelanget, wird sie der Wechsel-Weizen genannt, das ist, mit dessen Saat nach Beschaffenheit der Witterung kan gewechselt werden; ja es muß auch solches im fünften oder sechsten Jahr geschehen, wann indessen solcher allezeit im Herbst oder Frühjahr ist gesät worden, dann sonst verliert er, nach dem Bericht der Ackerleute, seine Fruchtbarkeit. Nachdeme wir diese Arten mit den Figuren und Beschreibungen anderer zusammen gehalten, kame faum eine oder die andere in allen Merkmalen überein, gleichwie auch die Blackwellische Figuren I. und IV. den unserigen II. III. V. zwar in vielen, aber nicht allen ähnlich sind. Daß der ersten von uns abgebildeten Art (dessen blühende Aehre von der Seite, und also die beyden Zeilen der Vollen zugleich fig. II. a. b., und eine reife Aehre nach der geraden Ansicht einer Zeile fig. III. abbildet) die oben unter den Nom. specif. n. I. angezeigte Synonyma zu kommen, ist wohl gewiß; ob aber diejenige, welche der andern von uns abgebildeten Art (davon eine reife Aehre in der geraden Ansicht einer Zeile fig. V. fürstellet) daselbst no. II. beygefüget worden, ausser Zweifel sind, überlassen wir andern zu beurtheilen. Die Kennzeichen der ersten oder nach dem Catalogo der Vten Art sind diese. I.) Der Halm, so weit er die Aehre unterstützt fig. 1., besteht aus zahnförmigen auf beyden Seiten in abwechselnder Ordnung stehenden Absätzen c. d.: die in eben der Ordnung eingerichtete Vollen machen also eine zweizeilige Aehre fig. II., und die letzte Velle steht auf dem Gipfel des Halms. II.) Die Vollen sitzen oder hängen unmittelbar am Halm fig. 2. 3. conf. fig. III. (der unterste Theil fig. 22. 23. seqq. zeigt nicht einen Stiel des Vollen, sondern ein Stücklein des Halms, welchem sie einverleibet, an) und sind mit ihrer ebenen Fläche gegen dem Halm gekehret, welche fig. 2. anzeigt, gleichwie die vordere gewölbte fig. 3. 22. III.) Die Theile einer Velle sind der calyx c. f. fig. 4. 22., und vier, fünf, sechs (nachdem der Acker fruchtbar ist) Blüthe- und Frucht-Balglein oder Fächlein. Vollen mit fünf Balglein und, um ihre Zusammensetzung desto deutlicher zu zeigen, etwas ausgebreitet und der Länge nach vergrößert, stellen unsere Figuren für, allmo das erste Balglein anzeigt v. fig. 4. 10. 12. 22. 23. 25. 27., das zweyte x. fig. 4. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 23. 25. 27., das dritte y. fig. 4. 10. 12. 14. 16. 22. 23. 25. 27., das vierte z. fig. 4. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 23. 25. 27., und das fünfte *. in eben diesen angezeigten Figuren. Es ist auch noch wahrzunehmen, daß insgemein das erste Balglein einer Velle rechts, und der andern folgenden links stehe, welches aus Zusammenhaltung fig. 4. und 22., 10. und 23., 12. und 25., 20. und 27. zu sehen. IV.) Die Balglein sind wiederum in abwechselnder Ordnung in zwey Reihen an einem besondern dünnen und gleichmäßig zahnförmig abgesetzten Stiel g. fig. 18. 20. 27. angehängt, und machen also gleichsam eine besondere kleine Aehre. Dadurch kan vielleicht die natürliche Einrichtung dieses Geschlechts zu einer spica multiplici (conf. C. BAUH. pin. 21. no. VI. Theatr. Bot. 371.) und die nähere Verwandtschaft einiger Graminum loliaceorum seu spicati-ticea (conf. MONTI l. c. 41. JO. SCHEUCHZERI Agrostogr.

rivero extremo angustiores. Exterior valva interiori crassior & rigidior deprehenditur, extrorsum convexa, introrsum concava, & per dorsi longitudinem, magis tamen mediam, pariter excurrit linea acuta, ut in calycis communis glumis, quae vero inferiora versus obliteratur & superiori extremo terminatur mucrone longiore & aristae similior fig. 13. 26. Interior valva membranacea est & plana, duriori tamen & utroque in latere prominente margine ita cincta, ut utrimque excavata reddatur, extrorsum pro grano, introrsum pro folliculo sequente excipiendo; hi margines coeunt in mucronem obtusum fig. 19. 28. In quarto, quinto & sexto folliculo haec valvae & magnitudine & rigiditate multo inferiores sunt, adeo, ut in duobus ultimis comparari vix queant, a se invicem praeterea difficulter recedant; quarti tamen valvam anteriorem vid. fig. 21. VII.) In his folliculis reperiuntur tria stamina b. fig. 11. 3., quae vero non simul, sed unum post alterum, extra folliculum prorumpunt; aucta magnitudine illa repraesentat fig. 5., ubi i. valva interior a facie exteriori, k. unum ex staminibus extra folliculum iam propendens, l. m. secundum & tertium intra folliculum adhuc recondita. Singula stamina constant ex filamento longo, capillari k. n., & anthera biloculari o., cuius uterque locus secundum longitudinem dehiscit p. & pulvisculum, seu semen masculinum, explodit. VIII.) Stamina haec circumdant unicum ovulum, seu unci seminis rudimentum, quod naturali magnitudine in situ fig. 12. 15. 16. 19., separatim, fig. 6. 7., & magnitudine aucta fig. 5. 8. 9. apparet, ubi q. facies exterior & convexa, r. interior sulcata, s. summitas lanuginosa, t. stylus capillaris, bifidus, reflexus, plumosus, seu totidem stigmatibus secundum LINNAEUM obsitus, quae fig. 5. pulvisculo antherarum exploso largiter conspersa reperiuntur. IX.) Semen maturum, quod in situ fig. 25. q., separatim fig. 29. 30. sistit, est ovato-oblongum, utrimque obtusum, exterius fig. 29. convexum, interius fig. 30. sulcatum. X.) Primus & secundus folliculus maturum semen semper (si excipias duas vel tres infimas locustas, quae interdum exiguae & penitus inanes sunt, conf. fig. 11.) conficiunt, ut & tertius in locustis quinquelocularibus, pariter ac quartus in sexlocularibus; in ultimo vero folliculo ne quidem vestigium staminum vel ovuli unquam discernere potuimus. Hic idem ordo ac nexus omnium locustarum partium observatur in altera specie aristis munita, cuius calycis glumam a facie interna repraesentat fig. 31. simulque ostendit, in hac specie lineam calycis acutam in mucronem paullo longiorem extendi. Folliculi valvam anteriorem aristam longa instructam delineat fig. 32. iterum a facie interna, & anteriorem valvam a facie externa fig. 33. cum grano maturo inhaerente q. eoque excusso fig. 34., ipsum vero granum maturum separatim a facie exteriori convexa fig. 35. & interiori sulcata fig. 36. ostendit.

licht rund, an beyden Enden stumpf, auswendig fig. 29. gewölbt, zweyte Bälglein bringen allezeit (wenn man die 2. oder 3. unterste Bollen ausnimmt, welche zuweilen ganz klein und völlig leer sind fig. 11.) das Saam-Korn zur Vollkommenheit, wie auch das dritte in den Bollen mit fünf Bälglein, gleichwie auch das vierte in den Bollen mit sechs Bälglein; in dem letzten Bälglein aber haben wir niemals auch nur den Anfang der staminum und des ovuli entdecken können. Eben diese Ordnung und Verbindung aller Theile einer Bolle wird auch bey der zweyten grätigten Art gefunden, dessen calycis Hülse von der innwendigen Fläche fürstellet fig. 31. und zugleich zeigt, daß die erhöhte Linie des calycis bey dieser Art sich mit einer längern Spitze endige. Den auswendigen Deckel eines Bälgleins, der mit einem langen Grat versehen ist, zeigt fig. 32. auch von der innwendigen Fläche, den innwendigen von der auswendigen Fläche fig. 33. mit dem annoch darinnen enthaltenen reifen Saam-Korn q. und von diesem ausgeleert fig. 34., das zeitige Saam-Korn aber selbst abgesondert von der auswendigen gewölbten Fläche fig. 35. und von der innwendigen mit der Furche fig. 36.

fig. 2. seqq. LINN. G. n. 78. H. 24. ROY. 70. HALL. 207.) bewiesen werden. V.) Der calyx besteht aus zwey Hülse e. f. fig. 4. 22.; eine jede ist hart und steif, länglicht rund, auswendig gewölbt und der Länge nach durch eine erhöhte Linie in zwey, aber ungleiche, nemlich vorwärts breitem rückwärts schmälern, Theile getheilet; ein jeder Theil ist an dem obern Ende ausgeschweifet, und die erhöhte Linie endiget sich mit einer kleinen Spitze fig. 11., welche Figur der äußern Fläche vordern Theil, und fig. 24., welche die innwendige Fläche fürstellet, doch keine deutlich genug. VI.) Ein jedes Bälglein, oder eigener calyx der Blüthe, welchen LINNAEUS für eine corolla erkennet, bestehet aus zwey Deckeln. Diese sind bey dem ersten und zweyten Bälglein größer als die Hülse des gemeinschaftlichen calycis, vornemlich in der Länge, an dem obern Ende aber schmaler. Der auswendige Deckel ist dicker und steifer als der innwendige, nach außen gewölbt, nach innen ausgeholet, und durch die Länge des Rückens, mehr aber durch die Mitte, lauft ebenfalls eine erhöhte Linie, wie bey der Hülse des gemeinschaftlichen calycis, die aber nach unten sich verlieret und an dem obern Ende mit einer längern und einem Grät ähnlichen Spitze sich schließet fig. 13. 26. Der innwendige Deckel ist häutig und eben, doch mit einem härtern und zu beyden Seiten vorragenden Rand also umgeben, daß dieser Deckel nach außen und innen eine Ausbuchtung bekommt, davon jene das Saam-Korn, diese das folgende Bälglein in sich schließet; dieser Rand machet eine stumpfe Spitze fig. 19. 28. Bey dem vierten, fünften und sechsten Bälglein nehmen diese Deckel so wohl an der Größe als Steife vieles ab, so, daß bey den zweyen letzten sie kaum in eine Vergleichung kommen, und überdies sehr schwer von einander zu theilen sind: doch stellet das vierten auswendigen Deckel fig. 21. für. VII.) In diesen Bälglein findet man drey stamina h. fig. 11. 3., welche aber nicht zugleich, sondern eines nach dem andern, in Vorschein kommen: vergrößert zeigt solche fig. 5. an, allwo i. der innwendige Deckel von der auswendigen Ansicht, k. eines von den staminibus, das außer dem Bälglein schon vorraget, l. m. das zweyte und dritte stamen, die in dem Bälglein annoch eingeschlossen sind. Ein jedes stamen bestehet aus einem langen haardünnen Faden k. k. und aus einer anthera biloculari o., dessen jedes Fächlein der Länge nach sich öfnet und einen Staub, das ist den männlichen Saamen, austreuet VIII.) Diese stamina umgeben ein einiges Eylein oder Anfang des Saam-Korns, welches in natürlicher Größe und Lager erscheinet fig. 12. 15. 16. 19., abgesondert fig. 6. 7., und vergrößert fig. 5. 8. 9., allwo q. die auswendige gewölbte Fläche anzeigt, r. die innwendige mit einer Furche, s. das obere wolligte Ende, t. den stylum, welcher haarförmig, doppelt, zurück gebogen und federicht oder nach LINNAEI Meinung mit so vielen stigmatibus besetzt ist, die wie fig. 5. mit dem ausgestreuten Staub der antherarum häufig bedeckt gefunden haben. IX.) Ein reifes Saam-Korn, welches in seinem Lager fig. 25. q., abgesondert fig. 29. 30. abgebildet, ist länglich, innwendig fig. 30. mit einer Furche versehen. X.) Das erste und zweyte Bälglein bringen allezeit (wenn man die 2. oder 3. unterste Bollen ausnimmt, welche zuweilen ganz klein und völlig leer sind fig. 11.) das Saam-Korn zur Vollkommenheit, wie auch das dritte in den Bollen mit fünf Bälglein, gleichwie auch das vierte in den Bollen mit sechs Bälglein; in dem letzten Bälglein aber haben wir niemals auch nur den Anfang der staminum und des ovuli entdecken können. Eben diese Ordnung und Verbindung aller Theile einer Bolle wird auch bey der zweyten grätigten Art gefunden, dessen calycis Hülse von der innwendigen Fläche fürstellet fig. 31. und zugleich zeigt, daß die erhöhte Linie des calycis bey dieser Art sich mit einer längern Spitze endige. Den auswendigen Deckel eines Bälgleins, der mit einem langen Grat versehen ist, zeigt fig. 32. auch von der innwendigen Fläche, den innwendigen von der auswendigen Fläche fig. 33. mit dem annoch darinnen enthaltenen reifen Saam-Korn q. und von diesem ausgeleert fig. 34., das zeitige Saam-Korn aber selbst abgesondert von der auswendigen gewölbten Fläche fig. 35. und von der innwendigen mit der Furche fig. 36.

TAB. 41. Lat. Verbena. Germ. Eisenkraut, Eisenhart, Taubenkraut. Grac. Πεντακίδιον, ἰερὸν ἄνθος. Angl. Vervein, Vervain. Hisp. Berbena. Ital. Verminacola, Verbena. Gall. Verveine Vervaine, Belg. Yferkruyt.

1. Altitudinem duorum pedum attingit: caulis puniceus, folia saligneae viriditatis, flores pallide purpurei sunt.

2. Crescit in viis publicis, prope vrbes atque pagos, floresque mense Julio producit.

3. Tota planta in usu est & inter cephalica remedia numeratur, conducit in morbis a frigidis & serosis causis promanantibus. Quidam ad obstructions hepatis atque lienis valere affirmant, itemque ad icterum atque podagram. Extrinsece etiam vulneribus applicatur, nec non lippis & inflammatis oculis.

4. NOM. GEN. Verbena Rai I. 535. Meth. 61. no. 4. Syn. 236. Tourn. 200. Riv. p. 12. Heuch. Ind. 26 Rupp. 236. Dill. 134. Boerh. I. 186. Vaill. 200. Heist. I. 31. Linn. G. no. 26. Roy. 326. Hall. 661. Kram. 9. 45. 49. Ludov. no. 222.

5. NOM. SPEC. Verbenaca Matth. 1052. Verbena Riv. tab. 56. Heuch. ind. 26. Rupp. 236. Dill. 134. Verbena communis Ger. 718. Verbena communis coeruleo flore C. B. pin. 269. Tourn. 200. Boerh. I. 187. Vaill. 200. Verbena mas seu recta & vulgaris Park 674. Verbena nostras flore coeruleo Kram. 49. Verbena officinarum Heist. I. 31. Verbena vulgaris F. B. III. 443. Rai. I. 535. Syn. 236. Verbena foliis multifidolaciniatis, spicis filiformibus Linn. H. 11. Roy. 327. Verbena foliis laciniatis superioribus tripartitis, spicis angustis longissimis Hall. 661.

Nota. Varietas hujus speciei occurrit frequens non aliter distincta, quam floribus albidis et caulibus totis viridibus, quæ est *Verbena communis floribus albidis* C. B. pin. 269., cuiusque ramulos florigeros fig. 11. & flores magnitudine aucta fig. 6. seqq. repræsentant: an constans sit hæc varietas, an a soli vel tempestatis differentia dependeat, incerti adhuc sumus; posterius tamen vero simile est, quum varii coloris gradus tum inter cæruleum & album in floribus, tum inter viridem & purpureum in caulibus huius plantæ reperiuntur. Characteres generici floris fructusque conveniunt cum illis plantarum flore labiato & galeato, si excipias corollæ limbum, qui magis explanatus est, cuius tamen segmenta quinque irregulari situ ita disposita sunt, ut duo superiora galeam & tria inferiora barbam imitentur, vid. fig. 6. 7. Paux corollæ coarctata villisque tenuissimis obsita est (id quod fig. 7. 9. aliquo modo indicat) & tubus obliquus fig. 6. 8., cui infra villos fauces adherent quatuor stamina, ex quibus duo paululo longiora, singula anthera biloculari instructa sunt: hæc quidem indicat fig. 9.; sed artifex in situ & numero eorum deceptus fuit, qualem errorem illi quoque, qui et aliorum observationibus edocti & magis exercitati iam sunt, in floribus tam exiguis facile incurrere possunt. Stylus brevis, simplex, tenuis est cum stigmate obtuso, qui insidet quatuor ovulis oblongis archissime inter se coherentibus fig. 11. Calyx villosus est & ex quinque segmentis profundis constructus, quæ in exiguis abeunt denticulos fig. 6. 10. Duo segmenta exterius latus occupant, & tria angustiora (quorum medium paulo brevius est) interius seu cauli obversum, unde totus calyx quadrangulus redditur. Hic arte circumdat ovula ab iisdem ad duas tertias partes repletus ita, ut exiguum tantum tubi corollæ partem obtegat; persistit idem ad seminum usque maturitatem & ab his tandem totus repletur. Calycem suffulcit brevis petiolus fig. 10., quem, & simul imam calycis partem, externe involvit foliolum oblongum proprium fig. 6. æque persistens. Semina matura sunt oblonga, exterius fusca, convexa & secundum longitudinem a pluribus sulcis inæqualia; interius, ubi inter se contigua sunt, duo angusta candida & per microscopium granulis quasi aspera apparentia latera angulum componunt obtusum. Naturali magnitudine sistant florem fig. 1. 2., calycem fig. 3. & semina fig. 4. secundum delineationem Blackvelliianam, quæ autem singulæ, ut & illæ aucta magnitudine additæ, correctione opus habent.

Ann. Man findet öfters eine Varietät von dieser Art, welche alleine mit weissen Blumen und ganz grünen Stengeln sich unterscheidet, und ist *Verbena communis floribus albidis* C. B. pin. 269., dessen blühende Zweige fig. 11. und vergrößerte Blumen fig. 6. seqq. fürstellen: Ob diese Varietät beständig ist, oder vielmehr von dem Unterscheid des Erdbodens oder der Witterung abhänge, ist noch nicht bestimmt, doch ist das letztere wahrscheinlich, weil unterschiedliche Stufen der Farbe, so wohl zwischen weiß und blau in der Blume, als auch zwischen grün und purpur in den Stengeln, bey dieser Pflanze gefunden werden. Die Geschlechts-Kennzeichen der Blume und der Frucht haben eine Ähnlichkeit mit denen, welche die plantæ flore galeato & barbato haben: Dann ob gleich der limbus corollæ fast ganz ausgebreitet ist, so stehen doch dessen fünf Einschnitte so ungleich, daß die zween obere mit dem Helm, und die drey untere mit dem Barth können verglichen werden fig. 6. 7. Die Desnung der Corollæ ist eng, und mit zarten Fäserlein besetzt (welches fig. 7. 9. einiger massen anzeigt) und die Röhre schief fig. 6. 8., an welcher unter den Fäserlein der Desnung vier stamina angewachsen sind, von welchen zwey etwas länger, alle aber mit einer anthera biloculari versehen sind: diese zeigt zwar fig. 9. an; aber der Künstler hat sowohl in der Zahl als auch in dem Lager sich versehen, dergleichen wohl denenjenigen, die schon durch anderer ihre Anmerkungen unterrichtet sind, bey dergleichen kleinen Blumen begegnen kan. Der Stylus ist kurz, einfach und schmahl mit einem stumpfen stigmate, welcher auf vier länglichten und unter sich genau vereinigten ovulis fig. 11. sitzt. Der calyx ist hart, rigt und bestehet aus fünf tiefen Einschnitten, die sich mit kleinen Spizen endigen fig. 6. 10. Zween Einschnitte stehen nach außen und drey etwas schmählere (darunter der mittlere ein wenig kürzer ist) nach innen oder gegen dem Stengel neben einander, wodurch der ganze calyx viereckigt wird. Dieser umgiebet die ovula ganz genau, ist davon über zwey Drittheil angefüllt, bedecket also nur einen kleinen Theil von dem tubo corollæ, bleibet bis zur Zeitigung der Saam-Körnlein stehen, und wird von diesen endlich ganz angefüllt. Den calycem unterstützet ein kurzer Stiel fig. 10., welchen und zugleich den untersten Theil des calycis ein länglichtes eigenes Blättlein fig. 6. auswendig umgiebet, das auch bis zur Zeitigung des Saamens stehen bleibet. In der natürlichen Gröse wird die Blume fig. 1. 2., der calyx fig. 3., der Saame fig. 4. nach der Blackvelliischen Abbildung fürgestellt, welche alle aber, gleichwie auch die beygesetzte vergrößerte Figuren, einer Verbesserung nöthig haben.

TAB. 42. Lat. *Bellis maior*. Germ. *Große Maslieben* oder *Gäns-Blumen*, *Johannis-Blumen*. Græc. *Βούρβαλ-+*
 +⊙ *nov. Angl.* The great Daisie, Ox-Eye. *Hisp.* Bupthalamo. *Ital.* Occhio di Bue, Margheritina magiore, Levcanthemo. *Gall.* Oeil de Boeuf, Margueritte, Confyre. *Belg.* Groote Magdelieyen.

1. Caules ultra pedis altitudinem assurgunt: folia saturate viridia sunt, flores albi, in quorum medio discus, luteus conspicitur.
 2. Crescit in pascuis, & mense Junio floribus ornatur.
 3. Flores balsamica gaudent virtute, omnibusque pectoris atque pulmonis morbis, tussi nimirum asthmatici, pleuritidi, phthisi et hecticæ, præstant medicinam: immiscentur frequenter decoctis vulnerariis ad contusiones, vulnera atque rupturas sanandas.

1. Die Stengel werden über einen Schuh hoch, die Blätter sind dunkel gras-grün, die Blumen weiß mit einer gelben Scheibe in der Mitte.

2. Es wächst auf den Vieh-Weiden, und blüht im Juni.

3. Die Blumen von diesen Maslieben, werden für balsamisch und nützlich gehalten in allen Krankheiten der Brust und Lungen, als Husten, kurzen Odem, Seitenstechen, Schwindsucht und Auszehrung. Man brauchet sie häufig unter die Wund-Träncke in innerlichen Querschüssen, Wunden und Zersprengungen.

4. NOM. GEN. *Bellis maior* Rai. I. 350. Meth. 36. no. 4. *Levcanthemum* Tourn. 492. Rai. syn. 184. *Heuch.* ind. 48. *Rupp.* 170. *Dill.* 82. *Boerh.* I. 107. *Vaill.* 115. *Heist.* I. 18. *Kram.* 80. *Bellidioides* Vaill. Act. 1720. p. 280. *Chrysanthemum* Linn. G. no. 788. Roy. 174. *Matricaria* Hall. 718. *Ludov.* no. 349.

5. NOM. SPEC. *Bupthalamum maius* Lonic. c. 66. nat. hist. p. 89. a. *Bellis maior* sive *Consolida media* vulnerariorum Lob. hist. 253. *Bellis maior* Ger. 634. f. B. III. 114. Rai. I. 350. *Bellis maior sylvestris* caule folioso C. B. pin. 261. *Bellis maior vulgaris* sive *sylvestris* Park. 528. *Levcanthemum* aliis *Bellis sylvestris* caule folioso maior *Heuch.* ind. 48. *Levcanthemum vulgare* Tourn. 492. Rai. syn. 184. *Rupp.* 170. *Dill.* 82. *Boerh.* I. 107. *Vaill.* 115. *Heist.* I. 18. *Levcanthemum folio oblongo obtuso vulgare virescens* Kram. 80. *Bellidioides vulgaris* Vaill. Act. 1720. p. 281. *Chrysanthemum foliis amplexicaulibus oblongis, superne serratis inferne dentatis* Linn. H. 416. Roy. 174. *Matricaria foliis imis petiolatis, ad caulem auritis & ferratis: varietas vulgarissima foliis obtusioribus, tenuioris carnis, caule ramosiore* Hall. 720.

Nota. Mirum procul dubio videbitur nonnullis, Auctores systematicos etiam recentissimos in constituendo huius plantæ nomine generico maxime inter se dissentire; sed his consuetudo nunc est, neglecto omnium partium reliquarum habitu, genericos characteres non nisi a floribus & fructibus, atque præterea in hac præcipue plantarum classe a calycis communis conformatione desumere, quæ fusius exponere, instituti ratio non permittit. Figuris Blackvelliianis sistitur calyx communis a., flos integer expansus a facie anteriore fig. 1., eius radius b., discus d., radii petalum separatim fig. 2., semen. fig. 3. Figuræ additæ repræsentant radii petalum magnitudine aucta c., & seminis ovulum k., quod Blackvelliiana fig. 2. male depingit papposum i., Disci flosculus magnitudine naturali delineatur e., aucta f., eius-

Ann. Es werden sich einige ohne Zweifel wundern, daß auch die neueste Auctores systematici in Bestimmung des Geschlechts Namens dieses Gewächses gar sehr von einander abgehen; es haben aber diese die Gewohnheit, mit Hintansetzung der Gestalt aller übrigen Theile, die Geschlechts-Kennzeichen alleine von der Blume und der Frucht, auch über dieses fürnehmlich bey dieser Classe der Gewächse von dem allgemeinen calyce, abzunehmen, welches weiters zu erklären, die Absicht dieses Werkes nicht gestattet. Durch die Blackvelliische Figuren wird fürgestellt der allgemeine calyx a., eine ganze offene Blume von vornen fig. 1., dessen Umkreis b., die Scheibe d., ein abgesondertes Blättlein des Umkreises fig. 2., der Saame fig. 3. Die beygesetzte Figuren zeigen, an ein Blättlein des Umkreises vergrößert c., und des Saamens Eplein k., welches in der

eiusque limbus quinque partitus *g.*, stylus *b.*, seminis ovulum
l., folia radicalia *m. n.*

der stylus *b.*, des Saamens Eylein *l.*, Blätter nahe an der Wurzel *m. n.*

Blackwellischen fig. 2. unecht mit einem pappo *i.* abgebildet
wird. Ein Blümlein der Scheibe wird fargestellet in natürli-
cher Größe *e.*, vergrößert *f.*, sein fünffach getheilter Rand *g.*
m. n.

TAB. 43. *Lat.* Anagallis terrestris mas flore phoeniceo. *Germ.* Gauchheyl, Grundheil, Heil aller Welt, Co-
rallen-Blümlein. *Grac.* Αναγallis, *Angl.* Pimpernel, male Pimpernel. *Hisp.* Muruges. *Ital.* Anagallo, Ana-
gallide. *Gall.* Morgeline, Mouron. *Belg.* Bastard Maur, Guychelheyl.

1. Hæc planta unius pedis longitudinem attingit,
folia graminea viriditate nitent, flores dilute rubri sunt.

2. Crescit in agris frumento obstitis, & mense Ma-
jo atque Junio floribus vestitur.

3. Mediocriter calida est hæc planta atque sicca, le-
niterque adstringit: a quibusdam pro egregia herba
vulneraria habetur. Succus vel solus, vel cum lacte
vaccino sumtus, in phthisi atque aliis pulmonis morbis
utilissimum præstat remedium. In febribus ardenti-
bus non raro permiscetur aquis confortantibus ac ale-
xipharmacis. Ab aliis quoque autoribus celebribus
commendatur in deliriis vel cum, vel sine febre. MAT-
THIOLUS succum ad odontalgiam prodesse dicit, si
scilicet naribus attrahatur ab ea parte, ubi nullus do-
lor sentitur.

4. *NOM. GEN.* Anagallis *Rai. II. 1023. Meth. 83. no. 1. Syn. 282. Tourn. 142. Heuch. Ind. 3. Dill. 127. Boerh. I. 203. Vaill. 12. Heist. I. 3. Linn. G. no. 150. Roy. 486. Hall. 481. Kram. 14. Ludov. no. 41.*

5. *NOM. SPEC.* Anagallis mas *Brunf. I. 238. Ger. 617. Rai. II. 1023.* Anagallis flore puniceo mas *Ruell. 427. Anagallis mas phoenicea f. B. III. 369. Anagallis terrestris mas Thal. 14. Anagallis mas Dioscoridis & Mat-
thioli Rup. 19. Anagallis phoeniceo flore Camer. Hort. 14. C. B. pin. 252. Park. 557. Rai syn. 282. Tourn. 142. Heuch. Ind. 3. Dill. 127. Boerh. I. 204. Hall. 481. Anagallis folio adverso bino lato flore phoeniceo Kram. 14. Anagallis puniceo flore Vaill. 12. Anagallis flore coccineo Heist. I. 3. Anagallis foliis ovatis Linn. H. 52. Anagal-
lis foliis indivisis. Roy. 416.*

Nota. Variat hæc species floris colore puniceo, obsoleto pur-
pureo & carneo: an varii hi colores constanter propagentur,
annotatum haud legimus. Variat non minus foliorum nume-
ro in una eademque planta: ordinarius est binus ex adverso,
interdum ternus, uti RUPPIUS recte annotavit atque GE-
RARDUS & PARKINSONUS figuris suis (sunt autem ead-
em) repræsentarunt; VAILLANT vero & KRAMERUS
ut varietates has differentias recensent. In arenosis præterea
arvis caules huius speciei breviores hinc inde sparsi humi iacent,
in pinguioribus & argillaceis contra multo longiores evadunt
& haud pauci eriguntur, quo habitu hanc plantam sistit nostra
figura Blackwellianæ substituta. Flos a facie antica repræsen-
tatur fig. 1. 2., laterali fig. 3., postica fig. 4., ubi simul calyx *a. a.*
apparet integer. Corolla monopetala est, plana & quinque seg-
mentis aequalibus, ovato lanceolatis, ad fundum usque divisa
fig. 1. 2., ex quo eriguntur quinque stamina breviora, inferius
villosa cum anthera simplici: unum horum segmentorum cum
adhærente stamine delineat fig. 5. Calyx angustioribus, attamen
non brevioribus, quinque segmentis acutis pariter ad fundum
usque divisus est fig. 6. & persistens fig. 8. 10. Hic includit ova-
rium globosum *c. fig. 7.*, cui insidet stylus filiformis cum stigma-
te capitato *b. fig. 6. 7.*, qui fundum corollæ perforatum pene-
trat & paullulum incurvatus est. Calycem sustinet petiolus lon-
gus fig. 1. Fructus sit globosus fig. 8. & capsulam format sim-
plicem, horizontaliter in medio circiter dehiscens, cuius
operculum seu partem superiorem repræsentat fig. 9. & inferio-
rem multis seminibus plenam fig. 10. Hæc colliguntur in me-
dio circa axem & sunt angulosa fig. 11. sigillatim magnitudine
aucta delineata.

men angefüllt fig. 10. Diese hängen in der Mitte an einer Axt zusammen, sind eckigt, und fig. 11. vergrößert einzeln abgebildet.

Anm. Die Farbe der Blume ist bey dieser Art unterschiedlich,
hell-granaten, halb-purpur, und fleisch-färbig: ob diese Farben
beständig fortgepflanzt werden, finden wir nicht angemerkt. Es
variret auch diese Art in der Zahl der Blätter in einer Pflanze:
ordentlich stehen zwey, zuweilen drey gegen einander, wie solches
RUPP mit Recht angemerkt auch GERHARD und PAR-
KINSON mit ihren Figuren (welche aber einerley sind) fargestel-
let haben; VAILLANT hingegen und KRAMER führen
diesen Unterschied als Varietäten an. Ueberdies werden die Sten-
gel dieser Art im sandigten Boden kürzer, und breiten sich hin und
wieder auf der Erden aus; im fetten und leimigten Boden hänge-
gen werden sie viel länger und etliche davon stehen aufrecht, in wel-
cher Gestalt unsere, statt der Blackwellischen Figur, diese Pflanze
furstellet. Die Blume ist von ihrer vordern Ansicht abgebildet
fig. 1. 2., von der Seite fig. 3., von hinten fig. 4., wo zugleich der
ganze calyx *a. a.* zu sehen. Die Blumen Blümlein hängen zusam-
men, und sind flach ausgebreitet, bestehen aus fünf gleichen länglich-
spizigen Einschnitten bis auf dem Grund fig. 1. 2., aus welchem fünf
etwas kürzere und zu unterst wolligte stamina mit einer einfachen
anthera aufrecht stehen: einen dieser Einschnitte mit dem daran
hängenden stamine zeigt fig. 5. Der calyx besteht aus fünf schmäh-
lern, aber nicht kürzern, spizigen und ebenfalls bis auf dem Grund
getheilten Einschnitten fig. 6. und bleibet bis zur Zeitigung der Frucht
fig. 8. 10. Dieser schließet in sich ein kugelförmiges ovarium *c. fig. 7.*,
auf welchem ein kleiner fadenförmiger stylus mit einem Knöpflein
b. fig. 6. 7. sitzt, der durch das Loch am Grunde der Blümlein
durchgehet und etwas gebogen ist. Der calyx wird unterstützt
von einem langen Stiel fig. 1. Die Frucht ist kugelförmig fig. 8.
und einfach, öfnet sich fast in der Mitte über quer, dessen Deckel
oder obern Theil fig. 9. furstellet, und den untern mit vielen Saam-
en angefüllt fig. 10. Diese hängen in der Mitte an einer Axt zusammen, sind eckigt, und fig. 11. vergrößert einzeln abgebildet.

TAB. 44. *Lat.* Jacea, Flos Trinitatis, Viola tricolor. *Germ.* Siebenfarben-Blümlein, Dreyfaltigkeit-Blume,
Stief-Mütterlein, Frenssam-Kraut. *Grac.* Jdr Enlax-pour. *Angl.* Pansies, Hearts-Ease, Three faces unter
a Hoat. *Hisp.* Yerva di S. Trinadados. *Ital.* Jacea, minuti Pensieri. *Gall.* Herbe a la Trinitè, Pensées,
Menues Pensées. *Bar.* Pensées, Drievaldige Bloemen.

1. Altitudo conficit unum pedem. Folia saturate
viridia, flores vel dilute vel saturate purpurei & fla-
vi sunt.

2. Sponte crescit in agrorum marginibus, quamvis
etiam in hortis colatur; flores fert omni ferme æsta-
tis tempore.

3. Folia mucilaginosa sunt, & vulneribus applicari
solent. Dicuntur tormina infantum lenire, adeoque
convulsionem ex his orientes præcavere.

1. Es wächst einen Schuh lang, das Laub ist dunkel-
grün, die Blumen sind hell oder dunkel-purpurfarb
und gelb.

2. Es wächst wild an dem Rande der Felder, wird
aber auch in den Gärten gezogen, und blüht einen grossen
Theil des Sommers.

3. Die Blätter sind schleimigt oder mucilagos, und
werden zu Wunden gebraucht; sie sollen das Grimmen
der Kinder vertreiben, und den daher kommenden Sch-
tern bevorzukommen.

4. *Nom.*

4. NOM. GEN. *Viola Rai. II. 1049. Meth. 112. no. 1. Syn. 364. Tourn. 410. Riv. III. p. 26. Heuch. Ind. 41. Rupp. 288. Dill. 48. Boerh. I. 243. Vaill. 204. Heist. I. 32. Linn. G. no. 821. Roy. 430. Hall. 502. Kram. 67. Ludvv. no. 629.*

5. NOM. SPEC. *Herba Trinitatis Brunf. II. 73. III. 29. Fuchsf. 303. Jacea Dorsten. 156. b. Jacea tricolor five Trinitatis flos J. B. III. 546. Jacea seu herba Trinitatis Camer. Epit. 912. Viola tricolor Ger. 854. Rai. II. 1052. Syn. 365. Riv. III. tab. 122. Rupp. 289. Viola tricolor male in officinis Jacea Heuch. Ind. 41. Viola tricolor maior & vulgaris Park. 756. Viola tricolor hortensis repens, an φλόξ καὶ φλόγιον Theophrasti C. B. pin. 199. Tourn. 420. Boerh. I. 244. Vaill. 204. Viola flore ad latera sparso in caule supino non flagellante semine testā capsula simplici, tricolor inodora, foliis longis Kram. 67. Viola pedunculis caulinis angulatis, stipulis oblongis pinnato - dentatis, foliis ovato - oblongis crenatis Linn. H. 427. Roy. 431. Viola (III. ordinis) annua caule procumbente, foliis sub ramis lacinatis, flore magno tricolore Hall. 504.*

Nota. Species hæc, quam HALLERUS l. c. jure distinguit ab altera, quæ est *Viola bicolor arvensis* C. B. pin. 200., florum magnitudine & colore, itemque caulium longitudine & situ vel erecto vel supino, multum variat. Quemadmodum autem floris color quandoque in una planta diversus reperitur, ita etiam caulium situs & magnitudo a foliis & tempestatis conditione procul dubio oritur. Colores picturæ Blackwellianæ no. 1. singulares sunt, nec ab ullo, si recte memini, hoc ordine indicati. Apud nos floris color huius speciei, ubique ferme in sepium aggeribus herbidis sponte provenientis, ex violaceo, coerulesco, albo & flavo cum nigris lineis inscriptis eo ordine, quem indicant fig. 5. 12., mixtus peramoenum oculis spectaculum exhibet. Quemadmodum autem iidem colores a pollice facie fig. 6. obscuriores deprehenduntur, ita etiam ab antica nunc magis saturati fig. 5., nunc magis diluti fig. 12., imo quandoque in eadem planta ex albo & flavo tantum variegati comparent. Calyx pentaphyllus est d. fig. 2. 6. 7. & ad fructus maturitatem usque persistit fig. 10. 13. 14. Petalorum etiam numerantur quinque, quæ situ irregulari ita disposita sunt, ut, petiolo erecto, duo fig. 6. a. a. locum infimum, duo b. b. lateralem, & unicum calcari seu nectario instructum c. supremum & medium teneat, qui vero situs in caule post floris expansionem reflexo invertitur fig. 5. 12. Stylum cum quinque staminibus eundem arcu circumdantibus sistit a. fig. 7., eadem stamina inter se coalita fig. 8., stylum ab his denudatum unicum ovario fig. 9., ubi fig. 7. 9., calcar petali solitarii adhuc adhæret. Fructum seu capsulam seminalem clausam & apertam sistit Blackwelliana fig. 3. et semen fig. 4., quæ vero formæ huius speciei minus respondent, eandem capsulam maturitati proximam cum stylo persistenter repræsentat nostra fig. 10. 11. 13. f., & maturam in tres valvas dehiscentem fig. 14. f. semina fig. 15. Quædam harum figurarum partes accuratiori adhuc indigent delineatione.

Anm. Diese Art, welche HALLERUS l. c. von der andern welche ist *Viola bicolor arvensis* C. B. pin. 200., mit Recht unterscheidet, variiert gar sehr in der Größe und Farb der Blumen, in gleichen in der Länge und dem aufrechten oder niederliegenden Lager der Stengel. Gleichwie aber zuweilen die Farb der Blume an einer Pflanze unterschieden gefunden wird, also entsteht auch ohne Zweifel das Lager und die Größe der Stengel von der Beschaffenheit des Erdreichs und der Witterung. Die Farben der Blackwellischen Malereien sind besondrer, und von niemand, wann ich mich recht erinnere, in dieser Ordnung angezeigt. Bey uns giebet die Farbe der Blumen dieser Art, welche fast allenthalben an den grasigten Hecken wächst, aus violett, blau, weiß und bleich - gelb mit schwarzen Strichen in der Ordnung, welche fig. 5. 12. anzeigt, vermischet ein angenehmes Ansehen. Gleichwie aber eben diese Farben bey der hintern Ansicht fig. 6. dunkler gefunden werden, also erscheinen sie auch bey der vordern Ansicht bald völliger fig. 5. bald bleicher fig. 12., ja zu weilen an eben der Pflanze nur aus weiß und bleich - gelb vermengt. Der calyx ist fünf - blättricht fig. 2. 6. 7. d. und bleibet bis zur Zeitigung der Frucht fig. 10. 13. 14. Der Blättlein der Blumen werden auch 5. gezehlet, welche in einem ungleichen Lager also eingerichtet sind, daß, wann der Stiel aufrecht steht, zwey fig. 6. a. a. zu unterst, zwey b. b. zu beyden Seiten, und eines c., das mit einem Sporn oder dem Nectario versehen ist, zu oberst in der Mitte stehen, welches Lager aber, wann der Stiel nach aufsteigender Blume sich unterwärts bieget, umgekehrt wird fig. 5. 12. Der Stylus mit 5. Staminibus, welche denselben genau umgeben, wird sargestellet a. fig. 7., eben diese zusammen gewachsene Stamina fig. 8., der von diesen entblößte Stylus nebst dem ovario fig. 9., allwo fig. 7. 9. der Sporn des einfachen Blumen - Blättleins noch anhänget. Die noch geschlossene und geöffnete Fruchtkapsel Saamen - Capsel wird abgebildet in der Blackwellischen fig. 3., die Saamen fig. 4., welche aber mit der Gestalt dieser Art nicht überein kommen; Eben diese fast zeitige Capsel mit dem überbleibenden Stylus auffspringende fig. 14. f., den Saamen fig. 15. Einige Theile dieser

10 zeigt unsere fig. 10. 11. 13. f., und eine ganz zeitige in 3. Decker Figuren haben noch eine genauere Abbildung nöthig.

TAB. 45. *Lat. Rubus vulgaris. Germ. Brombeer, Brambeer, Braunbeer, Grakbeer. Græc. βάλος. Angl. Bramble, Common Bramble, Blackberry Bush. Hisp. Carza, Carça, Ital. Rovo. Gall. Ronce. Bat. Braemen, Braambezie, Braembesjen.*

1. Sarmenta huius fruticis longa sunt, atque repentia. Quinque plerumque folia adhærent uni pediculo in parte fruticis inferiori; tria vero in parte eius superiori fructui proximiori: color eorum obscure viridis est, flores rubelli, interdum albi sunt; fructus tandem maturus niger evadit.

2. Crescit in multis fruticetis, & sepibus, profert flores Majo atque Junio mense, fructus autem mense Septembri maturefcit.

3. Foliis tribuitur vis adstringens, eaque ad gargarismata in faucium affectionibus adhibentur. Fructus nondum maturus valde adstringit, sistit profusionem sanguinis aliorumque humorum, medetur læsionibus oris: succus autem e fructibus maturis ad fyrupi consistentiam coctus ardorem urinæ mitigare perhibetur.

1. Diese Staude hat lange fortwiegende Neben. Es sind insgesamt 5. Blätter auf einem Stiel am untern Theil, 3. aber oben nächst bey der Frucht, die Blätter sind dunkel, grün, die Blumen bleich, roth und manchmahl weiß; die Frucht wenn sie zeitig ist, hat eine schwarze Farbe.

2. Es wächst in vielen Hecken, blüht im Junio und Julio. Die Frucht wird reif im September.

3. Die Blätter werden für zusammen ziehend gehalten, und öfters gebraucht in Gurgel, Wässern bey bösen Halsen; die unreife Frucht ziehet stark zusammen, und ist nützlich in allen Ergießungen des Blutes und anderer Feuchtigkeiten, wie auch bey Versehrung des Mundes; der Saft aus den zeitigen Früchten zu einem Sirup gekocht wird wider die Hitze des Urins gerühmt.

4. NOM. GEN. *Rubus Rai. II. 1639. Meth. 156. Syn. 467. Tourn. 614. Heuch. Ind. 18. Rupp. 142. Dill. 72. Boerh. II. 60. Vaill. 174. Heist. II. 25. Linn. G. no. 485. Roy. 273. Hal. 343. Kram. 137. Ludvv. no. 627.*

5. NOM. SPEC. *Rubus arvensis Tab. 896. Rubus fructu nigro Heist. II. 25. Rubus maior fructu nigro J. B. II. 57. Rai. II. 1639. Syn. 467. Rubus vulgaris seu Rubus fructu nigro C. B. pin. 479. Tourn. 416. Rupp. 142. Dill. 72. Boerh. II. 60. Vaill. 174. Rubus vulgaris major Park. 1013. Rubus supinus maior folio pinnato, bacca glabra inodora non cava & Rubus erectus polyanthos spinosus vulgaris Kram. 137. Rubus caule aculeato, foliis ternatis ac quinatis Linn. H. 192. Roy. 273. Rubus foliis ternatis & quinatis, costa spinosa, fructu nigro & lævi Hall. 345.*

Nota. Auctores valde variant in definiendo petalorum colore. Multi nullam plane eius mentionem faciunt, nec ipse C. BAUHINUS l. c. in annotandis varietatibus alias nimium curiosus BRUNFELSIUS III. 586., DODONÆUS 741., MAT-

Anm. In Bestimmung der Farbe der Blumen, Blättlein sind die Auctores sehr unterschieden. Viele gedenken desselben gar nicht, auch selbst C. BAUHINUS l. c., der in Bemerkung der Varietäten sonst sehr sorgfältig ist; BRUNFELSIUS III. 586., DO-

MATTHIOLUS 1009. **CAMERARIUS** *Epit.* 751. album eum describunt & **WEINMANNUS** *Phytant. tab.* 874. c. atque **SCHMIEDELIUS** *lc. Pl. tab. II* talem pingunt, qualem etiam sistit *nostra* fig. 2., utpote apud nos communem; **ZANNICHELLIUS** 228. rubescentem seu subrubrum (*rossleggiante*) illum definit, qualem etiam pingit *Blackwelliana* fig. 1.; **TRAGUS** 969. ex candido roseum eum appellat; **FUCHSIUS** 151. **CAMERARIUS** *Kräuterb.* 367. a., **TABERNÆMONTANUS** *Kräuterb.* 1297. eundem ab initio rubescentem deinde candidum esse tradunt. Hinc procul dubio **CÆSALPINUS** 98. **GERHARDUS** 1271., **PARKINSONUS** 1013., **J. BAUHINUS** l. c. **RAIUS** H. l. c. atque **HALLERUS** l. c. hanc coloris differentiam ut accidentalem & inconstantem, si non in eadem planta, saltem in propagatione, considerant, dum eundem vel album seu candidum, vel subrubentem seu carneum aut ex candido roseum esse monent; hinc etiam **LINNÆUS** H. l. c. huius differentie ne quidem inter varietates mentionem facit. E contrario eandem differentiam tanquam distinctæ speciei characterem considerant **MAGNOLUS** *Hort. Reg. Monsp.* 175. *Bot. Monsp.* 226. **TOURNEF.** l. c. **TILLI** *Hort. Pis.* 149. **GARIDEL** 414., **VON LINDERN** *Tournef. Alsat.* 54. *Hort. Alsat.* 94. & **SEGUIERUS** *Pl. Veron. Vol. II.* 301. Horum sententia multum favet nota a **DILLENIO** in *Rai. Syn.* l. c. his verbis adiecta; videntur sane dua Rubi vulgaris species in sepibus & dumetis Anglia sponte passim nasci, dum alteri flores albi maiores & praeciores, alteri serius nascentes, minores, purpureascentes. In foliis huius notabile discrimen non observatur: an in fructu etiam differentia sit, inquiri meretur. Sane **J. BAUHINUS** & *acidus, & dulces, & amaricantes, & fatuos fructus observavit.* Præter has differentias alius porro mentionem facit idem **BAUHINUS** & ex hoc **RAIUS** l. c. dum fructum describit *aristis quibusdam asperiusculum*, qualem etiam pingit *Blackwelliana* fig. 3. a. a., qui communiter totus lævis est, prouti *nostra* fig. 7. representatur, nisi forsitan hæ aristæ sint styliorum seu tubarum reliquæ, quæ super succofos acinos nonnunquam deprehenduntur monente **SCHMIEDELIO** l. c. p. 9., id quod etiam *Blackwelliana* fig. 4. distinctius indicare videtur. Thalamum seu receptaculum denique *Blackvv.* fig. 6. b. sistit satis crassum & conicum, *nostra* fig. 9. c. valde exiguum & intra fructum maturum dissectum fig. 8. non conspicuum; forsitan autem in baccis maioribus ulterius extenditur, ut docet figura Schmiedeliana citata, a *Blackwelliana* tamen nihilominus valde differens. Semen in singulis baccis contentum fig. 5. 10. delineat.

fen entzwey geschnittenen fig. 8. unsichtbar; vielleicht aber erstreckt sich dasselbe bey großen Beeren weiter, wie die angezogene Schmiedelische Figur beweiset, jedoch von der *Blackwellischen* sehr unterschieden ist. Der Saamen, welchen ein jedes Beerlein in sich schließt, wird fig. 5. 10. abgebildet.

DODONÆUS 741., **MATTHIOLUS** 1009. **CAMERARIUS** *Epit.* 751. beschreiben denselben weiß, u. **WEINMANN** *Phytant. tab.* 874. c. ingleichen **SCHMIEDELIUS** *lc. Plant. tab. II.* mahlen ihn also, gleichwie auch solchen unsere fig. 2. fürstellet, und er bey uns insgemein gefunden wird; **ZANNICHELLIUS** 228. nennet denselben röthlicht (*rossleggiante*), wie ihn auch die *Blackwellische* fig. 1. mahlet; **TRAGUS** 969. beschreibet denselben aus dem weißen rosenfarbig; **FUCHSIUS** 151., **CAMERARIUS** *Kräuterb.* 367. a., **TABERNÆMONTANUS** *Kräuterb.* 1297. geben vor, daß er anfänglich röthlicht seye, nachmals weiß werde. Daher haben ohne Zweifel **CÆSALPINUS** 98., **GERHARD** 1271., **PARKINSON** 1013., **J. BAUHINUS** l. c., **RAIUS** l. c. und **HALLER** l. c. diesen Unterschied der Farbe als zufällig und unbeständig, wann nicht in einem Gewächse, wenigstens in der Fortpflanzung, angesehen, indeme sie erinnern, daß er entweder weiß oder röthlicht, fleischfarbig oder aus dem weißen rosenfarbig seye; daher hat auch **LINNÆUS** H. l. c. nicht einmal unter den Varietäten diesen Unterschied gemeldet. Singegen haben denselben, als ein Kennzeichen unterschiedener Arten, angesehen **MAGNOL** H. *Reg. Monsp.* 175. *Botan. Monsp.* 226., **TOURNEFORT** l. c. **TILLI** H. *Pis.* 149. **GARIDEL** 414., **VON LINDERN** *Tournef. Alsat.* 54. *Hort. Alsat.* 94. und **SEGUIER** *pl. Veron. Vol. II.* 301. Dieser ihre Meynung bestärket **DILLENIUS** in der Anmerkung zur *Rai Syn.* l. c. mit diesen Worten: Es scheint, daß zwey Arten der gemeinen Brommbeer-Straude in den Hecken und Büschen Englands hin und wieder freywillig wachsen, indeme der einen Blümen weiß, größer und frühzeitiger sind, der andern später erscheinen, kleiner und purpurfarbig sind. In den Blättern wird kein merkwürdiger Unterschied wahrgenommen; ob in der Frucht auch ein Unterschied seye, verdient eine Untersuchung. **J. BAUHINUS** hat wirklich saure, süße, bittere und unschmackhafte bemerket. Außer diesem Unterschied hat eben dieser **BAUHINUS** und aus demselben **RAIUS** l. c. noch eines andern Meldung gethan, indeme er die Frucht von einigen Gräten rauh beschreibet, wie solche auch die *Blackwellische* fig. 3. a. a. mahlet, da sie insgemein ganz glatt ist, wie sie unsere fig. 7. fürstellet, wann nicht etwan diese Gräte nichts anders sind, als Ueberbleibsel der verdorren Styliorum oder tubarum, welche zuweilen auf den saftigen Beeren gefunden werden, wie solches **SCHMIEDELIUS** l. c. p. 9. anmerket, und auch die *Blackwellische* fig. 4. deutlicher anzuzeigen scheint. Der Thalamus oder das Receptaculum wird endlich in der *Blackwellischen* fig. 6. b. ziemlich dick und kegelförmig fürgestellet, in der unsern fig. 9. c. sehr klein und innerhalb der reifen Beeren verdeckt. Der Saamen, welchen ein jedes Beerlein in sich schließt, wird fig.

TAB. 46. Lat. Betonica, Betonica sylvestris aut vulgaris. **Germ.** Betonien, braune Betonien, Wiesen Betonien, Batenige. **Græc.** κίτρον, λυχνόρον. **Angl.** Betony, Wood Betony. **Hisp.** Bretonica. **Ital.** Betonica. **Gall.** Betoine, Betoelne. **Belg.** Betonie.

1. Octodecim digitorum mensuram altitudine exæquat: folia saturate viridia sunt, flos purpureus est.
2. Crescit in sylvis, fruticetis atque ad sepes mensæque Majo atque Junio floret.
3. Prodest capiti atque hepati, & refertur ad herbas vulnerarias. Adeo ab antiquis hæc planta æstimabatur, ut **ANTONIUS MUSA**, Augusti Imperatoris Archiater, integram tractatum de ea conscribere suscepit. Folia siccata & Tabaco permista, deinde vero per fumifugium accensa, attracto per os fumo cephalæam depellere, vertiginem curare, oculorumque affectus tollere perhibentur. Cum *Salvia sylvestri* & *Chamæpyti* mista potionem præbent utilissimam ad leniendam podagram & rheumata dolorosa. Folia adhuc viridia contusa conducunt vulneribus recentibus & fistulis extrahendis. Conserva florum atque emplastrum de Betonica in officinis prostant.

4. **NOM. GEN.** Betonica *Rai.* I. 550. *Meth.* 62. V. 1. *Syn.* 238. *Tourn.* 202. *Riv.* I. p. 10. *Heuch Ind.* 26. *Rupp.* 230. *Dill.* 126. *Boerh. I.* 154. *Vaill.* 20. *Heist.* I. 5. *Linn. G. no.* 571. *Roy.* 316. *Hall.* 645. *Kram* 49. 53. *Ludvv.* no. 203.

5. **NOM. SPEC.** Vetonica *Cord. in Diosc. IV.* c. 1. *Hist.* 164. b. Betonica *Brunf.* I. 38. *Fuchf.* 350. *Dorst.* 38. *Gerh.* 714. *Rai.* I. 550. *Riv.* I. tab. 28. *Rupp.* 230. *Dill.* 126. *Linn. H.* 310. Betonica purpurea *Trag.* 197. C. *Bauh. pin.* 235. *Tourn.* 203. *Boerh. I.* 154. *Vaill.* 20. Betonica flore purpureo *Heuch. Ind.* 26. *Kram.* 53. Betonica flore rubro *Heist.* I. 5. *Kram.* 49. Betonica vulgatio flore purpureo *Park.* 614. Betonica vulgaris *Clus. XXXIX.* Betonica vulgaris purpurea *J. Bauh. III.* 301. Betonica lacinula intermedia corollarum labii inferioris emarginata *Roy.* 316. Betonica foliis inter verticillos in vertice congestos brevissimis & integris *Hall.* 646.

Nota. Flores verticilli instar caulem dense circumdant & in summitate spicam componunt nunc laxiorem *fig. 1.*, nunc compactiorem *fig. 2.*, inter quam subinde foliola quaedam angustata absque petiolis *a. a. fig. 1. 2.* intercedunt; ipsi vero spica subicitur par foliorum paullo maiorum coniugatorum & manifeste per marginem dentatorum *fig. 1. 2. b. b.* Saepius unus vel alter florum verticillus a spica separatus reperitur similiter binis foliis coniugatis terminatus *fig. 7. c. c.*, quae folia etiam petiolis carent. In reliquo caule plerumque alia adhuc foliorum multo maiorum atque petiolis suffultorum coniugatio *fig. 1. d. d.* reperitur; plurima autem longissimis petiolis praedita *e. e.* ipsa radice proveniunt & circa caulem colliguntur: ceterum omnia petiolata folia basi subrotunda a reliquis caulinis differunt. Corollae floris magnitudine naturali *fig. 3. 4.* aucta *fig. 5.* a latere delineata, ex albo & purpureo eleganter variegata est & per microscopium praecipue considerata, tota scaturit villis tenuissimis albis; tubus *f. fig. 5. 6.* inferius angustior, superius amplior & paullulum inflexus est; fauces *g. fig. 3. 4. 5.* amplissimae sunt, quas ab antica facie magnitudine naturali *fig. 7. 8.* aucta *fig. 8.* sistit; galea *h. fig. 4. 5.* simplex est, erecta paullulum tamen reflexa, ad fauces *i. fig. 7. 8. 9. 10.* ampla & explanata, mox *k.* multo angustior & introrsum corniculi in formam convoluta atque in summitate *l.* leviter fissa vel saepe sinuata; barba *m. fig. 4. 5. 6.* horizontaliter ferme expansa & tripartita est *n. n. o. fig. 7. 8. 11. 12.*, in cuius segmento medio *m.*, reliquis latiori, ex albo ac dilute purpureo eleganter variegato & in margine undulato, plica singularis per medium elevatur ita, ut sulcus per ejus medium excurrere ad marginem sinum quasi exiguum formet. Stamina quatuor tubo adherent ita, ut duo galeae vicina *p. p. fig. 9. 10.* paullulum longiora, duo barbae proximiora *p. p. fig. 11. 12.* breviora sint, omnia autem parum extra fauces promineant *p. p. fig. 7. 8.* Stylus simplex, in vertice bifidus *fig. 13.* magnitudine naturali, *fig. 14.* aucta, quatuor insitit ovulis nudis. Calix *q. fig. 3. 4. 5. 15. 16. 17.* brevis quinque terminatur denticulis angustis, longis, rectis, mollioribus, exterius villis & ex nigro purpurascens, ex quibus duo infimi *r. fig. 16. 17.* a tribus superioribus paullulum recedunt & arctius ad se invicem accedunt, hincque calycem quasi bilabiatum formant, id quod *fig. 17.* magnitudine aucta distinctius indicat. Semina matura *fig. 18. 19.* sunt ex atro fusca & angulosa, ex quibus unum *fig. 20.* magnitudine aucta sistit. *Figurae 1. 3. 15.* ad exemplar Blackwellianum factae, *2. 4. 14. 16. 17. 19. 20.* ad naturae ductum adiectae sunt.

Ann. Die Blumen stehen dichte in einem Wirbel um den Stengel, und machen zu oberst einen Büschel, der manchmal weit-schichtiger *fig. 1.* manchmal dichter *fig. 2.* ist, zwischen welchem einige schmale Blättlein ohne Stiele *a. a. fig. 1. 2.* sich zeigen; unter dem Blumen-Büschel selbst aber stehen zwei etwas größere, und an dem Umkreis deutlich ausgezackte Blättlein *b. b. fig. 3. 4.* gegen einander. Derselbe zeigt sich ein und der andere Blumen-Wirbel vom Büschel abge-sondert und ebenfalls mit wenigen gegeneinander stehenden Blättlein un-terstützt *fig. 7. c. c.*, die auch keinen Stiel haben. In dem übrigen Sten-geln siehet insgesamt noch ein paar viel größere und mit Stielen versehene Blätter *fig. 1. d. d.*; viele aber mit gar langen Stie-len *e. e.* kommen aus der Wurzel hervor rund um den Stengel. Al-le diese Blätter mit Stielen sind mit einer Rinde bey'm Anfang von den andern unterschieden. Die Blume, welche in natürlicher Größe *fig. 3. 4.* vergrößert *fig. 5.* seitwärts abgebildet ist, ist aus weiß und purpur schön gemischt und, sonderlich durch ein Vergröß-ferungs-Glas betrachtet, ganz mit zarten weißen Härlein besetzt; die Röhre *f. fig. 5. 6.* ist unten enger, oben weiter und etwas ge-bogen; die Mündung *g. fig. 3. 4. 5.* ist weit offen, welche von der vordern Ansicht in natürlicher Größe *fig. 7.* vergrößert *fig. 8.* für-stellet; der Helm *h. fig. 4. 5.* ist einfach, steht aufrecht, doch et-was zurück gebogen, ist bey der Mündung *i. fig. 7. 8. 9. 10.* weit und ausgebreitet, bald aber *k.* viel schmälter und wie ein Hörn-lein einwärts gewickelt, zu oberst *l.* ganz leicht gespalten oder we-nigstens ausgeschweift; der Barth *m. fig. 4. 5. 6.* siehet fast ge-rade über quer ausgebreitet und ist in drey Theile getheilt *m. n. o. fig. 7. 8. 11. 12.* auf dessen mittlern Theil *m.*, der breiter als die andern, und schön aus weiß und hellpurpur gefärbet auch im Umkreis wellenartig gebogen ist, erhebet sich durch die Mitte eine besondere Falte dergestalt, daß seine durch die Mitte laufende Fur-che am Umkreis gleichsam eine kleine Ausschweifung machet. Vier Stamina hängen also an der Röhre, daß zwei davon nahe am Helm *p. p. fig. 9. 10.* etwas länger, und zwei näher am Barth *p. p. fig. 11. 12.* kürzer sind, alle aber wenig über die Mündung her-vorragen *p. p. fig. 7. 8.* Der einfache und zu oberst gespaltene Stylus in natürlicher Größe *fig. 13.* vergrößert *fig. 14.* siehet auf vier bloßen Eylein. Der calix *q. fig. 3. 4. 5. 15. 16. 17.* ist kurz und endiget sich mit fünf Spizen, die schmal, lang, gerade, weich, außen harigt und dunkel purpurfarbig sind: die zwei unterste da-von *r. fig. 16. 17.* stehen von den drey obern etwas ab und näher beysammen, machen daher gleichsam einen calycem bilabiatum, welches die vergrößerte *fig. 17.* deutlicher anzeigt. Die zeitige Saamen *fig. 18. 19.* sind schwarzbraun und eckigt: einen davon bildet *fig. 20.* vergrößert ab. *Figurae 1. 3. 15.* sind nach dem Blackwellischen Exemplar gemacht, *2. 4. 14. 16. 17. 19. 20.* nach der Natur bengezeichnet.

TAB. 47. *Lat.* Marum Syriacum, Maiorana Cretica, Marum Cretense. *Germ.* Rachen-Kraut. *Grac.* Μαρον ή υόσφιρον.

© *Angl.* Marum, Syrian Mastick, Thyme. *Ital.* Maro.

1. Haec planta, unum pedem altitudine aequat; Fo-lia sunt glauca, flos ruber.

2. Sponte crescit in Candia atque Syria; in nostris vero hortis a curiosis colitur, & mense Julio flores parit.

3. Marum refertur ad herbas caput atque nervos confortantes, & sternutatorii vicem praestat. Prae-ter hoc exiguum habet usum in medicina.

4. **NOM. GEN.** Teuerium Rai. I. 526. Linn. G. n. 558. Roy. 305. Ludw. n. 190. Marum Rai. Meth. 60. Heuch. Ind. 24. Rupp. 220. Boerh. I. 182. Heist. I. 20. Pseudo-Marum Riv. I. p. 5*. 8. Kram. 49. Chamædris Tourn. 204.

5. **NOM. SPEC.** Marum Cortusi J. B. III. 242. Rai. I. 527. Moris. III. 420. Rupp. 220. Marum Syriacum & Creticum Herm. H. Lugd. B. 409. Boerh. I. 182. Marum flore purpureo & Marum verum officinarum Heuch. Ind. 24. Marum flore rubro Heist. I. 20. Pseudo-Marum Riv. I. Tab. 13. Kram. 49. Chamædris maritima inaeana frutescens, foliis lanceolatis Tourn. 205. Teuerium foliis ovatis utrimque acutis integerrimis, flori-bus solitariis spicatum digestis Linn. H. 303. Roy 305.

Nota. Marum, Teucrium & Chamædryn solo habitu totius plantae & florum situ, non autem floris & fructus structura dif-ferre, omnes consentiunt auctores systematici. Qui habitum totius plantae inter characteres genericos admittunt, totidem genera inde constituunt, reliqua unum, distinguunt tamen Cha-mædryn & Marum a Teucrio propter calycem tubulatum, quem in hoc campanulatum appellant. *Fig. 1. Blackwelliana* sistit ha-bitum totius plantae, *Fig. 11. nostra* ramulum ejus. *Fig. 1. 8. 12.* *Blackwelliana* repraesentant florem, fructum & semina sigilla-tim, reliqua a nobis addita eadem, atque in his *fig. 2. a.* caly-cem cum flore coniunctum, *fig. 9.* eundem separatum, & *fig. 10.* a facie antica patentem quinquedidum, *fig. 11.* vero magnitudine auctam, ut eius textura pilosa nec non denticuli hinc superio-res maiores & reflexi unicum tribus inferioribus minoribus re-ctoribusque clarius appareant. *Fig. 2. b.* delineat corollam cum calyce iunctam, *fig. 3.* separatam a facie laterali & *fig. 4. a.* a facie antica, atque in his sigillatim *e. fig. 3.* tubum corollae angustum & incurvatum, *d. e. f. fig. 2. 3. 4.* limbum corollae in quin-

1. Diese Pflanze wächst einen Fuß hoch, die Blätter sind graugrün, und die Blüthe roth.

2. Man findet es wild in Candia und Syrien, bey uns aber wird es in Gärten von den Liebhabern gezogen; es blühet im July.

3. Das Marum wird unter die Haupt- und Nerven-stärkende Kräuter gezählet und zum Schnupfen gebraucht, ist aber sonst von wenigen Gebrauch in der Medicin.

4. Das Marum wird unter die Haupt- und Nerven-stärkende Kräuter gezählet und zum Schnupfen gebraucht, ist aber sonst von wenigen Gebrauch in der Medicin.

5. Das Marum wird unter die Haupt- und Nerven-stärkende Kräuter gezählet und zum Schnupfen gebraucht, ist aber sonst von wenigen Gebrauch in der Medicin.

6. Das Marum wird unter die Haupt- und Nerven-stärkende Kräuter gezählet und zum Schnupfen gebraucht, ist aber sonst von wenigen Gebrauch in der Medicin.

7. Das Marum wird unter die Haupt- und Nerven-stärkende Kräuter gezählet und zum Schnupfen gebraucht, ist aber sonst von wenigen Gebrauch in der Medicin.

8. Das Marum wird unter die Haupt- und Nerven-stärkende Kräuter gezählet und zum Schnupfen gebraucht, ist aber sonst von wenigen Gebrauch in der Medicin.

9. Das Marum wird unter die Haupt- und Nerven-stärkende Kräuter gezählet und zum Schnupfen gebraucht, ist aber sonst von wenigen Gebrauch in der Medicin.

10. Das Marum wird unter die Haupt- und Nerven-stärkende Kräuter gezählet und zum Schnupfen gebraucht, ist aber sonst von wenigen Gebrauch in der Medicin.

11. Das Marum wird unter die Haupt- und Nerven-stärkende Kräuter gezählet und zum Schnupfen gebraucht, ist aber sonst von wenigen Gebrauch in der Medicin.

12. Das Marum wird unter die Haupt- und Nerven-stärkende Kräuter gezählet und zum Schnupfen gebraucht, ist aber sonst von wenigen Gebrauch in der Medicin.

13. Das Marum wird unter die Haupt- und Nerven-stärkende Kräuter gezählet und zum Schnupfen gebraucht, ist aber sonst von wenigen Gebrauch in der Medicin.

14. Das Marum wird unter die Haupt- und Nerven-stärkende Kräuter gezählet und zum Schnupfen gebraucht, ist aber sonst von wenigen Gebrauch in der Medicin.

15. Das Marum wird unter die Haupt- und Nerven-stärkende Kräuter gezählet und zum Schnupfen gebraucht, ist aber sonst von wenigen Gebrauch in der Medicin.

16. Das Marum wird unter die Haupt- und Nerven-stärkende Kräuter gezählet und zum Schnupfen gebraucht, ist aber sonst von wenigen Gebrauch in der Medicin.

17. Das Marum wird unter die Haupt- und Nerven-stärkende Kräuter gezählet und zum Schnupfen gebraucht, ist aber sonst von wenigen Gebrauch in der Medicin.

18. Das Marum wird unter die Haupt- und Nerven-stärkende Kräuter gezählet und zum Schnupfen gebraucht, ist aber sonst von wenigen Gebrauch in der Medicin.

19. Das Marum wird unter die Haupt- und Nerven-stärkende Kräuter gezählet und zum Schnupfen gebraucht, ist aber sonst von wenigen Gebrauch in der Medicin.

20. Das Marum wird unter die Haupt- und Nerven-stärkende Kräuter gezählet und zum Schnupfen gebraucht, ist aber sonst von wenigen Gebrauch in der Medicin.

21. Das Marum wird unter die Haupt- und Nerven-stärkende Kräuter gezählet und zum Schnupfen gebraucht, ist aber sonst von wenigen Gebrauch in der Medicin.

22. Das Marum wird unter die Haupt- und Nerven-stärkende Kräuter gezählet und zum Schnupfen gebraucht, ist aber sonst von wenigen Gebrauch in der Medicin.

23. Das Marum wird unter die Haupt- und Nerven-stärkende Kräuter gezählet und zum Schnupfen gebraucht, ist aber sonst von wenigen Gebrauch in der Medicin.

24. Das Marum wird unter die Haupt- und Nerven-stärkende Kräuter gezählet und zum Schnupfen gebraucht, ist aber sonst von wenigen Gebrauch in der Medicin.

25. Das Marum wird unter die Haupt- und Nerven-stärkende Kräuter gezählet und zum Schnupfen gebraucht, ist aber sonst von wenigen Gebrauch in der Medicin.

26. Das Marum wird unter die Haupt- und Nerven-stärkende Kräuter gezählet und zum Schnupfen gebraucht, ist aber sonst von wenigen Gebrauch in der Medicin.

27. Das Marum wird unter die Haupt- und Nerven-stärkende Kräuter gezählet und zum Schnupfen gebraucht, ist aber sonst von wenigen Gebrauch in der Medicin.

28. Das Marum wird unter die Haupt- und Nerven-stärkende Kräuter gezählet und zum Schnupfen gebraucht, ist aber sonst von wenigen Gebrauch in der Medicin.

29. Das Marum wird unter die Haupt- und Nerven-stärkende Kräuter gezählet und zum Schnupfen gebraucht, ist aber sonst von wenigen Gebrauch in der Medicin.

30. Das Marum wird unter die Haupt- und Nerven-stärkende Kräuter gezählet und zum Schnupfen gebraucht, ist aber sonst von wenigen Gebrauch in der Medicin.

31. Das Marum wird unter die Haupt- und Nerven-stärkende Kräuter gezählet und zum Schnupfen gebraucht, ist aber sonst von wenigen Gebrauch in der Medicin.

32. Das Marum wird unter die Haupt- und Nerven-stärkende Kräuter gezählet und zum Schnupfen gebraucht, ist aber sonst von wenigen Gebrauch in der Medicin.

quinque partes inaequales divisum: duæ ex his acutæ *d.* sursum eriguntur, duæ aliæ obtusiores *e.* latera, & unica lata cochlearis instar excavata *f.* medium inferius occupant. LINNÆUS duas partes superiores *d.* pro labio superiori & reliquas tres *e. f.* pro labio inferiori tripartito declarat: reliqui limbum unilabiatum quinquepartitum dicunt. Pone hiatum corollæ supremum prominent stamina & stylus *g.* *fig. 2.*, illorum sunt quatuor exiguæ antheris coronata & tubi lateribus accretæ *g.* *fig. 5.*; stylus est simplex in vertice bifidus *h.* *fig. 6.*, qui infistit quatuor ovulis *i.* *fig. 6. 7.*, quæ in totidem abeunt semina *fig. 13.* ex quibus unum magnitudine auctum & pariter pilosum *fig. 14.* depingitur.

ten *h.* *fig. 6.*, sitet auf vier Eyleini. *fig. 6. 7.*, daraus eben so viele Saamen werden *fig. 13.*, davon einer vergrößert und ebenfalls ha-

licher erscheinen. *Fig. 2. b.* bildet die mit dem calyce vereinigte corollam ab, *fig. 3.* abgesondert von der Seite, *fig. 4.* von vornen, und bey dieser insbesondere *c.* *fig. 3.* die enge und krumme Röhre, *d. e. f.* *fig. 2. 3. 4.* den fünffach ungleich getheilten limbum: Zween spitzige Theile davon *d.* stehen in die Höhe, zween stumpfere *e.* zu beyden Seiten, und einer, breiter, als ein Köfflein ausgeholter *f.* in der Mitte nach unten. LINNÆUS nennet die zween obere Theile *d.* labium superius und die übrige drey *e. f.* labium inferius tripartitum: von denen übrigen wird der ganze limbus genennet unilabiatum quinquepartitum. Hinter dem obersten Spalt der corollæ ragen die stamina und der stylus *g.* *fig. 2.* hervor: jener sind vier mit gar kleinen antheris versehen und an der Röhre angewachsen *g.* *fig. 5.*; der Stylus ist einfach, zu oberst gespal-

TAB. 48. *Lat.* Becabunga. *Germ.* Wasserbungen, Bachbungen, Bachbammen. *Græc.* ἡνυδάριον. *Angl.* Brooklime, Water Pimpernel, Water-Speedwel. *Gall.* Cresson aquatique, Berle. *Belg.* Waterbongen, Be-

1. Alta est sedecim digitos, folia colore viridi splendent. Caulis e rubro viridis, flos amœne cœruleus est.

2. Reperitur ad rivos & flumina, ut & ad piscinas; floret mense Junio, & per totam hyemem folia retinet.

3. Pertinet ad aperientes atque antiscorbuticas herbas; multas partes habet volatiles, & ingreditur succos antiscorbuticos potionesque scorbutico contrarias. Purgat insimul atque detergit, obstructions renum ex fabulo vel mucidis humoribus ortas aperit: in calculo & hydropo quoque usui esse potest. MATHIOLUS molam ex utero depellere, & menses ciere tradit.

1. Es wächst 16. Zoll hoch, die Blätter sind grasgrün, die Stengel röthlich, grün, die Blüthe schön blau.

2. Diese Pflanze findet sich an Bächen und Flüssen, Bayern oder Deichen, blühet im Juny und behält seine Blätter den ganzen Winter.

3. Es gehört unter die antiscorbutischen und eröffnenden Kräuter, hat viele flüchtige Theile und ist gut im Scharbock, wie es denn ein ingrediens ist, der antiscorbutischen Säfte und der Tränke, die hierwider gebraucht werden. Es reiniget also auch und detergirt, hat seinen Nutzen in Verstopfungen der Nieren von Sand oder schleimigten Reichtheiten, ingleichen im Stein und der Wassersucht. MATHIOLUS sagt, es treibe die Gewächse aus der Mutter und befördere die monatliche Reinigung.

4. NOM. GEN. Veronica *Rai. l. 852. Meth. 83. Syn. 278. Tourn. 143. Dill. 76. Boerh. l. 224. Vaill. 202. Heist. l. 31. Linn. G. no. 20. Roy 301. Hall. 527. Kram. 48. Ludw. no. 183. Beccabunga Riv. l. p. 5^{ta}. 18. Heuch. Ind. 28. Rupp. 246.*

5. NOM. SPEC. I. Berula seu Anagallis aquatica *Tabern. ic. 719. Anagallis aquatica folio rotundiore maior l. B. III. 791. Anagallis aquatica sive Becabunga maior Park. 1237. Anagallis maior folio subrotundo C. B. pin. 252. Anagallis rectius Veronica aquatica folio rotundiore maior Rai. l. 852. Veronica aquatica maior folio subrotundo Moris. III. 323. Tourn. 145. Dill. 76. Boerh. l. 225. Veronica aquatica maior Beccabunga dicta Heist. l. 31. Veronica aquatica vulgo Becabunga maior folio subrotundo Kram. 48. Beccabunga Riv. tab. 100. fig. 1. Beccabunga officinarum Rupp. 246. Beccabunga seu Veronica aquatica maior folio subrotundo Heuch. Ind. 28.*

II. Sion *Brunf. III. 169. Fuchf. 725. Sion non odoratum Trag. 187. Hydropiper Dorst. 155. 6. Anagallis seu Becabunga Ger. 620. Anagallis aquatica Dod. 893. Thal. 14. Anagallis aquatica vulgaris sive Becabunga Park. 1236. Anagallis aquatica minor l. Tab. ic. 718. Anagallis aquatica flore cœruleo folio rotundiore minor l. B. III. 790. Anagallis aquatica minor folio subrotundo C. B. pin. 252. Anagallis rectius Veronica aquatica minor folio subrotundo Rai. l. 852. Veronica aquatica rotundifolia Becabunga dicta minor Rai. Syn. 280. Veronica aquatica minor folio subrotundo Moris. III. S. III. tab. 24. Tourn. 145. Dill. 76. Boerh. l. 225. Vaill. 202. Veronica aquatica vulgo Beccabunga minor Kram. 48. Veronica aquatica foliis ovatis ex alis racemosa Hall. 528. Veronica foliis oppositis lævibus crenatis floribus laxè spicatis ex alis Linn. H. 8. floribus laxè spicatis lateralibus Roy. 302. Beccabunga minor Riv. l. tab. 100. fig. 3. Beccabunga seu Veronica aquatica minor folio subrotundo Heuch. Ind. 28. Beccabunga minor folio subrotundo Rupp. 246.*

III. Berula maior *Tab. ic. 719. Anagallis aquatica maior Ger. 620. Anagallis aquatica folio oblongo crenato Park. 1237. Anagallis aquatica maior folio oblongo C. B. pin. 252. Anagallis aquatica flore cœruleo folio oblongo maior l. B. III. 791. Anagallis rectius Veronica aquatica maior folio oblongo Rai. l. 852. Veronica aquatica maior folio oblongo Moris. III. p. 323. Sect. III. tab. 24. Tourn. 145. Dill. 84. Boerh. l. 225. Vaill. 202. Veronica aquatica vulgo Beccabunga maior folio oblongo Kram. 48. Veronica aquatica foliis ovatis acuminatis ex alis racemosa Hall. 528. Beccabunga seu Veronica aquatica maior folio oblongo Heuch. Ind. 28. Beccabunga folio oblongo maior Rupp. 246.*

Nota. Figuræ I. Blackwellianæ competunt nomina no. I. indicata, fig. II. & III. nostræ illa no. II. & III. addita. Tres has differentes plantas pro varietatibus declarat LINNÆUS *H. Cliff. l. c.*; prima & secunda pariter varietates sunt HALLERO, sed tertiam ut distinctam speciem recenset idem, RIVINI operis prima exemplaria primæ tantum differentię iconem nomine *Beccabunga* exhibent; postea accessit altera nomine *Beccabunga minoris angustifolia*, quæ convenit cum *Veronica aquatica longifolia media* *Raj. Syn. 280. seu Anagallide aquatica minore, flore purpurascens, folio oblongo l. B. III. 791.* & est varietas tertiæ figuræ nostræ HALLERO; ultimis exemplaribus Rivinianis denique addita est tertia icon nomine *Beccabunga minoris*, quæ proxime accedit ad nostram figuram II. Prima & secunda differentia a nobis indicata varietates tantum omnino sunt & forsitan ne quidem constantes, quum in sola partium magnitudine consistant: tertia vero constanter differt non

Ann. Der Blackwellischen I. Figur werden die no. I. angezeigte Rahmen zugeeignet, der II. und III. von uns benachbarten Figur die no. II. und no. III. benachbarte Rahmen. Diese drey unterschiedene Pflanzen erkläret LINNÆUS *H. Cliff. l. c.* für varietäten; die erste und zweyte hält HALLERUS l. c. ebenfalls für varietäten, die dritte aber führet er als eine besondere Art an. Die erste Abdrucke von RIVINI Werk bilden nur die erste Art unter dem Rahmen *Beccabunga* ab; nachmals kam eine andere Figur dazu, mit dem Rahmen *Beccabunga minor angustifolia*, welche scheint zu seyn *Veronica aquatica longifolia media* *Raj. Syn. 280.* oder *Anagallis aquatica minor, flore purpurascens, folio oblongo l. B. III. 791.* und HALLERUS als eine varietät unserer dritten Figur anführet; den letzten Abdrucken des Rivinischen Werkes wurde endlich die dritte Figur mit dem Rahmen *Beccabunga minor* benachbaret, welche unserer II. Figur nahe kommt. Die erste und zweyte von uns abgebildete Arten sind

folum foliorum figura, verum etiam habitu vere erecto & elatiori. florum præterea colore multo pallidiori, proptereaque ut distincta species merito consideratur. Floris fructusque partes sigillatim depingunt figuræ Blackvvellianæ 1. 10. 11. 16. & nostræ 2. - 9. 12. - 15. 17. 18. a no. II. desumptæ. His fiuntur calyx monophyllus quadripartitus a. fig. 2. a facie antica magnitudine naturali & fig. 3. magnitudine aucta, a facie laterali fig. 5. 6. & ad fructus maturitatem persistens fig. 12. 13. Corolla a facie antica fig. 2. 3., a facie postica fig. 4. pariter quadrifida, cujus segmentum supremum b latissimum, lateralia c. c. angustiora, infimum d. angustissimum, ob quam magnitudinem inæqualem flos hic irregularibus adscribitur; corolla separata integra vereque monopetala fig. 4. cum foramine e in fundo pro styli transitu; Stamina duo f. f. fig. 3. duobus segmentis corollæ lateralibus accreta, unum ex his separatim magnitudine aucta fig. 7.; Stylus simplex & simplici capitulo coronatus, ovario insistent & ex centro floris surgens g. fig. 3., separatus in magnitudine naturali fig. 8., aucta fig. 9.; fructus bilocularis a facie laterali fig. 10. 11. 12., postica fig. 13., horizontaliter dissectus fig. 14. & magnitudine aucta fig. 15.; semina fig. 16. 17., magnitudine aucta fig. 18.

den Hauptlein versehenen Stylus, der auf dem ovario sitzt und aus dem Grund der Blume hervorkommet g. fig. 3., abgesondert in natürlicher Größe fig. 8., vergrößert fig. 9.; Die aus zwei Säcklein bestehende Frucht in der Ansicht von der Seite fig. 10. 11. 12., von hinten fig. 13., über quer entzwey geschnitten fig. 14. und vergrößert fig. 15.; Die Saamen fig. 16. 17., vergrößert fig. 18.

sind würfliche und vielleicht nicht einmal beständige Varietäten, weil der Unterschied nur alleine in der Größe der Theile besteht; die dritte aber unterscheidet sich beständig nicht nur alleine durch die Gestalt der Blätter, sondern auch durch eine würflich aufrechte und erhöhte Einrichtung der ganzen Pflanze, ja über dieses durch die viel bleichere Farbe der Blume, und wird daher billig als eine besondere Art betrachtet. Die Theile der Blume und der Frucht besonders werden durch die Blackwellische fig. 1. 10. 11. 16. und durch die unserige von no. II. genommene fig. 2. - 9. 12. - 15. 17. 18. abgebildet. Durch diese wird fargestellt der einfache und viermal getheilte calyx von der vordern Ansicht in natürlicher Größe a. fig. 2., und vergrößert fig. 3., von der Seite fig. 5. 6. und wie er bis zur zeitigen Frucht verbleibet fig. 12. 13.; Die Corolla von der vordern Ansicht fig. 2. 3., von der hintern fig. 4. ebenfalls viermal getheilt, dessen oberster Theil b. der breiteste ist, die beyde zur Seiten c. c. schmähler sind, und das unterste d. am schäblichsten ist, wegen welcher ungleichen Größe diese Blume unter die irregulären gerechnet wird; Die corolla abgesondert, ganz und würflich einfach fig. 4. mit dem Loch im Grund e., durch welches der Stylus gehet; Die zwey Stamina f. f. fig. 3., welche an den beyden Seiten Theilen der corollæ angewachsen sind; eines davon abgesondert und vergrößert fig. 7.; der einfache und zu oberst mit einem einfachen

TAB. 49. Lat. Spinachia. Germ. Spinat, Spinetsch, grünes Kraut. Græc. Σπανάκια, σπανάκιον. Angl. Spinach, Spinache, Spinage, Spinge. Hisp. Spanache, Espinaca. Ital. Spinacci, Spinace. Gall. Espinaches, Epinars. Belg. Spinagie.

1. Hæc planta duos fere pedes alta fit, folia virentem gramineam ostendunt, flores autem ex diluta flavedine & viredine pallent.

2. Seritur quotannis in hortis, & pro ratione temporis, quo seritur, vel citius, vel tardius floret.

3. Spinachia magis ad cibum, præcipue verno tempore, quam ad medicamenta ex ea præparanda adhibetur: cocta siquidem optime sapit, & virtute refrigerandi, humectandi, urinam alvumque promovendi, hincque calorem atque acredinem humorum mitigandi pollet. SERAPIO, Medicus Arabs, asserit, Spinachiam excitare flatum, a cujus usu propterea illos, qui colico morbo laborant, merito abstinere oporteat.

4. NOM. GEN. Spinachia Raj. I. 162. Meth. 19. no. 4. Heuch. ind. 54. Heist. II. 27. Kram. 20. 86. 87. Spinacia Tourn. 533. Rupp. 326. Boerh. II. 103. Linn. Gen. no. 900. Roy. 221. Ludvv. no. 929.

5. NOM. SPEC. I. Olus hispanicum Trag. 325. Lapathum hortense seu Spinacia femine spinoso C. B. pin. 114. Spanachia Fuchs. 668. Spinachium Cam. Epit. 248. Spinachia Dod. 619. Tab. ic. 425. Gerh. 330. Park. 751. Raj. I. 162. Spinachia mas Lugd. 543. J. B. II. 963. Spinacia Matth. 464. Lob. ic. 257. Spinacia vulgaris capsula seminis aculeata Tourn. 533. Rupp. 326. Boerh. II. 103. Heist. II. 27. Kram. 20. Spinacia femina Linn. H. 457. Roy. 221.

II. Lapathum hortense seu Spinacia femine non spinoso C. B. pin. 115. Spinachia nobilis & I. Trag. 324. Spinachia sylvestris Gerh. 330. Spinachia femine non pungente, folio majore rotundiore J. B. II. 964. Raj. I. 162. Spinacia vulgaris capsula seminis non aculeata Tourn. 533. Rupp. 326. Boerh. II. 104. Heist. II. 27. Kram. 20.

III. Lapathum hortense seu Spinacia sterilis C. B. pin. 115. Spinachia III. Trag. 326. Spinachia femina Lugd. 545. Camer. Hort. 164. Spinacia mas Linn. H. 457. Roy. 221.

Nota. Fig. I. est Blackvvelliana & videtur Spinacia mas seu sterilis no. III.: nam fig. 6., qua semen indicatur, imperfecta est & neque læve neque spinosum satis repræsentat. Reliquæ figuræ a nobis additæ depingunt Spinaciam femine lævi no. II. Num varietates constantes sint, i. e., illa femine spinoso nunquam in illam femine lævi & vice versa transmutetur, ex aliis iam quæsit RAIUS I. c., sed nullus, quantum scimus, responsum dedit. Num præterea plantæ, in quibus totis flores masculini & feminini communiter a se invicem distant, habitu externo, vel saltem florum situ, constanter quoque differant, eodem premittitur dubio. J. BAVHINVS Spinachiam femine non pungente duas sinit figuras, quarum una flores in alis foliorum conglomeratos, altera eosdem per ramulos dispersos repræsentat; an vero hæc flores masculinos i. e. steriles, illa femininos seu seminiferos indicet, neque ex figuris neque ex descriptione certo colligi potest. Notum præterea est, RVD. JAC. CAMERARIUM Eph. N. C. Dec. III. A. V. et VI. Obs. CCXI. p. 484. repetito examine, quamvis rarius, in una eademque planta & masculinos & femininos flores reperisse, eosque ne quidem a se invicem seiunctos, sed inter se in eodem ramulo florifero mistos. Ita sane etiam apparet nostra figura II.; ut autem verum fatear, tunc temporis, quum pingere, impeditus fui, ipsius plantæ vivæ examen suscipere, pictor vero nonnullum satis instructus erat, ut utrosque flores

1. Es wächst bis 2. Fuß hoch, die Blätter sind grasgrün, die Blüthen lichtgelblich grün.

2. Man siehet es jährlich in Gärten, und es blühet nach Verschiedenheit der Monathe, worinnen es gesät worden.

3. Der Spinat wird mehr zum Essen als zur Arzeney gebraucht, giebet ein sehr gut gekochtes Gemüß, und wird also viel im Frühling gebraucht, es temperiret die Hitze und Schärffe der Feuchtigkeiten, indem es kühet, anfeuchtet und den Urin treibet, auch den Leib offen hält. SERAPIO, ein Arabischer Medicus, sagt, der Spinat mache Blähungen, und solten ihn also diejenige zu essen unterlassen, welche mit der Colic geplagt sind.

Anm. Fig. I. ist die Blackwellische, und scheint die männliche oder unfruchtbare Art no. III. zu seyn: dann fig. 6., mit welcher der Saame angezeigt wird, ist unvollkommen, und stellet weder den stachelichten noch den glatten deutlich für. Die übrige Figuren sind von uns beigesetzt, und zeigen die Art mit dem glatten Saamen. Ob die varietäten beständig seyn, das ist, ob aus der Art mit dem stachelichten Saamen niemals die andere mit dem glatten hervorstachse, oder auch im Gegentheil veränderlich seyn, hat RAIUS schon von andern zu wissen verlangt; es ist aber, so viel uns bekannt, solches bis gegenwärtig noch nicht angezeigt worden. Ob auch über dieses die Pflanzen, an welchen die männliche und weibliche Blumen insgemein gänzlich voneinander abgesondert sind, auch in der äußerlichen Gestalt, oder doch wenigstens in der Lage der Blumen beständig sich unterscheiden, steht auch noch im Zweifel. JO. BAVHINVS hat zwei Figuren von der Spinachia femine non pungente, davon die Blumen bey der einen bey dem Ursprung der Blätter dichte beisammen sitzen, bey der andern an besondern Stielen angestrenget sind: Ob aber diese die männlichen oder unfruchtbaren, jene die weiblichen oder fruchtbaren Blumen anzeigen, kan weder aus den Figuren noch aus der Beschreibung deutlich abgenommen werden. Es ist über dieses bekannt, daß RVD. JAC. CAMERARIUS Eph. N. C. Dec. III. A. V. & VI. Obs. CCXI. p. 484. mehr als einmal, doch nicht oft, so wohl männliche als weibliche Blumen an einer Pflanze gefunden, und

weisen aber die dritte mittlere kaum hervorragt, welches in natürlicher Größe fig. 15. und vergrößert fig. 16. ist unterschieden.

und war nicht abgesondert, sondern an einem Stiel untereinander vermischt. So scheint auch unsere fig. 11. beschaffen zu seyn; die Wahrheit zu gesehen, wurde ich damals, als die Pflanze gemacht wurde, verhindert, solche selbst zu untersuchen, der Mahler war aber noch nicht genugsam geübet, daß er beyderley Blumen deutlicher unterschieden hätte, gleichwie er solches nachmals bey fig. III. gethan, welche aber nur weibliche Blumen hatte, beym Ursprung der Blätter dichte besammen, davon eine einzeln abgebildet ist, in natürlicher Größe fig. 4., vergrößert fig. 5. und zugleich der auf dem Saamen sitzende vierfach zertheilte calyx a. dessen 2. grössere und 2. kleinere Theile Kreuzweis stehen, aus dessen Mitte fünf Styli b. hervor kommen. Fig. IV. ist ein Ast des Männleins mit Blumen oder vielmehr derselben annoch geschlossen und an dem Stiel ausgestreuten Knöpfen, welche aber wiederum nicht deutlich genug angezeigt sind. Der zeitige Saame wird fürgestellt in natürlicher Größe fig. 7. 8., vergrößert fig. 9. und von seiner Hülse entblößet in natürlicher Größe fig. 13., vergrößert fig. 14. Damit aber der Unterscheid des flachlichten Saamens auch angezeigt werde, haben wir fig. 10. 11. 12. beygefüget, dabey dieser Unterschied noch zu finden, daß er öfters 2. Spitzen hat fig. 11. in natürlicher Größe fig. 10. und vergrößert fig. 12. anzeigt; dessen bloßer von dem andern mit der glatten Hülse fig. 13. 14. kaum merklich

TAB. 50. *Lat.* *Dipsacus sylvestris*, *Labrum veneris*. *Germ.* *Wilbe Karten Distel*, *Weber Kanten*. *Græc.* *Διψακος*.
 ♂†. *Angl.* *Wild Teasel*. *Hisp.* *Cardencha*, *Cardo penteador*. *Ital.* *Cardo da Panni*, *Dissaco*. *Gall.* *Cardon*,
Carder, *Chardon à Bonnetier*. *Belg.* *Groote vvilde Karden*.

1. Diese Distel steigt 4. bis 5. Fuß hoch, die Blätter sind lichtgrasgrün, die Blume purpurfärbig.

2. Sie wächst an denen Ufern der Felder, und blühet im Juny und July.

3. Die Wurzel hält man für reinigend; die Alten recommendiren ein Decoctum davon mit Wein bis zu einiger Dichte eingesotten, und in einem messingen Geschirr aufgehoben, zu denen Rhagadibus oder der aufgesprungenen Haut an denen Posterioribus, wie auch zur Fistel derselben, ingleichen die Warzen zu vertreiben. Das Wasser so man auf den Höhlen der Blätter derselben findet, soll so wohl als ein Augen, Wasser die entzündete Augen kühlen, als auch das Gesicht durch das Abwaschen schön machen.

5. NOM. SPEC. Carduus fullonum *Brunf.* III. 32. *Dorft.* 67. Carduus fullonum erraticus *Trag.* 848. Labrum Veneris *Lob. ic. II.* 18. Labrum Veneris alterum *Matth.* 662. *Camer. Ep.* 432. Dipfacus purpureus *Fuchs.* 225. Dipfacus sylvestris *Cord. Hist. I. c.* 59. *Dod.* 735 *Ger.* 1167. *Park.* 984. Dipfacus sylvestris seu Labrum Veneris *J. B. III. P. I.* 74. *Raii l.* 382. Dipfacus sylvestris aut Virga pastoris maior *C. B. pin.* 385. *Morif. II.* 158. *Tourn.* 466. *Rupp.* 217. *Dill.* 123. *Boerh. I.* 133. *Vaill.* 47. Dipfacus sylvestris, aliis Virga pastoris, item Labrum Veneris *Heuch. Ind.* 50. Dipfacus sylvestris folio non laciniato *Kram.* 75. Dipfacus vulgaris *Heist. I.* 11. Dipfacus capitulis florum conicis *Linn. H.* 29. *Roy.* 188. Dipfacus capitulis ovalibus, calycis foliis fulcatis, dentatis, aristis glumarum rectis *Hall.* 673.

6. *Nota.* *Figura* Blakvelliana folium retinuum capitulum flo-
riferum fig. 1. cum flosculo 1. & femine 8.; reliquis figuras ac-
curatius delineari curavimus. Sistuntur his 1) peculiariora folia,
longa, angusta, crassa, rigida, spinosa, sursum sapius flexa & re-
flexa, quorum aliquot variae magnitudinis capituli florigeri
basin circumdant *a. d. fig. 1. II.*; 2) foliola calycis communis,
floris tempore tenuia & membranacea, rigida tamen, hispida
& brevi arista munita *b. fig. 2.* in magnitudine naturali, *fig. 3.*
aucta, quæ persistunt & in maturante semine arida atque paleacea
sunt singulaque bina cavitatem formant, quæ primo floscu-
lum, deinde semen includit *fig. 7.*; 3) unum ex his foliolis se-
paratum a facie superiori excavata *fig. 7. b.*, inferiori angulosa
fig. 7. c. b.; 4) Flosculus separatus, calycis foliolo brevior, in mag-
nitudine naturali *fig. 2.*, aucta *fig. 3.*; 5) corolla inferius alba
superius ex coeruleo purpurascens monopetala, tubulosa, recta
aut parum inflexa, integra *fig. 4.*, dissecta & explanata a facie
interiori *fig. 5.* utraque in magnitudine aucta; 6) corollæ lim-
bus rectus quater sed in æqualiter incisus ita, ut inferius seg-
mentum reliquis longius & latius sit *c. d. fig. 3. 4. 5.*; 7) quatuor
stamina multum prominentia, apicibus transversalibus primum
flavis deinde purpurascensibus instructa *c. fig. 2. 3. 4.*, extubi me-
dio orientia *fig. 5.*; 8) stylus simplex, filiformis, eisdem cum
corolla longitudinis cum simplici stigmate *fig. 6.* in magnitudine
aucta; 9) ovulum *f. fig. 2. 3.* ejusque vertex membranaceus *g.*,
qui calycis proprii vices præstat. 10) Semen maturum ad sin-
gulos flosculos unicum, oblongum, angulosum cum calyce
proprio iam arido *fig. 9.* in magnitudine naturali, *fig. 10.* aucta;

Anm. Von der Blackwellischen Figur ist alleine der Blumen Büschel fig. 1. nebst einem Blümlein fig. 1. und Saamen fig. 8. beybehalten, die übrigen sind deutlicher von uns abgebildet worden. Damit werden fürgestellt 1) besondere, lange, schmahle, dicke, steife und stachlichte, öfters nach oben gerichtete und zuruck gebogene Blätlein, deren etliche von unterschiedlicher Gröſſe den Grund des Blumen-Büschels umgeben a. 2. fig. 1 II. 3) Die Blätlein des allgemeinen calycis, welche zur Zeit der Blüthe dünn und häutig, doch steif, haarigt und mit einer Spitze oder kurzen Barth versehen sind b. fig. 2. in der natürlichen Gröſſe, fig. 3. vergrößert, welche beständig bleiben, und, indeme der Saame zeitiget, drocken und Sprenenförmig werden, auch jedesmal zwey derselben eine Höhle machen, in welcher erstlich das Blümlein und hernach der Saame enthalten fig. 7. 3) eines von diesen Blätlein abgesondert, von der obern ausgeholten Fläche fig. 7. b. und von der untern eckigten fig. 7*. b.; 4) ein abgesondertes Blümlein, das kürzer als das Blätlein ist, in der natürlichen Gröſſe fig. 2., vergrößert fig. 3.; 5) Die unten weisse und oben aus dem blauen purpursfarbige corolla, welche aus einem Stuck bestehet, röhrenförmig, gerad oder nur ein wenig gebogen ist, ganz fig. 4., aufgeschnitten und ausgebreitet von der innern Fläche fig. 5. und beyde vergrößert; 6) dessen obere Oeffnung, die gerade, andern viermal aber ungleich eingeschnitten ist, also, daß der unterste Theil länger und breiter ist als die übrigen c. d. fig. 2. 3. 4.; 7) Vier weit hervorragende Stamina mit ihren über querstehenden anacibus, die Anfangs gelb sind, nachmals purpursfarbig werden e. fig. 2 3. 4. und aus der Mitte der Röhre entspringen fig. 5.; 8) Der Stylus, welcher einfach, faden-

11) basis calycis communis, seu thalamus conicus, fungosus *h.* fig. 7., cum quo undique ordine singulari coherent foliola calycis communis & semina; 12) folii inferioris dimidii facies superior *i.*, inferior *k.*

fig. 9. in natürlicher Grösse, fig. 10. vergrößert; 11) Der Grund des calycis proprii oder der thalamus, der kögelförmig und schwammig ist *h.* fig. 7. und mit welchen allenthalben in einer besondern Ordnung die Blättlein des calycis communis und die Saamen zusammen hängen; 12) eines untern Blattes Hälfte obere Fläche *i.*, untere Fläche *k.*

förmig, eben so lang als die Röhre und mit einem einfachen stigmate versehen ist fig. 6. vergrößert; 9) Das Enlein *f.* fig. 2. 3. und dessen häutiger Scheitel *g.*, welcher die Stelle eines calycis proprii vertritt; 10) Der zeitige Saame, der unter einem jeden Blättlein einfach, länglicht und eckigt ist mit dem verdorrten calyce proprio

TAB. 51. *Lat.* Chelidonium minus. *Germ.* Klein Schöllkraut, Feigwarzenkraut, Scharbockskraut, Platskerkraut, Pfaffenöblein, Bieherhöblein. *Grac.* χαλιδώνιον μικρόν. *Angl.* Pilewort, lesser or smal Celandine. *Hisp.* Scrofolaria menor. *Ital.* Favoscello, Celidonia minore. *Gall.* Petite chelidoine, Petite Eclair ou Eschlere, Cavilos des prêtres. *Belg.* Kleyn Speen kruid.

1. Caulis ad sex vel octo digitos extenditur: Folia fatura viriditate, flores lucida flavedine tincta sunt, radix ad mariscarum similitudinem accedere perhibetur.

2. Reperitur in pratis atque locis humidis, ut & in sepibus, ac mense Martio & Aprili florere conspicitur.

3. Radix interne sumta, cum unguento e foliis & radice præparato atque externe applicato, doloribus actumoribus hæmorrhoidum & mariscarum resistere, sanguinisque earum fluxum inhibere statuitur. Quidam contra icterum atque scorbutum oris, ad palatum roborandum & dentes conservandos commendant.

1. Der Stengel wird 6. oder 8. Zoll hoch. Die Blätter sind dunkelgrün, die Blumen schön hellgelb. Die Wurzel soll denen Feigwarzen an denen Menschen gleich sehen.

2. Man findet es auf Wiesen in feuchten Gründen und an Hecken, es blühet im März und April.

3. Dieses Kraut wird in der goldenen Ader und Feigwarzen gerühmet, es soll den Schmerzen und das Schwel len derselben mindern, und das Bluthen stillen, wenn man die Wurzel innerlich nimmt, eine Salbe aber von den Blättern und Wurzel gemacht äußerlich auflegt. Einige recommendiren es in der Gelbsucht, und dem Scharbock, besonders des Mundes, um den Gaumen zu stärken und die Zähne zu verwahren.

4. *NOM. GEN.* Chelidonium minus *Rai. I. 579. Meth. 68. Syn. 246. Boerh. I. 29. Ficaria Heuch. Jnd. 21. Rupp. 159. Dill. cat. 39. N. G. 108. Heist. I. 12. Hall. 321. Kram. 44. Ludw. no. 755. Marisca Siegesb. Ranunculus Tourn. 285. Vaill. 170. Act. Paris. 1719. 39. Linn. G. no. 554. Roy. 490.*

5. *NOM. SPEC.* Ficaria *Brunf. I. 215. Volck. Fl. Nor. 163. Dill. 39. Hall. 321. Kram. 44. Ficaria Brunfelsii vulgo chelidonium minus Heist. I. 12. Ficaria flore luteo, male chelidonium minus Heuch. Jnd. 21. Ficaria vulgaris Rupp. 159. Vulgago Dorst. 303. b. Favogello *Cesalp. 546. Scrophularia minor seu chelidonium minus vulgo dictum F. B. III. 468. Chelidonia rotundifolia minor C. B. pin. 309. Chelidonium minus Ruell. 431. Fuchs. 866. Trag. 113. Cord. Hist. 121. b. Matth. 631. Cam. Ep. 403. Dod. 49. Lob. ic. 593. Ger. 816. Park. 617. Raj. I. 579. Syn. 246. H. Eyslett. Vern. O. IX. T. I. fig. 2. Boerh. I. 29. Ranunculus præcox rotundifolius granulata radice Moris. II. 446. Ranunculus vernus rotundifolius minor Tourn. 286. Vaill. 170. Act. Paris. 1719. 40. Ranunculus foliis cordatis dentatis petiolatis Linn. H. 229. Roy. 490.**

6. *Nota.* Fig. I. est Blackwelliana, II. & reliquæ additæ sunt. Communiter hæc planta deprehenditur humifusa fig. I., cum qua aliorum auctorum icones etiam conveniunt; interdum tamen reperitur etiam erecta, præcipue tempestate calidiori in locis humidis & umbrosis, qualis est nostra fig. II. & illa CAMER. Epit. I. c. Figura I. foliorum pediculis amplas appingit vaginas *a. a. a.*, quas nos haud observavimus; nostra vero fig. II. *b. b. b.* ad ortum horum pediculorum repræsentat grana illa triticea seu bulbos, quorum iam mentionem fecit RAIUS *Hist. & Syn. I. c.* ut & DILLENIIUS *N. G. I. c.*, quæque veræ sunt radices. Flos octo constat petalis fig. 2. 3. 4.; novem sistit fig. 1., ex naturæ forsan luxuria sæpius consueta. Calyx *c. c.* & in Blackwelliana fig. 3. & in nostra fig. 4. conspicitur tetraphyllus, quem alii triphyllum ut ordinarius describunt & pingunt. Petalum separatim a facie superiori seu interiori in magnitudine naturali ostendit fig. 5., aucta fig. 6., cum squamula ejus ad unguem *d.*, quam LINNÆUS nectarium appellat. Staminum & pistillorum acervus conspicitur fig. 7., stamen separatim in magnitudine naturali fig. 8., aucta fig. 9., pistillorum vero & ovulorum glomus, demtis staminibus, in magnitudine naturali fig. 10., aucta fig. 11. Radicum fibrosarum & tuberifarum compagem repræsentat fig. 12. 13. & unam earum transversim sectam fig. 14.

Ann. Fig. I. ist die Blackwellische, Fig. II. nebst den übrigen ist hinzugethan. Insgemein liegt dieses Gewächs auf der Erde fig. I., mit welcher auch die Abbildungen anderer Auctorum übereinkommen; Zuweilen wird sie aber auch aufrecht gefunden, vornehmlich bei warmer Witterung an feuchten und schattigten Orten, dergleichen unsere fig. II. und des CAMERARII Epit. I. c. zeigt. Fig. I. mahlet die Stiele der Blätter mit breiten Scheiden *a. a. a.*, welche wir nicht gefunden haben; unsere Fig. II. *b. b. b.* aber stellet beyhm Ursprung dieser Stiele diejenige weichenförmige Knoten für, deren schon RAIUS *Hist. & Syn. I. c.* wie auch DILLENIIUS *N. G. I. c.* gedenket, und welche wahre Wurzeln sind. Die Blume bestehet aus acht Blättlein fig. 2. 3. 4.; neune derselben zeigt fig. 1., vielleicht aus einer öfters dabey gewöhnlichen Frechheit der Natur. Der calyx *c. c.* erscheint so wohl in der Blackwellischen fig. 3. als auch unserer fig. 4. mit vier Blättlein, welchen andere als ordentlich dreyblättrig beschreiben und abbilden. Ein abgesondertes Petalum zeigt sich von der obern oder inneren Fläche in natürlicher Gröse fig. 5., vergrößert fig. 6., nebst dessen kleiner Schuppe am Ursprung *d.*, welche LINNÆUS das Nectarium nennet. Der Hauffen der staminum und pistillorum erscheint fig. 7., ein abgesondertes stamen in natürlicher Gröse fig. 8., vergrößert fig. 9., der Hauffen der pistillorum und ovulorum aber in natürlicher Gröse fig. 10., vergrößert fig. 11. Die Vereinigung der zaserigten und knotigten Wurzeln wird fürgesetzt fig. 12. 13. und eine von diesen über quer zerschnitten fig. 14.

TAB. 52. *Lat.* Primula veris. *Germ.* Wilde Schlüsselblumen mit einzeln Blumen. *Grac.* φλβις βαρυς φάνιος. *Angl.* Common Primrose, Field Primrose. *Ital.* Fiore di Primavera. *Gall.* Primivere, Bouillon. *Belg.* Groote vville Sleudel Bloem.

1. Caulem octo vel decem digiti metiuntur. Folia colore herbeo, flores subflavo, radix e rubro purpureo prædita sunt.

2. Crescit in virgultis & sepibus, flores Martio & Aprili mensibus prodeunt.

3. Flores in morbis ab humoribus phlegmaticis provenientius commendantur. Succus radicis errhinum est seu sternutamentum prolicit & pituitam capitis extrahit.

1. Die Stengel wachsen 8. bis 10. Zoll hoch, die Blätter sind grasgrün, die Blumen bleichgelb, die Wurzel rötlich purpurfarb.

2. Sie wachsen im Gebüsch und Hecken, blühen im März und April.

3. Die Blumen werden gerühmet in Zufällen, welche von phlegmatischen Feuchtigkeiten herkommen. Der Saft von der Wurzel ist ein Niesen befördrendes Mittel, wodurch dicker Schleim aus den Kopfe gezogen wird.

4. NOM. GEN. Paralyfis five Primula veris Rai. *Meth.* 83. Primula veris Rai. II. 1080. *Syn.* 284. *Tourn.* 124. Boerh. I. 198. Vaill. 164. Primula Heuch. *Ind.* 3. *Linn. G.* no. 144. *Roy.* 414. *Hall.* 482. *Kram.* 7. *Luduv.* no. 50.
5. NOM. SPEC. Alisma sylvarum Col. *φύλλ.* 19. Verbasculum sylvarum maius singulari flore C. B. *pin.* 241. Verbasculum sylvestre maius singularibus floribus singularibus cauliculis insistentibus Moris. II. 555. Arthritica pallida, quæ singulis pediculis singulos flores sustinet Gesn. *Tab. coll.* 60. Herba paralyfis prior Casalp. 261. Primula veris minor Dod. 147. *Ger.* 781. Primula veris sylvestris flore pallido H. Eyst. *Vern. O. I. fol.* 1. *fig.* 5. Primula veris vulgaris Park. 535. *Raj.* II. 1080. *Syn.* 284. Primula veris pallido flore humilis Clus. *hist.* 302. Boerh. I. 198. Vaill. 164. Primula veris floribus, ex singularibus pediculis, pallidis majoribus simplicibus. I. B. III. 497. *Tourn.* 125. Primula sylvarum Lob. *ic.* 568. Primula sylvestris II. *Tabern.* *ic.* 310. Primula monantha *Kram.* 7. Primula foliis rugosis hirsutis, scapo unifloro *Hall.* 482.

TAB. 53. *Lat.* Satyrium mas, Orchis mas, Testiculus morionis. *Germ.* Knaben-Kraut, Stendelwur, Männlein. *Græc.* ὄρχις Theophr. Σάτυριον τριφύλλον Diosc. *Angl.* Male Satyrion, Male Foolsstones. *Hisp.* Coyon de Perro. *Ital.* Testicolo di cane. *Gall.* Couillon de chien mâle. *Belg.* Kulletjes Kruyt.

1. Hæc Orchis, quæ vulgare officinarum Satyrium est, ad pedem assurgit: Folia lucide virent, intermixtis simul maculis nigris; flores autem petiolo subfusco adherentes purpurei coloris sunt.

2. Reperitur in pratis humidis, vbi Mense Aprili atque Majo floret.

3. Radici vim stimulandi ad coitum, genitalia confortandi & conceptionem promovendi dicunt inesse, unde præcipuum Electuarii Diasatyrionis ingrediens est. Extrinsece ad discutiendos tumores cataplasmatibus forma adhibetur. Hanc radicem coctam & a masculis comestam efficere ut pueros gignant, radicem vero Satyrionis feminæ a mulieribus sumtam, ut puellas concipiant, Dioscorides affirmat.

1. Diese Orchis, welche das gemeine Satyrium der Apotheken ist, wächst bis einen Fuß hoch, die Blätter sind hellgrün, mit schwarzen Flecken, und die Blumen, welche an einem bräunlichten Stiel stehen, sind purpurroth.

2. Man findet es in feuchten Wiesen, es blüht im April und May.

3. Die Wurzel soll zu den Verschlag reizen, die Zeugungs-Theile stärken und die Empfängnis befördern, daher sind sie das Haupt Ingrediens der Latwerge Diasatyrionis. Aeußerlich werden sie zu Ueberschlägen angewendet, harte Geschwülsten zu zertheilen. Dioscorides sagt: die Wurzel dieser Pflanze, wenn sie abgessotten und von Manns-Personen geessen wird, verursacht, daß sie Knäblein zeugen, die Wurzel hingegen von dem satyrione femina, wenn solche die Weiber genießen, mache daß sie Mägglein concipiren.

4. NOM. GEN. Orchis *Raj.* II. 1212. *Meth.* 121. *Syn.* 376. *Tourn.* 431. Heuch. *Ind.* 43. *Rupp.* 297. *Dill.* 52. Boerh. II. 151. Vaill. 150. *Linn. G.* no. 823. *Roy.* 14. *Hall.* Ord. I. 262. *Kram.* 68. *Luduv.* no. 698.

5. NOM. SPECIF. Testiculus morionis mas Dod. 236. Cynorchis morio mas *Tab.* *ic.* 660. *Ger.* 208. Orchis mas angustifolia Fuchs. 555. Orchis major tota purpurea maculoso folio *J. B.* II. 763. Orchis morio mas foliis maculatis C. B. *pin.* 81. *Park.* 1346. *Raj.* II. 1214. *Syn.* 376. *Tourn.* 432. *Rupp.* 297. *Dill.* 52. Boerh. II. 152. Vaill. 150. *Tab.* 31. *fig.* 11. 12. Orchis radicibus subrotundis, cucullo sparso, labello ampliter trifido crenato, flore concolore *Hall.* 265.

TAB. 54. *Lat.* Malva hortensis. *Germ.* Garten-Pappeln, Herbst-Rosen, Stock-Rosen, Mund-Rosen. *Græc.* ἀνδρομαλάχη Camer. *Angl.* Hollyhocks. *Hisp.* Malvas. *Ital.* Malva maggiore. *Gall.* Mauve de Jardin, Mauve Romaine arborée, Rose d'outre mer ou de tremier. *Belg.* Maluvve, Stock Roosen.

1. Altitudo hujus plantæ sex vel septem pedum est, folia dilucide viridia, flores rubri sunt.

2. Crescit in hortis, mense Julio atque Augusto flores proferens.

3. Ejusdem fere naturæ est cum Malva vulgari, quam *Tab.* 22. descripsimus, minore tamen emolliendi virtute pollet. Adhibetur ut plurimum in gargarismis contra tonsillarum tumorem & uvulæ relaxationem.

1. Dieses Gewächs steigt 6. oder 7. Fuß hoch, die Blätter sind lichtgrün, die Blumen bleichroth.

2. Es wächst in denen Gärten, und blüht im Juli und August.

3. Diese Pappel ist meist von eben der Natur, wie die gemeine vid. *Tab.* 22. Doch erweicht sie nicht so sehr; man bedienet sich ihrer meistens in Gurgel-Wässern zu den geschwellenen Mandeln, und dem gefallenem oder relaxirten Zäpflein des Halses.

4. NOM. GEN. Malva *Raj.* I. 600. *Kram.* 14. Alcea *Tourn.* 97. Boerh. I. 270. *Linn. G.* no. 679. *Roy.* 357. *Kram.* 12. *Luduv.* no. 145.

5. NOM. SPECIF. Malva rosea folio ficus C. B. *pin.* 315. *Raj.* I. 600. Malva rosea simplex peregrina *Tab.* *ic.* 767. *Ger.* 928. Malva rosea peregrina folio ficus obscure viridi Moris. II. 524. an Malva rosea folio ficus major, *Kram.* 14. Alcea rosea hortensis maxima folio ficus *Tourn.* 98. Boerh. I. 270. Alcea foliis palmato digitatis *Linn. H.* 348. *Roy.* 357. an Alcea folio in summo caule fici viridi molli flore purpureo *Kram.* 12.

Nota. *Fig.* 1. 2. 7. ad exemplar Blakvellianum factæ, reliquæ a nobis additæ sunt. Figuram Blakvellianam pro Malva rosea folio ficus C. B. ut habeamus, suadent folia ejus profunde incisa; in altera certe, folio subrotundo C. B., ea nunquam talia observavimus nec ab alio depicta reperimus; nihilominus tamen neque cum foliis ficus, neque cum figuris auctorum citatorum magis conveniunt. Si ergo illius speciei folio subrotundo varietas rectius censenda esset, tunc secundum TOURNEFORTIUM ad malvæ genus pertineret, secundum LINNÆUM vero, VAN ROYEN atque LUDWIGIUM nihilominus alceis adscripta maneret, utpote qui characterem non ex foliorum, sed calycis differentia petierunt. Est autem calyx duplex *fig.* 3. 4.: externus a. a. brevior semisextidus, interior b. b. longior semiquinquidus, uterque ad fructus usque maturitatem persistens, quem interior post floris lapsum se contrahens obtegit *fig.* 4. b. b. Fructus c. c. *fig.* 5. 6. consistit ex multis seminibus in orbem dispositis & ad latera ar-

Ann. *Fig.* 1. 2. 7. sind nach dem Blakwellischen Exemplar nachgemacht, die übrige von uns hinzugehan. Daß wir die Blakwellische Figur für die malva rosea folio ficus angeben, ist wegen der tief eingeschnittenen Blätter geschehen: an der malva rosea folio subrotundo C. B. haben wir sie wenigstens niemals, noch auch von jemand also abgebildet gefunden; nichts destoweniger aber kommen sie auch weder mit einem Zeigenblat noch auch mit den Figuren der angezeigten Auctorum überein. Wann diese Figur demnach eine varietät der andern Art folio subrotundo seyn sollte, so würde sie nach dem TOURNEFORT unter das Geschlecht der Malva gehören, nach dem LINNÆO, VAN ROYEN und LUDWIGIO aber nichts destoweniger unter dem Geschlecht der Alcea verbleiben, als welche den Characterem nicht von dem Unterscheid der Blätter, sondern des calycis, genommen haben. Es ist aber der calyx doppelt *fig.* 3. 4.: der auswändige a. a. kürzer und auf die Hefte in 6. Theile, der inwendige länger und in 5. Theile gespalten: beyde bleiben bis zur Reifung der Frucht, welche

Et inter se coherentibus, attamen non coalitis, ad centrum vero fig. 6. placenta seu receptaculo brevi accretis. Ipsa semina sunt reniformia & singula peculiari involucrio cum semine deciduo inclusa fig. 7. 8. & ab hoc denudata fig. 9. multo minora.

von dem innwendigen, der sich nachdeme die Blume abgefallen zusammen zieht, bedeckt wird fig. 4. b. b. Die Frucht c. c. fig. 5. 6. besteht aus vielen Saamen, die in einer Scheibe dichte nebeneinander stehen und zusammen hängen, doch aber nicht zusammen gewachsen, in der Mitte aber fig. 6. an ein kurzes receptaculum oder placenta angewachsen sind. Die Saamen selbst sind Nierenförmig, jeder mit einer besondern Decke, die mit dem Saamen abfällt, umgeben fig. 7. 8. und, wenn sie von dieser entbloßt fig. 9., viel kleiner.

TAB. 55. Lat. Viola martia. Germ. Merzen Viole, blauer Veil. Grac. *Ion* Diofc. Angl. March Violet, Gall. Violette, Violette pourperée. Belg. Viole.

1. Hujus violæ caules repunt humi: Folia obscure viridia, flores purpureo-cærulei sunt.

2. Crescit vel sponte in silvis, vel educatur in hortis, & mensis Martii tempore flores ostendit.

3. Flores pertinent ad quatuor flores cordiales, & habent refrigerandi, humectandi atque laxandi virtutem, præstant insuper usum in morbis pectoris atque pulmonis, sedant tussim atque pleuritidem. Syrupus ex iis præparatus infantibus datur ad alvum laxandam & æstum temperandum. Eadem vi pollent quoque folia, unde sæpius contra inflammationes vel clysteribus vel unguentis immisceri solent. Semen calculo atque sabulo medetur.

4. NOM. GEN. Viola: vide Tab. 44. no. 4.

5. NOM. SPEC. Viola Riv. III. p. 26. tab. 110. Dill. 36. Viola officinarum Rupp. 288. Viola nigra Brunf. I. 137. Viola nigra seu purpurea Dod. 156. Ger. 850. Viola purpurea Ruell. 633. Fuchs. 311. Matth. 1180. Cam. Epit. 910. Viola martia Cam. Hort. 177. Viola simplex martia Park. Parad. p. 282. Viola martia purpurea Tab. 301. J. B. II. 542. Raj. II. 1049. Syn. 364. Viola martia purpurea flore simplici odore C. B. pin. 199. Tourn. 419. Boerh. I. 243. Vaill. 203. Viola martia flore coeruleo Heist. I. 32. Viola flore violaceo simplici Heuch. Ind. 41. Viola flore in summitate scapi solitario, herba flagellante, flore purpureo minore odore simplici, foliis rotundis integris Kram. 67. Viola acaulis, stolonibus teretibus reptatricibus, pedunculis radicatis Linn. H. 427. Royen. 431. Hall. 500.

Nota. Integra planta & fig. 12. 15. ad exemplar Blackvelliannum factæ, reliquæ a nobis additæ sunt. Fructus cum semine fig. 12. 15. ad hanc speciem non pertinent: veram eius adhuc clausi effigiem nos sistimus fig. 13. a facie anteriori, fig. 14. a facie laterali & fig. 16. aperti cum seminibus tribus valvis adherentibus. Huius speciei floris color reperitur etiam rubellus & albus: purpureum seu specificè ita dictum violaceum colorem sponte sua mutari in album, affirmat RAIUS Hist. & Syn. I. c.; purpureum in hortis sæpius transire in rubellum, repetita observatione ipsi didicimus. Eo tempore, quo floris partes representare suscipiebat pictor, Viola martia odoræ flores iam deficiebant; accepit autem adhuc ex horto quodam alios multo maiores, pallidiores & inodoros, sed sine planta ipsa, quare de specifico eius nomine dubii relictæ sumus. Eiusmodi florem representat a facie anteriori fig. 2., laterali fig. 3. & posteriori fig. 4., in quibus apparent a. a. duo petala superiora (ratione situs conf. nota ad tab. 44.), b. b. duo lateralia & c. quintum infimum cum calcaris seu nectario suo d. Eundem florem depingit fig. 5. iterum a facie anteriori, sed demtis duobus petalis supremis, quæ separata a. a. conspiciuntur, & fig. 6. remotis etiam duobus petalis lateralibus b. b. Quintum petalum separatim ostendit fig. 7. cum calcaris d. orificio e. Petala hæc comprehendit calyx f. fig. 8. quinquefolius persistens a facie anteriori depictus, cuius segmentum medium duobus petalis supremis a tergo est f. fig. 3., secundum & tertium petalis lateralibus adstet f. fig. 5. 6., quartum & quintum vero segmentum lateraliter subfulciunt petalum infimum ita, ut hiatus suo calcaris dorsum nudum relinquunt f. fig. 4. Centrum calycis occupat pistillum g. fig. 6. 8. 9., cuius stylus simplex est cum stigmate seu capitulo obliquo & circumdatus a quinque staminibus brevibus h. fig. 9. inter se coalitis fig. 10., quorum summitatem formant productiones triangulares membranaceæ aurantii coloris i. fig. c. 10. & extremum laterale externum duorum infimorum staminum prolongatur in totidem appendices singulares virides k. fig. 9. in calcaris cavo delitescentes. Hoc staminum coalitu convenit hic flos cum Viola tab. 44., differt vero, præter magnitudinem, odorem & colorem, eodem coalitu a Viola martia odora, in qua stamina inter se non coherent, quæ cum loculis apicem lateri staminum interiori adherentium alia occasione, Deo volente, singularibus figuris iam paratis explicabimus. Remotis staminibus apparet ovarium l. fig. 11., quod abit in Viola martia odora in fructum purpurascens, simplicem, subrotundum, hexagonum, trivalvem fig. 13. 4. plurima semina fig. 16. lævissimo & splendente cortice pallido tecta & valvis affixa continentem. Pediculi florum post horum lapsum humum versus torquentur, unde RAIUS Hist. I. c. visum est, fructum ex peculiaribus oriri pediculis.

6. Die Stengel dieses Veiles kriechen auf der Erden, die Blätter sind dunkelgrün, die Blumen purpurblau.

7. Sie wachsen wild in Hecken, und werden gleichfalls in Gärten gezogen, sie blühen im März.

8. Die Blumen gehören unter die 4. Herz-Blumen, sie kühlen, feuchten an, und öffnen den Leib, sie sind nützlich in Krankheiten der Brust und der Lungen, lindern die Husten und das Seitenstechen. Der Saft davon wird denen Kindern gegeben, den Leib zu eröffnen und zu kühlen. Die Blätter kühlen und öffnen gleichfalls, daher sie öfters in die Elystir und Salben wider Entzündungen genommen werden. Der Saame ist gut für den Stein und Sand.

Ann. Die ganze Pflanze und fig. 12. 15. sind nach dem Blackwellischen Exemplar gemacht, die übrigen von uns hinzugehan. Die Frucht mit dem Saamen fig. 12. 15. gehöret nicht zu dieser Art: Die wahre Gestalt desselben und zwar annoch geschlossen ist abgebildet zu sehen fig. 13. von der vordern Ansicht, fig. 14. von der Seite und fig. 16. geöffnet nebst den Saamen, welche an den dreien Deckeln der Frucht anhängen. Diese Art wird auch mit röthlicher und weißer Blume gefunden. Daß die Purpurfarbigen oder insonderheit also genannte Violettfarbigen von sich selbst in die weiße verwandelt werden, bejahet RAIUS Hist. & Syn. I. c.; Daß die Purpurfarbige in den Gärten öfters röthlich werden und bleiben, haben wir selbst aus wiederholter Erfahrung beobachtet. Zu der Zeit, als der Künstler die Theile der Blume fürzustellen unternahm, hatten die wohlriechende Merzen-Veile schon verblühet; er bekam aber annoch aus einem Garten andere Blumen, die viel größer, bleicher und ohne Geruch waren, aber nicht die Pflanze selbst, derowegen das nomen specificum derselben in Zweifel geblieben ist. Eine dergleichen Blume ist abgebildet von der vordern Ansicht fig. 2., von der Seite fig. 3. und von hinten fig. 4., bey welchen erscheinen a. a. die zwey oberste Blättlein (wegen des Pagers siehe die Anmerkung tab. 44.), b. b. die zwey Seiten-Blättlein, und c. das fünfte unterste mit seinem Sporn oder Nectario d. Eben diese Blume zeigt fig. 5. wiederum von vornen, aber ohne die zwey oberste Blättlein, welche seitwärts abgesondert a. a. zu sehen, und fig. 6., bey welcher auch die zwey Seiten-Blättlein b. b. abgesondert. Das fünfte abgesonderte Blättlein zeigt fig. 7. mit dem Sporn d. und dessen Defnung e. Diese Blättlein enthält ein fünfsach getheiltes und beständiger Calyx f. fig. 8. von vornen fürgestellt: dessen mittlster Theil steht hinter den beyden obersten Blättlein der Blume f. fig. 3., der zweyte und dritte hinter den beyden Seiten-Blättlein f. fig. 2. 5. 6., der vierte und fünfte Theil aber unterstützt seitwärts das unterste Blättlein also, daß zwischen beyden der ganze Rücken des Sporns bloß bleibt f. fig. 4. In der Mitte des Calycis steht das Pistillum g. fig. 6. 8. 9., dessen Stylus einfach und das Knöpflein schief, übrigens mit fünf kurzen Staminibus h. fig. 9. umgeben ist, die unter sich zusammen gewachsen sind fig. 10. und deren Spitzen dreneckigte, dünne und Pomeranzensfarbige Blättlein i. fig. 9. 10. ausmachen, und von den zwey untersten das Ende von der auswendigen Seite in zweyen grüne Züsätze fig. 9. verlängert ist, die in der Höhle des Sporns liegen. In der Zusammenwachung der Staminum kommt diese Blume mit der Viola tab. 44. überein, unterscheidet sich aber, außer der Größe, Geruch und Farbe, eben dadurch von dem wohlriechenden Merzen-Veil, bey welchem die Stamina nicht zusammen hängen, die wir nebst den Fächlein der apicem, die an ihrer innwendigen Seite anhängen, bey einer andern Gelegenheit G. G. mit besondern schon gefertigten Figuren fürstellen wollen. Wann die Stamina abge-

nommen, erscheint das ovarium l. fig. 11., aus welchem bey dem wohlriechenden Merzen-Weil eine Purpurfarbige, einfache, rundlichte und sechseckigte Frucht wird fig. 13. 14., die sich in drey Deckel theilet, an welchen viele mit einer glatten, glänzenden und bleichgelben Schale bedeckte Saamen fig. 16. anhängen. Die Stiele der Blumen, wann diese abgefallen, biegen sich gegen die Erde, daher RA- IUS Hist. l. c. dafür gehalten, daß die Frucht auf besondern Stielen entspringe.

TAB. 56. Lat. Saxifraga alba. Germ. Weiser Steinbrech. Angl. White Saxifrage. Ital. Saffragia. Gall. la grande Saxifrage. Belg. Steenbreck.

1. Hæc planta, unum pedem alta, folia habet pal- lide viridia, & flores albos flavis apicibus.

2. Reperitur in pratis florens mense Aprili & Majo.

3. Nomen sortita est a virtute, quæ in prolicienda urina, & calculo atque sabulo ejiciendo ipsi tribuitur. Aqua ejusdem destillata in officinis prostat.

4. NOM. GEN. Sedum Saxifraga dictum Rai. II. 1040. 1048. Saxifraga Rai. Meth. 111. Syn. 353. Tourn. 252. Heuch. Ind. 17. Rupp. 122. Dill. 50. Boerh. I. 222. Vaill. 176. Heist. I. 27. Linn. G. no. 434. Roy. 453. Kram. 35. 36. Hall. 401. Ord. II. Ludw. no. 566.

5. NOM. SPEC. Sedum bicornne album rotundifolium erectum, radice granulosa Moris. III. 479. Saxi- fragia Brunf. I. 185. Saxifragia maior seu alba Fuchf. 747. Saxifraga officinarum Heist. I. 27. Saxifraga alba Ger. 841. Gesn. Hort. 279. Dod. 315. Tab. ic. 841. Rai. II. 1048. Saxifraga alba chelidonides Lob. ic. 612. Saxi- fraga alba vulgaris Parck. 424. Saxifraga alba radice granulosa F. B. III. 706. Saxifraga rotundifolia alba C. B. pin. 309. Tourn. 252. Rupp. 122. Dill. 50. Boerh. I. 222. Vaill. 176. Kram. 36. Saxifraga flore albo radice gra- nulosa Heuch. Ind. 17. Saxifraga foliis reniformibus lobatis, caule ramoso, radice granulosa Linn. H. 167. Roy. 453. Hall. 401.

Nota. Integra planta & fig. 1. 10. 11. 16. imitationes exem- plaris Blackwelliani, reliquæ figuræ additæ sunt. Sistentur his fig. 1. 2. flos integer a facie anteriori, fig. 3. laterali, fig. 4. posteriori explanata; a. a. fig. 3. 4. calyx quinquefidus & ovarii dimidio inferiori accretus cum flore iunctus, fig. 5. a flore se- paratus cum decem staminibus, 5. longioribus & 5. breviori- bus; b. fig. 2. 3. 4. petala quinque; fig. 6. stamen brevius & lon- gius in magnitudine naturali, fig. 7. aucta; fig. 8. ovarium a su- periori calycis parte libera separatum cum binis stylis in magni- tudine naturali, fig. 9. aucta; fig. 10. 12. fructus maturus seu capsula seminalis cum calyce persistente, fig. 11. 13. idem a ca- lyce separatus ex stylis persistentibus quasi bicornis; fig. 14. idem horizontaliter dissectus in magnitudine naturali, fig. 15. aucta; fig. 16. 17. semina, fig. 18. semen in aucta magnitudine.

1. Dieses Kraut wird bis einen Fuß hoch, die Blä- ter sind lichtgrün, die Blumen weiß mit gelben Apicibus.

2. Es wächst auf Wiesen, blühet im April und May.

3. Diese Pflanze führet ihren Nahmen von der ihr zu geeigneten Tugend, indeme sie den verhaltenen Urin, Stein und Sand fortreibt. In den Apotheken hat man das davon destillierte Wasser.

Ann. Die ganze Pflanze und fig. 1. 10. 11. 16. sind nach dem Blackwellischen Exemplar gemacht, die übrige hinzugehan. Da- mit werden dargestellt fig. 1. 2. die ganze Blume von vornen, fig. 3. von der Seite, fig. 4. von hinten ausgebreitet; a. a. fig. 3. 4. der fünffach getheilte und an die untere Hälfte des Ovarii angewach- sen. Calyx mit der Blume vereinigt, fig. 5. von der Blume abge- sondert mit 1. Staminibus, 5. kürzern und 5. längern; b. fig. 2. 3. 4. die 5. Blätlein der Blume; fig. 6. ein kurzes und langes Stamen in natürlicher Größe, fig. 7. vergrößert; fig. 8. das Ovarium von dem obern freyen Theil des Calycis abgesondert mit den beyden Sty- lis in natürlicher Größe, fig. 9. vergrößert; fig. 10. 12. die zeitige Frucht oder Saamen-Gehäuf nebst dem beständig bleibenden Calyce, fig. 11. 13. eben dieselbe davon abgesondert, welche von den beyden beständig bleibenden Stylis gleichsam zwey Hörner bekommt; fig. 14. eben dieselbe über quer entzwey geschnitten in natürlicher Größe, fig. 15. vergrößert; fig. 16. 17. die Sammen, fig. 18. ein Saame ver- größert.

TAB. 57. Lat. Helleboraster, Elleborum nigrum. Germ. Wilde Christwurz, Stinkende Nieswurz, Lauf-Kraut. Græc. Εμβροχονίδας Diosc. Angl. Bearsfoot, Black Hellebore, Christmäs flower, Great bastard black Hel- lebore, Great Oxe-heele, Setterwort. Hisp. Verde Gambre nero, Elleboro. Ital. Elleboro nero. Gall. Illeboire noir. Belg. Swarte Nieswortel.

1. Altitudinem acquirit octodecim digitorum: Folia inferiora obscure, superiora vero lucide viridia sunt: ad- huc dilutiori viriditate tincti sunt flores, margine infi- mul purpureo cincti.

2. Invenitur in montibus Helvetiæ, Austriæ atque Styriæ; Angli alunt in hortis. Floret sub finem Decem- bris, unde ab Anglis Christmäs flower appellatur.

3. Celebratur ab antiquis iam autoribus Helleborus niger ceu remedium insigne contra melancholiam atque maniam, siquidem atram bilem atque inde pro- venientes humores insigniter purgare crediderunt. In lepra, serpigine, scabie aliisque cutis affectionibus medicinæ loco præscripserunt. Laudatur quoque ejus usus in podagra. A neotericis vero sæpiissime in diu- turnis mensium obstructionibus adhibetur. Tinctura Hellebori in officinis prostat.

4. NOM. GEN. Helleboraster Rupp. Edit. I. 150. II. 131. Helleborus niger Rai. I. 697. Meth. 77. Syn. 271. Heist. IV. 8. Syst. Pl. gen. 35. Helleborus Tourn. 271. Heuch. Ind. 49. Rupp. edit. III. 163. Boerh. I. 296. Vaill. 97. Linn. G. no. 556. Kram. 31. 44. 69. 75. Ludw. no. 625.

5. NOM. SPEC. I. Enneaphyllon Plinii Casalp. 583. Confiligo Ruell. 447. Gesn. Hort. 255. Sesamoides mag- num Cordi & Confiligo Ruelli Lob. ic. 680. Pedicularia tertia foetida Trag. 251. Veratrum nigrum III. Dod. 386. Clus. 274. Helleboraster Rupp. Ed. I. 150. II. 131. Helleboraster maximus H. Eyf. Hiem. Tab. III. fig. 1. Ger. 976. Rai. Syn. 271. Helleboraster maximus five Confiligo Park. 212. Helleborastrum magnum Tab. ic. 722. Elle- borus niger adulterinus sylvestris Fuchf. 275. Elleborus niger sylvestris adulterinus etiam hyeme virens F. B. III. 880. Helleborus niger foetidus C. B. pin. 185. Tourn. 272. Boerh. I. 296. Vaill. 97. Helleborus niger ramosus angu-

1. Es wächst bis 18. Zoll hoch, die unterste Blätter sind dunkel, die obern hellgrün, die Blumen sind sehr hellgrün mit Purpur an dem Rande eingefasset.

2. Man findet es auf den Bergen in der Schweiz, in Oesterreich und Steyermark, in Engelland wird es in Gärten gezogen, und blühet gegen das Ende des Decem- bers, daher es im Englischen die Christmäs-Blume ge- nennet wird.

3. Die Nieswurz wird schon von denen Alten als ein gutes Mittel in der Melancholie und Tollheit gerühmt, um die schwarze Galle und die daher entstehende Feuch- tigkeiten zu purgiren. Sie geben es gleichfalls im Aus- saß, Flechten, in der Krätze und andern dergleichen Krank- heiten der Haut. Man recommendirt es auch im Zipo- perlein, und die neuern bedienen sich dessen häufig in hartnäckigten Verstopfungen der weiblichen Reinigung. In den Apotheken hat man eine Tincturam Hellebori.

angustifolius semper virens elatior *Morif. III. 459.* Helleborus niger flore viridi maximus ramosus foetidus *Heist. IV. 8.* Helleborus flore viridi clauso *Rupp. Ed. III. 163.* Helleborus maximus *Rai. I. 698.* Helleborus foetidus vulgo Helleboraster *Kram. 31. 44. 69.* Helleborus caule inferne angustato multifolio multifloro, foliis caule brevioribus *Linn. H. 227. Roy. 484. Wachend. 264.* Helleborus vaginis pallidis vix serratis flore virente *Hall. 317.*

II. Veratrum nigrum III. peregrinum *Clus. 274.* Helleboraster maximus alter *Parck. 213. Rai. I. 698.* Helleborus niger hortensis alter *C. B. pin. 185. Tourn. 272. Mill. Gard. Dict.*

Nota. Secundum auctores no. I. citatos flores hujus speciei ex viridi pallide flavi sunt, & nos illos olim reperimus tales in Helvetia circa Augustam Rauracorum & in ascensu montis Pezberg in via Thermas Badenses versus; tales præterea eosdem sistit imago, quam fol. 422. a. continet opus istud B. CONRADI GESNERI dudum celebratissimum nondum editum & nunc singulare nostræ bibliothecæ ornamentum, ubi tamen consueta accurate pediculi foliorum ad horum nervos usque, itemque folia floralia seu vaginæ pediculos florigeros foventes ad apicem, ubi finduntur, ex viridi leviter purpurescentes pinguntur. JO. BAUHINUS l. c. e contrario observavit, floris segmentorum oras, quum se magis explicant, rubere, id quod interdum accidere etiam annotavit PARKINSONUS p. 213., tanquam ordinarium vero declarat MORISONUS l. c. p. 460. CLUSIUS tandem l. c. utramque varietatem ut distinctam consideravit speciem addiditque, posterioris folia esse paullo atriora, cujus sententiæ subscripsit C. BAUHINUS & TOURNEFORTIUS itemque PHIL. MILLERUS, qui præterea priorem speciem Angliæ indigenam (quemadmodum etiam RAJUS Syn. l. c.) posteriorem vero exoticam declarat; sed RAJUS jam *Hist. l. c.* de hac distinctione, ut legitima, nondum convictus erat & LINNÆUS atque HALLERUS ejus ne quidem ut varietatis mentionem fecerunt.

Ann. Nach denen no. I. angeführten Auctores sind die Blumen dieser Art aus dem grünen bleichgelb, und wir haben sie selbst also ehedem in der Schweiz um Auzit und im Aufsteigen des so genannten Pezberges von dar nach Baden zu gefunden; eben so stellet solche auch für das Gemählde, welches am 422. Blat a. das längst berühmte und noch nicht edirte Werk des Seel. CONR. GESNERI, das nun eine besondere Zierde unserer Bibliothec ist, enthält, bey welchem jedoch nach der gewöhnlichen Accurate die Stengel der Blätter bis auf ihre Nerven, ingleichen die Scheidenförmige Blätter, welche die Blumen-Stengel in sich schließen, an ihrem gespaltenen Ende aus dem grünen etwas purpurfarbig gemahlet sind. Im Gegentheil hat JO. BAUHINUS l. c. angemercket, daß die Ende der Blumen-Blättlein, wann sie sich mehr ausbreiten, roth sind, welches, daß es zuweilen geschehe, auch PARKINSONUS l. c. p. 213., als ordentlich aber MORISONUS l. c. p. 460. angezeigt hat. Endlich hat CLUSIUS l. c. beyde Varietäten als besondere Arten angegeben und beygefüget, daß der letzteren Blätter mehr schwarz-grün seyen, welche Meynung auch C. BAUHINUS und TOURNEFORTIUS angenommen, ingleichen PHIL. MILLERUS, der über dieses die erste Art als eine in Engelland einheimische (gleichwie auch RAJUS Syn. l. c.), die andere aber als ausländisch erkläret; es war aber RAJUS schon *Hist. l. c.* von dieser Unterscheidung, als rechtmäßig, noch nicht überzeuget, und LINNÆUS sowohl als HALLERUS haben derselben nicht einmal als einer Varietät Meldung gethan.

TAB. 58. *Lat.* Geranium columbinum. Pes columbinus. *Germ.* Gemeiner Storchschnabel. *Græc.* Γερανιον. *Angl.* Common Doves foot, Cranes Bill. *Hisp.* Pico de Cinguenha. *Ital.* Geranio. *Gall.* Bec de C. cogné. *Belg.* Duyvevoet.

1. Hæc Geranii species unum pedem altitudine attingit: Folia inferiora super humo sese explicant, lucideque virent: Caules sunt e rubro virides, flores ex rubro purpurei.

2. Crescit in aggeribus, æstatis tempore diu florens.

3. Adnumeratur herbis vulnerariis, & in læsionibus ac contusionibus internis, hæmorrhagiis, ut & in omnibus fluxionibus adhibetur. Folia in pulverem conversa atque infantibus hernia laborantibus data multum auxilii afferre, quamplurimi statuunt. Calculo etiam medetur, urinamque promovet.

NOM. GEN. Geranium *Rai. II. 1055. Meth. 111. Syn. 356. Tourn. 266. Dill. 69. Boerb. I. 262. Vaill. 79. Heist. I. 13. Linn. G. no. 673. Roy. 350. Wachend. 123. Hall. 365. Ord. II. Ludvv. no. 640. Gruinalis Heuch. Ind. 18. Pr. I. 69. Rupp. 103. Kram. 31. 35. 37.*

5. NOM. SPEC. I. Geranium columbinum majus flore minore cæruleo *Rai. II. 1059. Syn. 358. Tourn. 268. Dill. 69. Boerb. I. 265. Vaill. 79. tab. xv. fig. 1.* Geranium foliis subrotundis semiseptifidis, caule erecto, umbellato flore minimo *Hall. 366.*

II. Geranium alterum *Fuchs. 205. Geranium II. Camer. Ep. 600. Geranium folio rotundo multum serrato five columbinum J. B. III. 473. Geranium columbinum, Pes columbinus Tab. 10. 56. Geranium columbinum majus dissectis foliis Ger. 938. Rai. II. 1059. Geranium malacoides laciniatum five columbinum alterum *Parck. 706.**

III. Pes columbinus *Dod. 61. Pes columbinus seu alterum Geranium Dioscoridis Lob. ic. 658. Gruinalis folio malvæ rotundo Rupp. 104. Geranium II. Matth. 855. Geranium columbinum Ger. 938. Rai. II. 1059. Geranium columbinum vulgare *Parck. 706. Geranium malvæ folio rotundo C. B. pin. 318. Tourn. 268. Vaill. 79. Geranium pedunculis bifloris, foliis subrotundis multifidis caule procumbente Linn. H. 344. Roy. 351. Wachend. 124. no. 10. Geranium foliis reniformibus semiquinquefidis mollibus & latissimis Hall. 366.**

b. *Nota.* Fig. I. 8. 12. 17. ad Blackwellianum, reliquæ ad naturæ exemplar factæ sunt. Figuram I. & II. repræsentare Europæum Geranium columbinum communiter ita dictum, omni dubio caret; sed in indicandis ejus varietatibus, tum constantibus tum accidentalibus, ita discrepant auctores, ut difficulter sane synonyma conjungantur aut distinguantur, præcipue quoniam ex ipsis etiam earum iconibus una cum altera vix conveniat, id quod non tam figurarum vitium, quam varietatis polymorphæ indicium nobis videtur. RAJUS primus, quantum scimus, no. I. & III. ut species distinctas proposuit, folisque priorem descripsit et VAILLANT delineavit, HALLERUS vero postea utriusque notas specificas confirmavit, Geranium Blackwellianum pro no. I. declaravit & inter synonyma addita FUCHSII & TABERNÆMONTANI figuras no. II. indicatas citavit, LINNÆUS contra no. I. ut varie-

Ann. Fig. I. 8. 12. 17. sind nach dem Blackwellischen Muster die übrige nach der Natur gemahlet. Daß fig. I. und II. das Europäische insgemein so genannte Geranium columbinum fürstelle, ist ohne Zweifel; es sind aber die Auctores in Bestimmung der so wohl beständigen als zufälligen Varietäten desselben so uneinig, daß die Synonyma sehr schwer zu vereinigen oder zu unterscheiden sind, fürnehmlich weil auch unter ihren Abbildungen kaum eine mit der andern übereinkommt, welches uns nicht sowohl ein Fehler derselben, als vielmehr eine Anzeige der vielfältigen Veränderung zu seyn schenket. Es hat zuerst, so viel wir wissen, RAJUS no. I. & II. als unterschiedene Arten angegeben auch die erste beschrieben, und VAILLANT abgebildet, HALLERUS aber hernach beyder notas specificas bestätiget, das Blackwellische Geranium für no. I. erkläret und unter den beygesetzten Synonymis die no. II. angezeigte Figuren des FUCHSII und TABERNÆMONTANI citiret; LIN-

varietatem illius n. III. tantum recensuit, & DILLENIIUS pro synonymis habuit. Quantum nos discernere potuimus, auctorum no. II. citatorum icones cum illa VAILLANTII & nostra II. tanto magis conveniunt, quanto magis a Blackvelliana & illis no. III. indicatis recedunt; quousque vero hæc differentia constans sit, ulteriori inquisitione adhuc opus habet: interea hoc certum est, in omnibus his petalorum colorem nunc purpurascentem nunc cærulescentem annotatum, ideoque inconstantem esse. Floris fructusque partes hisce sistuntur: fig. 1. flos in magnitudine naturali, fig. 3. aucta; fig. 4. petalum separatim; fig. 5. 6. ovarium, stamina & stylus in naturali & aucta magnitudine; fig. 7. ovarium & stylus remotis staminibus; a. a. fig. 3. calyx in nexu cum petalis, fig. 8. 9. a. fig. 11. 5. idem persistens flore delapso in magnitudine naturali, fig. 10. aucta; fig. 11-14. fructus cum stylo persistente; fig. 15. b. styli spinula remotis seminibus; fig. 16. semen involucri suo caudato adhuc tectum, fig. 17. 18. nudum in magnitudine naturali, fig. 19. aucta.

16. ein Saam-Korn mit seiner geschwächten Hülse noch bedeckt, fig. 17. 18. entbloßt in natürlicher Größe, fig. 19. vergrößert.

TAB. 59. Lat. Clematis, Vinca, Pervinca, *Vinca pervinca*. Germ. Wintergrün, Singrün, Ingrün. Græc. ΚΑΛ. ♂ *ματίς δαφνοειδής* Diosc. Angl. Perivinkle. Hsp. Pervinqua. Ital. Provenca. Gall. Lisseron. Bat. Vincoorde, Mæghden-Palm.

1. Vinca unum pedem longa foliis viridibus lucide splendet: flores sunt purpureo-cærulei leviterque albi.

2. Crescit in cespitibus umbrosis & ad piscinas sicciore, atque per totam fere æstatem flores ferre conspicitur.

3. Refertur ad herbas vulnerarias, & sæpius datur in potionibus contra contusiones, sanguinis vomitum, nimium mensium fluxum & gonorrhæam muliebrem.

4. NOM. GEN. Clematis Daphnoides Rai. II. 1091. Meth. 79. Synops. Ed. II. 223. Pervinca Tourn. 119. Dill. 39. Boerh. I. 311. Vaill. 159. Heist. I. 24. Syst. 8. Hall. 526. Kram. 10. Ludvv. no. 56. Vinca pervinca Rai Syn. Ed. III. 268. Vinca Heuch. Ind. 4. Rupp. 27. Linn. Gen. no. 217. Roy. 412. Wachend. 41.

5. NOM. SPEC. Clematis Matth. 956. Cam. Epit. 694. Cord. 61. b. Clematis ægyptia Gesn. Hort. 254. b. Clematis ægyptia vulgatio cærulea Clus. 121. Clematis Daphnoides Fuchs. 360. Dod. 405. Clematis Daphnoides minor C. B. pin. 301. J. B. II. 130. Rai. II. 1091. Syn. edit. II. 223. Vinca Rivini Rupp. 27. Vinca flore cæruleo vulgo Vinca per Vinca officinarum Heuch. Ind. 4. Vinca foliis ovatis Linn. Hort. 77. Roy. 412. Wachend. 41. no. 1. Vinca pervinca Brunf. I. 178. Dorst. 216. b. Vinca pervinca minor Ger. 894. Raj. Syn. Ed. III. 268. Vinca pervinca vulgaris Park. 380. Pervinca Trag. 394. Ruell. 580. Pervinca folio viridi Heist. I. 24. Pervinca folio ovato mucronato angusto glabro viridi flore parvo Kram. 10. Pervinca foliis ovato-lanceolatis Hall. 526. Pervinca vulgaris angustifolia flore cæruleo Tourn. 120. Dill. 39. Boerh. I. 311. Vaill. 159. Provenca (quod nomen Italicum est) vulgo officinarum Cesalp. 336.

6. Nota. Fig. I. 14. 15. 16. Blackvellianum exemplar exhibet; Fig. II. 2.-13. a nobis additæ sunt. Calyx est brevis, profundus quinquefidus fig. 3. a. 7. 8. & persistens. fig. 12. 14. a. Corollæ tubus est infundibuliformis fig. 3. b., ejusque extremum angustum, cylindraceum & perforatum fig. 4. c.; mox vero valde ampliatur & quinque lineis inscriptis externe notatur fig. 3. b. Superior ejus pars interne peculiari modo quinque distincta est fig. 5. d. d. & oris suis elegans format pentagonum fig. 2. d. Corollæ limbus ordinarie in quinque segmenta fig. 2. 3. 5. e. interdum in quatuor tantum fig. 4. e. ad tubum usque divisus, amplius & horizontaliter quasi expansus fig. 2. 4. e. e. est, cujus segmenta externe cum tubo continua sunt fig. 3., interne vero ejusdem orificio pentagono quasi inserta apparent fig. 2. 5., ex basi angusta latefcunt & in marginem extremum quasi truncatum aut sinuatum abeunt fig. 2. 3. 4. 5. Medio circiter tubi loco adherent stamina quinque fig. 5. f., quorum unum separatim in magnitudine paullulum aucta sistit fig. 6. Filamenta eorum fig. 6. g. sunt brevia, inflexa & retro flexa conf. fig. 5. f. Antheræ fig. 6. k. squamulæ similes, membranaceæ, erectæ, ellipticæ, sed obtuso extremo introrsum flexæ comparent, quibus singulis, notante HALLERO, duo insculpti sunt loculi. Calycis centrum occupat ovarium fig. 9. i., cujus superficiem superiorem in magnitudine magis aucta repræsentat fig. 11.: duplex est i. i. & conjuncta habet duo corpuscula peculiariter k. k. Ex medio ovarii erigitur stylus simplex, cylindraceus, cujus magnitudinem naturalem sistit l. fig. 7. auctam fig. 9.: supra stamina non prominet, sed brevis est & singularis structuræ, duplici namque capitulo instructus, quorum primum m. planum & orbiculatum annuli quasi in modum stylum cingit, alterum vero n. minus, concavum & in ambitu suo plumosum, paullo post styli extremum occupat, quod separatim a facie verticali sistit fig. 10.: hinc duo stigmata stylo tribuit LINNÆUS. Ovarium excrefcit in duas siliquas fig. 12. o. o.; raro tamen utræque perfectionem attingunt, alterum potius fig. 13. p. pierumque abortit. Siliquas has perfectas repræsentat Black-

LINNÆUS hingegen hat no. I. nur als eine Varietät von no. II. angeführt und DILLENIIUS beide für einerley gehalten. So viel wir haben erkennen können, kommen die Figuren der no. II. angezeigten Auctorum mit der Figur des VAILLANT und unserer no. II. so viel mehr überein, je mehr sie von der Blackwellischen und denen no. III. bemerkten abgehen; wie weit aber dieser Unterschied beständig seye, hat noch einer weitem Untersuchung nöthig: indessen ist dieses gewiß, daß an allen diesen die Farbe der Blumen-Blätlein bald purpurfarbig, bald bläulich, und also unbeständig bemercket worden seye. Die Theile der Blume und Frucht werden mit folgenden abgebildet: fig. 1. 2. die Blume in natürlicher Größe, fig. 3. vergrößert; fig. 4. ein abgesondertes petalum; fig. 5. 6. das ovarium, die stamina und der stylus in natürlicher und vermehrter Größe; fig. 7. das ovarium und der stylus nachdem die stamina abgenommen worden; fig. 3. a. a. der calyx in der Vereinigung mit den petalis, fig. 8. 9. a. fig. 11. 15. eben derselbe als beständig nach abgefallener Blüthe in natürlicher Größe, fig. 10. vergrößert; fig. 11-14. die Frucht mit dem beständig-bleibenden stylo; fig. 15. b. der stylus nach abgenommenen Saamen; fig. 17. 18. entbloßt in natürlicher Größe, fig. 19. vergrößert.

1. Singrün wächst einen Fuß lang, die Blätter sind hell glänzend grün, die Blumen purpur blau, doch etwas weißlicht.

2. Es wächst auf schattigten Wäsen, und an truckenen Teichen, und blüht die mehresten Monate des Sommers.

3. Man rechnet es unter die guten Wund Kräuter und braucht es öfters zu denen Träncken bey Quetschungen, innerlichen Verblutungen, Blutauswurf, allgus, starker Reinigung und dem weißen Fluß der Frauen.

4. Man rechnet es unter die guten Wund Kräuter und braucht es öfters zu denen Träncken bey Quetschungen, innerlichen Verblutungen, Blutauswurf, allgus, starker Reinigung und dem weißen Fluß der Frauen.

Ann. Fig. I. 14. 15. 16. ist aus dem Blackwellischen exemplar genommen; Fig. II. 2.-13. sind von uns hinzugehan. Der calyx ist kurz, tief fünffach eingeschnitten fig. 3. a. 7. 8. und beständig fig. 12. 14. a. Die Röhre der Blume hat die Gestalt eines Trichters fig. 3. b., und sein äußerstes ist eng, cylindrisch und mit einem Loch versehen fig. 4. c., bald aber wird sie weiter und ist auswendig mit fünf Linien bezeichnet fig. 3. b. Sein oberster Theil ist innwendig auf eine besondere Weise fünffach unterschieden fig. 5. d. d. und machet mit seinen Enden ein schönes Fünfeck fig. 2. d. Der Rand der Blume ist ordentlich in fünf Theile fig. 2. 3. 5. e., zuweilen aber nur in vier fig. 4. e. bis auf die Röhre zertheilet, weit und gleichsam der Quere nach ausgebreitet fig. 2. 4. e. e., dessen Theile äußerlich mit der Röhre ein Stück ausmachen fig. 3., innerlich aber derselben fünffedigen Öffnung gleichsam angefügget zu seyn scheinen fig. 2. 5., aus einem schmalen Grund breiter werden und an ihrem äußersten Rand gleichsam abgestumpft oder ausgeschnitten befunden werden fig. 2. 3. 4. 5. Ungefähr in der Mitte der Röhre hängen fünf stamina fig. 5., davon eines abgesondert und vergrößert fig. 6. fürstellet. Ihre Fäden fig. 6. g. sind kurz, gebogen und wieder zurück gebogen fig. 5. f. Ihre Spitzen fig. 6. k. sind Schuppenförmige Häutlein, länglicht rund und stehen aufrecht, doch aber mit ihrem stumpfen Ende einwärts gebogen, deren jedes nach HALLERI Anmerkung mit zwey Fächlein versehen ist. In der Mitte des calycis sitzt das ovarium fig. 9. i. dessen Oberfläche noch mehrers vergrößert fig. 11. abbildet: es ist solches zweyfach i. i. und sind ihm zwey besondere corpuscula k. k. begefüget. Aus der Mitte des ovarii steigt der stylus in die Höhe, der einfach und cylindrisch, und in natürlicher Größe i. fig. 7. vergrößert aber fig. 9. fürgestellt ist, er raget über die stamina nicht heraus, sondern ist kurz von einer besondern Bildung, nemlich mit einem doppelten Häutlein versehen, davon das erste m. platt und rund gleichsam als ein Ring denselben umgiebet, das andere aber n. kleiner, ausgehöhlet und an seinem Umkreis faserigt bald hernach das äußerste des styli ausmachet, welches abgesondert von der obersten Fläche fig. 10. zeigt: am

Blackwelliana figura 14., alteramque earum apertam fig. 15. cum seminum locatione, horumque unum separatim fig. 16. Denique notamus, corollæ colorem, quem Blackwelliana fig. 1. pingit azureum, nos nunquam non deprehendisse ex cæruleo-purpureo, 2. purpureo tamen seu rubente, utpote multo obscuriori, quem in alia specie seu potius varietate annotavit J. B. L. c. alique, satis distinctum.

als aus dem blauen purpurfarbig, jedoch von der purpurfarbig oder röthlichten und viel dunklern Farbe, welche in einer andern Art oder, vielmehr varietät J. B. und andere beobachtet haben, genugsam unterschieden befunden haben.

um dieser willen eignet LINNÆUS dem stylo zwey stigmata zu Aus dem ovario wachsen zwey Schotten hervor fig. 12. o. o., bey de aber erlangen selten ihre Vollkommenheit, vielmehr stehet eine davon fig. 13. p. insgemein ab. Die zeitigen Schotten zeigt die Blackwellische fig. 14. und eine davon gediffnet fig. 15. samt der Lage der Saamen und einen von diesen abgefondert fig. 16. Endlich bemerken wir, daß der Blumen Farbe, welche in der Blackwellischen fig. 1. Himmelblau gemahlet ist, wir niemals anders,

TAB. 60. Lat. Asperula odorata, Aspergula, Matrisylva. Germ. Wald-Reißer, Waldmännlein, Stein-Leber, © frant. Grac. Epi. Spōdaron ἀγριον Diosc. Angl. Wood-roof. Hiss. Ruvia. Ital. Robbia salvatica. Gall. Epatique en forme d'Etoile, Garance. Bat. Walmeester. Sterrenkruyt.

1. Caulis altitudo pes unus est. Foliorum color saturate viridis, floris albus est.

2. Crescit in fruticetis & silvis cæsis; mense Maio flores profert.

3. Multum hepatis prodesse inque ejus inflammatione, vesiculæ fellis obstructione, ut & in morbo regio conducere, affirmatur. De hac herba, vino immersa, sicuti Britanni de boragine atque pimpinella, multis in locis ad confortationem cordis & refocillationem spirituum bibere consueverunt Germani. Pagani herbam adhuc recentem contundere, eamque tumoribus calidis aliisque inflammationibus, ut & vulneribus applicare solent.

4. NOM. GEN. Asperula Rai. I. 433. Meth. 55. Syn. 224. Heuch. Ind. 2. Rupp. 6. Dill. 61. Boerh. I. 149. Heist. I. 4. Syst. 6. Linn. Gen. no. 93. Roy. 255. Wachend. 22. Aparine Tourn. 114. Vaill. 14. Rubeola Hall. 457. Galium Ludov. no. 11.

4. NOM. SPEC. Caprifolium Brumf. II. 13. Dorst. 63. a. Hepatica Dorst. 145. a. (utrique enim nomini & descriptioni unam eandemque apponit figuram) Hepatica stellata Tabern. 10. 816. Matrisylva Trag. 496. Rubia sylvatica aspera Gesn. hort. 277. Rubiis accedens Asperula quibusdam seu Hepatica stellaris J. B. III. 718. Rubeola foliis octonis, seminibus hispidis, ex summo caule paniculata Hall. 457. Asperula Ger. 1124. Rai. I. 483. Syn. 224. Heist. I. 4. Asperula officinarum Dal. pharmac. 219. Asperula sylvatica Rupp. 6. Kram. 2. 6. 8. Asperula flore albo vulgo Matrisylva Heuch. Ind. 2. Asperula odorata flore Clus. CLXXV. Asperula odorata flore albo Dod. 355. Boerh. I. 149. Asperula aut Aspergula odora nostras Lob. ic. 801. Asperula sive Aspergula odorata Park. 562. Asperula sive Rubeola montana odora C. B. pin. 334. Dill. 41. Asperula foliis pluribus pedunculo elevatis Linn. H. Cliff. 33. Roy. 255. Asperula foliis octonis lanceolatis, floribus fasciculatis pedunculatis Linn. Fl. Suec. 41. Wachend. 22. no. 2. Aparine latifolia humilior montana Tourn. 114. Vaill. 14.

6. Nota. Blackwelliana figura no. I. valde convenit cum Rubia sylvestri Cam. Ep. 663. minime autem cum nomine adscripto, & alia species est Asperulæ vel Rubeolæ aut Gallii, quam tamen indicare non audemus, quia characteres ejus generici fig. 1. 7. imperfecte repræsentantur. Addidimus ergo plantæ hujus nominis genuinæ iconem fig. II. ejusque floris fructusque partium fig. 2. 6. 8. 14., quarum explicatio hæc est: Flos in magnitudine naturali fig. 1., in magnitudine aucta a facie anteriori fig. 3., posteriori fig. 4. cum foramine in fundo pro styli transitu a., a facie laterali fig. 5., locus ubi cum ovario coheret b., corollæ segmenta duo fig. 6. totidemque stamina c. c. quorum unum singulis segmentis accretum est, ovarium cum stylo insistente in magnitudine naturali fig. 8. aucta fig. 9. racemus seminifer fig. 10. duo semina matura conjuncta fig. 11., unum ex his, altero plerumque abortiente, fig. 12., semen ab involucro aspero denudatum a facie superiori seu exteriori globosum fig. 13. inferiori seu interiori excavatum fig. 14., omnia in magnitudine naturali.

oder außern runden Ansicht fig. 13., von der untern oder innern ausgehohleten fig. 14., alle in natürlicher Gröſſe.

6. Anm. Die Blackwellische Figur I. kommt wohl der Rubiæ sylvestri Cam. Ep. 663. sehr nahe aber mit dem ihr gegebenen Namen nicht überein, sondern ist eine andere Art der Asperulæ oder Rubeolæ oder Gallii, welche aber anzuzeigen wir uns nicht unterſuchen, weil derselben Geschlecht Kennzeichen fig. 1. 7. unvollkommen ſurgestellt sind. Wir haben also der ächten Pflanze dieses Namens Gestalt Fig. II. hinzugeſetzt, nebst den Theilen der Blume und der Frucht fig. 2-6. 8-14., deren Erklärung ſolgende ist: Die Blume in natürlicher Gröſſe fig. 1., vergrößert von vornen fig. 3. von hinten fig. 4. nebst dem Löchlein im Grunde für den Durchgang des Styli a., von der Seite fig. 5. nebst dem Ort, wo ſie mit dem Ovario zuſammen hängt b., zwey Abtheilungen der corolla fig. 6. und ſo viel ſtamina c. c. deren eines jeder Abtheilung angewachſen iſt, das ovarium mit dem darauf ſtehenden ſtylo in natürlicher Gröſſe fig. 8. vergrößert fig. 9. ein Saamen tragender Aß fig. 10. zwey untereinander vereinigte Saamen fig. 11., einer von dieſen, indeme der andere mehrentheils abortiret, fig. 12., ein aus ſeiner rauhen Hülſe genommenes Saamkorn von der obern oder außern runden Anſicht fig. 13., von der untern oder innern ausgehohleten fig. 14., alle in natürlicher Gröſſe.

TAB. 61. Lat. Hyacinthus. Germ. Hyacinthen, Blaue Sincken. Grac. Yavivdos. Angl. Hyacinth, Harebells. * Hiss. Majos flores. Ital. Hyacinto. Gall. Vaciet, Jacinte. Belg. Hyacinthen.

1. Ascendit hujus plantæ caulis ad altitudinem octo vel novem digitorum: Color foliorum herbis, Flores plerumque saturate cærulei, interdum incarnati, interdum albi sunt.

2. Crescit in Angliæ sepibus & silvis, menſeque Maio flores agit.

3. Bulbus ibidem abhibetur tanquam remedium urinæ excretionem promovens: præterea omnis generis fluxiones impedire ſtatuitur.

4. NOM. GEN. Hyacinthus Rai. II. 1155. Meth. 115. Synopf. 372. Tourn. 344. Heuch. Ind. 6. Boerh. II. 111. Vaill. 105. Heist. II. 15. Linn. Gen. no. 342. Roy. 27. Kram. 6. 8. 9. Ludov. no. 121. Wachend. 299. Hyacinthoides Heist. III. 24. Syst. 5.

5. NOM. SPEC. Hyacinthus Anglicus Ger. 111. Ra. II. 1159. Syn. 373. Hort. Eystett. Vern. O. II. tab. 8. fig. 1. Hyacinthus Anglicus flore cæruleo Heist. II. 15. Hyacinthus Anglicus & Belgicus Lob. ic. 103. J. B. II. 585. Kram. 6. Hyacinthus

1. Der Stengel wächſet 8. oder 9. Zoll hoch, die Blätter ſind Grasgrün, die Blumen gemeinlich dunkelblau, manchmalen Fleiſchfarb, zuweilen weiß.

2. Es wächſt in Hecken und Wäldern in Engelland, und blüht im May.

3. Die Zwieſel wird daſelbſt gebraucht als ein Urin treibendes Mittel und ſoll alle Arten der Flüſſe zurück halten.

thus Hispanicus *Clus. hist. 176. Suvert. tab. 13. fig. 1.* Hyacinthus Anglicus, Belgicus vel Hispanicus *Park. Parad. 122. 125. fig. 5.* Hyacinthus non scriptus *Dod. 215.* Hyacinthus oblongo flore cœruleus major *C. B. pin. 43. Tourn. 344. Heuch. Ind. 6. Boerb. II. 111. Vaillant. 105.* Hyacinthus major oblongo cœruleo pendulo flore *Morif. Hist. Ox. II. 373. S. IV. tab. 11. fig. 8.* Hyacinthus corollis campanulatis sexpartitis *Linn. H. 125. Roy. 27. Wachend. 300.*

6. *Nota.* RAJUS *hist. II. p. 1160.* Hyacinthum Hispanicum CLUSII distinguit ab Anglico foliis non adeo splendentibus, nec humi stratis, sed potius surrectis, caule breviori itemque floris colore & odore; sed ipsa CLUSII figura folia ostendit humi strata estque eadem, qua Anglicum repræsentant GERARDUS, LOBELIUS, DODONÆUS & JO. BAUHINUS; solus Hortus Eystettensis pingit folia erecta, cujus imitatio tantum est illa figura MORISONII: PARKINSONUS et SWERTIUS folia nulla suis figuris addiderunt.

6. *Ann.* RAJUS *hist. II. p. 1160.* unterscheidet den Hyacinthum Hispanicum CLUSII von dem Anglico durch die Blätter, die nicht so glänzen und nicht nach unten hängen, sondern vielmehr aufrecht stehen, durch den kürzern Stengel, in welchem der Blumen Farbe und Geruch. Es zeigt aber des CLUSII Figur selbst abhangende Blätter, und ist eben diejenige, womit GERARDUS, LOBELIUS, DODONÆUS und JO. BAUHINUS den Anglicum surgestellt haben: der Hortus Eystettensis alleine zeigt aufrechte Blätter an, davon des MORISONII Figur eine Nachahmung ist. PARKINSONUS und SWERTIUS haben bey ihren Figuren die Blätter weggelassen.

TAB. 62. *Lat.* Laureola. *Germ.* Groß-Kellerhals. *Græc.* Δαφνοειδής. *Angl.* Spurge-Laurel, dvvarf Laurel. *Ital.* Laureola. *Gall.* Laureole.

1. Hic frutex ad trium pedum altitudinem ascendit: Folia saturate viridia sunt: flores e flavo virides.
2. Crescit in silvis & saltibus; mense Martio flores prodeunt, Septembri fructus maturefcunt.
3. Folia, ut & baccæ, præscribuntur a quibusdam ad bilem atque humores aqueos purgandos; nimis tamen vehementer supra & infra vim suam exercent. Audaces hydropicis eandem adhibent medicinam.

1. Diese Staude wächst 3. Fuß hoch, die Blätter sind dunkel grün, die Blumen gelblich-grün.
2. Es wächst in Wäldern und dicken Gebüsch, blühet im März und April, die Frucht ist reif im September.
3. Die Blätter und Beeren werden von einigen gebraucht, die Galle und wässerigte Feuchtigkeiten zu purgieren: allein sie greiffen mit grosser Heftigkeit sowohl ober als unter sich an. Einige verwegene Leute geben sie in der Wassersucht.

4. *NOM. GEN.* Laureola *Rai. II. 1587. Meth. 152. Syn. 465. Heuch. Ind. 7. Rupp. 40. Heist. Syst. 10. Thymelæa Tourn. 594. Boerb. II. 213. Vaill. 191. Hall. 187. Kram. 133. Ludvv. no. 132. Daphne Linn. Gen. no. 379. Roy. 208. Wachend. 256.*

5. *NOM. SPEC.* Daphnoides *Lob. ic. 368. Matth. 1217. Casalp. 150. cap. VI. Tab. ic. 1074 1075.* Daphne floribus racemosis lateralibus, foliis lanceolatis integris *Linn. H. 147. Roy. 208. Wachend. 256.* Laureola *Dod. 365. Lob. ic. 368. Ger. 1404. Park. 205. Rai. II. 1587. Syn. 465.* Laureola seu Daphnoides *Gesn. H. 264.* Laureola semper virens flore luteolo *J. B. I. 564.* Laureola semper virens flore viridi, quibusdam Laureola mas *C. B. pin. 462. Rupp. 41. Vaill. 191. Thymelæa Trag. 957. Thymelæa foliis perennibus Kram. 133. Thymelæa Laurifolio sempervirens sive Laureola mas Tourn. 595. Boerb. II. 213. Thymelæa floribus inter folia acuminata lævia duraque Hall. 188.*

TAB. 63. *Lat.* Sanicula, Diapensia. *Germ.* Sanickel, Berg-Sanickel. *Angl.* Sanicle, Self-Heal. *Ital.* Cinque-
© foglio maggiore. *Gall.* Sanicle. *Bat.* Sanickel.

1. Caules uno pede mensurantur. Folia diluto virore gaudent, flores alben.
2. Crescit in sylvis, & mense Majo floret.
3. Hæc planta inter vulnerarias præcipua est, & decoctis vulnerariis aliisque apozematibus traumaticis plerumque immiscetur. Usum igitur habet in omnibus hæmorrhagiis atque vulneribus, in rupturis internis, in contusionibus, ut & in sputo sanguinis. Ceterum tam intrinsecus quam extrinsecus applicatur.

1. Die Stengel wachsen einen Fuß hoch, die Blätter sind hellgras-grün, die Blumen weiß.
2. Es wächst in Wäldern und blühet im May.
3. Dieses ist eines von den vornehmsten Wund-Kräutern, und wird häufig unter die Wund-Träncke und ausheilende Arzneyen genommen, man pflegt es bey innerlichen Zersprengungen, Quetschungen, Blut auswerfen, und allen Verblutungen und Wunden, sowohl innerlich als äußerlich mit Nutzen zu gebrauchen.

4. *NOM. GEN.* Sanicula *Rai. I. 475. Meth. 53. Syn. 221. Tourn. 326. Riv. III. p. 15. Heuch. Ind. 38. Rupp. 279. Dill. 64. Boerb. I. 73. Vaill. 176. Heist. I. 27. Syst. 6. Linn. Gen. no. 244. Roy. 93. Hall. 449. Kram. 66. 67. 68. Ludvv. no. 679. Wachend. 14.*

5. *NOM. SPEC.* Sideritis tertia *Dioscoridis Col. Phytob. 71.* Diapensia *Dorft. 105. a. Brunf. I. 80. Camer. Ep. 763.* Diapensia seu Sanicula *Matth. 1019. Sanicula & Diapensia Lob. ic. 663. Ger. 948. Raj. I. 475. Syn. 221. Sanicula, Consolida quinquefolia Tab. ic. 84. Sanicula Ruell. 460. Trag. 509. Casalp. 556. Gesn. Hort. 278. b. Dod. 140. H. Eystett. Vern. O. VI. tab. 10. fig. 3. Riv. III. tab. 31. Dill. 64. Linn. H. 88. Roy. 93. Hall. 449. Kram. 66. 67. 68. Sanicula mas *Fuchsf. 671. Sanicula mas Fuchsf. sive Diapensia J. B. III. 639. Sanicula vulgaris sive Diapensia Park. 532. Sanicula officinarum C. B. pin. 319. Mor. Hist. Ox. II. 616. S. V. tab. 34. fig. 1. Tourn. 326. Rupp. 279. Boerb. I. 73. Vaill. 176. Heist. I. 27. Sanicula flore albido Heuch. Ind. 38. Sanicula foliis radicalibus simplicibus, flosculis omnibus sessilibus Linn. Flor. Suec. 78. Wachend. 14.**

Nota. Fig. I. 5. 6. 13. 16. ad exemplar Blackwellianum, Fig. II. 1-5. 7-15. ad naturæ ductum factæ sunt, quarum expositio hæc est: fig. 1. glomus florum, quem calyx communis comprehendit; fig. 2. calyx hic a tergo; fig. 3. flosculus perfectus seu androgynus separatus, fig. 4. idem in magnitudine aucta; fig. 5. ejus calyx proprius separatus in magnitudine naturali; fig. 6. calyx & corolla floris staminei seu masculini & sterilis; fig. 7. ejusmodi flos in magnitudine aucta; fig. 8. 9. hujus petalum & fig. 10. 11. stamen separatum in naturali auctaque magnitudine; fig. 12. ramulus fructifer, fig. 13. fructus separatus, fig. 14. ejusdem divisio, fig. 15. idem transversim dissectus, ex quo apparet, plerumque alterum tantum ex binis seminibus ad perfectionem pervenire; fig. 16. semen ab involucro suo hispido denudatum.

Ann. Fig. I. 5. 6. 13. 16. sind nach dem Blackwellischen Muster, Fig. II. 1-5. 7-15. nach der Natur gemacht, deren Erklärung folgende ist: fig. 1. ein Büschlein Blumen, welche ein allgemeiner calyx einschließt; fig. 2. dieser calyx von hinten, fig. 3. ein abgesondertes vollkommenes Blümlein, fig. 4. vergrößert, fig. 5. dessen abgesonderter besonderer calyx in natürlicher Grösse und vergrößert; fig. 6. calyx und corolla eines unfruchtbaren Blümleins, fig. 7. ein solches Blümlein vergrößert; fig. 8. 9. dessen Blättlein fig. 10. 11. stamen abgesondert in natürlicher Grösse und vergrößert; fig. 12. ein Frucht-tragendes Aestlein, fig. 13. eine abgesonderte Frucht, fig. 14. desselben Zertheilung, fig. 15. eben dieselbe über quer entzwen geschnitten, bey welcher zu ersehen, daß insgemein nur einer von den beyden Saamen zur Vollkommenheit komme; fig. 16. ein von seiner rauhen Decke entblösster Saame.

TAB. 64. *Lat.* Consolida media, Bugula. *Germ.* Guldene Günsel. *Græc.* Βυσάνιος Rencalm. *Angl.* Bugle, middle Confound. *Ital.* Bugola, Morandula, Consolida mezzana. *Gall.* Bugle. *Bat.* Senegroen.

1. Caulis floriger in altitudinem novem digitorum assurgit: Folia cum rubedine virent; Flores dilute cœrulei sunt.

2. Reperitur in sylvis & sepibus, mense Majo floret.

3. Idem herba est vulneraria notissima, ejusque usus tum internus tum externus in omnis generis læsionibus, vulneribus & contusionibus, ut & spuito cruento aliisque hæmorrhagiis, nec non in ulceribus inveteratis.

4. *NOM. GEN.* Bugula *Rai.* I. 575. *Meth.* 65. *Syn.* 245. *Tourn.* 209. *Riv.* I. p. 14. *Heuch.* Ind. 27. *Rupp.* 231. *Dill.* 49. *Boerh.* I. 184. *Vaill.* 23. *Heist.* I. 6. *Syst.* 7. *Hall.* 633. *Kram.* 49. 54. *Luduv.* no. 191. *Teucrium* *Linn.* *H. Cliff.* 301. & 303. in nota, *Roy.* 305. *Wachend.* 139. *Ajuga* *Linn.* *Gen. Ed.* I. no. 466. II. no. 557. *Flor. Suec.* no. 475. *Wachend.* 139.

5. *NOM. SPEC. I.* Verbenaca supina *Gesn. hort.* 285. a. *Prunella* *Dorst.* 237. a. *Prunella*, *Consolida minor* *Lonic.* 243. *Brunella cœrulea* prior *Trag.* 309. 311. *Consolida media* *Bruff.* I. 95. *Fuchs.* 391. *Matth.* 962. *H. Eystett. Fern.* O. I. tab. 6. fig. 1. *Consolida media* I. Tab. ic. 554. *Consolida media pratensis cœrulea* C. B. pin. 260. *Consolida media*, quibusdam *Bugula* *J. B.* III. 430. *Bugula* *Dod.* 135. *Ger.* 631. *Rai.* I. 575. *Syn.* 245. *Riv.* I. tab. 76. fig. 1. *Tourn.* 209. *Rupp.* 231. *Dill.* 49. *Boerh.* I. 184. *Vaill.* 23. *Bugula*, *Prunella* & *Consolida media* *Fuchsi* & *Matthioli* *Lob. ic.* 475. *Bugula vulgaris* *Park.* 525. *Bugula flore cœruleo* *Heist.* I. 6. *Bugula officinarum* *Heuch. Ind.* 27. *Bugula sylvatica vulgaris cœrulea* *Mor. H. Ox.* III. 391. S. XI. tab. 5. fig. 1. *Bugula folio integro subrotundo* *Kram.* 54. *Bugula foliis ovatis inter flores stipatis, flagellis repens* *Hall.* 634. *Teucrium foliis obverse ovatis crenatis, caule simplicissimo, stolonibus reptatricibus* *Linn. H. Cl.* 301. *Roy.* 306. *Wachend.* 139. no. 6.

II. *Consolida media major* *Thal.* 28. *Consolida media* II. Tab. ic. 555. *Consolida media Genevensis* *J. B.* III. 432. *Rai.* I. 575. *Bugula hirsuta Genevensis* *Morif. H. Ox.* III. 391. S. II. tab. 5. fig. 3. *Bugula alpina cœrulea* *Park.* 525. *Pluk. Phyt. tab.* XVIII. fig. 3. *Bugula montana* *Riv.* I. tab. 76. fig. 2. *Rupp.* 231. *Dill.* 72. *Bugula sylvestris villosa flore cœruleo* *Tourn.* 209. *Boerh.* I. 184. *Vaill.* 24. *Bugula folio integro oblongo dentato montana* *Kram.* 54. *Bugula foliis angulose dentatis, caule simplici* *Hall.* 635. *Ajuga tetragono-*
pyramidalis *Linn. Fl. Suec.* no. 475. p. 172. *Wachend.* 139.

6. *Nota.* Fig. I. 1. 6. 9. *Blackwelliani* exemplaris, Fig. II. 2. 5. 7. 8. naturæ imitationes sunt: ad priorem pertinent nomina no. I. ad posteriorem no. II. indicata. Multi utramque haud satis distinxerunt; *HALLERVS* hinc p. 635. jam monuit, figuras *DODONÆI*, *LOBELII* (adde *GERARDI* & *PAKINSONII* sunt namque eadem) ut & *MATTHIOLI* & *TABERNÆMONTANI* (hæ enim pariter ad earundem figurarum, non autem naturæ, ductum composuit videntur, licet *TABERN.* alteram magis hirsutam addiderit) posteriorem speciem propius exprimere, imo ipsum C. *BAUHINIUM* posteriori speciei in horto sicco asseruata tribuisse illud nomen inter synonyma prioris recensitum, cui in pinace synonyma prioris propria junxit. Nonnulli porro cum posteriori specie confundunt *Consolidam mediam alpinam* C. B. prodr. 120. *J. B.* III. 432., quam uterque figura addita satis distinxit. Neque vero etiam posterior semper eodem habitu comparet, sed in solo sicco multo humilior & compactior manet, qualem nostra figura sistit, in humidioribus vero locis elatior & magis explicata reperitur, prouti a *RIVINO* depingitur; unde minus superest dubium, *Ajuga tetragono-pyramidalis* *Linn.* esse omnino eandem cum nostra planta, prouti id ipse synonymis additis declaravit. Ejusdem porro folia non omnia profunde & angulose dentata deprehenduntur: infima saltem & nostræ fig. 2. a. a facie superiori, k. inferiori, æque ac figuræ *Rivini* a. ejusmodi denticulis profundis carent. Ceterum fructificationis partes, quas nos addidimus, sequentibus indicantur: fig. 2. integer flos a facie laterali, fig. 3. corolla a facie anteriori, fig. 4. laterali, fig. 5. dissecta a facie interiori, ubi a. calyx, b. labii inferioris seu barbæ segmentum medium bifidum, c. c. ejusdem segmenta lateralia, d. labium superius minimum seu galea, e. stamina cum stylo juncta & galeam longe superantia, f. f. stamina explicata, duo longiora & duo breviora. Fig. 7. est calyx & fig. 8. pistillum sigillatim, ubi g. stylus b. quatuor ovula e quorum medio ille surgit, l. m. indicantur stolones prioris speciei repentes.

ragente stamina, f. f. diese stamina ausgebreitet, davon 2. länger, 2. kürzer sind. Fig. 7. ist der calyx und fig. 8. das pistillum abgetrennt, wovon g. der stylus, h. die 4. ovula, aus deren Mitte dieser in die Höhe steigt. Endlich zeigen l. m. die kriechende Sprossen der ersten Art an.

1. Die Stengel, worauf die Blumen stehen, wachsen bis 9. Zoll hoch, die Blätter sind röthlich grün, die Blumen hell-blau.

2. Man findet es in Wäldern und Hecken und blühet im May.

3. Guldene Günsel ist ein bekanntes Wund-Kraut und wird innerlich und äußerlich gebraucht in allen Arten von Verletzungen, Wunden und Quetschungen, ingleichen bey offnen und alten Schäden, Blutauswerfen und andern Blutflüssen.

Anm. Fig. I. 1. 6. 9. sind nach dem *Blackwellischen* Muster, Fig. II. 2. 5. 7. 8. nach der Natur gemacht: zur ersten gehören die no. I. und zur andern die no. II. angezeigte Rahmen. Viele haben beyde nicht genug unterschieden: daher hat auch *HALLERUS* p. 635. schon erinnert, daß die Figuren des *DODONÆI*, *LOBELII* (dazu noch zu setzen *GERHARDI* und *PARKINSONI*, dann sie einerley sind) wie auch des *MATTHIOLI* und *TABERNÆMONTANI* (dann diese gleichfalls nach den gemelden Figuren und nicht nach der Natur verfertigt zu seyn scheinen, obgleich *TABERN.* eine andere mehr haarigte Figur dazu gethan hat) der zweyten Art näher kämen, ja daß auch selbst C. *BAUHINUS* der zweyten unter seinen gedruckten Pflanzen aufbehaltenen Art den unter den Synonymis der ersten Art angeführten Rahmen beigesetzt habe, welchen er doch im Pinace mit denen der ersten Art eigenen Synonymis vereinigt hat. Einige haben ferner mit der zweyten Art vermischt *Consolidam mediam Alpinam* C. B. prodr. 120. *J. B.* III. 432., welche beyde mit angefügten Figuren deutlich unterschieden haben. Es erscheint aber auch die zweyte Art nicht allezeit unter einerley Gestalt, sondern bleibet in einem trockenen Boden viel niedriger und dichter zusammen gesetzt, wie unsere Figur fürstellet; hingegen an feuchtern Orten wird sie höher und mehr aus einander gedehnet, der gleichen die *Rivini*ische Figur abbildet: daher wir desto weniger zweiffeln, daß die *Ajuga tetragono-pyramidalis* *Linn.* eben diese seye, dafür er sie auch mit den beigesetzten Synonymis erkläret hat. Ferner werden auch nicht alle Blätter dieser Art tief eingekerbt gefunden: wenigstens haben die untersten Blätter sowohl bey unserer fig. II. i. von oben k. von unten, als auch bey der *Rivini*ischen Figur dergleichen tiefe Kerben nicht. Im übrigen werden die von uns beigesetzte Blumen-Theile mit folgenden angezeigt: fig. 2. eine ganze Blume von der Seite, fig. 3. die Blumen-Blättlein von vornen, fig. 4. von der Seite, fig. 5. aufgeschnitten von innen, bey welchen a. der calyx, b. des labii inferioris oder barbæ mittlster gespaltener Theil, c. c. dessen beyde Seiten-Theile, d. das sehr kleine labium superius oder galea, e. die mit dem stylo vereinigte und über die galeam weit hervor

TAB. 65. *Lat.* Pœonia femina. *Germ.* Pängst-Rosen, Nicht-Rosen, Pœonien-Rosen, Weiblein. *Græc.* Παιωνία γλυκυκίδης, δινεία. *Angl.* Female Piony. *Hisp.* Rosa del monte, Rosa albardeira. *Ital.* Peonia. *Gall.* Pivoine, Pynoine. *Bat.* Picne-rooze.

1. Duos vel tres pedes alta est. Folia gramineam habent viriditatem: Flores coccinei sunt.

2. Coli-

1. Sie steigt 2. oder 3. Fuß hoch, ihre Blätter sind gras-grün, die Blumen schön Carmesin-roth.

G 3

2. Sie

2. Colitur in hortis, flores prodeunt mense Aprilique Majo.

3. Hæc planta in genere Pæoniæ mari substituitur & adhibetur in epilepsia, apoplexia, spasmodicis aliisque nervorum affectibus, juvenum senumque. Medetur obstructionibus mensium atque lochiorum aliisque uteri morbis. Radix & semina hujus plantæ collis infantum, qui dentire incipiunt, ad præcavendam epilepsiam solent appendi.

NOM. GEN. Pæonia Rai. H. I. 693. Metth. 77. Tourn. 273. Heuch. Ind. 21. Rupp. 162. Boerh. I. 294. Heist. I. 23. Linn. Gen. no. 531. Hall. 310. Kram 44. Wachend. 117. Pæonia Cæsalp. 588. Roy. 481. Ludvv. no. 715.

NOM. SPEC. I. Pæonia Trag. 581. Linn. H. 211. Roy. 481. Wachend. 117. Pæonia femina Fuchs. 202. Metth. 915. Cord. hist. 135. b. Ger. 981. Rai. I. 694. Gesn. hort. 270. a. Lob. ic. 682. Pæonia femina altera Dod. 194. Cæsalp. 588. Pæonia femina vulgaris flore simplici Park. 1380. Pæonia femina vulgatiores J. B. III. 493. Pæonia communis vel femina C. B. pin. 323. H. Ox. III. 454. Tourn. 274. Pæonia rubra flore simplici H. Eyst. Vern. O. 6. tab. 15. fig. 1. Pæonia folio non splendente femina, radice verticillata, folio strictiore subtus incano, flore rubente simplici Kram. 44. Pæonia foliis difformiter lobatis Hall. 311.

II. Pæonia flore pleno rubro J. B. III. 493. Raj. I. 696. Heist. I. 23. Pæonia polyphyllanthos Clus. hist. 279. Pæonia polyanthos flore rubro H. Eyst. Vern. O. 6. tab. 8. f. 1. Pæonia femina polyanthos Lob. ic. 684. Pæonia femina multiplici flore Gesn. hort. 270. a. Dod. 195. Pæonia femina multiplex Ger. 981. Tab. ic. 784. Pæonia femina flore pleno purpureo Park. 1380. Pæonia femina flore rubro pleno Rupp. 162. Pæonia femina flore pleno rubro majore C. B. pin. 324. H. Ox. III. 455. Tourn. 274. Boerh. I. 295.

III. Pæonia flore pleno rubro minor Clus. hist. 280. J. B. III. 494. Rai. I. 696. Pæonia flore pleno rubro minore C. B. pin. 324. Tourn. 274.

6. Nota. Ad Blackwellianam imaginem pertinere potissimum nomina no. III. indicata, facile patet; illam tamen varietatem no. II. expositam non nisi causis accidentalibus originem debere, nemò in dubium vocabit, quid? quod utramque ex illa no. I. recensita, tanquam matre, progenitam esse, non majori dubio premitur. Quamquam enim ejusmodi plantæ flore multiplici superbientes hanc formam constanter servare soleant; nihilominus tamen CLUSIUS I. c. jam annotavit, ex femine floris multiplicis natas fuisse soboles nonnullas pleno, alias simplici tantum flore condecoratas, quemadmodum circa alios flores plenos idem quotidiana experientia manifestat, unde etiam nullas plantas pleno flore instructas botanici considerant ut species ab illis simplici flore diversas.

2. Sie wird in Gärten gezogen, und blüht im April und May.

3. Diese Pflanze wird überhaupts anstatt der Pæonia maris gebraucht und in der fallenden Sucht, dem Schlag, und allen Arten der Gichter und Nerven Zufälle, sowohl bey jungen als alten gegeben. Es wird in Mutter-Umständen, Verstopfung der monatlichen und Kinderbetter Reinigung gerühmet. Die Wurzel und Samen werden den Kindern um den Hals gehendet, die fallende Sucht bey dem Zahnen zu verhüten.

Anm. Es ist leicht zu sehen, daß die no. III. angezeigte Nahmen zu dem Blackwellischen Gemählde fürnehmlich gehören; es wird aber auch niemand in Zweifel ziehen, daß die no. II. angeführte Veränderung nur aus zufälligen Ursachen seinen Ursprung habe, ja es ist auch eben so wenig zu zweifeln, daß beyde aus der no. I. fürgestellt, als von ihrer Mutter, erzeugt worden seyen. Denn obgleich dergleichen Pflanzen, die mit einer gefüllten Blume prangen, diese Gestalt beständig zu behalten pflegen, so hat nichts desto weniger CLUSIUS schon I. c. bemerkt, daß aus dem Samen einer gefüllten Blume einige Pflanzen mit gefüllter, andere mit einfacher Blume hervorkommen sind, wie eben solches bey andern gefüllten Blumen die tägliche Erfahrung weist, daher dann die Botanici keine Pflanzen mit gefüllter Blume von denen mit einfacher als besondere Arten unterscheiden.

TAB. 66. Lat. Cyanus major, Batifecula officinarum Cam. Germ. Grose Korn-Blume. Græc. Κόρυς. Angl. Great Blevvottle. Ital. Fior Campese, Fior Aliso, Battifuocera, Ciano Gall. Biver, Bluet. Bat. Groote Koornbloem.

1. Extenditur ad altitudinem octodecim digitorum: folia interius saturate, exterius dilute viridia, flores cærulei sunt.

2. Colitur in hortis & mense Junio floribus ornatur.

3. Etiam ad vulnerarias plantas refertur. Succus commendatur ad rupturas & contusiones a lapsu fortuito provenientes; item si vena quædam rumpatur & sanguinem vomat ægrotus. Alias quoque læsiones & vulnera recentia curare perhibetur.

4. NOM. GEN. Cyanus Rai. H. I. 321. Tourn. 445. Rupp. 182. Boerh. I. 145. Vaill. act. 1718. p. 184. Hall. 690. Heist. I. 11. Kram. 79. Jacea Rai. Meth. p. 41. no. 7. Centaurea Linn. Gen. 805. Ludvv. no. 466. Centaurea Linn. H. Cl. 420. Roy. 137. Wachend. 218.

5. NOM. SPEC. Verbasculum Trag. 219. Cyanus montanus Tab. ic. 150. Cyanus montanus vel sylvaticus Gesn. hort. 256. a. Cyanus montanus latifolius, vel Verbasculum Cyanoides C. B. pin. 273. Tourn. 445. Rupp. 182. Boerh. I. 145. Vaill. Act. 1718. p. 185. Cyanus montanus perennis latifolius flore grandi Moris. H. Ox. III. 134. S. 7. t. 25. f. 1. Cyanus perennis flore magno cæruleo Heist. I. 11. Cyanus Alpinus radice perpetua J. B. III. 23. Cyanus Alpinus folio lato Kram. 79. Cyanus major Lob. ic. 548. Metth. 507. Cam. Ep. 288. Dod. 251. H. Eystett. Vern. O. 7. tab. 6. f. 2. Ger. 732. Rai. I. 322. Cyanus major vulgaris Park. 482. Cyanus foliis integris subtus tomentosis, caule alato Hall. 692. Centaurea calycibus serratis, foliis lanceolatis integerrimis decurrentibus Linn. H. 422. Roy. 138. Wachend. 219. no. 8.

TAB. 67. Lat. Cotula foetida, Chamæmelum foetidum. Germ. Stinckende Camillen, Krötten Dill. Græc. Κρότον. Angl. Mayweed, foetid Camomile. Hisp. Manzanilla. Ital. Camamilla. Gall. Camenima, Camomille. Bat. Stinckende Camillen.

1. Alta ferme unum pedem. Folia e nigro viridia, flores albi, in quorum medio discus flavus conspicitur.

2. Reperitur in agris, aggeribus aliisque locis incultis, & per plures æstatis menses floret.

3. A quibusdam adhibetur in affectibus vaporosis

1. Sie wächst ohngefähr einen Fuß hoch, die Blätter sind dunkel grün, die Blume weiß mit einer gelben Scheibe in der Mitte.

2. Man findet es in Kornfeldern auf Angern und öden Orten, und blüht verschiedene Monate des Sommers.

3. Einige Autores geben diese Pflanze in Ueblichkeiten an

atque hystericis. RAIVS interdum ad tumores scrofulosos præscribi tradit. In Gallia prope Lutetiam dolores & tumores ex hæmorrhagiis ortos hac planta foveri asserit TOVRNEFORTIVS,

und Mutter Umständen. RAYVS sagt, sie werde manchmal in verhärteten oder scrofulösen Geschwülsten der Drüsen gebraucht. TOVRNEFORT schreibt, daß sie selbige in der Gegend um Paris zu Bähungen wider die Schmerzen und Geschwülsten, so von Blutsflüssen kommen, anwenden.

4. NOM. GEN. Chamæmelum Rai. I. 353. Meth. 37. Syn. 184. Tourn. 494. Rupp. 173. Dill. 122. Boerb. I. 109. Vaill. 34. Act. a. 1720. p. 316. Hall. 716. Luduv. no. 357. Chamomilla Siegesb. Cotula Heuch. Ind. 48. Anthemis Linn. Gen. no. 793. Fl. Suec. 252. Roy. 172. Wachend. 242.

5. NOM. SPEC. I. Parthenium Fuchs. 583. Cota Casalp. 492. Cotula foetida Ruell. 596. Brunf. I. 255. H. Eyst. Æst. O. frut. t. 10. f. 2. Ger. 157. (cum icone Cotula alba Dodonæi non conveniente) Park. 87. Rai. I. 355. Cotula foetida officinarum, est Parthenium vel Virginea Lob. ic. 773. (citata Dodonæi figura) Cotula flore albo vulgo chamomilla foetida Heuch. Ind. 48. Anthemis Dorst. 56. b. figura exterior. Anthemis foliis pinnato-decompositis laciniis linearibus, caulibus diffusis, radice annua Roy. 172. Anthemis receptaculis conicis, paleis setaceis, feminibus nudis Linn. Fl. Suec. 252. Wachend. 242. Chamomilla altera & Cotula foetida Trag. 147. Chamæmelum foetidum C. B. pin. 135. Rai. Syn. 185. Tourn. 494. Rupp. 173. Dill. 122. Boerb. I. 109. Vaill. 34. Act. 1720. p. 317. no. 2. Chamæmelum foetidum seu Cotula foetida J. B. III. 120. Chamæmelum sylvestre foetidum seu Cotula foetida Dod. 258. Chamæmelum annuum præcox foetidum semine aureo H. Ox. III. 36. S. VI. t. 12. f. 10. Chamæmelum foliis pene glabris, pinnis pinnatis, pinnulis latiusculis Hall. 717.

II. Bupththalmum Fuchs. 144. Cotula Tab. ic. 21. Cotula altera alba non foetida Dod. 258. Cotula non foetida Gesn. Hort. 291. Park. 87. Anthemis receptaculis conicis, paleis lanceolatis, feminibus coronato-marginatis Linn. Fl. Suec. 252. Chamomilla fatua Trag. 148. Chamæmelum inodorum C. B. pin. 135. Rai. Syn. 185. Tourn. 494. Rupp. 173. Dill. 72. Boerb. I. 109. Vaill. 35. Act. 1720. p. 318. no. 5. Chamæmelum inodorum sive Cotula non foetida J. B. III. 120. Chamæmelum annuum serotinum foliis obscure virentibus flore maiore H. Ox. III. 35. S. VI. t. 12. f. 8.

b. Nota. Nomina no. I. recensita ad Fig. 1. 8. 9. Blackveliani exemplaris, illa vero no. II. ad nostras additas Fig. 2. — 7. 10. — 12. pertinent. Nonnulli utramque speciem habent tantum pro varietatibus & quidem tam levibus, ut non, nisi odore, discerni queant. Alii vero dudum iam observarunt, posterioris flores esse maiores eorumque pediculos longiores, quibus notis alias adhuc ex ipsis fructificationis partibus petitis nuper demum iunxit LINNÆVS, ut patet ex eius nominibus supra citatis. Repræsentant autem fig. 2. integrum florem a facie anteriori fig. 3. posteriori & supra hanc a laterali facie & in his a. radium, b. discum, c. calycem communem; fig. 4. radii semiflosculi extremum inferius, fig. 5. disci flosculum in magnitudine naturali fig. 6. aucta fig. 7. eius limbum quinque-partitum, d. e. ovulum, cui insitit; fig. 10. semina matura in magnitudine naturali, fig. 11. aucta cum vertice coronato, fig. 12. folium huius speciei separatim.

b. Ann. Die no. I. angezeigte Rahmen gehören zu der fig. 1 8. 9. des Blackwellischen Modells, die aber no. II. zu denen von uns beigefügten fig. 2 — 7. 10 — 12. Einige halten beyde Arten nur für Varietäten, und zwar für so geringe, daß sie nur alleine durch den Geruch könnten unterschieden werden. Es haben aber andere schon längstens angemerkt, daß die Blumen der zweyten grösser und ihre Stengel länger seyn, welchen Kennzeichen noch andere, von den Theilen der Blüthe selbst hergenommene, LINNÆVS ohnlängst beigefügt hat, wie solche aus seinen obenangezeigten Rahmen zu erkennen sind. Es zeigt aber fig. 2. eine ganze Blume von vornen, fig. 3. von hinten und ober dieser von der Seite und dabey a. den Umkreis, b. die Scheibe, c. den gemeinschaftlichen calycem; fig. 4. das unterste Ende eines Halb-Blümleins des Umkreisses, fig. 5. ein Blümlein der Scheibe in natürlicher Grösse, fig. 6. vergrößert, fig. 7. dessen fünffach getheilte Mündung, d. e. das ovulum, worauf sie steht; fig. 10. zeitige Saamen in natürlicher Grösse, fig. 11. vergrößert mit seinem gekrönten Scheitel, fig. 12. ein abgesondertes Blatt dieser Art.

TAB. 68. Lat. Thlaspi. Germ. Bauern-Senff. Græc. Θλάσπι. Angl. Threacle-Mustard, Penny-Cress. Hisp. Paniqueño de flor blanco. Ital. Thlaspi. Gall. Seneve sauvage. Bat. Boeren-kerste, Wilde Mostaert.

1. Hæc planta unum pedem alta folia habet dilute viridia, flores albos.

2. Crescit in agris, & mense Majo flores producit.

3. Calida est atque sicca, & ad urinam promovendam solet adhiberi, usum quoque præstat in hydrope, arthritide, malo ischiatico, præcipue in mensium fluxu ciendo. Semen Theriacum & Mithridatum ingreditur, cujus loco tamen sumitur sæpissime semen Thlaspi vulgarissimi, siquidem, quantum sufficit, vix reperiri potest.

4. NOM. GEN. Thlaspi Rai. I. 830. Meth. 98. Syn. 305. Tourn. 212. Heuch. Ind. 13. Rupp. 86. Dill. 72. Boerb. II. 7. Vaill. 191. Heist. II. 28. Syst. 9. Linn. Gen. no. 648. Roy. 333. Kram. 21. Luduv. no. 418. Wachend. 170. Nasturtium Ord. II. Hall. 544.

5. NOM. SPEC. Thlaspi Ruell. 409. Thlaspi II. Matth. 567. Cam. Ep. 337. Thlaspi verum Gesn. Hort. 284. a. Thlaspi Dioscoridis Ger. 262. Rai. I. 831. Syn. 305. Thlaspi Discoridis Drabæ & Chamælinæ folio Lob. ic. 212. Thlaspi Drabæ folio Park. 836. Thlaspi maius Tab. ic. 458. Thlaspi latius Dod. 712. Thlaspi cum siliquis latis J. B. II. 923. Thlaspi arvense siliquis latis C. B. pin. 105. Moris. Hist. Ox. II. 293. S. 3. t. 17. f. 12. Tourn. 412. Rupp. 86. Dill. 72. Boerb. II. 7. Vaill. 191. Thlaspi arvense flore candido Heuch. Ind. 13. Thlaspi arvense vulgare capsulis amplis cordiformibus Heist. II. 28. Thlaspi flore albo, folio mucronato viridi non perfoliato, filiculis latis glabris Kram. 21. Thlaspi filiculis orbiculatis, foliis oblongis dentatis glabris Linn. H. Cl. 330. Fl. Suec. 193. Roy. 333. Wachend. 170. Nasturtium filiculis orbiculatis, foliis oblongis dentatis glabris Hall. 545.

TAB. 69. Lat. Iris nostras hortensis. Germ. Blaue Garten-Gilgen oder Lilien, Himmel-Schwertel, blaue Schwert-Lilie. Græc. Ἴρις. Angl. Garden Floerverde-Luce. Hisp. Lirio cardeno. Ital. Giglio celeste. Gall. Flambe. Bat. Lisch, Liefch, Lies-bloem.

1. Decem & octo digitorum altitudinem attingit, folia lucide virent, flores cæruleo-purpurei sunt.

2. Co.

1. Sie wird 18. Zoll hoch, die Blätter sind lichtgrün, die Blumen blaupurpurfarbig.

H

2. Es

2. Colitur in hortis & mense Majo floret.
3. Succus radicis naso attractus fortiter excitat sternutationem, purgat capitis atque cerebri tenues humores. Decoctum radicis saturatum vomitum ciet vehementiorem, Insimul usum præstat in hydrope, ictero & quibusdam febribus. Sed hoc medicamentum vomitorium stomachum valde offendit.

4. NOM. GEN. Iris Rai. II. 1180. Meth. 118. Tourn. 358. Rupp. 31. Boerh. II. 123. Vaill. 109. Heist. Syst. 5. Linn. Gen. no. 49. Roy. 17. Kram. 46. Luduv. no. 8. Wachend. 318.

5. NOM. SPEC. I. Iris Dorst. 169. b. Tab. ic. 643. Casalp. 421. Blau Gilgen Brunf. Arb. cxii. Iris cœrulea Dod. 243. Iris communis Gesn. Hort. 262. b. Iris vulgaris Ger. 50. Rai. II. 1180. Iris purpurea live vulgaris Park. Parad. 181. Iris maior latifolia Park. Th. 255. Iris domestica Matth. 16. Cam. Ep. 1. Iris Germanica Fuchs. 316. b. Trag. 703. Iris nostras sativa Cord. Hist. 132. b. Iris nostras vulgaris Lob. ic. 59. Iris latifolia vulgaris cœrulea H. Eyst. Vern. O. 8. t. 5. f. 2. Moris. Hist. Ox. II. S. 4. t. 5. f. 4. Iris hortensis latifolia C. B. pin. 31. Tourn. 358. Boerh. II. 124. Vaill. 109. Iris hortensis latifolia elatior Kram. 46. Iris vulgaris violacea live purpurea hortensis & sylvestris F. B. II. 709. Iris corollis barbatis, caule foliis longiore multifloro Linn. H. Cliff. 18. Roy. 17. Wachend. 318.

II. Iris vulgaris sylvestris Matth. 17. Cord. Hist. 133. Tab. ic. 648. Iris sylvestris maior Cam. Ep. 2. Iris vulgaris Germanica live sylvestris C. B. pin. 30. Tourn. 358. Rupp. 31. Moris. H. Ox. II. 350.

6. Nota. Iridium hortensem habitu suo a sylvestri non nisi ex cultura folique bonitate differre, multi quidem testantur auctores; eos tamen, qui differentiam inter utramque indicant, præterire nolumus.

2. Es wird in Gärten gezogen und blühet im May.
3. Der Saft aus der Wurzel ist ein starkes Niesen-erweckendes Mittel, wenn er in die Nase gezogen wird, er reiniget Haupt und Hirn von dinnen Feuchtigkeiten. Ein starkes Decoctum der Wurzel wenn es eingegeben wird, verursacht heftiges Brechen, und wird nützlich gebraucht in der Wassersucht, der Gelbsucht und einigen Fiebern. Dieses Brech-Mittel ist dem Magen sehr schädlich.

Ann. Daß die Garten Schwert-Lilie in der Gestalt von der wilden nicht anders, als durch die Güte der Wartung und des Erdbodens unterschieden seye, bezeugen zwar viele Auctores: doch haben wir diejenige, die den Unterscheid angezeigt haben, nicht vorben gehen wollen.

TAB. 70. Lat. Lilium convallium. Germ. Mayen-Blümlein. Angl. Lillies of the Valley, Convall Lillies, Lilly convally, May Lilly. Ital. Lilio convallio. Gall. Muguet. Bat. May-blœmken, Lelie van den daalen.

1. Altitudinem octo vel decem digitis metimur, folia sunt viridia, flores albi.

2. Crescunt in vallibus, præcipue autem in hortis, ac mense Majo & Junio flores agunt.

3. Usus habent egregium in variis capitis atque nervorum morbis, scilicet in apoplexia, epilepsia, paralyti, spasmo atque vertigine. Immiscetur frequenter pulveribus cephalicis ad ciendum sternutamentum, ut & larga in copia Aquæ Pæoniæ compositæ, Spiritui Lavendulæ composito, nec non Aquæ Antiepilepticæ.

* Quam in folio hujus plantæ delineatam vides erucam, hanc ibidem invenimus, licet alias fructiferis plerumque insideat arboribus, suæque inde rapiat alimenta: quia diversis coloribus prædita est, Laquey vocari solet.

4. NOM. GEN. Lilium convallium Rai. I 667. Meth. 73. Syn. 264. Tourn. 77. Rupp. 51. Dill. 56. Boerh. II. 64. I. 18. Syst. 5. Convallium Kram. 1. 3. Convallium flos Rivini Heuch. Ind. 9. Rupp. 51. Convallaria Linn. Gen. no. 341. Roy. 25. Luduv. no. 127. Wachend. 299. Liliago Vaill. 116. Maianthemum Siegesb. Fl. 70. Polygonatum Hall. 286.

5. NOM. SPEC. Ephemerum non lethale Fuchs. 240. Lilium convallis vel sylvestre Lilium Brunf. I. 211. Lilium convallium Dorst. 171. b. Trag. 572. Matth. 875. Cam. Ep. 618. Dod. 205. Casalp. 224. Tab. ic. 754. Ger. 410. Rai. I. 667. Syn. 264. Lilium convallium vulgo F. B. III. 531. Hist. Ox. III. 539. S. 13. t. 4. f. 1. Lilium convallium vulgo dictum, Callionymus vel Chamæcytinus dicendum Gesn. Hort. 265. a. Lilium convallium vel vernum Theophrasti Lob. ic. 172. Lilium convallium Tournefortii & officinarum Rupp. 51. Lilium convallium flore albo H. Eyst. Vern. O. 9. t. 6. f. 2. Park. Parad. 349. 351. f. 1. Heist. I. 18. Lilium convallium album C. B. pin. 304. Tourn. 77. Dill. 56. Boerh. II. 64. Convallium flore albo Kram. 3. Convallium flores flore albo, vulgo Lilium convallium Heuch. Ind. 9. Convallaria scapo nudo Linn. H. Cliff. 124. Roy. 26. Wachend. 299. Liliago, Lilium convallium album Vaill. 116. Majanthemum flore albo simplici Siegesb. Fl. 70. Polygonatum bifolium scapo florifero aphylo Hall. 186.

6. Nota. LINNÆVS atque HALLERVS ex Lilio convallium & Polygonato unum genus constituunt: hic Polygonati nomen retinet, ille novum excogitavit; sed LVDWIGVS utrumque genus iterum distinguit. Figuris a nobis additis representantur fig. 2. scapus floriger in magnitudine ordinaria, fig. 3. corollæ limbus a facie anteriori, fig. 4. Corolla dissecta a facie interna cum adhærentibus quinque staminibus a. a., fig. 5. eadem in magnitudine aucta, fig. 6. stamen separatum, fig. 7. pistillum in magnitudine naturali fig. 8. aucta.

Ann. LINNÆVS und HALLERVS haben aus dem Lilio convallium und Polygonato ein Geschlecht gemacht: Dieser hat den Rahmen Polygonatum behalten, jener einen neuen ausgedacht, LVDWIGVS aber beyde wieder unterschieden. Durch die von uns beygesetzten Figuren werden sîrgestellt fig. 2. der Stengel mit der Blûthe in der ordentlichen Gröfse, fig. 3. die Deffnung der Blume von der vordern Ansicht, fig. 4. eine aufgeschnittene Blume von innen mit denen daran hângenden staminibus a. a., fig. 5. eben so vergröfsert, fig. 6. ein abesondertes stamen, fig. 7. das pistillum in der natürlichen Gröfse, fig. 8. vergröfsert.

TAB. 71. Lat. Salvia minor, Salvia virtutis, Salvia nobilis. Germ. Spigiger Salbey, schmaler Salbey, Kreuz-Sauge, Sauge franche. Belg. Kleiner Savie. Angl. Sage of vertue. Hiss. Salva minore. Ital. Salvia minore. Gall. Petit S. Cau.

1. Caulis altitudo ad 18 digitos ascendit; Folia subviridia, flores autem subpurpurei sunt.

2. Crescit in hortis, Majus & Junius sistit florentem.

3. Insignem præstat usum in omnibus capitis ac nervorum affectibus, videlicet in paralyti, convulsionibus aliisque; adhibetur etiam in obstructionibus uteri, ut & in omni generis febribus. Folia ingrediuntur Aquam Antepilepticam, Antiparalyticam, Vitæ compositam; syrupum stœchados, Vnguentum martiatum Casp. Commelini.

4. NOM. GEN. Vid. TAB. 10. no. 4.

5. NOM. SPEC. *Salvia Dorst. 256. b. Salvia minor Casalp. 441. Fuchs. 249. Dod. 290. Tab. ic. 371. Lob. ic. 555. Cam. Ep. 476. Ger. 764. Rai. I. 510. Riv. I. tab. 71. fig. 2. Heuch. Ind. 27. Rupp. 223. Salvia minor sive Sphacelus Matth. 710. Salvia minor sive pinnata Parck. Parad. 475. fig. 7. 478. Theatr. 50. Salvia minor pinnata H. Eyst. Æst. Ord. 8. tab. 1. fig. 3. Salvia minor auriculata J. B. III. 305. Salvia minor aurita & non aurita C. B. pin. 237. Hist. Ox. III. 400. Sect. XI. tab. 15. fig. 11. Tourn. 181. Boerb. I. 166. Salvia angustifolia Trag. 52. Salvia folio ovali aurito Kram. 53. Salvia folio angustiori & candidiori seu nobilis & aurita Gesn. Hort. 278. a. Salviæ foliis lanceolato-ovatis integris crenulatis, floribus spicatis, calycibus acutis, varietas » Linn. H. Cliff. 12.*

6. Nota. Folia huius speciei nunc simplicia, nunc pinnata seu ad basin interdum uno tantum in latere, interdum in utroque, exiguo appendice instructa esse, hancque varietatem quandoque in eadem planta occurrere, iam observavit C. BAVHINVS l. c. adeoque non nisi varietatem inconstantem indicant: in Blackwelliana figura I. omnia folia apparent simplicia. Floris color communiter ex cœruleo purpurascit, qualem monstrat nostra Fig. II., haud raro reperitur purpureus Fig. I.: num constans propagetur, uti albus, qui in hac specie non minus frequens est, dubii adhuc sumus. Floris fructusque partes indicantur his: a. fig. 2. 3. 4. corollæ labium superius seu galea; b. fig. 2. 3. 4. labium inferius seu barba; fig. 5. idem separatum & explanatum a facie interna, cuius media lacinia c. c. maior & emarginata est, duæ laterales d. d. minores & integre sunt; e. e. fig. 5. stamina duo, singula bifurcata; g. fig. 3. calyx bilabiatus, cuius labium superius g. fig. 6. 9. in tres, inferius h. 8. b. fig. 6. in duos dentes acutos fissum est; i. fig. 6. 7. stylus cum stigmate duplici, quod extralabium corollæ superius i. fig. 3. 4. prominet; k. fig. 7. quatuor ovula circa styli basin, fig. 10. 11. totidem semina matura.

1. Der Stengel wird 18 Zoll hoch, die Blätter sind bleichgrün die Blumen blaspurpurfarbig.

2. Es wächst in Gärten und blüht im May und Juny.

3. Es ist gut in allen Beschränkungen des Hauptes und der Nerven, als in der Lähmung, Sichterz. Man bedient sich desselben gleichfalls in Mutterverstopfungen, und allen Arten der Fieber. Die Blätter nimmt man zur Aqua antepileptica, antiparalytica, vitæ composita, syrupo stœchados, unguento Martiato Casp. Commelini.

Anm. Daß die Blätter dieser Art manchmal einfach sind, manchmal am Grunde nur an einer, manchmal an beiden Seiten einen kleinen Zusatz haben, und daß diese Abwechslung öfters an einer Pflanze vorkomme, hat C. BAVHINVS l. c. schon beobachtet, welches also eine unbeständige Veränderung anzeigt: in der Blackwellischen fig. I. sind sie alle nur einfach. Die Farbe der Blume ist gemeinlich aus dem Blauen purpurfarbig, wie solche unsere fig. II. zeigt, nicht selten ist sie ganz purpurroth fig. I.: ob sie beständig so fortgepflanzt werde, wie die weisse, die in dieser Art auch nicht selten ist, sind wir noch ungewiß. Die Theile der Blume und der Frucht werden mit folgenden angezeigt: a. fig. 2. 3. 4. der obere Theil der Blume; b. fig. 2. 3. 4. der untere; fig. 5. eben dieser abgesondert und ausgebreitet von der innwendigen Ansicht, dessen mittlere Abtheilung c. c. die grösste und ausgeschnitten ist, die zweien Seitenabtheilungen d. d. kleiner und ganz sind; e. e. fig. 5. die zweien stamina, deren jedes wie eine Gabel doppelt ist; g. fig. 3. der calyx bilabiatus, dessen obere Abtheilung g. fig. 6. 9. in drei, die untere fig. 8. h. fig. 6. in zweien spizige Zähne gespalten ist; i. fig. 6. 7. der stylus mit einem doppelten stigmate, welcher ausser dem obern Theil der Blume i. fig. 3. 4. vorragt; k. fig. 7. die vier ovula um die Gegend des styli, fig. 10. 11. eben so viele zeitige Saamen.

TAB. 72. Lat. Alchimilla, Pes Leonis. Germ. Sinau, Frauenmantel, Guldengänserich. Angl. Ladies Mantle.

© Ital. Stellaria. Gall. Pié de Lion. Belg. Sinnauvv, Vrouvvenmantel.

1. Altitudinem metitur pes unicus: Folia ad instar graminis viridia, flores autem e flavo virides sunt.

2. Crescit in pratis & pascuis & mense Majo flores explicat.

3. Pertinet ad herbas vulnerarias, siccatur, adstringit, condensat & consolidat. Medetur etiam internis hæmorrhagiis, nec non nimio mensium fluxui, ut & fluori albo. Folia extrinsecus applicata flaccidas feminarum mammas firmare atque ad meliorem formam redigere dicuntur.

4. NOM. GEN. Alchimilla Rai. I. 208. Meth. 23. Syn. 158. Tourn. 508. Dill. 67. Boerb. II. 92. Heist. Syst. 11. Hall. 184. Ludvv. no. 764. Alchemilla Linn. Gen. no. 122. Roy. 231. Wachend. 249. Alchymilla Rupp. 64. Heist. I. 2. Kram. 19. 88.

5. NOM. SPEC. Herba vulneraria Brunf. II. 57. Drosium Cord. Hist. 147. b. Stella herba Gesn. Hort. 283. a. Stellaria Matth. 1177. Cam. Ep. 908. Pes leonis Brunf. III. 79. Fuchs. 612. Pes leonis sive Alchimilla J. B. II. 398. i. Alchimilla Dorst. 22. b. Trag. 512. H. Eyst. Vern. Ord. VI. tab. 10. f. 2. Casalp. 557. Lob. ic. 663. Dod. 140. Ger. 949. Rai. I. 208. Syn. 158. Alchymilla officinarum Heist. I. 2. Alchimilla, Stellaria Tab. ic. 86. Alchimilla vulgaris Clus. CVIII. C. B. pin. 319. Tourn. 508. Rupp. 64. Dill. 67. Boerb. II. 92. Alchimilla maior vulgaris Park. 538. Alchymilla virens Kram. 19. Alchymilla maior & minor Eiusd. 88. Alchimilla perennis viridis maior, foliis ex luteo virentibus H. Ox. II. 195. S. H. tab. 20. fig. 1. Alchimilla folio integro stellato polygonio Hall. 184. Alchemilla foliis palmatis Linn. H. Cliff. 38. Roy. 231. Wachend. 249.

6. Nota. Fig. I. 1. 7. ad exemplar Blackwellianum, reliquæ ad naturæ ductum, hæc secundum plantam iuniorum, illæ secundum adultam factæ sunt. Siliuntur autem fig. 1. 2. flos integer a facie anteriori, seu superiori, fig. 3. in magnitudine aucta, ubi a. a. a. a. perianthii seu calycis segmenta quatuor exteriora & angustiora, b. b. b. b. totidem interiora & latiora alterno ordine invicem juncta, ut & in medio quatuor stamina admodum exigua apparent; fig. 4. flos integer a facie laterali, fig. 5. in magnitudine aucta, fig. 6. verticaliter dissectus, ubi c. ovulum cum stylo simplici filiformi in vertice & duo stamina ad latus conspiciuntur; fig. 7. 8. semen maturum, fig. 9. in magnitudine aucta.

1. Es wird einen Fuß hoch mit grasgrünen Blättern und gelblichgrünen Blumen.

2. Es wächst auf Wiesen und Waiden, und blüht im May.

3. Dieses Kraut gehöret unter die Wundkräuter, trocknet, ziehet zusammen, verdicket und heylet, hat viele Krafft die innerliche Verblutungen zu stillen, wie in gleichen die allzustarke Reinigung und den weissen Fluß. Die Blätter dienen, wenn sie äußerlich gebraucht werden, die hangenden Brüste anzuziehen, und selbige fester und kleiner zu machen.

4. Es wird einen Fuß hoch mit grasgrünen Blättern und gelblichgrünen Blumen.

5. Dieses Kraut gehöret unter die Wundkräuter, trocknet, ziehet zusammen, verdicket und heylet, hat viele Krafft die innerliche Verblutungen zu stillen, wie in gleichen die allzustarke Reinigung und den weissen Fluß. Die Blätter dienen, wenn sie äußerlich gebraucht werden, die hangenden Brüste anzuziehen, und selbige fester und kleiner zu machen.

Anm. Fig. I. 1. 7. sind nach dem Blackwellischen Muster, die übrigen nach der Natur, diese nach einer jungen Pflanze, jene nach einer erwachsenen gemacht. Es werden damit vorgestellt fig. 1. 2. ein ganzes Blümlein nach der vordern oder obern Ansicht, fig. 3. vergrößert, allwo a. a. a. a. des calycis vier auswändige schmälere Einschnitte, b. b. b. b. eben so viel innwendige und breitere, welche in abwechselnder Ordnung neben einander stehen, und in der Mitte vier sehr kleine Stamina zu sehen sind; fig. 4. ein ganzes Blümlein von der Seite, fig. 5. vergrößert, fig. 6. der Länge nach entzwey geschnitten, allwo c. das ovulum mit dem darauf stehenden einfachen fadenförmigen stylo, und zwey stamina zur Seite zu sehen; fig. 7. 8. der zeitige Saame, fig. 9. vergrößert.

TAB. 73. *Lat.* Rosa alba. *Germ.* Weiße Rosen. *Græc.* Ρόδον λευκόν. *Angl.* White Rose. *Hisp.* Rosas blancos. *Ital.* Rosa bianca. *Gall.* Rosés blanches. *Belg.* Witte Roos.

1. Hic frutex ceteris, qui rosas ferunt, altior assurgit; ramorum spinæ sunt pauciores, sed & latiores: folia profert e nigro viridia, flores sunt albi.

2. Crescunt hæ rosæ in hortis, & mense Junio prodire solent.

3. Vim habent exsiccantem, adstringentem atque refrigerantem. Aqua ex his destillata sæpissime in oculorum inflammationibus extrinsecus adhibetur, & in omnibus officinis prostat.

4. NOM. GEN. Vid. Tab. 8. no. 4.

5. NOM. SPEC. Rosa alba *Dorst.* 249. *b. Ger.* 1206. *Rai.* II. 1273. *Tab. ic.* 1083. Rosa anglica alba *Park. Parad.* 412. Rosa alba vulgaris maior *C. B. pin.* 482. *Tourn.* 637. *Rupp.* 138. *Vaill.* 173. Rosa hortensis alba multiplici flore *Gesn. Hort.* 276. *a.* Rosa flore albo *Heist.* I. 26. Rosa flore albo pleno *H. Eyslett.* *Vern. Ord.* VI. tab. 3. fig. 1. *Boerh.* II. 251. Rosa candida *Casalp.* 96. Rosa candida plena & semiplena *J. B.* II. 44. Rosa sativa flore candido *Dod.* 187.

1. Dieser Strauch wächst höher als die meisten übrigen Arten der Rosen, die Stacheln an den Aesten sind weniger und ziemlich breit, die Blätter sind dunkelgrün, die Blumen weiß.

2. Sie wachsen in Gärten, und blühen im Juny.

3. Die Blumen trocknen, ziehen zusammen und kühlen; das davon destillierte Wasser wird öftters zum äußerlichen Gebrauch in bösen entzündeten Augen genommen, und ist in den Officinen zu finden.

TAB. 74. *Lat.* Elleborum album, Helleborus albus, Veratrum album. *Germ.* Weiße Nieswurz. *Græc.* Ἑλλεβορός λευκός. *Angl.* White Hellebore. *Hisp.* Verdegambre blanco, Yerva balleste. *Ital.* Elleboro bianco, Veladra. *Gall.* Ellebore blanc, Veratre, Veraire. *Belg.* Witte Neesvortel.

1. Caules ad duos vel tres pedes extenduntur: folia saturate viridia, flores subvirides vel e nigro purpurei sunt.

2. Crescit in montosis regionibus Helvetiæ, Austriæ atque Stiriæ. Nostrates colunt in hortis, ubi mense Junio flores conspiciuntur.

3. Radix vehementissime purgat, unde rarissime intrinsecus sumitur. In pulverem redacta sternutamentum excitat violentum si naribus attrahatur: vix igitur, nisi cum aliis permixta, adhiberi solet. Usus tamen non exiguum præstat in omnibus cutis affectibus, psora scilicet, scabie, impetigine &c. In officinis Anglicanis Electuarium ex Helleboro asseruatur.

2. Der Stengel steigt 2 bis 3 Fuß hoch, die Blätter sind dunkelgrün, die Blumen bleichgrün oder dunkel Purpurfarb.

2. Es wächst in den gebürgigen Theilen der Schweiz, in Oesterreich und Steyermark; bey uns wird es in den Gärten gepflanzt und blüht im Juny.

3. Die Wurzel purgieret mit grosser Heftigkeit, und wird daher selten innerlich gegeben. Die gepulverte Wurzel verursacht ein starkes Niesen, wenn es in die Nase gezogen wird, daher wird es nicht leicht ohne mit andern Ingredientien vermischet zum Schnupfen gegeben. Diese Pflanze braucht man äußerlich mit guten Nutzen in allen Krankheiten der Haut, als Räudigkeit, Krätze, Flechten und dergleichen. In den Officinen in England hat man das Electuarium ex Helleboro.

4. NOM. GEN. Helleborus albus *Raj.* I. 168. *Meth.* 77. *Heist.* Syst. 28. 35. 41. 42. Veratrum *Tourn.* 272. *Heuch.* Ind. 20. *Rupp.* 155. *Boerh.* I. 296. *Heist.* I. 31. Syst. 41. 42. *Linn.* G. no. 923. *Roy.* 45. *Hall.* 298. *Kram.* 42. 68. *Ludov.* no. 731. *Wachend.* 306.

5. NOM. SPEC. I. Elleborum album floribus herbaceis *Casalp.* 580. Elleborus albus *Fuchs.* 271. *Brunf.* III. 3. *Cord.* hist. 165. *a.* *Trag.* 408. *Matth.* 1219. *Gesn. Hort.* 257. *b.* an Elleborus albus mas maior & durior *Eiusd. de Stirp. coll.* 75? Elleborus albus exalbido flore *Clus.* H. 274. Elleborus albus vulgaris *Park. Parad.* 346. Helleborum five Veratrum album *Dod.* 383. *Lob. obs.* 167. *ic.* 311. Helleborus albus *Cammer.* *Krauterb.* 420. *a.* *Ger.* 440. *Raj.* I. 186. Helleborus albus mas *Tab. Kräuterb.* 1096. *ic.* 720. Helleborus albus vulgaris *Park. Theatr.* 217. Helleborus albus flore herbaceo *H. Eysl. Æstiv. Ord.* VIII. tab. 9. fig. 1. Helleborus albus flore ex herbaceo albicante *J. B.* III. 634. Helleborus albus flore subviridi *C. B. pin.* 186. *Hist. Ox.* III. 485. *Secl.* XII. tab. 4. fig. 1. *Weinm.* T. III. 106. tab. 568. *d.* Veratrum seu Helleborus albus *Heist.* I. 31. Veratrum *Linn.* H. *Clif.* 468. *Roy.* 45. *Hall.* 298. *Wachend.* 306. Veratrum album *Cord. in Diosc.* 73. *b.* *Lonic.* *Hist. nat.* T. I. 172. *b.* Veratrum flore herbaceo *Kram.* 42. Veratrum flore subviridi *Tourn.* 273. *Heuch.* Ind. 20. *Boerh.* I. 296.

II. Ellebori albi alterum genus foliis latioribus, lævioribus ac magis virentibus, floribus purpureis *Casalp.* 580. an Elleborus albus femina maior & mollior *Gesn. stirp. coll.* 75? Elleborum album flore atro-rubente *J. B.* III. 634. Elleborum five Veratrum album fulvo colore *Cammer.* *Ep.* 939. Elleborus albus flore ex purpura nigricante *Clus.* *Hist.* 274. Helleborum album floribus atro-rubentibus præcox *Lob. obs.* 168. *ic.* 311. Helleborum five Veratrum album floribus nigricantibus *Dod.* 383. Helleborus albus femina *Tab. ic.* 721. Helleborus albus præcox *Ger.* 440. Helleborus albus præcox atro-rubente flore *Park. Parad.* 346. *Theatr.* 217. *Raj.* I. 169. Helleborus albus vernus atro-rubente flore *Park. Parad.* 343. fig. 5. Helleborus albus flore atro-rubente *C. B. pin.* 186. *H. Eysl. Æst. Ord.* VIII. tab. 9. fig. 2. *Hort. Reg. Paris.* 86. *Hist. Ox.* III. 485. *Secl.* XII. tab. 4. f. 2. *Weinmann.* *Tom.* III. 107. tab. 568. *e.* Veratrum flore atro-rubente *Tourn.* 273. *Heuch.* Ind. 20. *Boerh.* I. 296. Veratrum flore atro-virente *Kram.* 42. Veratrum flore ferrugineo *Rupp.* 155.

6. *Nota.* Colorem floris exalbidum, herbaceum, ex herbaceo albicantem & subviridem seu, uti *HALLERVS* p. 299. accuratius definit, obsolete album lineis virentibus, speciei no. I. recensitæ; itemque purpureum, nigricantem, ex purpura nigricantem, atro-rubentem, atro-virentem, fulvum & ferrugineum alterius speciei no. II. propositæ, plurimi merito pro synonymis agnoscunt. Sunt tamen, qui utriusque huius coloris differentiam specificam indicant, ita *LOBELIVS obs.* 168. *MVNTINGIVS vvaare Oeffen. der Planten* 328. & *Nauvuk. Beschryv. der Aardgevv.* 433. ut & *CAMMERARIUS Kräuterb.* 420. *b.* florem album a subviridi, *Jo. BAVHINVS III.* 634. vero nigrum & *Hortus Reg. Parisiensis* 86. purpureum ab atro-rubente tanquam species peculiare distinguunt. Quum vero postea, tanto temporis intervallo, nemo amplius huius differentie men-

Ann. Daß die weißlichte und grünlichte, oder wie sie *HALLERVS* p. 299. genauer bestimmt, die abgeschossene weiße Farbe mit grünlichten Streifen, bey den Blumen der no. I. angezeigten Art, ingleichen die purpurfarbige, schwärzlichte, schwarzrothe, schwarzgrüne, braunrothe Farbe bey den Blumen der no. II. angeführten Art einerley bedeute, haben die meiste billig erkandt. Doch sind einige, die bey diesen beyden Farben einen besondern Unterscheid angezeigt haben. So hat *LOBELIVS obs.* 168, *MVNTINGIVS vvaare Oeffen. der Planten* 328. und *Nauvuk. Beschryv. der Aardgevv.* 433. wie auch *CAMMERARIUS Kräuterb.* 420. *b.* die weiße Blume von der grünlichten, *Jo. BAVHINVS III.* 634. aber die schwarze und *Hortus Regius Parisiensis* 86. die purpurfarbige von der schwarzrothen als besondere Arten unterschieden. Weil aber hernach, in einer geraumen Zeit, nie-

mentionem fecit, ea, si non auctorum lapsui, accidentalibus tantum causis, tanquam inconstans, procul dubio adscribenda est. Quousque vero ipsæ species no. I. & II. a se invicem distinctæ sint, nondum definitum legitur. Differentia namque satis notabilis atque etiam constans observata quidem est non solum in floris colore, verum etiam in vegetatione ita, ut posterior priori sit uno minimum mense præcocior, ut & in foliorum magnitudine & qualitatibus, quas præcipue illustrat PHILIPPI MILLERI curiosa observatio, quæ docet, quando utraque species proxime ad se invicem in hortum plantantur, limaces tota ferme consumere folia posterioris, dum illa prioris vix tangunt, vid. ejus *Gardeners Dictionary sub veratri nomine*; num autem & scapi magnitudo & conformatio, itemque florum magnitudo, dispositio &c., ulteriorem differentiam exhibeant, neque ex descriptionibus neque ex figuris hucusque evulgatis certo colligi potest. Prioris exemplar naturale nunquam vidimus, sed eius figuras (ex quibus illa DODONÆI optima videtur eademque reperitur apud LOBELIUM, CLVSIVM, PARKINSONVM) cum posteriori specie (cuius bonam iconem sistit solus WEINMANNVS tab. 568. e) conferentes in his notabilem quidem deprehendimus distinctionem; sed quum citata figura nimium imminuta sit, ad definitionem differentiarum formandam non sufficit. Blackwelliana figura, quam representamus, pariter Dodonæianæ propius accedit, licet color in nostro exemplari purpureus sit, siquidem ex descriptione patet, eius opinione inter utramque speciem nullum aliud intercedere discrimen, nisi ex floris colore petendum, hincque forsan in aliis exemplaribus eadem icon cum floribus herbacei coloris reperitur. Ab aliis ergo definitionem utriusque speciei perfectam expectantes interea ex relatione amici addimus, quæ ipse ex utriusque speciei copiose in Austria sponte crescentis repetito examine observavit. De foliorum differentia eundem nihil compertum habet, sed colorem floris prioris speciei pallidum seu exalbidum & lineis virentibus per longitudinem petalorum excurrentibus variegatum, posterioris vero atro-rubentem, huiusque, præcocem proventum omnino constantem esse asserit, porro prioris speciei scapum semper multo humiliorem manere, eius flores odorem fortiolem & caput ferentem spirare, multo præterea majores nec adeo dense congestos (tales nimirum, quales WEINMANNI figura tab. 568. d. sed perperam plane virides pingit) esse quam in posteriori specie, hancque tandem nonnisi in montosis & quidem siccioribus locis, priorem vero tum in elatioribus, tum in uliginosis declivibus planisque provenire, id quod etiam CLVSIVS I. c. iam annotavit.

niemand mehr dieses Unterscheid's Meldung gethan hat, so ist solches, wo nicht einem Versehen der Auctorum, nur zufälligen Ursachen, als unbeständig, ohne Zweifel zu zuschreiben. Wie weit aber die Arten no. I. und II. selbst von einander unterschieden seyen, ist noch nicht genau bestimmt zu finden. Dann es ist zwar ein merklicher und auch beständiger Unterschied beobachtet worden nicht nur allein in der Farbe der Blume, sondern auch im Wachsthum also, daß die letztere Art wenigstens um ein Monath früher kommt, über dieses auch in der Größe und Eigenschaften der Blätter, welche besonders erläutert die curiose Anmerkung PHILIPPI MILLERI, die anzeigt, daß, wann beyde Arten nahe neben einander in einen Garten gepflanzt werden, die Schnecken die Blätter der letzten Art fast ganz verzehren, indem sie der ersten ihre kaum berühren: siehe desselben Gärtner-Lexicon unter den Rahmen Veratrum. Ob aber auch des Stengels Größe und Bildung, ingleichen der Blumen Größe, Ordnung &c. einen mehrern Unterschied anzeigen, kan weder aus denen Beschreibungen noch Figuren, die bisher bekandt gemacht worden, sicher abgenommen werden. Die erste Art haben wir niemals in der Natur gesehen, wann wir aber derselben Abbildungen (unter welchen des DODONÆI keine die beste zu seyn scheint und eben diejenige ist, welche bey LOBELIO, CLVSIO, GERARDO, PARKINSONO zu finden) mit der zweyten Art (davon der einzige WEINMANNVS tab. 568. e. eine gute Abbildung hat) zusammen halten, so finden wir zwar in diesen einen merkwürdigen Unterschied; weil aber die angezeigte Figur gar zu sehr verkleinert ist, so ist sie zu einer Beschreibung des Unterschiedes nicht zulänglich. Die nachgemachte Blackwellische Figur kommt auch der Dodonæischen näher, ob gleich die Blumen in unsern Exemplar purpurfarbig sind, sintemal aus der Beschreibung erhellet, daß ihrer Meinung nach unter beyden Arten kein anderer Unterschied, als die Farbe der Blumen seye, und daher vielleicht in andern Exemplaren eben diese Figur mit grünlichten Blumen zu finden ist. Indeme wir also von andern eine vollkommene Beschreibung beyder Arten erwarten, fügen wir indessen aus der Erzählung eines Freundes bey, was er selbst aus wiederholter Untersuchung beyder in Oesterreich häufig wachsender Arten angemerkt hat. Von den Unterschied der Blätter ist ihm zwar nichts bekandt, dieses aber bejahet er, daß die bleiche oder weißlichte mit grünen durch die Länge der Blümlein gezogenen Strichen schwächter Farbe bey den Blumen der ersten und die schwarzrothe bey der zweyten Art, wie auch dieser ihr frühzeitiger Wachsthum allerdings beständig seye; daß ferner der Stengel der ersten Art allezeit viel niedriger bleibe, seine Blumen einen stärkern und den Kopf beschwehrenden Geruch haben, über dieses viel grösser seyn und nicht so dicht zusammen stehen (so nemlich, wie sie die Figur des WEINMANN-

NI tab. 568. d. aber falsch ganz grün fürstellet) wie bey der zweyten Art, und daß endlich diese allezeit nur auf bergichten und zwar drohenden die erste aber so wohl auf Bergen als auch in sumpfsichten, niedrigen und ebenen Gründen wachse, welches auch CLVSIVS schon I. c. angemerkt hat.

TAB 75. Lat. Dictamnus albus, Fraxinella. Germ. Weiser Diptam, gemeiner Diptam. Græc. χαμαί μέντιον off. © Angl. White Dittany, Fraxinella. Hiss. Dittamo blanco. Ital. Dittamo bianco. Gall. Dittam bastarde, Fraxinelle. Bat. Witte Diptamum, Fraxinella.

1. Duo ferme pedes metiuntur altitudinem: folia e nigro viridia, flores rubri, interdum & albi reperiuntur.

2. Sponte nascitur in variis locis Galliae atque Germaniae. In Anglia vero plantatur in hortis, ubi Junius atque Julius flores provocant.

3. Radix cor atque caput confortare creditur; resistit putredini atque veneno; in malignis & contagiosis morbis utiliter adhibetur, sicut & in epilepsia aliisque capitis affectibus. Reserat quoque obstructions uteri & fluxum mensium promovet. Ingreditur Aquam antepilepticam theriacalem, Pulverem liberantem & Empl. stipticum Paracelsi.

1. Es wächst bis 2 Fuß hoch, die Blätter sind dunkelgrün, die Blumen roth und manchmal weiß.

2. Man findet ihn wild an verschiedenen Orten in Frankreich und Deutschland; in Engelland aber wird er in den Gärten gepflanzt und blüht im Juny und July.

3. Die Wurzel hält man für Herz- und Hauptstärkend, sie ist gut wider die Fäulung und Gift, man braucht sie in bößartigen und ansteckenden Krankheiten. Ingleichen wider die fallende Sucht, und andere Zufälle des Haupts. Sie eröffnet die Verstopfungen der Mutter und treibt deren Reinigung. Es kommt unter die nachfolgenden Compolita: Aqua Antepilept. Theriacalis Pulv. Liberans, Empl. Stipticum Paracelsi.

4. NOM. GEN. Fraxinella Rai, I. 698. Meth. 79. Tourn. 430. Riv. p. 28. Heuch. Ind. 43. Rupp. 291. Boerh. I. 299. Heist. I. 13. Syst. 8. Hall. 311. Kram. 67. Dictamnus Linn. G. no. 412. Roy. 462. Ludvv. I. no. 649. Wachend. 73.

5. NOM. SPEC. Dictamni loco usurpata hætenus planta Gesn. hort. 256. b. Dictamnium album Casalp. 589. Matth. 134. 706. Cam. Ep. 473. Dictamnus Dorst. 106. a. fig. 1. Linn. H. Clif. 161. Roy. 462. Wachend. 73. Dictamnus tertia Ruell. 505. Dictamnus vulgaris Trag. 27. Dictamnus albus vulgo, sive Fraxinella C. B. pin. 222. Tragium creticum Guiland. Theon. 6. Polemonium, Fraxinella Tab. ic. 775. Fraxinella Cord. Hist. 94. b. Clus. Hist. 99. Dod. 348. Ger. 1245. Park. Parad. 333. fig. 1. Hist. Ox. III. 456. S. XII. tab. 1. fig. 1. H. Eyst. Vern. Ord. IX. tab. 5. fig. 1. Tourn. 430. Riv. III. tab. 134. Boerh. I. 299. Hall. 311. Fraxinella Cordi, an Tragium Dioecoridis Lob. ic. 96. Fraxinella officinis Dictamnus J. B. III. 494. Rai. I. 698. Fraxinella & Dictamnus albus officinarum Rupp. 291. Fraxinella flore rubro Heist. I. 13. Fraxinella flore rubro seu purpureo Heuch. Ind. 43. Fraxinella foetore hirci maior & minor, latifolia & angustifolia Kram. 67.

6. Nota. Apertum huius speciei florem colore rubro tinctum adeo exaltato, uti illum figura I. Blackwelliana pingit, nunquam observavimus, sed semper multo dilutior, uti eum fig. II. nostra sistit, cui præterea iunximus fig. 2-8, 10-12. & 14. Si-

Ann. Wir haben niemals eine geöffnete Blume dieser Art von einer so hochrothen Farbe gefunden, wie solche die Blackwellische Fig. I. mahlet, sondern allezeit viel bleicher, wie solche unsere fig. II. fürstellet, welcher wir noch beygefüget haben fig. 2. - 8. I

Sistuntur autem *fig. 2.* flos explicatus a facie anteriori, *fig. 3.* a facie posteriori, ubi apparent *a.* petiolus, *b. b.* calyx quinque folius, *c. c. c.* quinque petala, *d. d. d.* decem stamina incurvata, quæ statim post floris explicationem *fig. 2.* breviora sunt, deinde *fig. 3.* longiora fiunt; *fig. 4.* repræsentatur *b. b.* calyx, *d. d.* duo stamina ex reliquis resectis relicta, quibus pollen ab antheris explosum copiose adhæret; *e.* est stylus cum stigmate simplici, *f.* ovarium; *fig. 5. 6.* sunt duo stamina separata in magnitudine aucta, *fig. 7.* ovarium transversim dissectum, *fig. 8.* idem in magnitudine aucta; *fig. 9.* Blackwelliana repræsentat fructum immaturum, *fig. 10.* maturum a facie laterali cum quinque capsulis adhuc clausis, *fig. 11.* eundem a facie superiori cum capsulis jam dehiscens, *fig. 12.* eundem cum capsulis jam apertis & a seminibus vacuis, excepto unico *g.* in sede relicto; *fig. 13.* sunt semina secundum Blackwellianam delineationem, *fig. 14.* eadem matura secundum nostram, *fig. 15.* radices pars.

sind die Saamen nach der Blackwellischen, *fig. 14.* eben diese ganz zeitig nach unserer Abbildung, *fig. 15.* ein Theil der Wurzel.

10 - 12. und 14. Es werden aber damit abgebildet *fig. 2.* eine geöffnete Blume von der vordern, *fig. 3.* von der hintern Ansicht, alle wo erscheinen *a.* der Stiel, *b. b.* der fünfblätterichte calyx, *c. c. c.* die fünf Blättlein der Blume, *d. d. d.* die zehn gekrümmte stamina, welche bald nach Defnung der Blume *fig. 2.* kürzer sind, hernach *fig. 3.* länger werden; *fig. 4.* werden fürgestellt *b. b.* der calyx, *d. d.* zwey stamina nachdem die übrige abgeschnitten worden, an welchen der aus den antheris ausgeflogene Staub häufig hängt, *e.* der stylus mit einem einfachen stigmate, *f.* das ovarium; *fig. 5. 6.* sind zwey abgesonderte und vergrößerte stamina, *fig. 7.* das über quer entzwey geschnittene ovarium, *fig. 8.* eben dieses vergrößert. Die Blackwellische *fig. 9.* stellet eine unzeitige Frucht für, unsere *fig. 10.* eine zeitige von der Seite mit ihren annoch geschlossenen fünf Fächern, *fig. 11.* eben dieselbe von der obern Ansicht mit denen sich schon öffnenden Fächern, *fig. 12.* eben dieselbe mit denen schon völlig offenen und von Saamen leeren Fächern, davon nur einer noch in seinem Lager übrig ist; *fig. 13.*

TAB. 76. *Lat.* Cruciata. *Germ.* Gelb Kreuz-Kraut, Rauhes-Meyer-Kraut, Gölben Wald-Meister. *Græc.* *⊕* *Ἡρίερον* Hadr. Junius. *Angl.* Crows Wort, Mugveed. *Gall.* Croisette.

1. Altitudinem æquat pes unus, folia dilute viridia sunt, flores flavi.

2. Reperitur in sepibus & marginibus agrorum, in vicinia vero urbis Londini raro. In quibusdam tamen Hamstadii vallibus, nec non in cœmeterio ejus loci, quondam copiose proveniebat, sed temporis tractu penitus eradicata est. Mense Junio floret.

3. Annumeratur herbis vulnerariis, virtute siccante atque adstringente gaudens. Præcipue vero ad hernias intestinorum scrotales commendatur.

Eruca *fig. 11.* vocatur a quibusdam Leopardus, quæ tandem in papilionem elegantissimæ formæ permittitur: vid. ALBINI Historiam tab. 20.

1. Es wächst bis einen Fuß hoch, die Blätter sind hellgrün, die Blumen gelb.

2. Man findet es in Hecken, und an dem Rande der Felder; allein in der Nähe bey London, wird es selten gesehen, ausgenommen in einigen Gründen zu Hamstadt. Es wuchs ehedem in grosser Menge auf dem Kirchhof daselbst, ist aber nun ausgerottet. Es blühet im Juny.

3. Man rechnet es unter die Wund-Kräuter, weil es eine trocknende und zusammenziehende Eigenschaft hat; es wird besonders gerühmt in denen sogenannten Brüchen oder Austritt der Gedärme in dem Hoden-Sack.

Die Raupe *fig. 11.* wird von einigen der Leopard genannt, und wird zu einem sehr schönen Sommer-Vogel. Sie ALBINI historiam davon tab. 20.

4. NOM. GEN. Cruciata Rai. I. 479. *Meth.* 54. *Syn.* 233. *Tourn.* 115. *Heuch. Ind.* 2. *Rupp.* 5. *Dill.* 67. *Vaill.* 43. *Heist.* III. 8. *Syst.* 6. *Kram.* 12. *Galium* Linn. G. no. 97. *Roy.* 256. *Hall.* 458. 460. *Wachend.* 22. *Galium* Ludov. no. 11.

5. NOM. SPEC. Crucialis herba *Cas.* 325. *Ruell.* 547. *Cruciata* Ger. 1123. *Rai* I. 479. *Syn.* 223. *Dod.* 357. *Cruciata* herniaria *Thal.* 28. *Cruciata* flore luteo *Heuch. Ind.* 2. *Cruciata* minor *Lob.* ic. 804. *Cruciata* vulgaris *Park.* 566. *Heist.* III. 8. *Cruciata* hirsuta *C. B. pin.* 335. *Hist. Ox.* III. 328. *S. IX.* t. 21. f. 1. *Tourn.* 115. *Rupp.* 5. *Dill.* 67. *Vaill.* 43. *Cruciata* hirsuta latifolia flore luteo *Kram.* 12. *Cruciata* Gallio cognata *Gesn. Hort.* 255. *b.* Gallii secundum genus *Trag.* 493. *Galium* latifolium *Cruciata* quibusdam flore luteo *J. B.* III. 717. *Galion* *Turner. Herball* P. II. 6. *b.* *Galium* foliis quaternis, flosculis in alis confertis *Linn. H. Clf.* 34. *Roy.* 257. *Hall.* 462. *Wachend.* 23.

6. *Nota.* *Fig. I.* 1. 10. ad Blackwellianum, reliquæ ad naturæ exemplar factæ sunt. Sistuntur his *fig. 2.* racemus florum in magnitudine naturali, *fig. 3.* flos a facie anteriori, 4. posteriori, 5. laterali, 6. superiori cum quatuor staminibus, omnes in magnitudine aucta; *fig. 7. 8.* pistillum in naturali & aucta magnitudine, *fig. 9.* idem transversim sectum, *fig. 10.* unum ex gemellis seminibus maturum in magnitudine naturali & aucta. Græcis hæc planta vix nota fuit, atque hinc nomen ex *ADR. IUNIO* perperam citatur, quod ad *Senecionem*, ut ipse interpretatur, pertinet: dum vero *Senecionem*, quæ planta a Germanis nonnullis etiam vocatur Kreuz-Wurk, und Kreuz-Kraut, minus caute vertit in cruciatam, hinc error.

unvorsichtig in Cruciatam übersetzt hat, so kommt daher der Irrthum.

6. *Ann.* *Fig. I.* 1. 10. sind nach dem Blackwellischen Muster, die übrigen nach der Natur gemacht. Damit werden abgebildet *fig. 2.* ein blühendes Aestlein in natürlicher Größe, *fig. 3.* eine Blume von der vordern Ansicht, 4. von der hintern, 5. von der Seite, 6. von der obern mit den vier staminibus, alle vergrößert; *fig. 7. 8.* das pistillum in der natürlichen und vermehrten Größe, *fig. 9.* eben dieses quer entzwey geschnitten, *fig. 10.* einer von den gedoppelten zeitigen Saamen in natürlicher und vermehrter Größe. Den Griechen ist dieses Gewächs schmächtig bekannt gewesen, und wird daher der Mahne unrecht aus *ADR. IUNIO* angeführt, welcher dem *Senecioni* zu kommt, wie er es selbst auslegt: indeme er aber den *Senecionem*, welcher von einigen Deutschen auch Kreuz-Wurk und Kreuz-Kraut genennet wird,

TAB. 77. *Lat.* Fragaria, *Germ.* Erdbeer-Kraut. *Angl.* Common Strawberry. *Hisp.* Miezgado, Mayveta. *Ital.* *⊙* *Fragolaria*, *Fragole.* *Gall.* Fraiser, Herbe des Fraises. *Bar.* Erbesien kruyt, Erbeyen.

1. Hæc planta repit humi, petioli fructum ferentes longitudinem fere habent octo digitorum: Folia saturate viridia, flores albi sunt.

2. Crescit in sylvis & mense Majo floret. Junius fructum maturat.

3. Herba inservit gargarismis in læsionibus ulceribusque oris, palati atque faucium adhibendis. Laudatur a quibusdam contra icterum & varii generis catarrhos. Fructus confortat cor, atque iis, qui bilioso temperamento præditi, apprime utilis; Fraga præterea stomacho grata sunt atque accepta, præcipue si cum vino saccharo permixto comedantur. Ex floribus paratur Aqua antinephritica Caspari Commelini.

1. Diese Pflanze kriecht auf der Erde, die Stengel, woran die Frucht wächst, werden ohngefahr 8. Zoll lang, die Blätter sind dunkelgrasgrün, die Blumen weiß.

2. Es wächst in Wäldern, und blüht im May, die Frucht wird reif im Juny.

3. Das Kraut wird in Gurgel-Wässern gebraucht bey Versehrungen und Geschwüren des Mundes und Schlundes, wie auch des Gaumens. Einige Autores rathen es in der Gelbsucht und allerhand Arten von Flüssen zu gebrauchen. Die Frucht wird als Herzstärkend und mit Nutzen bey hitzigen gallichten Naturen gebraucht, sie ist den Magen angenehm, besonders wenn sie mit Wein und Zucker genossen wird. Aus den Blumen wird die Aqua antinephritica *Casp. Commelini* gemacht.

4. NOM.

4. NOM. GEN. *Fragaria* Rat. I. 609. Meth. 68. Syn. 254. Tourn. 295. Heuch. Ind. 15. Rupp. 108. Dill. 50. Barh. I. 41. Vaill. 55. Heist. I. 13. Syst. 7. Linn. G. no. 486. Roy. 274. Hall. 343. Kram. 30. 31. Wachend. 111. *Potentilla Ludov.* no. 621.

5. NOM. SPEC. I. *Fragula* Cord. Hist. 173. *Fragum*, *Trifolium fragiferum* Tab. ic. 118. *Fraga* fructu rubro H. Eystett. Vern. O. VII. t. 8. f. 3. *Fragaria* Brunf. II. 40. Dorst. 130. b. Trag. 500. Matih. 1021. Casalp. 554. Rat. I. 609. Syn. 254. *Fragaria* & *Fraga* Dod. 672. Lob. ic. 697. Ger. 997. *Fragaria* major & minor Fuchsf. 853. *Fragaria* flore albo Heuch. Ind. 15. *Fragaria* fructu, quem *fragum* vocant, rubente Gesn. Hort. 259. b. *Fragaria* ferens *fraga* rubra F. B. II. 394. *Fragaria* sylvestris H. Ox. II. Sect. II. tab. 19. f. 1. Heist. I. 13. *Fragaria* sylvestris vel montana Cam. Ep. 765. *Fragaria* vulgaris C. B. pin. 326. Park. 758. H. Ox. II. 186. Tourn. 295. Rupp. 108. Dill. 50. Barh. I. 41. Vaill. 55. *Fragaria* folio molli viridi, flore albo simplice, fructu parvo rubro molli succulento odorato, in anno semel fructifera Kram. 30. *Fragaria* flagellis reptans Linn. H. Cliff. 192. Roy. 274. Hall. 343. Wachend. 111.

II. *Fragaria* flore pleno Volk. Fl. Nor. 172. Rupp. 108. *Fragaria* fructu rotundo suavissimo, flore duplici H. R. P. Tourn. 296. Barh. I. 42. *Fragaria* folio molli viridi flore albo duplici fertili Kram. 30. 31.

6. Nota. Græcum hujus plantæ nomen genuinum ignotum esse, plurimi statuunt: nonnulli APULEIO subscribunt, qui eam *Kopuagor* appellari asseruit, sub quo nomine alii tamen *Arbutum* intelligunt. Fig. I. Blackwelliani exemplaris, reliquæ naturæ imitationes sunt. Ad fig. I. & II. pertinent nomina no. 5. I. indicata, ad fig. III. illa no. II. addita. In opere Weinmanniano t. 514. lit. c. vulgaris *fragaria* pingitur flos multiplex, simplex vero pentapetalus describitur ibid. p. 485. Neque etiam no. II. a. I. differt, nisi ut varietas, constans tamen & propagabilis. Fig. 1. 2. repræsentatur flos a facie anteriori, 3. posteriori cum calyce, 4. verticaliter dissectus, ubi b. receptaculum, cui pistilli plurimi circum circa adherent, c. c. quadam ex staminibus, receptaculi basin ambientibus; fig. 5. apparet petalum separatum, 6. 7. stamen, 8. 9. pistillum, utrumque in magnitudine naturali & aucta; fig. 10. 11. fructus maturus cum calyce persistente a., fig. 12. idem verticaliter fig. 13. transversim dissectus, ubi b. receptaculi & d. pistillorum seu ovulorum mutatio in carnem mollem apparet; fig. 14. semen maturum in magnitudine naturali, fig. 15. aucta repræsentat, quod ipsi superficiæ fructus inhæret, vid. fig. 11.

Verwandlung in ein weiches Fleisch angezeigt wird; fig. 14. ist ein zeitiger Saame in natürlicher und fig. 15. in vermehrter Größe, welcher auf der Fläche der Frucht anhänget, siehe fig. 11.

Anm. Die meiste Auctores halten davor, daß der griechische Name dieses Gewächses unbekant sey: einige glauben dem APULEIO, daß es *Kopuagor* genennet worden, unter welchem Namen aber andere den Erdbeer-Baum verstehen. Fig. I. ist nach dem Blackwellischen Muster, die übrige sind nach der Natur gemacht. Zur fig. I. und II. gehören die no. 5. I. angezeigte Mahmen, zur fig. III. die andern no. II. In dem Weinmannischen Werk wird tab. 514. c. das gemeine Erdbeer-Kraut mit doppelter Blüthe abgebildet, p. 485. aber einfach mit 5. Blätlein beschrieben; es unterscheidet sich aber auch no. II. von I. nicht anders, als eine varietät, die aber doch beständig ist und also kan fortgepflanzt werden. Fig. 1. 2. wird fürgestellt die Blüthe von vornen, 3. von hinten mit dem calyce, 4. durch die Länge entzwey geschnitten, allwo b. das receptaculum, an welchem um und um viele pistilla anhängen, c. c. einige stamina. die den Grund des receptaculi umgeben; fig. 5. erscheint ein abgesondertes Blumen-Blätlein, 6. 7. ein stamen, 8. 9. ein pistillum, beyde in natürlicher und vermehrter Größe; fig. 10. 11. die zeitige Frucht mit dem beständig bleibenden calyce a. fig. 12. eben dieselbe nach der Länge und fig. 13. über quer entzwey geschnitten, allwo b. des receptaculi und d. der pistillorum oder ovulorum

TAB. 78. Lat. *Rosa* rubra, *Rosa* fina, *Rosa* finissima officinarum. Germ. Rothe Rosen, gefeinte Rosen. Græc.

⊙ Rosæ. Angl. Red Rose, Velvet Rose. Hist. Rosas. Ital. Rosa. Gall. Rosier. Bat. Kad. Rosen.

1. Stirps *Rosarum* rubrarum minor est quam albarum & *Damascenarum*, petioli quoque florum minus sunt aculeati: Folia graminea viriditate & flores coccineo colore nitent.

2. Crescit in hortis, mense autem Junio atque Julio flores agit.

3. *Rosa* rubra præ reliquis *rosarum* generibus majore adstringendi virtute pollet; medetur catarrhis, confortat stomachum, cohibet vomitum, sistit tussim ab acris humoribus proveniente, impedit enim eorum defluxiones; prodest insimul phthisicis. Sunt, qui antheras luteas quoque ad cordialia referunt. Præparantur in officinis ex his floribus sequentia: Aqua rosar. simpl., conserva rosarum, saccharum rosatum, syr. e. rosis siccis, mel rosarum, oleum rosarum, unguentum rosatum, tinctura rosarum, & spec. aromat. rosatæ.

1. Dieser Rosen-Strauch ist kleiner als der Weissen oder auch der Damascener Rosen; die Blumen haben nur wenige Stacheln am Stiele, die Blätter sind grasgrün, die Blumen hellcarmesinroth.

2. Es wächst in den Gärten und blüht im Juny und July.

3. Die rothe Rose ist mehr zusammen ziehend als einige von denen andern Arten, und man hält sie für sehr nützlich in allen Arten derer Flüsse. Sie stärket den Magen, widerstehet dem Erbrechen, stillt die Huste, welche von scharfen Feuchtigkeiten erweckt wird, indeme es derselben herabsinken verhindert, und ist von guten Nutzen in der Schwindsucht. Einige halten auch die Knospflein der gelben Zäuserlein oder die sogenannte Staubfächerlein für Herzkstärkend. In den Apotheken wird daraus bereitet aqua rosarum simplex, conserva rosarum, saccharum rosatum, syrupus e. rosis siccis, mel rosarum, oleum rosarum, unguentum rosatum, tinctura rosarum, und species aromaticæ rosatæ.

4. NOM. GEN. vid. tab. 8. no. 4.

5. NOM. SPEC. *Rosa* intense rubens simplex vel plena, quam vulgo pharmacopœi vocant finam Cam. Hort. 143. *Rosa* Milefia flore simplici rubro, *Rosa* fina H. Eyst. Vern. VI. t. 6. f. 3. *Rosa* rubra saccharina dicta Weinm. tab. 870. d. quoad imaginem. *Rosæ* rubræ varietas F. B. II. 34. b.

6. Nota. Fig. I. Blackwelliana est imago, reliquæ additæ sunt. Fig. 1. est alabastrus seu floris globus nondum explicatus, fig. 2. flos explicatus a facie anteriori, fig. 3. posteriori, fig. 4. petalum exterius separatum cum ungue pallido, fig. 5. petalum interius separatum, seu stamen petaloideum, i. e. stamen a. in petalum transformatum, id quod fit in plurimis floribus, quorum petala ex plantæ luxuria multiplicantur; fig. 6. calyx, cuius segmenta c. partim integra partim pinnata sunt, b. congeries staminum; fig. 7. 8. stamen separatum in naturali & aucta magnitudine, cuius apex seu globulus vocatur anthera; fig. 9. idem calyx demta maxima staminum parte, ubi apparet insertum staminum b. in calycem d. & stylorum fasciculum e. per centrum calycis transiens; fig. 10. calyx & ovarium verticaliter dissectum, ubi conspicitur stylorum fasciculi e. nexus f. cum ovulis; fig. 11. 12. ovulum cum proprio stylo suo separatum, in naturali & aucta magnitudine, ubi g. stylus

Anm. Fig. I. ist die Blackwellische Abbildung, die übrige sind hinzugegeben. Fig. 1. ist ein Knopf oder noch nicht aufgegangene Blume, fig. 2. eine ausgebreitete Blume von vornen, fig. 3. von hinten, fig. 4. ein abgesondertes auswendiges Blumen-Blätlein mit seinem bleichgelben Nagel oder Ende, fig. 5. ein abgesondertes innwendiges Blumen-Blätlein, welches nichts anders ist, als ein in ein Blätlein verwandeltes stamen a., das vielfältig geschiehet bey Blumen, die aus Frechheit ihre Blätlein vermehren; fig. 6. der calyx, dessen Einschnitte zum Theil einfach, zum Theil blättericht sind, b. die stamina, die in einem Büschel beisammen stehen; fig. 7. 8. ein abgesondertes stamen in der natürlichen und vermehrten Größe, dessen Knöpflein anthera genennet wird; fig. 9. eben der calyx nachdeme der größte Theil von den staminibus weggenommen, allwo erscheint b. die vereinigung der staminum mit dem calyce d. und ein Büschel von stylis e., der durch die mitte des calycis durchgeht; fig. 10. der calyx und ova

lus simplex cum stigmate simplici, *b.* villi ovuli, *i.* ovulum seu seminis rudimentum. Hæc rosarum species est illa, cujus alabastrum seu florum globos nondum explicatos colligunt pharmacopœi, extracta petala, unguibus pallidis abscissis, siccant ac pro aceti & tincturæ rosarum præcipue paratione asservant: vid. dispensator. Nor. 1667. p. 222. Ceterum ab hac specie parum differt *Rosa saturatus rubens* C. B. pin. 481. Tourn. 637. Rupp. 138. *Rosa purpurea sive in rubronigricans* Camer. hort. 144. uti hic ipse ibidem monet. Neque etiam, nisi petalorum colore paulo remissione differt *Rosa rubra* C. B. pin. 481. *Rosa caule aculeato, petiolis inermibus, calycibus semipinnatis varietas a.* Linn. mater. med. no. 241. & adhuc remissiori *Rosa holoserica* Lob. ic. II. p. 207. *Rosa holoserica multiplex* Ger. 1266. Park. Parad. 416. Rai. II. 1469. Perquam difficile autem synonyma harum varietatum ex auctorum nominibus, descriptionibus iconibusque ab omni dubio liberantur.

med. no. 241. und durch eine noch bleichere Farbe *Rosa holoserica* Lob. ic. II. 207. *Rosa holoserica multiplex* Ger. 1266. Park. Parad. 416. Rai. II. 1469. Es ist aber sehr schwer die Synonyma dieser varietäten aus der Auctorum Drahmen, Beschreibungen und Abbildungen von allem Zweifel zu befreien.

ovarium der Länge nach entzwey geschnitten, allwo zu sehen des Büschels von Stylis e. Vereinigung f. mit den ovulis; fig. 11, 12. ein ovulum mit seinem eigenen stylo abgesondert in natürlicher und vermehrter Grösse, allwo g. der einfache stylus mit einem einfachen stigmate, h. die Haare des ovuli, i. ein ovulum oder erste Bildung des Saamen-Korns. Diese Art der Rosen ist diejenige, davon die Apotheker die noch nicht aufgegangene Endpfe sammeln, von den herausgenommenen Blätlein die bleiche Mägel abschneiden und solche vornehmlich zu verfertigung des Rosen-Essigs und Rosen-Tinctur aufbehalten: Siehe das Dispensator. Norimb. edit. 1666. p. 222. Im übrigen ist von dieser Art wenig unterschieden *Rosa saturatus rubens* C. B. pin. 481. Tourn. 637. Rupp. 138. *Rosa purpurea sive in rubro nigricans* Camer. hort. 134. wie dieser Autor selbst alda erinnert. So unterscheidet sich davon auch nur durch eine wenig bleichere Farbe der Blumen-Blätlein *Rosa rubra* C. B. pin. 481. *Rosa caule aculeato, petiolis inermibus, calycibus semipinnatis varietas a.* Linn. mater.

TAB. 79. *Lat.* Carduus Mariæ. *Germ.* Marien-Distel, Frauen-Distel, Feh-Distel, Stech-Körner. *Angl.* Ladies Thistle, Common Milk Thistle. *Ital.* Cardo del Latte, Scordacio bianco. *Gall.* Chardon de nôtre Dame. *Bat.* Onser Vrouwen Distel.

1. Caulis extenditur ad quatuor vel quinque pedes, folia viriditate saligna nitent, albis maculis aspersa, flores sunt purpurei.
2. Reperitur sæpius in aggeribus, ut & in marginibus arborum, ac mense Junio floret.
3. Gaudet eadem, qua Carduus benedictus, virtute, paulo tamen debiliore. Celebratur tamquam specificum in pleuritide, præcipue emulsio sui seminis. Præterea in ictero, calculi dolore, atque ischuria cum fructu adhibetur.

4. NOM. GEN. Carduus Rai. I. 299. 312. Meth. 40. Syn. 194. Tourn. 440. Heuch Ind. 46. Prov. I. 72. Rupp. 185. Dill. 129. Boerh. I. 136. Heist. I. 7. Linn. G. no. 763. Roy. 132. Kram. 72. Ludw. no. 321. Wachend. 208. Maria Heist. Syst. 7. Silybum Vaill. 28. Act. Paris. a. 1718. p. 172. Hall. 684.

5. NOM. SPEC. Spina alba hortensis Fuchsf. 56 Chamæleon albus Comitis de Neuenare apud Brunf. II. 242. Feh-Distel Brunf. II. 71. Carduus albus Ejusd. III. 41. Carduus lacteus Cam. Ep. 445. Carduus levcographus Dod. 721. Carduus Marianus seu lacteus Tab. ic. 699. Carduus Marianus seu lacteus maculis notatus J. B. III. 52. Carduus Mariæ Trag. 850. Ger. 1150. Rai. I. 312. Syn. 195. Heist. I. 7. Carduus Mariæ vulgaris Park. 976. Carduus Mariæ vulgo dictus, foliis latis, maculis lacteis Gejn. hort. 251. b. Carduus albis maculis notatus vulgaris C. B. pin. 381. H. Ox. III. 155. S. VII. t. 30. f. 1. Tourn. 440. Rupp. 186. Dill. 139. Boerh. I. 136. Carduus albis maculis notatus vulgaris, aliis Carduus lacteus Heuch Ind. 46. Carduus calyce capitato imbricato spinoso, foliis spinosis maculatis sinuatis glabris, flore in summitate discreto, semine nudo Kram. 72. Carduus squamis calycinis margine & apice spinosis Linn. H. Clif. 393. Roy. 133. Wachend. 209. Silybum, Carduus Mariæ & lacteus, Levcographis Plinii Lob. ic. II. 7. Silybum albis maculis notatum flore purpureo Vaill. Act. Paris. a. 1718. p. 172. Bot. Paris. 28. Silybum nervis foliorum albis Hall. 684.

6. Nota. Synonymis huius plantæ adscribere Bedegarin sive Spinam albam Dorst. 47. & Cordum lacteum Matth. 676. propter folia laciniis nimis profundis differentia dubitavimus. Omnes huius tabulæ figuræ ad naturale exemplar factæ sunt. Fig. 1. repræsentatur caput florigerum, fig. 2. idem, sed magis adultum cum aliquot seminibus iam perfectis & verticaliter dissectum, ubi a. flosculi, b. calyx foliosus, c. receptaculum sive placenta papposa; fig. 3. flosculus integer separatus, ubi d. corolla, e. ejus tubus, f. stylus cum antherarum theca, i. pappus k. ovulum seu seminis rudimentum; fig. 4. corolla quinquepartita dissecta & explicata a facie, interna; fig. 5. flosculus integer demta corolla, fig. 6. idem in magnitudine aucta, ubi e. ejus tubus, f. staminum antheræ in thecam coalitæ, g. staminum filamenta, h. stylus bifidus extra thecam prominens; fig. 7. b. stylus denudatus, k. ovulum cui insiluit; fig. 8. semen maturum cum flosculo marcescente adhuc continuum, ubi k. semen, l. ejus corona i. pappus, m. flosculus marcidus; fig. 9. semen maturum separatum; fig. 10. folium inferius a facie superiori.

1. dessen Krone, i. der pappus, m. das verdorrte Blümlein; fig. 9. der zeitige Saame abgesondert; fig. 10. Ein. Blat unten vom Stengel nach der obern Fläche.

1. Der Stengel wächst 4. bis 5. Schuh hoch, die Blätter sind wendengrün mit weissen Flecken, die Blüthe purpurfarb.

2. Es wird öfters auf Aagern und an dem Rande der Felder gefunden, blüht im Juny.

3. Diese Distel hat gleiche Tugenden mit dem Carduo benedicto, allein in etwas geringern Maas; man rühmet sie als ein specificum im Seitenstechen, besonders die Milch aus dem Saamen. Sie ist auch nützlich in der Gelbsucht, dem Stein, und der Verhaltung des Urins.

4. NOM. GEN. Carduus Rai. I. 299. 312. Meth. 40. Syn. 194. Tourn. 440. Heuch Ind. 46. Prov. I. 72. Rupp. 185. Dill. 129. Boerh. I. 136. Heist. I. 7. Linn. G. no. 763. Roy. 132. Kram. 72. Ludw. no. 321. Wachend. 208. Maria Heist. Syst. 7. Silybum Vaill. 28. Act. Paris. a. 1718. p. 172. Hall. 684.

5. NOM. SPEC. Spina alba hortensis Fuchsf. 56 Chamæleon albus Comitis de Neuenare apud Brunf. II. 242. Feh-Distel Brunf. II. 71. Carduus albus Ejusd. III. 41. Carduus lacteus Cam. Ep. 445. Carduus levcographus Dod. 721. Carduus Marianus seu lacteus Tab. ic. 699. Carduus Marianus seu lacteus maculis notatus J. B. III. 52. Carduus Mariæ Trag. 850. Ger. 1150. Rai. I. 312. Syn. 195. Heist. I. 7. Carduus Mariæ vulgaris Park. 976. Carduus Mariæ vulgo dictus, foliis latis, maculis lacteis Gejn. hort. 251. b. Carduus albis maculis notatus vulgaris C. B. pin. 381. H. Ox. III. 155. S. VII. t. 30. f. 1. Tourn. 440. Rupp. 186. Dill. 139. Boerh. I. 136. Carduus albis maculis notatus vulgaris, aliis Carduus lacteus Heuch Ind. 46. Carduus calyce capitato imbricato spinoso, foliis spinosis maculatis sinuatis glabris, flore in summitate discreto, semine nudo Kram. 72. Carduus squamis calycinis margine & apice spinosis Linn. H. Clif. 393. Roy. 133. Wachend. 209. Silybum, Carduus Mariæ & lacteus, Levcographis Plinii Lob. ic. II. 7. Silybum albis maculis notatum flore purpureo Vaill. Act. Paris. a. 1718. p. 172. Bot. Paris. 28. Silybum nervis foliorum albis Hall. 684.

Ann. Unter die Synonyma dieses Gemächses die Bedegarin sive Spinam albam Dorst. 47. und Cardum lacteum Matth. 676. zu zehlen, haben wir wegen der Blätter, die durch die allzutiefe Einschnitte unterschieden sind, Zweifel getragen. Alle Figuren dieser Tafel sind nach der Natur gemacht. Fig. 1. wird abgebildet der Blumen-Kopf, fig. 2. eben derselbe mit einigen schon vollkommenen Saamen und der Länge nach entzwey geschnitten, allwo a. die Blümlein, b. der blätterichte calyx, c. das haarigte receptaculum oder placenta fig. 3. ein ganzes abgesondertes Blümlein, allwo d. die corolla, e. derselben Röhre, f. der stylus in der Scheide der Staubfächlein, i. der pappus, k. das ovulum oder Anfang des Saamens; fig. 4. die fünffach getheilte corolla entzwey geschnitten und ausgebreitet von der inwendigen Ansicht; fig. 5. ein ganzes Blümlein von welchem die corolla abgesondert, fig. 6. eben dasselbe vergrößert, allwo e. die Röhre, f. die in eine Scheide zusammen gewachsene Staubfächlein der staminum, g. der staminum Fächerlein oder Fäden, h. der gespaltene stylus wie er ausser der theca hervor raget, fig. 7. h. der stylus besonders, k. das ovulum, auf welchen er stehet; fig. 8. ein zeitiger Saame mit dem verdorrten Blümlein annoch vereinigt, allwo k. der Saame

TAB. 80. *Lat.* Melilotus. *Germ.* Guldener Klee, Bären-Klee, Stein-Klee, Zieger-Kraut. *Græc.* *Μελιλότος*, *Λο-
τος* *ἡμετερος*. *Angl.* Melilot, Common Melilot. *Hisp.* Corona de Rei. *Ital.* Meliloto, Trifoglio Cavallino. *Gall.* Melilot, Saxifrage jaune. *Bat.* Melilote, Geelen Steenbreck, Steenclaveren.

1. Caulis attingit altitudinem trium pedum, folia colore gramineo, flores dilute flavi sunt.
2. Copiose crescit inter segetes, aliisque in locis; Junii tempore floret.

1. Der Stengel wächst bis 3. Fuß hoch, das Kraut ist grasgrün, die Blumen hellgelb.

2. Es wächst häufig im Korn-Feldern und Hecken, blüht im Juny.

3. Herba ipsius & flores emolliunt, dissipant, aperiant atque leniunt dolores: Hunc in finem in inflammationibus & omnis generis tumoribus in sacculis & cataplasmatibus adhibentur. Emplastrum Meliloti, quod ex hac herba, resina, pinguedine vervecina atque cera præparatur, vim habet attrahentem & vulneribus recentibus felici cum successu adplicatur. Præcipue tamen post vesicatoriorum adplicationem apertis vesicis imponi solet.

Eruca adpicta a quibusdam vocatur *Hussy*. D. MUFFET appellat *Sayl-Yard* sive antennam. Vescitur autem plurimis herbarum generibus.

4. NOM. GEN. Melilotus *Rai*. I. 950. *Meth*. 107. *Syn*. 331. *Tourn*. 406. *Riv*. II. p. 9. 10. *Heuch*. Ind. 31. *Prov*. II. 55. *Rupp*. 256. *Dill*. 93. *Boerh*. II. 29. *Vaill*. 124. *Heist*. I. 21. *Syst*. 9. *Hall*. 587. *Kram*. 61. *Trifolium* *Linn*. G. no. 713. *Roy* 377. 380. *Ludvv*. no. 473. *Wachend*. 190. 193.

5. NOM. SPEC. I. *Fragaria* *Brunf*. III. 49. *Saxifraga lutea* *Fuch*. 749. *Trifolium odoratum* sive Melilotus *Dod*. 567. *Trifolium odoratum* seu Melilotus vulgaris flore luteo *J. B.* II. 370. *Trifolium odoratum* seu Melilotus fruticosa lutea vulgaris vel officinarum *H. Ox.* II. p. 161. *Trifolium floribus racemosis*, leguminibus nudis dispermis, caule erecto *Linn*. H. *Cliff*. 376. *Roy*. 381. *Wachend*. 193. *Lotus sylvestris* *Tab.* ic. 508. *Lotus sylvestris flosculis luteis* vulgo *Trifoli* *Cas.* 241. *Lotus urbana* *Matth.* 1162. *Cam.* Ep. 893. Melilotus *Dorff*. 185. f. 1. *Riv*. II. t. 6. *Dill*. 93. Melilotus flore luteo *Heuch*. Ind. 31. Melilotus vera *Gesn.* *Hort.* 267. Melilotus Germanica *Lob.* ic. II. 43. Melilotus Germanica flore luteo *H. Eyst.* *Æst.* O. X. t. 12. f. 1. Melilotus officinarum Germaniæ *C. B. pin.* 331. *Tourn*. 407. *Rupp*. 256. *Vaill*. 124. Melilotus fruticosa lutea vulgaris vel officinarum *Boerh*. II. 29. Melilotus vulgaris *Ger.* 1205. *Park*. 319. *Rai*. I. 951. *Syn*. 331. Melilotus vulgaris & major *Trag.* 590. Melilotus filiculis pendentibus curtis lutea vulgaris officinarum *Hist.* *Ox.* II. *Secl.* II. t. 16. f. 2. Melilotus foliorum pinnis oblongis crenatis, flore parvo luteo homostichico, semine reniformi tecto filicula strigosa simplici *Kram*. 61. Melilotus filiquis turgidis, brevibus, obscure transversim rugosis *Hall*. 587.

- - - II. *Trifolium odoratum* sive Melilotus vulgaris flore candido *J. B.* II. 370. *Trifolium odoratum* seu Melilotus fruticosa candida major *Hist.* *Ox.* II. p. 161. *Lotus sylvestris floribus candidis* *Cas.* 241. *Lotus sylvestris flore albo* *Tab.* ic. 507. Melilotus Germanica *Ger.* 1205. Melilotus II. flore candido *Dod*. 567. Melilotus flore albo *Park*. 719. *Rai*. I. 951. *Heuch*. Ind. 31. Melilotus vulgaris flore albo *Heist.* I. 21. Melilotus officinarum Germaniæ flore albo *C. B. pin.* 371. *Tourn*. 407. *Rupp*. 256. *Vaill*. 124. Melilotus vulgaris major candida *Trag.* 590. Melilotus fruticosa candida major *H. Ox.* II. 161. *Boerh*. II. 29. Melilotus filiculis pendentibus curtis candida major *H. Ox.* II. *S.* II. tab. 16. f. 1. Meliloti veræ alia species flore albo *Gesn.* *Hort.* 267b. Meliloti prioris varietas *Linn.* *Roy*. & *Hall*. ll. cc.

6. Not. Hujus tabulæ figuræ iterum omnes ad naturæ ductum factæ sunt, sola eruca secundum exemplar Blackwellianum adpicta est. Fig. I. & II. floris tantum colore differunt: quibus nominibus distinguantur ab auctoribus, indicant no. I. & II. Fig. 1. est flos integer a facie superiori, a calyx, b. vexillum; fig. 2. idem a facie inferiori, a. calyx, b. vexillum, c. c. duæ alæ, d. carina; fig. 3. est vexillum separatim a facie interiori, fig. 4. una ex alis, fig. 5. d. carina, e. staminum vagina; fig. 6. 7. fructus seu filicula ab utraque facie, fig. 8. semen maturum, omnia in magnitudine naturali.

3. Kraut und Blumen erweichen, zertheilen, eröffnen und lindern die Schmerzen. Zu diesem Ende werden sie in trocknen Säcklein und feuchten Überschlügen bey Entzündungen und allerley Arten der Geschwülsten gebraucht. Das Meloten-Pflaster, so aus diesem Kraut, Schöpfen-Unschlit, Schaffleins-Pech und Wachs gekochet und zubereitet wird, ist ziehend und wird mit Nutzen bey frischen Wunden gebraucht; doch werden hauptsächlich damit die gezogene und nachmahls geöffnete Blasen verbunden.

Die benngemahlte Raupe wird von einigen Hussy genennet; Doctor MUFFET giebt ihr den Nahmen Sayl-Yard, d. i. Seegelslange: sie findet ihr Futter an den meisten grünen Pflanzen.

Anm. Alle Figuren auch dieser Tafel sind nach der Natur gemacht, nur die Raupe alleine ist nach dem Blackwellischen exemplar dazu gesetzt. Fig. I. und II. sind nur in der Farbe der Blumen unterschieden: mit welchen Nahmen sie von den Auctoribus unterschieden werden, zeigt no. I. und II. Fig. 1. ist eine ganze Blume von der obern Ansicht, a. der calyx, b. das vexillum; fig. 2. eben dieselbe von der untern Ansicht, a. der calyx, b. das vexillum, c. c. die beyde alæ, d. die carina; fig. 3. ist das vexillum abgesondert von der innwendigen Ansicht, fig. 4. eine von den alis, fig. 5. d. die carina, e. die vagina, welche die Stamina machet; fig. 6. 7. die Frucht oder Saamens-Hülse von beyder Ansicht, fig. 8. der zeitige Saame, alles in der natürlichen Grösse.

TAB. 81. *Lat.* Raphanus hortensis. *Germ.* Langer Garten-Rettig, Franz-Rettig. *Græc.* Ράπανοις, Ράπανος. *Angl.* Garden Radish, small Garden Radish. *Hisp.* Ravano, Ravanillo. *Ital.* Rafano, Radice longa. *Gall.* Re-fort, Raifort. *Bat.* Peper Wortel, Radylen.

1. Ad trium pedum altitudinem ascendit caulis, folia e nigro viridia, flores interdum purpurei sunt, interdum albi cum rubra singulorum petalorum macula.

2. Seritur in hortis, mensè Majo atque Junio floret.

3. Refertur Raphanus inter herbas atque radices aperientes, attenuantes atque antiscorbuticas, promovet urinam, & contra calculum sabulumque adhibetur.

Insectum fig. 13. Anglico idiomate vocatur Mole Kricket, a D. MUFFET Latine Gryllotalpa, quia similem his animalibus formam habere creditur. Vescitur radicibus, & ante solis occasum raro in conspectum venit.

4. NOM. GEN. Raphanus *Rai*. I. 804. *Meth*. 96. *Syn*. 296. *Tourn*. 220. *Heuch*. Ind. 12. *Rupp*. 72. *Boerh*. II. 11. *Heist*. II. 24. *Syst*. 9. *Linn*. G. no. 658. *Roy*. 344. *Kram*. 22. *Ludvv*. no. 404. *Wachend*. 167.

5. NOM. SPEC. Radix *Casalp.* 353. Radicula sativa minor *Dod*. 676. *Ger.* 237. Raphanus *J. B.* II. 846. *Rai*. I. 804. *Syn*. 296. Raphanus II. *Matth.* 441. Raphanus longus *Cam.* Ep. 224. Raphanus minor *Fuch*. 661. Raphanus minor purpureus *Lob.* ic. 291. Raphanus minor oblongus *C. B. pin.* 96. *Morif.* H. II. 265. *S.* III.

2. 13 f. 4. *Tourn.* 229. *Rupp.* 72. *Boerb.* II. 17. *Weinmann.* tab. 360. a. *Raphanus minor oblongus albus & ruber vulgo Francicus Kram.* 22. *Raphanus filiquis teretibus torosis bilocularibus Linn. H. Cliff.* 340. *Roy.* 344. *Wachend.* 167.

6. *Nota.* Raphani genus in duas potissimum dividitur species: radice namque rotunda & longa; sed ambæ intuitu magnitudinis & corticis coloris in multas abeunt varietates, quæ ab hortulanis nostri ævi studiosissime in usum potissimum culinarem coluntur. Ob radicem totam purpuream singularis est illa varietas secundæ speciei, quæ secundum exemplar Blackvellianum hic sistitur, cui pro charactere generico accuratius explicando junximus *fig. 2 - p. 12.* partes floris fructusque ex illa varietate defumtas, cujus nomina specifica indicavimus & cujus radice longæ, gracilis, albæ in summitate purpureæ, omnibus notissimæ, elegans figura depingitur in opere Weinmanniano l. c. *Fig. 2.* ostendit ramulum florigerum cum floribus a facie anteriori, *fig. 3.* florem separatim a facie laterali, ubi a. calyx, b. b. quatuor petala, c. stylus, d. d. quatuor stamina extra floris oras prominentia; *fig. 4.* easdem partes demtis petalis, ubi præter calycem a. stylum c. & quatuor stamina d. d. in conspectum veniunt reliqua duo stamina e. e. breviora; *fig. 5.* stylum e., sex stamina d. d. e. a calyce denudata; *fig. 6.* stylum ab omnibus separatim. *fig. 7.* filiquas. *fig. 8.* filiquam maturam *fig. 9.* eandem apertam cum seminibus in situ, *fig. 12.* semen separatim.

mina d. d. e. e. vom dem calyce entblöset, *fig. 6.* den stylum von eitige hilfe, *fig. 9.* eben dieselbe geöffnet mit den Saamen in ihrem Lager, *fig. 12.* einen abgesonderten Saamen.

Ann. Das Geschlecht des Rettigs wird vornehmlich in zwei Arten eingetheilt: nemlich mit runder und langer Wurzel; beyde aber verändern sich in Ansehung der Größe und der Rinden Farbe in vielerley varietäten, welche heutiges Tages von den Gärtnern, vornehmlich zum Küchen-Gebrauch, auf das sorgfältigste gebauet werden. Wegen der ganz purpurrothen Wurzel ist besonders diese varietät der zweyten Art, welche nach dem Blackwellischen Muster hier abgebildet ist, welcher wir, um die Geschlechts Kennzeichen deutlich fürzustellen, *fig. 2 - 9. 12.* beygefüget haben die Theile der Blume und Frucht von derjenigen varietät genommen, dessen besondere Rahmen wir angezeigt haben, und dessen lange schmale Wurzel durch ein schönes Gemälde in dem Weinmannischen Werk l. c. zu sehen ist. *Fig. 2.* zeigt ein blühendes Aestlein mit den Blumen von der vordern Ansicht, *fig. 3.* eine Blume besonders von der Seite, allwo a. der calyx, b. b. die vier Blumen-Blättlein, c. der stylus, d. d. die vier über die Fläche der Blume hervorragende Stamina; *fig. 4.* eben diese Theile nach abgenommenen Blumen-Blättlein, allwo außer dem calyce a. dem stylo c. und denen vier staminibus d. d. in Vorschein kommen die übrige zwey kürzere stamina e. e.; *fig. 5.* zeigt den stylum e., die sechs ita allen abgesondert, *fig. 7.* die Saamen-Hülsen, *fig. 8.* eine ganz abgesonderten Saamen.

TAB. 82. *Lat.* Rosa Damascena vel pallida. *Germ.* Gemeine rothe Garten-Rose, Damascener-Rose. *Græc.* Ῥόδον. *Angl.* Damask-Rose. *Hisp.* Rosas. *Ital.* Rosa. *Gall.* Roles. *Bat.* Rrovincie Roos.

1. Frutex hujus rosæ minor deprehenditur quam albarum, elatior tamen quam rubrarum; folia colore dilato gramineo tinguntur, flores subrubri apparent. 2. Colitur in hortis, ibique per aliquot æstatis menses floret.

3. Hoc genus rosarum leniter alvum laxat excernendo biliosos atque aquosos humores, unde etiam infantibus aliisque debiliore naturæ hominibus, paulo tamen fortioribus permittæ purgantibus, sæpius dari solent.

4. NOM. GEN. vid. Tab. 8. no. 4.

5. NOM. SPEC. Rosa roseo colore *Casalp.* 96. Rosa incarnata *Cam. hort.* 143. Rosa fativa II. five incarnata *Dod.* 187. Rosa Persica five incarnata *Gesn. Hort.* 276. Rosa Damascena *Lob.* 16. II. 206. *Park. Parad.* 413. *Rat.* II. 1468. Rosa Provincialis five Damascena *Ger.* 1261. Rosa Provincialis major *Tab.* 16. 1034 *conf.* *Ejusd. Kräuterb.* 1494. Rosa purpurea *C. B. pin.* 481. *Tourn.* 637. *Rupp.* 138. Rosa hortensis ex purpura albicans *Trag.* 999. Rosa rubello flore majore multiplicato five pleno, incarnata vulgo *J. B. II.* 36. Rosa caule aculeato, petiolis inermibus, calycibus semipinnatis, varietas 8. *Linn. Mater. med.* no. 241.

6. *Nota.* Hujus rosæ speciei plures quoque reperiuntur varietates, quæ petalorum dispositione, potissimum vero eorum numero majori minorive, differunt, inter quas illa Centifolia vulgo dicta speciosissima est. Sola *fig. 1.* secundum Blackvellianum exemplar exhibetur, reliquæ ad naturalem normam additæ sunt. Representatur autem *fig. 1.* ramulus floriger cum flore penitus explicato a facie anteriori. *fig. 2.* similis flos a facie posteriori cum calycis segmentis se reflectentibus b., & alabastrum cum ovario e.; *fig. 3.* calyx a facie anteriori demtis petalis, cujus fundus staminibus d. oblitus est, & stylorum fasciculus e. ex ovario proveniens; *fig. 4.* stamen separatim in magnitudine aucta; *fig. 5.* b. duo stamina in petala transmutata, quorum anthera d. adhuc clare conspicienda; *fig. 7.* calyx integer a facie laterali, ubi, demtis petalis & staminibus, ejus segmenta a. a., trium staminum reliquorum d. ortus ex calycis fundo, & stylorum fasciculus nudus e. apparet; *fig. 8.* hujus fasciculi summa superficies; *fig. 9.* ovarium verticaliter dissectum, ubi iterum staminum ortus d., stylorum fasciculus e. eorumque cum ovulis nexus e. conspicitur; *fig. 10.* 11. separatim ovulum villosum g. ejusque stylus proprius f. in naturali & aucta magnitudine; *fig. 12.* fructus maturus, *fig. 13.* semen maturum.

ihre Vereinigung mit den ovulis e. zu sehen; *fig. 10.* 11. ein abgesondertes haarigtes ovulum g. und sein eigener stylus f. in natürlicher und vermehrter Größe; *fig. 12.* eine reife Frucht; *fig. 13.* ein reifer Saame.

Ann. Von dieser Art der Rosen giebt es auch mancherley varietäten, welche in der Ordnung der Blumen-Blättlein, vornehmlich aber in der mehrern oder wenigern Zahl derselben unterschieden sind, unter welchen die insgemein sogenannte hundertblättrige die ansehnlichste ist. *Fig. 1.* wird alleine nach dem Blackwellischen Muster fürgestellt, die übrige sind nach der Natur hinzugehan. Es werden aber abgebildet *fig. 1.* ein blühender Zweig mit einer ganz geöffneten Blume nach der vordern Ansicht, *fig. 2.* eine solche Blume von der hintern Ansicht mit denen sich zurück biegenden Theilen des calycis, und ein Knopf mit dem ovario e.; *fig. 3.* der calyx von der vordern Ansicht nachdeme die Blumen-Blättlein weggenommen, dessen Grund mit den staminibus d. besetzt ist, und der Büschel von stylis e., der aus dem ovario hervorkommt; *fig. 4.* ein abgesondertes stamen in vermehrter Größe; *fig. 5.* 6. zwey in Blumen-Blättlein verwandelte stamina, deren Staubfächlein d. deutlich noch zu sehen; *fig. 7.* der ganze calyx von der Seite, allwo nach abgenommenen petalis und staminibus dessen Theile a. a., dreier zurück gelassenen staminum d. Ursprung aus dem Grunde des calycis und der Büschel von stylis e., blos erscheinen; *fig. 8.* die oberste Fläche dieses Büschels; *fig. 9.* daß ovarium nach der Länge entzwey geschnitten, allwo abermals der staminum Ursprung d., der Büschel von stylis e. und dieser

TAB. 83. *Lat.* Pisum. *Germ.* Erbsen, Erbsen. *Græc.* Πισίον. *Angl.* Pease, Field Pease, common white. *Pease.* *Hisp.* Aroveias. *Ital.* Pisello, Piso. *Gall.* Pois. *Bat.* Erweten.

1. Caules ad duos pedes assurgunt: folia saturata nitent viriditate, flores albi.

2. Seruntur in hortis atque agris. Mense Majo ferunt flores, & Junio currente maturescunt.

4. Pisa vel recentia vel cocta salsam atque scorbuticam sanguinis intemperiem edulcorare creduntur.

1. Die Stengel werden bis 2. Schuh hoch, die Blätter sind dunkelgrün, die Blüthen weiß.

2. Man sät die Erbsen in Gärten und Feldern, da sie im May blühen, und im Juny zeitigen.

3. Sie sollen das Geblüht und besonders dessen gesalzene und scorbutische Beschaffenheit versüssen, wenn sie entweder frisch oder gekocht geessen werden.

4. NOM. GEN. Pisum *Rai.* l. 890 *Meth.* 103. *Syn.* 318. *Riv.* II. p. 13. *Tourn.* 394. *Heuch.* Ind. 32. *Rupp.* 259. *Boerb.* II. 40. *Vaill.* 160. *Heist.* II. 22. *Syst.* 9. *Linn.* G. no. 706. *Roy.* 362. *Kram.* 59. *Luduv.* no. 487. *Wachend.* 189. 5. NOM.

5. NOM. SPEC. *Piscolus flore candido* *Cesalp.* 231. *Pisum Brunf.* III. 213. *Dorff.* 226. *Riv.* II. tab. 36 *Rupp.* 259. *Pisum minus* *Dod.* 521. *Matth.* 410. *Cam. Ep.* 214. *Ger.* 1219. *Pisum minus* I. Tab. ic. 496. *Pisum agreste* seu III. genus *Trag.* 606. *Pisum sylvestre* I. *Park.* 1059. *Rai. Syn.* 318. *Pisum vulgatum majus* *Lob.* ic. II. 65. *Pisum vulgare parvum album sive arvense* *J. B.* II. 297. *Rai. I.* 891. *Pisum in arvis caducum humiferpens* *Fuchs.* 628. *Pisum arvense* *Vaill.* 160. *Pisum arvense fructu albo* *Tourn.* 394 *Boerb.* II. 40. *Pisum arvense flore albo* *Heist.* II. 22. *Pisum arvense flore candido, fructu rotundo albo* *C. B. pin.* 342. *Pisum flore in singulo petiolo gemello flavo, foliis bis pinnatis, semine globoso flavo* *Kram.* 59. *Pisum stipulis crenatis* *Linn. H. Cliff.* 369. *Roy.* 362. *Pisum petiolis rotundis* *Wachend.* 180.

1. *Nota.* Primaria figura & fig. 9. est *Blackwelliana*, reliquæ sunt additæ. Fig. 2. sistitur flos a facie anteriori, fig. 3. laterali, a. calyx, b. vexillum, c. c. duæ alæ, d. carina; fig. 4. est vexillum separatum, fig. 5. 6. sunt duæ alæ separatæ, fig. 7. a. a. calyx, d. carina; fig. 8. e. staminum vagina; fig. 9. filiqua nondum matura aperta, fig. 10. integra, fig. 11. maturitatis proxima aperta, fig. 12. semen maturum.

Ann. Die Haupt-Figur und fig. 9. sind *Blackwellisch*, die übrige hinzugehan. Damit werden abgebildet fig. 2. eine Blüthe von vornen, fig. 3. von der Seite, a. der calyx, b. das vexillum, c. c. die beyden alæ, d. die carina; fig. 4. ist das vexillum besonders, fig. 5. 6. die beyden alæ besonders, fig. 7. a. a. der calyx, d. die carina, fig. 8. e. die Scheide der staminum, fig. 9. eine unreife geöfnete Hülse, fig. 10. eine solche ganze Hülse, fig. 11. eine fast reife geöfnete Hülse, fig. 12. ein reifer Saame.

TAB. 84. *Lat.* *Galiopsis*, *Galeopsis*. *Germ.* Taube Nessel, Ede Nessel, Bien-Saug. *Græc.* γαλιόψις. *Angl.* Hedge Nettle. *Hisp.* Ortica muerta. *Ital.* Ortica morta. *Gall.* Ortie morte. *Bat.* Dove Netlen.

1. *Caulis duos pedes altus, folia e nigro viridia sunt, flos ruber.*

2. *Reperitur in sepibus ac dumetis, & Junii tempore floret.*

3. *Quidam plantam hanc ad omnis generis ulcera antiqua atque vulnera prodesse statuunt. Virtutem habet confringendi, & internum sanguinis fluxum sistendi, præcipue in mictione cruenta.*

1. Der Stengel wird 2. Schuh hoch, die Blätter sind dunkelgrün und die Blumen roth.

2. Man findet sie in Hecken und Sträuchen, sie blüht im Juny.

3. Diese Pflanze rühmen einige als ein gutes Wundkraut, welches dienlich ist in allen Arten von Wunden, und alten Schäden. Sie ziehet zusammen, stopft das innerliche Bluten, besonders wenn Geblüth mit dem Urin weggehet.

4. NOM. GEN. *Galeopsis* *Rai.* I. 547. *Meth.* 62. *Syn.* 237. *Tourn.* 185. *Dill.* 97. *Boerb.* I. 162. *Vaill.* 77. *Heist.* III. 10. *Galearia forte* *Heist.* Syst. 7. conf. p. 22. 37. 40. *Stachys Riv.* p. 5*. *p. Heuch.* Ind. 24. *Rupp.* 227. *Linn.* G. no. 579. *Roy.* 31. *Hall.* 642. *Kram.* 49. *Luduv.* no. 194. *Wachend.* 134.

5. NOM. SPEC. *Urtica Herculea* Tab. ic. 536. *Urtica Herculea* *Plinii* *Trag.* 6. *Lugd.* 1244. *Urtica* XI. *Heraclea* *Trag.* 5. *Urtica foetida maxima* *Πορφύριος* *Thal.* 132. *Lamium maximum sylvaticum foetidum* *C. B. pin.* 231. *Galeopsis* seu *Urtica iners magna foetidissima* *J. B.* III. 853. *Galeopsis vera* *Ger.* 704. *Galeopsis Dioscoridis* *Trag.* 6. *Galeopsis legitima Dioscoridis* *Park.* 608. *Rai.* I. 548. *Syn.* 237. *Galeopsis legitima* vel vera *Dioscoridis* *Clus.* XXXV. *Galeopsis procerior foetida spicata* *Tourn.* 185. *Dill.* 97. *Boerb.* I. 162. *Heist.* III. 10. *Stachys sylvatica* *Riv.* I. tab. 26. *Rupp.* 227. *Stachys sylvestris*, aliis *Urtica foetida*, item *Heraclea* *Heuch.* Ind. 24. *Stachys foetida sepium*, flagellis reptatricibus *H. Ox.* III. 382. *S. XI* t. 11. f. 10. *Stachys spica florum laxè verticillata, verticillis a se remotis spicaque herbata, foliis imis Urticæ* *Kram.* 49. *Stachys foliis cordatis acuminatis petiolatis, floribus laxè spicatis* *Linn. H. Cliff.* 309. *Roy.* 31. *Hall.* 643. *Stachys verticillis sexfloris, foliis cordatis petiolatis* *Linn. Fl. Suec.* no. 489. *Wachend.* 134.

6. *Nota.* Fig. I. 1. 2. 8. 13. ad *Blackwellianum*, reliquæ ad naturale exemplar factæ sunt. In floris magnitudine & magis adhuc in ejus colore notabilis conspicitur differentia: magnitudo equidem variat ita, ut flores in ramis lateralibus, itemque in spicæ parte superiori, sint paullo minores, id quod nostra figura 3. & 5. etiam indicat; sed eorum colorem talem, qualem *Blackwellianum* monstrat exemplar, nos nunquam observavimus: an ex eo ad varietatem huius speciei eamque constantem conclusio valeat, aliis diiudicandum relinquimus. Nostrarum figurarum expositio hæc est: Fig. II. spica florida, fig. 3. flos minor a facie anteriori, fig. 4. laterali, ubi d. stamina extra galeam paullulum prominentia; fig. 5. flos major a facie anteriori, ubi a. galea pilosa, b. b. barba segmenta duo lateralia, c. medium emarginatum, d. d. quatuor stamina, duo longiora & totidem breviora; fig. 6. galea a barba resecta & explanata cum duobus staminibus longioribus d. d. ei adherentibus; fig. 7. (calcographi errore numerus 5. iterum adscriptus est, ex quo etiam in adsculpto nomine Germanico, loco *Bien-Saug*, legitur *Birn-Saug*) barba a galea resecta & explanata, ubi b. b. ejus segmenta lateralia, c. medium emarginatum & d. d. duo stamina breviora clarius apparent; fig. 9. est calyx, fig. 10. idem apertus cum stylo e. & quatuor ovulis f. eundem in fundo calycis circumdantia; fig. 11. calyx adultior, fig. 12. idem a facie suprema cum quatuor seminibus in fundo ejus conspicuis; fig. 14. hæc quatuor semina exenta in magnitudine naturali, fig. 15. unum ex his in magnitudine aucta.

Ann. Fig. I. 1. 2. 8. 13. sind nach dem *Blackwellischen* Muster die übrigen nach der Natur gemacht. In der Größe und noch mehr in der Farbe der Blume ist ein merklicher Unterschied zu sehen: Die Größe varüet zwar also, daß die Blumen an den Neben-Ästen wie auch an dem obern Theil des Blumen-Büschels etwas kleiner seyn, welches unsere fig. 3. und 5. auch anzeigt; aber ihre Farbe haben wir also, wie solche das *Blackwellische* Muster zeigt, niemals beobachtet: Ob daraus auf eine und zwar beständige varietät dieser Art könne geschlossen werden, überlassen wir andern zu beurtheilen. Unserer Figuren Erklärung ist folgende: Fig. II. der Blumen-Büschel, fig. 3. eine kleinere Blume von vornen, fig. 4. von der Seite, allwo die stamina d. ein wenig über den Helm vorragen; fig. 5. eine größere Blume von vornen, allwo a. der haarigte Helm, b. b. die zwey Seiten-Einschnitte des Barths, c. der mittlere ausgeschweifte, d. d. die vier stamina, zwey längere und so viel kürzere; fig. 6. der von dem Barth abgeschnittene und ausgebreitete Helm mit denen d. d. daran hangenden zwey längern staminibus; fig. 7. (aus Irrthum des Kupferstechers ist abermals die Zahl 5. dazu gesetzt, durch welchen auch in dem benegestochenen teutschen Nahmen, an Statt *Bien-Saug*, gelesen wird *Birn-Saug*) der von dem Helm abgeschnittene und ausgebreitete Barth, allwo b. b. dessen Seiten-Einschnitte, c. der mittlere ausgeschweifte und d. d. die zwey kürzere stamina deutlicher erscheinen; fig. 9. ist der calyx, fig. 10. eben derselbe geöfnet mit dem stylo e. und vier ovulis f. die denselben am Grunde des calycis umgeben; fig. 11. ein mehr erwachsener calyx, fig. 12. eben derselbe von der obersten Ansicht mit den vier Saamen, die im Grunde desselben zu sehen; fig. 14. diese vier Saamen herausgenommen in der natürlichen Größe, fig. 15. einer davon in vermehrter Größe.

TAB. 85. *Lat.* *Caryophyllus ruber*, *Vetonica*, *Tunica*, *Flores Tunicae*. *Germ.* Gras-Blumen, Nelken, Garoten-Nägelein, Braune Nägelein. *Græc.* καρυόφυλλον. *Angl.* Clove July Flowers, Pinke. *Hisp.* Clavel. *Ital.* Garofoni, Garofoli. *Gall.* Oeillet, Girofle. *Bat.* Anjeliens, Groffels blcemen, Ginoffel, blcemen.

1. *Caulis & folia diluto saligno colore virent, flores eleganter rubent.*

1. Stengel und Blätter sind lichtweidengrün, die Blumen schön roth.

2. Edu-

K 2

2. Sie

2. Educantur in hortis, & Julio mense florent.

3. Flores usum præstant in omnibus nervorum atque capitis morbis, confortant caput & cor, solvunt lipothymiam, medentur palpitacioni cordis, in febribus etiam malignis aliisque utiliter adhiberi possunt. Prostant in officinis Syrupus & Conserva florum.

4. NOM. GEN. Caryophyllus Rai. II. 986. Meth. 109. Syn. 335. Tourn. 329. Heuch. Ind. 16. Prov. I. 38. Dill. Cat. Giff. 94. &c. Boerb. I. 216. Heist. II. 7. Kram. 40. Tunica Rupp. 117. Dill. H. Elsh. 400. Hall. 381. Ludvv. no. 563. Dianthus Linn. G. no. 430. Roy. 443. Wachend. 77.

5. NOM. SPEC. I. Betonica altera altilis, Betonica seu Vetonica coronaria Fuchs. 351. 354. Betonica coronaria five Caryophyllos flore simplici sativus J. B. III. 328. Caryophillea altilis Trag. 533. Flos Gariofilus Casalp. 253. Caryophyllæus flos major simplex saturate rubens Dod. 174. Caryophyllus flore simplici Heist. II. 7. Caryophyllus sylvestris major vulgarior Lob. sc. 440. Caryophyllus hortulanus, Betonica coronaria Tab. ic. 287. Caryophyllus hortensis Rai. II. 986. Caryophyllus hortensis simplex flore majore C. B. pin. 208. Tourn. 331. H. Ox. II. 561. S. V. t. 25. f. 9. Boerb. I. 217. Tunica hortensis simplex Rupp. 117. Dianthus floribus solitariis, squamis calycinis subovatis brevissimis, corollis crenatis Linn. H. Cliff. 164. H. Ups. 104. Roy. 443. Wachend. 77. Dianthus floribus subsolitariis, corollis crenatis, squamis calycinis subovatis brevissimis Linn. Mat. med. no. 213.

II. Betonica coronaria vulgaris sativa J. B. III. 325. Caryophylli domestici Matth. 578. Cam. Ep. 350. Caryophyllus multiplex Lob. sc. 441. Tab. ic. 283. Ger. 588. Caryophyllus flos major multiplex saturate rubens Dod. 173. Caryophyllus altilis major C. B. pin. 207. Tourn. 330. H. Ox. II. p. 561. Boerb. I. 217. Herba Tunica quibusdam C. B. pin. 207. b. Tunica hortensis plena Rupp. 117.

6. Nota. Fig. I. 1. Blackwelliani exemplaris est imitatio, reliquæ ad naturæ normam additæ sunt. Hujus speciei variatio innumerabilis ferme est, five petalorum colorem five eorum numerum & magnitudinem spectes. Nostræ figuræ sunt illam, quæ Tunica florum nomine medico usu celeberrima est, a qua Blackwelliana figura non nisi colore rubro dilutiori differt, sed cum reliquis ex officinis pharmaceuticis excluditur. Naturalis hujus floris petalorum numerus est quinquarius, quem monstrat fig. II. 3., & ad quem pertinent nomina no. I. indicata; hic vero sponte sua sæpissime augetur fig. III. cujus varietatis nomina specifica exhibentur no. II. Partes hujus floris hæc sunt: a. fig. II. calyx simplex cylindraceus, fig. 4. idem fillus & explanatus, b. fig. II. 3. 5. 7. calycis squamæ imæ, c. fig. II. 3. quinque petala, fig. 2. unum ex his separatim, fig. 6. petalum separatim floris multiplicati ex stamine transformatum, cujus vestigium d. adhuc conspicitur; d. d. fig. 5. stamina, e. e. fig. 5. 7. 8. bini styli, f. fig. 3. 7. ovarium, fig. 8. hoc ovarium dissectum; g. fig. 9. placenta cui ovula circum circa adherent, fig. 10. in magnitudine aucta.

set; g. fig. 9. die placenta, an welcher die ovula um und um anhängen, fig. 10. in vermehrter Grösse.

2. Sie werden in Gärten gezogen, und stehen in der Blüthe im July.

3. Die Blumen sind Haupt- und Herzstärkend und werden in allen Krankheiten der Nerven und des Haupts mit Nutzen gebraucht. Sie dienen in bössartigen und andern Fiebern, ingleichen bey Ohnmachten und Herzklopfen. In den Apotheken hat man besonders hievon den Saft und die Conserve der Blumen.

Num. Fig. I ist nach dem Blackwellischen Muster gemacht, die übrige sind nach der Natur beigezeichnet. Die Veränderung dieser Art ist fast unzählig, in Ansehung so wohl der Farbe, als auch der Zahl und Grösse der Blumen-Blätlein. Unsere Figuren stellen diejenige für, welche unter dem Nahmen der braunen Däglein im Arzney Gebrauch sehr berühmt ist, von welcher die Blackwellische Figur nur alleine durch ihre hell-rote Farbe unterschieden, aber mit den übrigen aus den Apotheken ausgeschlossen ist. Die natürliche Zahl der Blumen-Blätlein ist fünf, welche fig. II. 3. anzeigt, und welcher die no. I. angezeigte Drahmen zukommen; sie mehret sich aber öfters von sich selbst fig. III., zu welcher Veränderung die besondere Drahmen no. II. gehören. Die Theile dieser Blume sind folgende: a. fig. II. der einfache cylinderrörmige calyx, fig. 4. eben derselbe gespalten und ausgebreitet, b. fig. II. 3. 5. 7. die unterste Schuppen des calycis, c. fig. II. 3. die fünf Blumen-Blätlein, fig. 2. eines von diesen abgesondert, fig. 6. ein abgesondertes Blumen-Blätlein der gefüllten Blume, das aus einem Stamme verwandelt ist, dessen Ueberbleibsel d. noch zu sehen; d. d. fig. 5. die stamina, e. e. fig. 5. 7. 8. die beyde styli, f. fig. 3. 7. das ovarium, fig. 8. das ovarium in zween Theile zertheilt, fig. 10. in vermehrter Grösse.

TAB. 86. Lat. Scrophularia aquatica. Germ. Wasser-Betonick, Weisser Nachtschatten, Wurm-Kraut, Klei-ne Braun-Wurz (huic & sequenti tabulæ ex errore insculptum est Durr-Wurz) Angl. Water Betony, Water Figwort. Ital. Scrofularia. Gall. Scrofulaire, Herbe de Siege. Bat. Speen-Kruid, S. Antuenis-Kruid.

1. Hæc planta caules alit crassiores atque altiores quam Scrophularia altera, ramos gestat pauciores, folia tamen sunt latiora & petiolis longioribus instructa. Hujus autem caules ac folia etiam pallidiori viriditate, sicut & flores lucidiore rubedine, colorantur.

Crescit in locis palustribus & prope piscinas: Floret mense Junio.

3. Laudantur in doloribus atque tumoribus hæmorrhoidum, refertur inter purificantia atque vulneraria & adhibetur contra scabiem.

Animalculum fig. 14. depictum reperiebatur medio Junii in margine piscinæ cujusdam, quod hæcenus nunc in aqua, nunc extra eam vivum quoque conservatum est. Herbæ atque vermiculi alimentorum loco fuerunt: unde Squillæ speciem esse arbitror.

1. Diese hat dickere und höhere Stengel, als die andere Braun-Wurz, sie hat weniger Aeste aber breitere Blätter, welche auf längern Stielen stehen. Die Blätter und Stengel von dieser sind mattergrün, die Blumen aber heller roth.

2. Sie wächst an sumpfigten Orten und bey Weyern oder Teichen, ihre Blüht-Zeit ist im Juny.

3. Man rühmet sie in Schmerzen und Geschwulst der guldernen Ader und Feigwarzen, sie wird gebraucht zum reinigen, und als ein Wund-Kraut, ingleichen wider die Krätze.

Die Creatur fig. 14. wurde am Rande eines Teichs in der mitte des Juny gefunden, und bis hieher hat man sie bald im Wasser, bald auf der Erde, lebendig erhalten. Man hat sie mit Kräutern und kleinen Würmen gefüttert; es scheint mir daher eine species Squillæ zu seyn.

4. NOM. GEN. Scrophularia Rai. I. 764. Meth. 89. Syn. 283 *. Tourn. 166. Riv. I. p. 5 **. 19. Heuch. Prov. I. 58. Rupp. 241. Dill. 127. 145. Boerb. I. 234. Vaill. 181. Heist. III. 19. Linn. G. no. 612. Roy. 243. Hall. 618. Kram. 45. Ludvv. no. 252. Wachend. 150.

5. NOM. SPEC. Ocymastrum majus Trag. 185. Clymenum in aquosis seu fœmina Gesn. hort. 254. b. Betonica aquatilis Dod. 50. Betonica aquatica Tab. ic. 544. Ger. 715. Park. 613. Galeopsis Casalp. 349. Scrofularia nullis grumis ad radicem adnatis Clus. CCXIX. Scrofularia altera in humidis nascens, caule quadrangulo, nullis radicem scrofulis Gesn. hort. 280. Scrophularia fœmina Cam. Ep. 867. Scrophularia radice fibrosa H. Ox. II. 482. S. V. t. 8. f. 4. Boerb. I. 234. Scrophularia maxima, radice fibrosa J. B. III. 421. quoad descriptio nem,

nem, *Sideritis Monspeffulana Ejusd. III. 426. Scrophularia aquatica major C. B. pin. 235. Rai. I. 764. Syn. 283*. Tourn. 166. Rupp. 241. Vaill. 181. Scrophularia aquatica major caule fimbriato Loeffl. Fl. Pruss. 248. Scrophularia palustris caule alato Heist. III. 19. Scrophularia palustris minus foetida, caule alato Hoffm. Fl. Alt. Dill. 145. Scrophularia folio simplici Urticæ, radice fibrosa Kram. 45. Scrophularia foliis conjugatis ex elliptico decrescentibus caule & ramo paniculatis nudisque spicis terminatis Hall. 618. Scrophularia foliis cordatis petiolatis decurrentibus, caule acutangulo, racemis terminalibus Linn. H. Upf. 177. Mat. med. no. 311.*

6. *Nota.* Blackwellianis fig. I. 1. 9. 12. 14. addimus reliquas: explicatio earum hæc est. Fig. I. II. caulis floriger; fig. 1. 2. flos a facie anteriori seu inferiori, a. calyx, b. b. corollæ segmenta duo superiora erecta, c. c. duo lateralia patula, d. quintum & infimum reflexum; fig. 3. idem flos a facie posteriori seu superiori cum foraminulo e. infra duo segmenta superiora; fig. 4. duo segmenta superiora a reliquis resecta cum foraminulo e. a facie anteriori seu inferiori; fig. 5. duo segmenta lateralia & infimum resecta a facie interiori cum quatuor staminibus f. f. adhærentibus; fig. 6. a. calyx a corolla separatus, g. stylus; fig. 7. 8. ovarium a calyce resecto denudatum in naturali & aucta magnitudine, g. stylus, h. ovarium; fig. 9. 10. fructus seu capsula feminalis matura, fig. 11. transversim secta; fig. 12. 13. semen in naturali & aucta magnitudine; fig. 14. folium inferius cum insecto peculiari, quod repræsentavit & descripsit Blackwellianum opus; fig. III. radix hujus speciei fibrosa.

Anm. Der Blackwellischen Fig. I. 1. 9. 12. 14. haben wir die übrigen beygefüget; ihre Erklärung ist folgende. Fig. I. II. der blühende Stengel, fig. 1. 2. eine Blüthe von der vordern oder untern Ansicht, a. calyx, b. b. die zween obere und aufrechtstehende Einschnitte der Blüthe, c. c. die zween seitwärts stehende und ausgebreitete Einschnitte, d. der fünfte und unterste zurückgebogene; fig. 3. eben diese Blüthe von der hintern oder obern Ansicht mit einem Löchlein e. unter den zween obern Einschnitten; fig. 4. die zween obere von den übrigen abgeschnittene Einschnitte mit dem Löchlein e. von der vordern oder inwendigen Ansicht; fig. 5. die zween seitwärts stehende Einschnitte und der unterste von den übrigen abgeschnitten, von der inwendigen Ansicht mit denen darans hangenden vier staminibus f. f.; fig. 6. a. der calyx von der Blüthe abgesondert, g. stylus; fig. 7. 8. das ovarium, von dem abgeschnittenen calyce entbloßet, in der natürlichen und vermehrten Größe, g. der stylus, h. das ovarium; fig. 9. 10. eine zeitige Frucht oder Saamen-Capsel, fig. 11. nach der quer entzwey geschnitten, fig. 12. 13. der Saame in natürlicher und vermehrter Größe; fig. 14. ein unteres Blatt mit einem besondern Insect, welches in dem Blackwellischen Werk abgebildet und beschrieben ist; fig. III. die faserichte Wurzel dieser Art.

geschnitten, fig. 12. 13. der Saame in natürlicher und vermehrter Größe; fig. 14. ein unteres Blatt mit einem besondern Insect, welches in dem Blackwellischen Werk abgebildet und beschrieben ist; fig. III. die faserichte Wurzel dieser Art.

TAB. 87. *Lat.* Scrophularia major vel nodosa foetida. *Germ.* Grose Braun-Wurz, Knoten-Kraut, Feigwarzen-Kraut. *Größ Feigwarzen-Kraut, Schwarzer Nachtschatten, Brauner Nachtschatten. Engl.* Great Figwort, common Kobby-rooted Figwort. *Ital.* Scrofolaria. *Gall.* Grande Scrolaire, Scrofulaire. *Bat.* Groot Speenkruyt.

1. *Altitudo* hujus plantæ tribus pedibus æqualis est, folia gramineam viriditatem obtinent, flores purpurei sunt.

2. *Crescit* in sepibus & fruticetis, Junius flores producit.

3. Hæc planta, ob signaturam suæ radicis, in induratis glandularum tumoribus omnium corporis partium, præcipue scrofulis, quas Angli *Kings Evil* five morbum regium vocant, commendari solet. Remedium quoque est tam internum quam externum in dolorificis hæmorrhoidum tumoribus. Cancrosis insuper ulceribus rebellibus inservit.

Insectum fig. 13. amat præ reliquis plantis utramque Scrophulariæ speciem.

4. *NOM. GEN.* vid. Tab. 86. præcedentem no. 4.

5. *NOM. SPEC.* Ocimastrum *Trag.* 184. Clymenum cum nodis in radice seu mas *Gesn. hort.* 254. b. Galeopsis, Scrophularia major officinarum *Fuchsf.* 194. Braunwurz *Brunsf.* I. 213. Scrophularia *Ejusd.* I. 215. *Dorft.* 265. b. *Matth.* 1130. *Cam. Ep.* 866. *Dod.* 50. *Riv. I. t.* 107. *Rupp.* 241. *Dill.* 127. Scrophularia seu Castrangula *Tab. ic.* 542. Scrofularia radice tuberculis oblita *Clusf. CCIX.* Scrofularia major *Casalp.* 349. *Gesn. hort.* 280. Scrophularia major *Lob. ic.* 533. *Ger.* 716. *Rai. I.* 764. *Syn.* 283*. *Lugd.* 1085. Scrophularia vulgaris *Park.* 610. Scrophularia vulgaris & major *F. B. III.* 421. Scrophularia nodosa foetida *C. B. pin.* 235. *Læssl. Fl. Pruss.* 250. *H. Ox. II.* 482. *S. V. t. 8. f.* 3. *Tourn.* 166. *Boerb. I.* 234. *Vaill.* 181. Scrophularia folio simplici Urticæ, radice nodosa foetida, flore purpureo *Kram.* 45. Scrophularia foliis oppositis, racemo terminali *Linn. H. Cliff.* 322. *Fl. Suec. no.* 520. *Roy.* 293. *Wachend.* 150. Scrophularia foliis cordatis, caule obtusangulo, racemo terminali *Linn. Mat. med. no.* 310. Scrophularia foliis cordatis conjugatis, caule & ramis spica nuda paniculata terminatis *Hall.* 619.

6. *Nota.* Blackwellianis figuris I. II. 1. 2. 8. 11. 13. reliquas addimus: sislitur autem fig. 3. flos a facie superiori seu posteriori, a. calyx, b. duo corollæ segmenta superiora erecta; fig. 4. idem a facie inferiori seu anteriori, a. calyx, b. duo corollæ segmenta superiora, c. c. duo lateralia, d. infimum reflexum; fig. 5. idem flos per medium infimi segmenti d. d. dissectus & explanatus a facie interna cum quatuor staminibus e. e. corollæ tubo adhærentibus; fig. 6. 7. a. ovarium a calyce denudatum, f. stylus; fig. 9. capsula feminalis matura, fig. 10. transversim secta, fig. 12. semen; fig. III. radix recens efflosa ex nodis & fibris composita.

ein Saame; fig. III. eine frisch ausgegrabene aus Knoten und Fasern zusammengesetzte Wurzel.

1. Der Stengel wird 3. Schuh hoch, die Blätter sind grasgrün, die Blumen purpurroth.

2. Es wächst in Hecken und Gebüsch, und blüht im Juny.

3. Diese Pflanze wird, wegen der Signatur ihrer Wurzel, in scrophulösen Härtingkeiten der Drüsen in allen Theilen des Körpers, und besonders in Kröpfen, welche die Engländer Kings-Evil oder die Königs-Krankheit nennen, zum Gebrauch angerathen, wie ingleichen sowohl äußerlich als innerlich bey schmerzhaften Geschwulsten der guldernen Ader gegeben, und dienet auch in krebshaftern widerspenstigen Geschwühren.

Die Raupe fig. 13. ist den beeden Arten des Feigwarzen-Krauts gemein, und bedienet sich derselben mehr als aller übrigen Pflanzen.

6. *Anm.* Den Blackwellischen Fig. I. II. 1. 2. 8. 11. 13. haben wir die übrigen beygefüget. Damit wird fürgestellt fig. 3. eine Blume von der obern oder hintern Ansicht, a. der calyx, b. die zween obere aufrecht stehende Einschnitte; fig. 4. eben diese Blume von der untern oder vordern Ansicht, a. der calyx, b. die zween obere Einschnitte der Blume, c. c. die zween seitwärts stehende, d. der unterste zurückgebogene; fig. 5. eben diese Blume durch die Mitte des untersten Einschnitts d. d. entzwey geschnitten und ausgebreitet von der innwendigen Ansicht mit denen an die Röhre der Blume angewachsenen vier staminibus e. e.; fig. 6. 7. a. das von dem calyce entbloßte ovarium; f. der stylus; fig. 9. eine zeitige Saamen-Capsel, fig. 10. quer entzwey geschnitten, fig. 12.

TAB. 88. *Lat.* Lactuca. *Germ.* Garten-Lattig, Garten-Salat. *Græc.* ὀπιδάχ, ὀπιδανίμ. *Angl.* Lettice, Garden-Lettuce. *Hisp.* Lechuga, Alfalfa, Alfaca. *Ital.* Lactuca. *Gall.* Laituë, Laituë. *Bat.* Lettewe, Lattouwe, Salaet.

1. *Caulis* ad altitudinem duorum vel trium pedum crescit, folia dilute viridia, flores flavi sunt.

1. Der Stengel wird 2. bis 3. Fuß hoch, die Blätter sind hellgrün, die Blumen gelb.

a. Sc-

L

2. Man

2. Seritur in hortis, & pro ratione sationis diversæ, etiam diversis mensibus, floret.

3. Lactuca hæc in genere, commune acetariorum ingrediens, grata est stomacho, temperat calorem, sitim sedat, & humorum acridinem mitigat. Insuper urinam ciet, & lactantium lac auget. Semen lactucæ inter quatuor minora semina frigida in pharmacopoliis refertur.

4. NOM. GEN. Lactuca Rai. I. 220. Meth. 29. Tourn. 473. Heuch. Ind. 51. Prov. I. 78. II. 80. Rupp. 206. Vaill. Act. Paris. A. 1721. p. 198. Boerh. I. 81. Heist. Syst. 7. Linn. G. no. 739. Roy. 121. Kram. 78. Ludov. no. 340. Wachend. 222.

5. NOM. SPEC. Lactuca Tab. ic. 421. Casalp. 514 Lactuca rotunda Fuch. 298. Lactuca lata Trag. 258. Lactuca non capitata Heuch. Ind. 51. Lactuca florescens Matth. 521. Cam. Ep. 299. Lactuca sativa C. B. pin. 122. Dod. 644. Lugd. 546. Ger. 306. Park. 812. H. Ox. III. 37. S. VII. t. 2. f. 1. Rai. I. 220. Tourn. 473. Vaill. Act. Paris. A. 1721. p. 198. Boerh. I. 82. Rupp. 206. Linn. H. Cliff. 384. Mat. med. no. 370. Roy. 121. Wachend. 222. Lactuca sativa folio Scariolæ Lob. ic. 241. Lactuca sativa vulgaris non capitata F. B. II. 997. Kram. 78.

6. Nota. Blackwellianis figuris 1. 2. 6. subjungimus fig. 3. 4. 5. 7. 8. Repræsentat fig. 3. 4. semisflosculum in naturali & aucta magnitudine, 4. petalum lingulatum, 6. ejus tubum, 5. stylum antherarum thecæ inclusum, 7. pappum, 8. ovulum; fig. 5. f. calycem persistentem, 8. semina matura; fig. 7. 8. semen maturum in naturali & aucta magnitudine, 6. pappum, i. semen.

2. Man sät ihn in den Gärten, er blühet verschiedentlich, nachdem er in diesem oder jenem Monate gesät worden.

3. Der Lattig wird überhaupt zu dem gewöhnlichsten Salad genommen, er ist den Magen angenehm, vermündert die Hitze, löscht den Durst, und mildert die Schärfe derer Feuchtigkeiten in dem Körper, er treibet den Urin und vermehret die Milch zum Säugen; der Saamen desselben ist einer von den 4. kleinen kalten Saamen der Apothecken.

Anm. Den Blackwellischen fig. 1. 2. 6. haben wir beigelegt fig. 3. 4. 5. 7. 8. welche abbilden fig. 3. 4. ein Blümlein in natürlicher und vermehrter Grösse, 2. das zungenförmige Blättlein, b. dessen Röhre, c. den in der Scheide der Staubfächlein eingeschlossenen Stylum, d. den pappum, e. das ovulum; fig. 5. f. den bis zur Reifung des Saamens bleibenden calycem, g. die zeitige Saamen; fig. 7. 8. einen zeitigen Saamen in natürlicher und vermehrter Grösse, h. den pappum, i. das Saam-Korn.

TAB. 89. Lat. Acanthus, Acanthus sativus, Branca Ursina. Germ. Welsche Bärnklaue. Græc. Ακανθός, Ακανθώ, Ακανθώ. Angl. Bears Breech, Brank-Ursin. Hisp. Yerva Giguante, Branqua Ursina. Ital. Acantho, Branca orfina, witte Malve, Acante. Bat. Beeren Clauw.

1. Hæc planta duos pedes alta foliis e nigro viridibus & splendentibus, albis autem floribus ornatur. Antiquis temporibus artifices secundum eotypum prædictorum foliorum ornamenta sua finxisse, ex autorum relatione constat.

2. Colitur hæc planta in hortis, in Italiæ autem, Hispaniæ & meridionalibus Galliæ regionibus illa sponte crescit, & Julio currente floret.

3. Adhibetur potissimum ad clysteres atque balnea in obstructionibus & calculo. Mulierculæ herbariæ, loco hujus plantæ, folia Helleborastri vel vulgaris Spondylii ignorantibus vendere solent.

Papilio x. ex eruca tab. 76. depicta ortus est.

4. NOM. GEN. Acanthus Rai. II. 1325. Meth. 92. Tourn. 176. Riv. p. 5**. 16. Heuch. Ind. 27. Rupp. 241. Boerh. I. 238. Heist. I. 1. Linn. G. no. 640. Roy. 304. Kram. 49. Ludov. no. 239. Wachend. 147.

5. NOM. SPEC. Carduus acanthus, sive Branca Ursina F. B. III. 75. Acanthus Matth. 673. Cam. Ep. 442. Acanthus vulgo Branca Ursina Casalp. 333. Acanthus aliis Branca Ursina Heuch. Ind. 27. Acanthus lævis H. Eyst. Æst. O. XI. t. 2. f. 3. Acanthus mollis Riv. tab. 87. Rupp. 241. Acanthus mollis Vigiliæ Heist. I. 1. Acanthus non spinosus H. Ox. III. 604. Acanthus non spinosus mollis Kram. 49. Acanthus sativus Dod. 719. Lob. ic. II. 2. Tab. ic. 685. Ger. 1147. Parkin. 992. Rai. II. 1326. Acanthus sativus, id est, Branca Ursina vulgo dicta Gesn. hort. 244. Acanthus sativus vel mollis Vergiliæ C. B. pin. 383. Tourn. 176. Boerh. I. 238. Acanthus vera seu legitima Fuch. 51. Acanthus verus seu peregrinus Trag. 863. Acanthus foliis sinuatis inermibus Linn. H. Cliff. 326. Roy. 304. Wachend. 147.

1. Sein Stengel steigt bis 2. Fuß hoch, die Blätter sind von glänzend dunkler grüner Farbe, und die Blumen weiß. Die alten Autores berichten, daß die Künstler von diesem Kraut das Muster zu denen Blättern der Zierathen genommen haben.

2. Diese Pflanze wird in Gärten gezogen, in Italien aber, Spanien und denen Mittägigen Theilen Frankreichs wächst es von selbst, und blühet im July.

3. Sie wird hauptsächlich zu Clystiren und Bädern in Verstopfungen, dem Stein und Gris genommen. Die Kräuter Weiber verkaufen die Blätter von Heleboraster oder der teutschen Bären-Klaue denenjenigen, welche es nicht verstehen, an statt dieses Krauts.

Der Sommer-Vogel oder Schmetterling x. ist aus der Raupe, so auf der 76. Kupfer-Tafel abgebildet ist, geworden.

TAB. 90. Lat. Althæa, Ibisus, Bismalva. Germ. Ibis, Eibisch, Wurz und Kraut, Heyl-Wurz, Sammet, Pappeln. Græc. Αλθαία, Αλθαία, Εβισκος, Βισμαλβα, Αναδινδρομαλβα. Angl. Marshmallows. Hisp. Hierva Caunamera, Marmaje. Ital. Malvavischio, Malvavisco, Altea. Gall. Guimauve ordinaire. Bat. Althæa, witte Huemst, Heems-Wortel.

1. Altitudo duarum ulnarum mensuram excedit, folia e flavo viridia sunt, flores pallide rubent.

2. Nascitur in locis salis atque palustribus, flores agit mense Julio.

3. Vi gaudet emolliendi, maturandi atque leniendi, in stranguria, calculo, sabulo, ardore urinæ, acris stomachi atque intestinorum humoribus, tussi, raucedine, tumoribus atque inflammationibus utiliter applicanda. Præparata officinalia sunt syrupus

1. Der Stengel wird über 2. Ellen hoch, die Blätter werden gelblichtgrün, die Blumen bleichroth.

2. Sie wächst in salzig und sumpfigen Boden, und blüht im July.

3. Diese Pflanze erweicht, zeitiget und lindert; ist sehr nützlich bey der Harnwinde, Sand, Stein, brennenden Urin, scharfen Feuchtigkeiten des Magens und der Gedärme, Husten, Heusferkeit, Geschwulsten und Entzündungen. Gewöhnliche Præparata officinalia hiervon sind

pus de althæa, Pulvis dialthææ, vnguentum dialthææ.

sind der Saft, das Pulver, und die Salbe von der Eibisch-Wurzel.

4. NOM. GEN. Althæa Rai. I. 608. Meth. 86. Syn. 252. Tourn. 97. Heuch. Ind. 3. Prov. I. 13. II. 28. Dill. 144. Boerb. I. 269. Vaill. 10. Heist. I. 3. Syst. 8. Linn. G. no. 680. Roy. 357. Kram. 12. 14. Luduv. no. 146. Wachend. 130. Malva Rupp. 15.

5. NOM. SPEC. Malva sylvestris vel palustris aut Ibiscus Hist. Ox. II. 522. S. V. t. 19. f. 12. Herm. H. L. Bat. 400. Malva palustris mollis & incana Rupp. 15. Anadendromalache & Althæa Galeni Casalp. 561. Althea Brunsf. III. 132. Cam. Ep. 667. Althea officinarum Heist. I. 3. Althæa Dorst. 5. b. Trag. 370. Math. 925. Althæa, Ibiscus Dod. 655. Lob. ic. 653. Gesn. hort. 245. b. Ger. 933. Althæa, Ebiscus, Ibiscus Fuchs. 16. Althæa Hibiscus, Bismalva Tab. ic. 769. Althæa sive Bismalva J. B. II. 954. Althæa Dioscoridis & Plinii C. B. pin. 315. Tourn. 97. Boerb. I. 269. Dill. 144. Althæa vulgaris Clus. XXIV. H. Eyst. Æst. O. VI. t. 4. f. 1. Park. 304. Rai. I. 602. Althæa officinarum Vaill. 10. Althæa flore incarnato Heuch. Ind. 3. Althæa foliis simplicibus tomentosis Linn. H. Clif. 348. Roy. 375. Wachend. 130.

6. Nota. Huius tabulæ Blackwellianis figuris I. II. 8. 11. reliquas adposuimus. Sifit autem fig. 2. integrum florem a facie laterali, fig. 3. a facie anteriori seu interiori, fig. 4. ita verticaliter dissectum, ut staminum tubus seu cylindrus ejusque cum corolla nexus atque ovarium integrum cum stylo per staminum tubum transeunte in situ & ordine naturali appareant; fig. 5. est ovarium cum stylo denudatum; fig. 6. calyx interior semiquinquefidus ab exteriori separatus a facie posteriori seu exteriori; fig. 7. calyx interior cum exteriori multifido (minus accurate vero in hac figura ab interiori distincto) conjunctus a facie anteriori cum ovario adultiori in fundo conspicuo; fig. 8. idem cum seminum perfectorum orbiculo; fig. 9. receptaculum seu axis, cui seminum orbiculus affixus est, cum styli particula persistente; fig. 12. unum ex seminibus folliculo suo adhuc inclusum, fig. 13. denudatum.

Anm. Auf dieser Tafel haben wir denen Blackwellischen Figuren I. II. 8. 11. die übrigen beigegeben. Es wird aber fürgestellt fig. 2. eine ganze Blume von der Seite, fig. 3. von vornen oder innen, fig. 4. also der Länge nach entzwey geschnitten, daß die Röhre oder der Cylinder der staminum und desselben Zusammenhang mit der corolla, wie auch das ganze ovarium mit dem durch die Röhre der staminum durchgehenden stylo in dem natürlichen Lager und Ordnung erscheinen; fig. 5. das ovarium mit dem stylo ganz bloß; fig. 6. der innwendig bis auf die Helfte fünfmal getheilte calyx von dem auswändigen abgesondert nach der hintern oder auswändigen Ansicht; fig. 7. der innwendige calyx mit dem auswändigen vielfachgetheilten (in dieser Figur aber nicht deutlich genua unterschiedenen) vereinigt von der vordern Ansicht mit einem mehr ausgewachsenen auf dem Grund zu sehenden ovario; fig. 9. eben dieses mit der Scheiben der vollkommenen Saamen; fig. 10. das receptaculum oder die Axt, an welcher die Saamen-Scheibe den Saamen in seinem Wälglein noch eingeschlossen, fig. 13. von

anhänget, mit einem bleibenden Theil des styli; fig. 12. einer von demselben entblößet.

TAB. 91. Lat. Chelidonium majus, Papaver corniculatum luteum. Germ. Gold-Wurz, Schell-Wurz, Schellkraut, Schöl-Kraut. Græc. χελιδόνιον μέγα Angl. Great Celandine, Yellow-horn-Poppy. Hsp. Celiduenha, Celiduenha. Yerva del las Golondrinas. Ital. Celidonia maggiore, Herba Donna. Gall. Grande Chelidoine, Esclaire, Grande Esclaire, Herbe de Jaunisse. Bat. Chelidonia, Goudwortel, Schelkruyt, stinkende Gounee, Gouwe.

1. Crescit in altitudinem unius pedis, folia glauca, flores flavi sunt.

2. Nascitur in locis incultis, ruinosis muris atque ædificiis, & Maji atque Junii tempore flores producit.

3. Refertur ad plantas aperientes atque mundificantes, dissipat obstructions lienis atque epatis, estque contra icterum atque scorbutum insigne remedium. Quidam ipsi virtutem cor roborandi & veneno pestilentiali resistendi attribunt. Insuper ad ophthalmiam, catarrhos, maculas, pannos, leucomata, pustulas, aliaque scorbutica exanthemata depellenda prodest.

4. NOM. GEN. Papaver Rai. I. 853. Meth. 100. Syn. 308. Chelidonium Tourn. 231. Heuch. Ind. 12. Rupp. 71. Dill. 56. Boerb. I. 305. Vaill. 35. Heist. I. 3. Syst. 9. Linn. G. no. 496. Roy. 478. Hall. 305. Kram. 22. Luduv. no. 447. Wachend. 116. Chelidonium majus Heist. Syst. 35.

5. NOM. SPEC. Papaver corniculatum luteum Chelidonia dictum Rai. Syn. 309. Chelidonia Brunsf. I. 236. Dorst. 78. b. Trag. 106. J. B. III. 482. Rapp. 71. Chelidonium majus Trag. 107. Fuchs. 865. Dod. 48. Lob. ic. 760. Gesn. hort. 253. Casalp. 269. Matth. 628. Cam. Ep. 402. Tab. ic. 41. Ger. 1096. Rai. I. 858. Lugd. 1250. Chelidonium majus vulgare Clus. CCIII. C. B. pin. 144. Park. 617. Hist. Ox. II. 257. S. III. t. 11. f. 2. Tourn. 231. Dill. 56. Boerb. I. 305. Vaill. 35. Chelidonium majus officinarum Heist. I. 8. Chelidonium flore luteo vulgo Chelidonium majus Heuch. Ind. 12. Chelidonium folio rapaceo quasi & pinnato vulgare Kram. 22. Chelidonium pedunculis multifloris Linn. H. Clif. 201. Mat. med. no. 252. Roy. 478. Wachend. 116. Chelidonium lobis subrotundis Hall. 305.

6. Nota. Blackwellianæ imaginis ramulus tantum floriger fig. I. 1. fructus & semen 6. 11. ut & radix fig. 13. hic apparet; reliquæ figuræ secundum naturale exemplar factæ sunt. Fig. 2. repræsentat florem a facie antica, 3. laterali, 4. postica, ubi a. a. fig. 4. calyx bifolius, caducus; b. fig. 2. 3. stylus cum ovario, c. stamina; fig. 5. fructus seu siliqua, fig. 7. matura siliqua cum seminibus in situ, una ejus valva ablata, fig. 8. 9. utraque valva separata, fig. 11. 12. semen maturum in naturali & aucta magnitudine. Ceterum monemus, RAIVM quidem (quemadmodum etiam LINNÆVM) Chelidonium inter Papaveris corniculati seu Glaucii Tournefortii species retulisse, sed ut speciem peculiarem a Papavere corniculato flore luteo distinxisse.

1. Es steigt bis einen Fuß hoch, die Blätter sind bläulichgrün, die Blumen gelb.

2. Es wächst in öden Gründen, bey eingefallenen Gebäuden und auf alten Mauern, blüht im May und Juny.

3. Man zählet es zu denen eröffnend- und reinigenden Pflanzen, es zertheilet die Verstopfungen des Milches und der Leber, und wird mit Nutzen bey der Gelbsucht und dem Scharbock gebraucht. Einige eignen ihm eine Herzkärkende und dem Pestilentialischen Gift widerstehende Kraft zu. Außerlich ist es dienlich zu bösen Augen, die Flüsse zu verzehren, Flecken, Felle, Mäler, Blattern, und scorbutischen Ausschlag zu zertheilen.

Anm. Von den Blackwellischen Fürstellungen erscheint hier nur ein blühendes Nestlein Fig. I. 1., Frucht und Saame fig. 6. 11. und die Wurzel fig. 13., die übrigen sind nach der Natur gemacht. Fig. 2. ist zu sehen eine Blume von vornen, fig. 3. von der Seite fig. 4. von hinten, allwo a. a. fig. 4. der calyx, der aus 2. Blätlein bestehet und bald abfällt, b. fig. 2. 3. der stylus mit dem ovario, c. die stamina, fig. 5. die Frucht oder Schotten, fig. 7. eine zeitige Schotte mit den Saamen in ihrem Lager nachdeme der eine Deckel abgenommen; fig. 8. 9. die beyde Deckel besonders, fig. 11. 12. ein zeitiger Saame in natürlicher und vermehrter Gröfse. Im übrigen erinnern wir, daß RAIVS zwar (gleichwie auch LINNÆVS) das Chelidonium zu den Arten des Papaveris corniculati oder Glaucii Tournefortii gerechnet, aber von dem Papavere corniculato flore luteo als eine besondere Art unterschieden habe.

TAB. 92. *Lat.* Galega, Ruta capraria. *Germ.* Geiß-Raute, Flecken-Kraut. *Angl.* Goats-Rue, *Ital.* Galega, *La.* vanese, *Gall.* Vefce sauvage, Ruë de Chevres *Bat.* Geytenkruyt.

1. Caulis duas ferme ulnas æquat, folia viridia ceu gramen, flores subcærulei sunt.

2. In variis Italiæ locis sponte crescit. In Anglia autem propagatur in hortis, ubi tempore Junii atque Julii flores agit.

3. Galega confortat cor, excitat sudorem, expellit venenum, & in morbis acutis, febribus, variolis atque morbillis egregiam affert medelam. Enecat quoque vermes, & morsus animalium venenatorum sanat.

4. NOM. GEN. Galega *Rai.* I. 911. *Meth.* 192. *Tourn.* 398. *Riv.* II. p. 9. 15. *Heuch.* Ind. 33. *Rupp.* 265. *Boerh.* II. 45. *Heist.* I. 13. *Syst.* 9. *Linn.* G. no. 692. *Roy.* 386. *Hall.* 576. *Kram.* 62. *Ludvv.* no. 497. *Wachend.* 178.

5. NOM. SPEC. Ruta capraria *Gesl. hort.* 277. b. Ruta capraria, Fœnum Græcum sylvestre *Tab. ic.* 135. *Caprago Casalp.* 249. Galega *Dod.* 548. *Lob. ic.* II. 57. *Lugd.* 976. *Ger.* 1253. *J. B.* II. 342. *Rai.* I. 911. *Riv.* tab. 72. *Linn.* H. *Cliff.* 362. H. *Ups.* p. 208. *Mat. med.* no. 349. *Roy.* 386. *Hall.* 576. *Wachend.* 178. Galega sive Ruta capraria *Matth.* 739. *Cam. Ep.* 497. *Park.* 417. Galega flore pallide cæruleo, quibusdam Galega Italica *Heuch. Prov.* I. 66. Galega flore cinereo *H. Eyst. Æst.* O. X. t. 12. f. 2. Galega flore cæruleo *Heist.* I. 13. Galega major frutescens *Kram.* 62. Galega vulgaris *Clus. CCXXXIII.* C. B. pin. 352. H. Ox. II. 91. S. II. t. 7. f. 9. Galega vulgaris Cæruleis floribus *Tourn.* 398. *Rupp.* 265. *Boerh.* II. 45.

6. *Nota.* In hactabula Blackwellianarum imaginum ramulus cum flore tantum fig. I. conspicitur, qui flores fig. 1. colore cæruleo non naturali pinguntur, & fig. 7. 9. 10. siliqua & semen, quæ pariter non bene sistuntur. Nostris figuris secundum naturale exemplar adornatis repræsentantur fig. II. ramus florens; fig. 3. flos integer, a. calyx, b. vexillum, c. alæ, d. carina; fig. 4. vexillum separatim; fig. 5. una ex alis separata; fig. 6. idem flos ablatis alis & vexillo, a. calyx, d. carina, e. vagina staminum; fig. 7. a. calyx, f. pistillum in staminum vagina latens denudatum; fig. 8. ramulus cum siliquis maturis; fig. 11. semina matura; fig. 12. radix.

1. Der Stengel wird bey 2. Ellen hoch, die Blätter sind grasgrün, die Blumen bleichblau.

2. In verschiedenen Orten Italiens wächst es wild, hier aber wird es in Gärten gezogen, und trägt seine Blüthe im Juny und July.

3. Geißraute stärket besonders das Herz, treibet Schweiß und Gift aus, und ist sehr gut in hitzigen Krankheiten. Es wird in den meisten Fiebern, Blattern und Masern mit Nutzen gebraucht, bringet die Würmer um, und dienet zur Cur des Bisses giftiger Thiere.

4. Auf dieser Tafel ist von dem Blackwellischen Abbildungen nur alleine fig. I. ein Zweiglein mit der Blüthe zu sehen, welche Blüthen mit einer nicht natürlichen blauen Farbe gemahlet sind, und fig. 7. 9. 10. die Frucht und Saame, die ebenfalls nicht gut vorgestellt werden. Mit unsern nach der Natur gemachten Abbildungen werden angezeigt fig. II. ein blühender Ast; fig. 3. eine ganze Blume, a. calyx, b. vexillum, c. alæ, d. carina; fig. 4. das vexillum alleine; fig. 5. eine von den alis besonders; fig. 6. eben diese Blume nachdem die alæ und das vexillum davon abgenommen, a. calyx, d. carina, e. die Scheide der staminum; fig. 7. a. calyx, f. das bloße pistillum, welches in der Scheide der staminum verborgen lieget; fig. 8. ein Aestlein mit zeitigen Schotten; fig. 11. zeitige Saamen; fig. 12. die Wurzel.

TAB. 93. *Lat.* Rhaponticum vulgare, Centaurium majus. *Germ.* Rhapontic, Groß-Tausendgulden-Kraut. *Græc.* Κενταύριον μέγα. *Angl.* Great Centory. *Hisp.* Ruipontic. *Ital.* Centaurea maggiore. *Gall.* Rapontic vulgaire, Grande Centaurée. *Bat.* Gemeyne Rapontick, Gemeyne Rabarber, Groote Guldewortel, Groote Sentory.

1. Alta est hæc planta quinque vel sex pedes, folia sunt dilute viridia, flores purpurei.

2. Sponte crescit in Italia, apud nos autem colitur in hortis, floret tempore Julii.

3. Radix siccatur, adstringit, & ad omnis generis fluxiones utilis est, sistit sanguinem ex ore, naribus aliisque corporis partibus profluentem. PLINIVS autor est, hanc plantam nomen accepisse a CHIRONE CENTAVRO, utpote qui ejus ope vulnus ab HERCVLIS sagittâ sibi inflictum feliciter sanasse dicatur, unde adhuc, illam vulneribus medendis salutarem esse, judicatur.

4. NOM. GEN. Centaurium majus *Rai.* I. 329. *Meth.* 40. *Tourn.* 449. *Boerh.* I. 143. *Heist.* Syst. 7. 35. Centaurea *Linn.* H. *Cliff.* 421. *Roy.* 137. *Wachend.* 218. Centauria *Linn.* G. ed. I. no. 671. II. no. 805. *Ludvv.* no. 366. Chironia *Rupp.* 187. *Kram.* 70. Rhaponticoides *Vaill. Act. Paris.* A. 1718. p. 177. Rhaponticum *Hall.* 687.

5. NOM. SPEC. Centaurium magnum *Dod.* 334. *Matth.* 653. *Cam. Ep.* 425. *Ger.* 546. *Rai.* I. 329. Centaurium majus *Lob. ic.* 712. Centaurium majus vulgo Rhaponticum *Tab. ic.* 779. Centaurium majus vulgo Rhaponticum alterum *Gesl. hort.* 252. b. Centaurium majus vulgare *Park.* 466. Centaurium majus I. vulgare *Clus. hist.* X. Centaurium majus folio in lacinias plures diviso C. B. pin. 117. *Tourn.* 449. *Boerh.* I. 144. Centaurium majus Iuglandis folio *J. B.* III. 38. H. Ox. III. 131. S. VII. t. 25. f. 1. Centaurea major *Casalp.* 540. Centaurea calycibus inermibus, squamis ovatis, foliis pinnatis, foliolis ferratis, decurrentibus *Linn.* H. *Cliff.* 421. *Roy.* 137. *Wachend.* 218. Rhapontica, Centaurium majus *Trag.* 138. Rhaponticoides major, folio in amplos lacinias diviso *Vaill. Act. Paris.* A. 1718. p. 179. Chironia Rivini *Rupp.* 187. Chironia elatior, folio in plures lacinias dissecto, flore purpureo *Kram.* 70.

1. Der Stengel wird 5. bis 6. Fuß hoch, die Blätter sind lichtgrün, die Blumen purpursfarbig.

2. In Italien wächst es wild, hier aber blüht es in den Gärten im July.

3. Die Wurzel trocknet, ziehet zusammen und ist in allen Arten der Flüsse zu gebrauchen, indem es das Blut aus der Nase, dem Mund, und andern Theilen stillt. Man rühmet es auch in Heilung der Wunden, da es, wie PLINIVS schreibt den Nahmen von dem CENTAVRO CHIRONE führet, welcher sich selbst eine Wunde, die er von dem Pfeil des HERCVLIS bekommen, durch den Gebrauch dieses Krauts soll gehelet haben.

TAB. 94. *Lat.* Androsæmum vulgare, Clymenon. *Germ.* Cunrads-Kraut, S. Ceciliaen-Kraut, Johannis-Kraut mit grossen Beeren, Sicilianisch Grundheil. *Græc.* Ανδροσαμνον *Angl.* Tutlan, Park leaves. *Ital.* Androsæmo. *Gall.* Toutlain.

1. Caules altitudinem duorum vel trium pedum assequuntur; folia viriditate graminea tincta, flores flavi, maturæ autem baccae purpureæ apparent.

1. Die Stengel wachsen 2. bis 3. Schuh hoch, die Blätter werden grasgrün, die Blumen gelb, die Beeren aber wenn sie reif sind purpurroth.

2. Cres-

2. Es

2. Crescit in virgultis & sepibus, mense Julio floret.

Folia atque flores simili cum Hyperico vulgari virtute gaudent, & tanquam herba vulneraria tam interne quam externe adhiberi solent. Galli vocant Toutfain, i. e. totum sanum, unde Angli corrupte Tutfan pronunciant.

4. NOM. GEN. Hypericum Rai. II. 1017. Meth. 109. Syn. 343. Linn. G. no. 736. Roy. 470. Wachend. 108. Siciliana Heuch. Ind. 17. Androsæmum Tourn. 251. Rupp. 142. Boerh. I. 243. Vaill. 12. Heist. I. 4. Kram. 32. Luduv. no. 611.

5. NOM. SPEC. Clymenon Italarum Ger. 543. Clymenum Italarum sive Siciliana, non est Androsæmum Lob. ic. 632. Herba Siciliana Tab. ic. 760. Siciliana H. Eyf. Æst. O. VIII. t. 10. f. 1. Heuch. Ind. 17. Siciliana sive Clymenum Plinii Gesn. hort. 281. Siciliana, aliis Ciciliana vel Androsæmum J. B. III. 384. Hypericum maximum, Androsæmum vulgare dictum Rai. Syn. 343. Hypericum floribus trigynis, fructu baccato, foliis ovatis pedunculo longioribus Linn. H. Clif. 380. Roy. 473. Wachend. 108. Androsæmum, herba Hyperico similis & cognata Gesn. hort. 246. b. Androsæmum sive Hypericum bacciferum Heist. I. 4. Androsæmum Dod. 78. Lugd. 1156. Trag. 75. Casalp. 395. Kram. 32. Androsæmum vulgare Park. 575. Rai. II. 1020. Androsæmum majus Siciliana sive Ciciliana vulgo Cam. hort. 15. Androsæmum maximum frutescens C. B. pin. 280. Tourn. 251. Boerh. I. 242. Rupp. 142. Vaill. 12. Androsæmum maximum (quali frutescens) bacciferum H. Ox. II. 472. S. V. t. 6. f. 12.

6. Nota. Blackvellianis fig. I. 10. 13. addidimus reliquas ad naturale exemplar factas. Aliqua quidem differentia apparet inter utrumque exemplar, præsertim in floris magnitudine, ejus petiolorum longitudine & fructus maturi colore; sed quum nostrum exemplar in horto cultum est, Blackvellianum vero farfan sponte crevit (indigena namque est Angliæ planta) hæc differentia inde deduci potest. Nostris figuris sistitur fig. 11. flos expansus a facie anteriori ejusque quinque petala & staminum copia; fig. 3. a facie laterali, ubi apparet a. calyx, b. b. petala, c. c. stamina demtis anterioribus, ut pistillum simul in conspectum veniat; fig. 4. idem demtis omnibus staminibus, ut appareat nudum pistillum, nempe ovarium d. & styli tres e.; fig. 5. flos expansus cum calyce quinquepartito a. a. & petalis quinque b. b. a facie posteriori; fig. 6. 7. stamen separatim in naturali & aucta magnitudine; fig. 8. 9. pistillum separatim, d. ovarium, e. tres styli; fig. III. racemus cum fructu maturo nigricante 11. & calyce a. persistente; fig. 12. bacca seu fructus transversim sectus; fig. 14. 15. semina in naturali & aucta magnitudine.

2. Es steht in Hecken und Gebüsch und blüht im July.

3. Blätter und Blumen haben vieles von der Natur des ordentlichen Johannes-Krauts, und werden sowohl innerlich als äußerlich als ein gutes Wund-Kraut gebraucht. Die Franzosen nennen es Toutfain, All-Heyl, und daher die Engländer corrupte Tutfan.

Anm. Der Blackwellischen Fig. I. 10. 13. haben wir die übrigen nach der Natur beygefügt: es erscheint zwar einiger Unterschied zwischen beyden Mustern, vornehmlich in der Größe der Blume, Länge derselben Stielen und Farb der zeitigen Frucht; alleine weil unser Muster im Garten gezogen worden, das Blackwellische aber vielleicht wild gewachsen ist, denn diese Pflanze in Engelland einheimisch ist, so kan dieser Unterschied davon hergeleitet werden. Mit unsern Figuren wird abgebildet Fig. II. 2. eine offene Blüthe von vornen, dessen 5. Blätlein und Menge der staminum; fig. 3. von der Seite, a. a. der calyx, b. b. b. die Blumen-Blätlein, c. c. die stamina, von welchen die vordern weggenommen, daß das pistillum zugleich gesehen werde; fig. 4. eben diese Blume, davon alle stamina weggenommen, daß das pistillum bloß erscheine, nemlich das ovarium d. und die 3. styli e.; fig. 5. eine offene Blüthe mit dem fünffachgetheilten calyce a. a. und fünf Blumen-Blätlein b. b. von hinten; fig. 6. 7. ein abgesondertes stamen in natürlicher und vermehrter Größe; fig. 8. 9. das abgesonderte pistillum, d. das ovarium, e. die 3. styli; fig. 11. ein Zweiglein mit der reifen schwarzlichten Frucht 11. und dem beständig bleibenden calyce a.; fig. 12. ein über quer

entzwey geschnittenes Beer oder Frucht; fig. 14. 15. der Saame in natürlicher und vermehrter Größe.

TAB. 95. Lat Perfoliata vulgaris. Germ. Durchwachs, Bruch-Wurz. Angl. Thorow-Wax. Ital. Perfogliata. © Gall. Perfoliate, Percefeuille. Bat. Deurwas.

1. Altitudo mensuratur pede uno, folia glauca seu ex cæruleo viridia, flores ex viridi flavi conspiciuntur.

2. Reperitur in agris frumento obsitis; flores producit Junius atque Julius.

3. Hæc planta ad plantas vulnerarias refertur & vel in pulverem redacta vel decocta usum habet in vulneribus recentibus, contusionibus, herniis atque ulceribus inveteratis manantibusque.

4. NOM. GEN. Perfoliata Rai. I. 471. Meth. 53. Syn. Ed. II. 115. Riv. III. p. 11. 17. Heuch. Ind. 38. Rupp. 281. Dill. 124. Boerh. I. 72. Heist. I. 24. Kram. 63. Bupleurum Tourn. 309. Vaill. 24. Rai. Syn. Ed. III. 221. Linn. G. no. 272. Roy. 109. Hall. 436. Luduv. no. 685. Wachend. 4.

5. NOM. SPEC. Sefeli Æthiopicum nigrum Casalp. 296. Perfoliatum Fusch. 632. Perfoliatum vulgatus flore luteo folio umbilicato Lob. ic. 396. Perfoliata Dorst. 215. Matth. 1156. Cam. Ep. 888. Dod. 104. H. Eyfett. Æstiv. O. IV. t. 3. f. 3. Riv. III. t. 46. Dill. 124. Perfoliata Rivini & officinarum Rupp. 281. Perfoliata II. Tab. ic. 759. Perfoliata vera Brunf. I. 182. Edit. 1539. Perfoliata major Trag. 482. Gesn. hort. 271. b. Perfoliata flore luteo Heuch. Ind. 38. Perfoliata vulgaris Ger. 536. Park. 580. H. Ox. III. 299. S. IX. t. 12. f. 1. Rai. I. 471. Syn. Ed. II. 115. Perfoliata simpliciter dicta vulgaris annua J. B. III. 198. Perfoliata latifolia vulgaris Heist. I. 24. Perfoliata vulgatissima seu arvensis C. B. pin. 277. Boerh. I. 72. Perfoliata vulgatissima major Kram. 63. Bupleurum perfoliatum rotundifolium annum Tourn. 310. Vaill. 24. Rai. Syn. Ed. III. 221. Bupleurum foliis ovatis perfoliatis Linn. H. Clif. 104. Roy. 109. Hall. 437. Wachend. 4. Bupleurum involucris universalibus nullis, foliis perfoliatis Linn. H. Ups. p. 64. Mat. med. no. 136.

6. Nota. Ex figuris Blackvellianis conspicitur tantum Fig. I. ramulus cum umbella fig. 1. florente, fig. 4. umbella partialis, fig. 11. semina & fig. 15. ima caulis pars cum radice: reliquæ figuræ ad naturæ ductum factæ sunt, quibus repræsentatur Fig. II. planta hæc cum umbellis nonnullis fig. 2. flores, aliisque fig. 3. semina maturefcentia continentibus; fig. 5. umbella partialis a facie superiori, fig. 6. laterali ubi a. a. involucrum florum quinquefolium, b. flores in eo contenti; fig. 7. involucrum hoc a facie inferiori; fig. 8. flos separatim in magnitudine naturali, fig. 9. aucta a facie laterali, fig. 10. superiori, ubi a. quinque petala se reflectentia, d. quinque stamina cum antheris

1. Es wächst bis einen Schuh hoch, die Blätter sind bläulichgrün, die Blumen grünlichtgelb.

2. Man findet es in Korn-Feldern, da es im Juny und July blühet.

3. Durchwachs wird unter die Wund-Kräuter gezählet, und in frischen Wunden, Quetschungen, Brüschchen, alten und fließenden Schäden, entweder als ein Pulver oder abgesotten gebraucht.

4. NOM. GEN. Perfoliata Rai. I. 471. Meth. 53. Syn. Ed. II. 115. Riv. III. p. 11. 17. Heuch. Ind. 38. Rupp. 281. Dill. 124. Boerh. I. 72. Heist. I. 24. Kram. 63. Bupleurum Tourn. 309. Vaill. 24. Rai. Syn. Ed. III. 221. Linn. G. no. 272. Roy. 109. Hall. 436. Luduv. no. 685. Wachend. 4.

5. NOM. SPEC. Sefeli Æthiopicum nigrum Casalp. 296. Perfoliatum Fusch. 632. Perfoliatum vulgatus flore luteo folio umbilicato Lob. ic. 396. Perfoliata Dorst. 215. Matth. 1156. Cam. Ep. 888. Dod. 104. H. Eyfett. Æstiv. O. IV. t. 3. f. 3. Riv. III. t. 46. Dill. 124. Perfoliata Rivini & officinarum Rupp. 281. Perfoliata II. Tab. ic. 759. Perfoliata vera Brunf. I. 182. Edit. 1539. Perfoliata major Trag. 482. Gesn. hort. 271. b. Perfoliata flore luteo Heuch. Ind. 38. Perfoliata vulgaris Ger. 536. Park. 580. H. Ox. III. 299. S. IX. t. 12. f. 1. Rai. I. 471. Syn. Ed. II. 115. Perfoliata simpliciter dicta vulgaris annua J. B. III. 198. Perfoliata latifolia vulgaris Heist. I. 24. Perfoliata vulgatissima seu arvensis C. B. pin. 277. Boerh. I. 72. Perfoliata vulgatissima major Kram. 63. Bupleurum perfoliatum rotundifolium annum Tourn. 310. Vaill. 24. Rai. Syn. Ed. III. 221. Bupleurum foliis ovatis perfoliatis Linn. H. Clif. 104. Roy. 109. Hall. 437. Wachend. 4. Bupleurum involucris universalibus nullis, foliis perfoliatis Linn. H. Ups. p. 64. Mat. med. no. 136.

Anm. Von denen Blackwellischen Figuren ist nur alleine zu sehen Fig. I. ein Ast mit einer fig. 1. blühenden umbella, fig. 4. eine von den abgetheilten umbellis, fig. 12. die Saamen und fig. 15. der unterste Theil des Stengels mit der Wurzel: die übrige Figuren sind nach der Natur gemacht, mit welchen abgebildet wird Fig. II. diese Pflanze mit einigen fig. 2. noch blühenden und andern fig. 3. schon reifende Saamen tragenden umbellis; fig. 5. eine von den abgetheilten umbellis nach der obern und fig. 6. nach der seiten Ansicht, allwo erscheint a. a. die fünfblätterichte Decke der Blumen, b. die in derselben enthaltene Blumen; fig. 7. diese Decke von unten, fig. 8. ein abgesondertes Blümlein in der natürlichen

theris globosis, *e.* pistilli superficies suprema cum stylis exiguis in medio, *f.* ovula bina infra florem; *fig. 11.* umbella emarcida cum seminibus maturis, *fig. 13.* bina semina matura conjuncta singulos flores succedentia, *fig. 14.* eadem divisa a facie contigua.

Des Blümlein folgen, *fig. 14.* eben diese zertheilt von der Ansicht,

lichen Größe, *fig. 9.* vergrößert von der Seite, *fig. 10.* von oben, allwo *c.* die fünf sich zurückbiegende Blumen-Blättlein, *d.* die fünf Stamina mit ihren runden Staubfächlein, *e.* die oberste Fläche des pistilli mit denen sehr kleinen stylis in der Mitte, *f.* die beyde ovula unter der Blume; *fig. 11.* eine verwelkte umbella mit zeitigen Saamen; *fig. 13.* die beyde vereinigte zeitige Saamen, die auf ein je wo sie einander berühren.

TAB. 96. *Lat.* Asclepias, Vincetoxicum, Hirundinaria. *Germ.* Schwalben-Wurz. *Græc.* Ἀσκληπιάς Dioscori. *dis.* *Angl.* Swallow-Woort, White Swallow-Woort, Tame Poison. *Ital.* Vincetossico, Asclepiade volgare. *Gall.* Asclepias, Vincpoison, Dompsevenin. *Bat.* Swaluwe Wortel.

1. Caulis sesquipedem altitudine æquat, folia saturate viridia, flores albi sunt.

2. In Anglia reperitur in hortis, flores agens mense Junio atque Julio.

3. Radix hujus plantæ insigne antidotum in specie contra malignas Apocyni aliarumque herbarum venenatarum qualitates dat remedium. Puncturas quoque ac morsus animalium venenatorum sanat, utilis est in febribus malignis pestilentialibusque, ubi sudorem excitat præterea hydropæ & ictero affectis pariter propinatur.

4. NOM. GEN. Asclepias *Rai. II. 1090. Meth. 78. Tourn. 93. Dill. 65. Boerb. I. 312. Vaill. 16. Heist. I. 4. Syst. 8. Linn. G. no. 224. Roy. 410. Hall. 525. Luduv. no. 99. Wachend. 51. Vincetoxicum Heuch. Ind. 4. Rupp. 25. Kram. 11.*

5. NOM. SPEC. Hirundinaria *Brunf. II. 39. Dorst. 150. b. Trag. 180. Vincetoxicum Matth. 809. Dod. 407. Vincetoxicum flore albo Kram. 11. Vincetoxicum & Hirundinaria officinarum Rupp. 25. Vincetoxicum, Asclepias, Hirundinaria Cam. Ep. 559. Asclepias Fuchs 129. Cord. Hist. 128. b. Gesn. Hort. 249. Casalp. 269. Asclepias I. & II. Tab. ic. 729. Asclepias vulgi, Apocynum Dioscoridis Col. Scirp. P. II. 37. Dill. 65. Asclepias seu Vincetoxicum Lob. ic. 630. Asclepias seu Vincetoxicum officinarum Heist. I. 4. Asclepias five Vincetoxicum multis floribus albicantibus *J. B. II. 138. Asclepias albo flore C. B. pin. 303. Ger. 898. Park. 388. Rai. II. 1090. H. Ox. III. 611. Tourn. 94. Boerb. I. 312. Vaill. 16. Asclepias foliis ex ovato lanceolatis glabris, floribus racemosis albis Hall. 525. Asclepias caule erecto annuo, foliis ovato lanceolatis, floribus confertis Linn. H. Clif. 78. Roy. 410. Asclepias caule erecto simplicissimo herbaceo, foliis cordato-lanceolatis, racemis conglomeratis alternis Linn. Fl. Suec. no. 200. Mat. med. no. 103. Wachend. 51.**

6. *Nota.* Blackwelliani exemplaris imitationes sunt *Fig. 1. 2. 3. 4.* reliquæ naturæ: his representatur *fig. 11.* pars superior hujus plantæ cum flore; *fig. 2.* flos separatus a facie anteriori, *fig. 3.* laterali; *fig. 5. 6.* calyx in magnitudine naturali & aucta; *fig. 7. 8.* quinque nectaria, totidem squamas stamina tegentes circumdantia, iterum in magnitudine naturali & aucta; *fig. 9.* pistillum ex duobus ovariis in totidem siliquis excrecentibus compositum; *fig. 10.* una ex his siliquis matura, *a.* ligamentum peculiare, quod locum firmat, ubi siliqua dehiscit; *fig. 11.* siliqua hiulca seminibus plena, *fig. 12.* ab iisdem vacua, *a.* ligamentum peculiare a siliquæ basi ejus apicem versus solutum; *fig. 13.* semen maturum cum pappo suo.

1. Der Stiel wird anderthalb Schuh hoch, die Blätter sind dunkelgrasgrün, und die Blumen weiß.

2. Es wächst in Engeland in denen Gärten, und blühet im Juny und July.

3. Die Wurzel wird als ein großes Gegen-Gift gegeben, besonders wider die schädliche Wirkungen des Apocyni und anderer giftigen Kräuter. Man nimmt sie auch beym Stich oder Biß giftiger Thiere. Sie ist nützlich in böartigen pestilenzialischen Fiebern, wo sie den Schweiß treibt. Man braucht sie auch in der Wassersucht und Gelsucht.

Ann. Nach dem Blackwellischen Muster sind *Fig. 1. 2. 3. 4.* die übrigen nach der Natur gemacht. Durch diese werden abgebildet *fig. 11.* der oberste Theil dieser Pflanze mit der Blüthe; *fig. 2.* eine abgesonderte Blüthe von der vordern Ansicht, *fig. 3.* von der Seite; *fig. 5. 6.* der calyx in der natürlichen und vermehrten Größe; *fig. 7. 8.* die fünf nectaria, die eben so viele Schuppen, welche die stamina bedecken, umgeben, ebenfalls in der natürlichen und vermehrten Größe; *fig. 9.* das pistillum, welches besteht aus zweyen ovariis, woraus eben so viele Schotten erwachsen; *fig. 10.* eine zeitige Schotte, *a.* das besondere Band, welches die Schotte befestiget, wo die Schotte aufspringet; *fig. 11.* eine aufgesprungene und mit den Saamen angefüllte Schotte, *fig. 12.* eine leere Schotte, *a.* das besondere von dem Grunde der Schotte gegen seine Spitze aufgelöste Band, *fig. 13.* ein zeitiger Saame mit seinem pappo.

TAB. 97. *Lat.* Malus Punica, Punica mala, Granata, Flores Balaustræ. *Germ.* Granat-Äpfel-Baum, Gefüllte Granaten-Blüthe. *Græc.* Πόνια, Πόνι. *Angl.* Pomgranates, the double flowrs of wild Pomegranat. *Hisp.* Granadas. *Ital.* Melagrano, Pomo granato. *Gall.* Grenadies, Pomes de Granades, Mygrains. *Bat.* Granat-Appelen, Granaat Boom.

1. Hæcarbor exigua est altitudine, ejus rami paucis quibusdam spinis armantur; folia diluto virore, flores autem coccineo colore splendent.

2. Crescit non solum in Hispania atque Italia, sed & in aliis regionibus compluribus; flores durante Junio atque Julio prædeunt.

3. Balaustræ officinarum sunt flores insignes atque pleni Punicæ sylvestris, ceterum non differentis. Hi flores æque, ac simplices, ut & fructus cortex eadem siccandi atque adstringendi virtute pollent, unde in varii generis fluxionibus & hæmorrhagiis usum præstant egregium. Profunt etiam gingivæ, ac dentes, si mobiles sunt, firmos reddunt. Relaxatæ insuper uvulæ, nec non cancrinis oris ulceribus opem ferre prædicantur.

4. NOM. GEN. Malus Punica *Rai. II. 1461. Meth. 143. Punica Tourn. 636. Rupp. 165. Boerb. II. 250. Heist. I. 26. Linn. G. no. 269. Roy. 267. Kram. 131. Luduv. no. 736. Wachend. 96. Granatus Heuch. Ind. 21. Granada Heist. Syst. 15.*

5. NOM. SPEC. Balaustræ *Dorst. 43. Lob. ic. II. 130. Tab. ic. 1033. H. Eyst. Æst. arb. t. 8. f. 1. Balaustræ si-*

1. Es ist ein niedriger Baum, welcher an seinen Zweigen etliche wenige Dornen hat, seine Blätter sind lichtgrasgrün, die Blumen schön scharlachfarb.

2. Der Granaten-Baum wächst in Spanien, Italien, und vielen andern Ländern, er blüht im Juny und July.

3. Die Balaustræ der officinen sind die große gefüllte Blumen des wilden Granaten-Baums, welcher am Gewächse vom andern nicht unterschieden ist. Sie sowohl als die einfache Blumen und die Rinden der Frucht trocknen sehr, ziehen zusammen, und werden daher in allerhand Arten von fluxionen und hæmorrhagien oder Blutflüssen gebraucht. Sie stärken das Zahnfleisch, befestigen die Zähne, und dienen wann das Kieferfleisch gesunken ist, wie auch in Krebsichten Geschwüren des Mundes und Halses.

ve pleni flores Granati sylvestris *Ger. 1450. Balauſtia flore pleno majore C. B. pin. 438. Malus Punica flore pleno H. R. Par. 117. H. L. Bat. 404. Malus Punica sylvestris major, ſive Balauſtium majus Park. 1511. Rai. II. 1463. Malus Punica sylvestris & ſterilis, cujus ſlos βαλαύς in nominatur Dod. 794. Punica varietas β Linn. H. Clif. 184. H. Upf. 122. Mat. med. no. 223. Punica sylvestris, cujus ſlos Balauſtium vocatur Caſalp. 141. Punica balauſtifera, ſeu Balauſtia Hiſpanica J. B. I. 82. Punica flore pleno majore Tourn. 636. Rupp. 165. Boerh. II. 250. Punica ſive Granada malus flore pleno Heiſt. I. 26. Granatus flore pleno Heuch. Ind. 21.*

6. Nota. Secundum Blackwellianum exemplar ſeſſit ramulus fig. 1.; alter fig. II. cum fig. 6. 7. naturæ imitatio eſt. Conſpicitur autem fig. 1. calyx (qui alias hoc in flore cytinus proprie vocatur) adhuc clauſus & fig. 2. 3. ſe explicans et petala denudans: ubique ovarium, ſeu calycis ima pars, diſtincta globositate comparet; fig. 4. eſt ſlos explicatus a facie laterali, fig. 5. anteriori; fig. 6. calyx verticaliter diſſectus, a. piſtillum cum ſtylo & ſtigmate capitato, b. ovarii cavum cum veſtigiiſ quibusdam ſeminum inanium ſeu ad perfectionem nullam pervenientium: ſterilis namque ſemper eſt hæc ſpecies aut potius varietas & nullis gaudet ſtaminibus, utpote quæ omnia transformantur in petala, ex quibus unum ſeparatum fig. 7. repræſentat.

Anm. Nach dem Blackwellſchen Muſter zeigt ſich das Aeſtlein fig. 1.; der andere Aeſt fig. II. nebst fig. 6. 7. iſt nach der Natur gemacht. Eſs erſcheinet aber fig. 1. der calyx (der ſonſten bey dieſer Blüthe eigentlich cytinus geneunet wird) annoch geſchloſſen und fig. 2. 3. wie er ſich außbreitet und die Blumen Blätlein entblöſet: an allen iſt auch das ovarium oder der unterſte Theil durch eine beſondere Rundung unterſchieden zu ſehen; fig. 4. iſt die außgebreitete Blume nach der Anſicht von der Seite, fig. 5. von vornen; fig. 6. der calyx der Länge nach entzwey geſchnitten, a. das piſtillum mit dem ſtylo und knopfigten ſtigmate, b. die Höhle des ovarii, mit einigen Anzeigen von tauben Saamen die niemals zur Vollkommenheit kommen: dann eſs iſt dieſe Art oder vielmehr varietät allezeit unfruchtbar und mit keinen ſtaminibus verſehen, als welche alle in Blumen-Blätlein verwandelt werden, von welchen eines abgeſondert fig. 7. fürſtellet.

TAB. 98. Lat. Balaſmita mas, Coſtus hortorum. Germ. Frauenmünz, Marien-Münz, Pfannenſuchen-Kraut, Eyer-Kraut. Angl. Coſtmary, Alecoſt. Ital. Menta Græca, Salvia Romana, Herba di S. Maria, Laſſulata, Giulia. Gall. Coch. Cocq. Mente Sarſenique. Bat. Roomsche Munte, Onſe Vrouwen Munte, Balaſm Munte, Balſeme.

1. Caulium longitudo pedem excedit, folia pallide viridia, flores lutei ſunt.
2. Colitur in hortis, & Julii tempore floret.
3. Folia robur addunt ſtomacho debili, & ex hoc provenientes capitis dolores ſedant. Flatus præterea diſſipant & acidos ventriculi ruſtus tollant. Extrinſecus ad fomentationes membrorum roborandum gratia ſæpius adhiberi ſolent.

4. NOM. GEN. Coſtus hortorum Rai. I. 363. Meth. 38. Balaſmita Vaill. Act. Pariſ. a. 1719. p. 280. Heuch. Ind. 45. Boerh. I. 125. Heiſt. I. 5. Kram. 73. Tanacetum Tourn. 461. Rupp. 195. Linn. G. no. 773. Roy. 154. Ludvv. no. 295. Wachend. 212.

5. NOM. SPEC. Herba Sanctæ Mariæ Caſalp. 483. Alifma Trag. 163. Ovaria Geſn. hort. 270. Mentha Græca Matth. 715. Cam. Ep. 480. Mentha Græca vel Romana vel Saracenica Geſn. hort. 267. b. Mentha Saracenica H. Eſtett. Aſſ. O. VII. t. 6. f. 3. Mentha hortensis corymbifera C. B. pin. 226. Mentha corymbifera ſive Coſtus hortensis J. B. III. 144. Rai. I. 363. Coſtus hortensis Lugd. 678. Coſtus hortensis recentiorum Geſn. hort. 255. b. Coſtus hortorum major Park. 78. Balaſmita major Dod. 295. H. Ox. III. p. 2. S. VI. t. 1. f. 1. Vaill. Act. Pariſ. a. 1719. p. 280. Boerh. I. 125. Balaſmita mas Ger. 648. Balaſmita vulgaris Kram. 73. Balaſmita Tanacetii flore Heiſt. I. 5. Balaſmita, aliis Tanacetum hortense Lepidii foliis ferratis, officinarum Mentha Saracenica Heuch. Ind. 45. Tanacetum hortense foliis & odore Menthæ. Herm. H. L. B. 697. Tourn. 461. Rupp. 195. Tanacetum foliis ovatis integris ferratis Linn. H. Clif. 398. H. Upf. 225. Mat. med. no. 382. Roy. 154. Wachend. 212.

6. Nota. Huic tabulæ addidimus fig. II. 1 — 5. ſecundum naturale exemplar repræſentatas, fig. 1. eſt calyx a facie inferiori, fig. 2. laterali; fig. 3. 4. floſculus in naturali & aucta magnitudine, a. ovulum; fig. 5. floſculi limbus.

Anm. Deſer & upfer-Tafel haben wir fig. II. 1 — 5. nach Anſetzung der Natur beygeſetzt. Fig. 1. iſt der calyx von der untern Anſicht, fig. 2. von der Seite; fig. 3. 4. ein Blümlein in der natürlichen und vermehrten Größe, a. das ovulum; fig. 5. die Deſnung des Blümleins.

TAB. 99. Lat. Atriplex alba hortensis, pallide virens. Germ. Melte, Milte, Molte, Weiſſe Garten-Melte. Græc. Ἀράραξ, λευκὰ ἄραρα. Angl. Arrath, Arrach, Orache, white Garden-Orache. Hiſp. Armoles. Ital. Armola, Atriplice, Repice, Trapece, Treppice, Atrepice. Gall. Arroches, Arrouches, Choux, Bonnes Dames, Folletes. Bat. Melde.

1. Caulis ad altitudinem trium ferme pedum aſcendit; folia pallide viridia, interdum purpuſcentia, flores autem e viridi flavi ſunt.

2. Seritur in hortis & Junio atque Julio menſibus floret.

3. Folia ſicut reliqua olera ſæpius coqui & cibi loco aſſumi ſolent, præcipue cum carne ſalita, & lactucæ inſtar: Virtus illorum eſt refrigerans & nutriens, exhibentur pro alvo ſolvenda, illisque, qui bile laborant, maxime proficua celebrantur. Cum aliis herbis emollientibus clyſteribus quoque ſolet immiſceri.

4. NOM. GEN. Atriplex Rai. I. 191. Meth. 22. Tourn. 505. Heuch. Ind. 53. Rupp. 340. Dill. 153. Boerh. II. 19. Heiſt. I. 5. Syſt. 11. Linn. G. no. 930. Roy. 217. Hall. 175. Kram. 34. 87. Ludvv. no. 775. Wachend. 281.

5. NOM. SPEC. Atriplex Caſalp. 160. Atriplex ſive Olus aureum Park. Parad. 488. Atriplex domestica Matth. 459. Atriplex pallide virens Heuch. Ind. 53. Atriplex alba Geſn. hort. 249. b. Atriplex hortensis Fuchſ. 118. Dod. 615. Cam. Ep. 240. Atriplex alba hortensis J. B. II. 970. Rai. I. 191. Dill. 153. Atriplex ſpuria alba hortensis

1. Der Stengel wird bis 3. Fuß hoch, die Blätter ſind bleichgrün, und manchemalen purpurfärbig, die Blumen grünlichtgelb.

2. Man ziehet ſie in Gärten, wo ſie im Juny und July blühet.

3. Die Blätter werden öfters gekocht, und geſſen wie Kraut oder Kohl, beſonders zu geſalzenem Fleiſch, und als Salad; man hält ſie für kühlend und nährend, gibt ſie zur Eröſnung des Leibes, und rühmet ſie bey galliſchen Naturen. Sie werden mit andern erweichenden Kräutern zu hiſtdämpfenden Clyſtiren genommen.

tenfis *Volk. Fl. Nor. 53. Atriplex hortensis alba sive pallide virens C. B. pin. 119. H. Ox. II. 606. Kram. 34. 37. Tourn. 505. Rupp. 340. Boerh. II. 89. Atriplex folliculata hortensis H. Ox. II. S. V. t. 32. f. 12. Atriplex maxima esculenta seu hortensis Heist. I. 5. Atriplex sativa alba Lob. ic. 253. Ger. 325. Atriplex sativa folio in luteum languescente Trag. 710. Atriplex caule erecto annuo (herbaceo) foliis triangularibus Linn. H. Clif. 469. H. Ulf. 303. Mat. med. no. 473. Roy. 217. Wachend. 281.*

TAB. 100. *Lat. Atriplex olida sylvestris. Germ. Wilde Melte, Hunds-Melte, Maugen-Kraut. Græc. Ἀλπαφα-
 ♂ + Ἰκ ἀπλα. Angl. Wild stinking Arrach, Stinking Orache. Hispan. Armoles. Ital. Repice salvatico. Gall.
 Arroches sauvages, Pate d'Oye. Bat. Wild Melde.*

1. Hujus plantæ caules humi jacent expansi, folia sunt viridia & quasi farina conspersa: flores itidem virides, sed pusilli.

2. Tota foetidum & pisces olentem spirat odorem. Crescit prope fimeta & loca deserta, atque per aliquot æstatis menses florens conspicitur.

3. Sexui muliebri præcipue herba hæc dicatur: deobstruit & laudatur in plurimis affectionibus hysteriis, promovet mensium ac lochiorum fluxum, pellit secundinas & strangulationes hystericas lenit. Datur autem plerumque in decoctis. Angli ex hujus plantæ succo & saccharo Syrupum præparare solent.

1. Die Stengel dieser Pflanze breiten sich auf der Erde aus, die Blätter sind grün und wie mit Mehl bestreut, die Blumen klein und gleichfalls grün.

2. Die ganze Pflanze hat einen starken stinkenden Fisch-Geruch. Sie wächst an Misthaufen und öden Plätzen und blühet einige Monate des Sommers.

3. Dieses Kraut wird dem weiblichen Geschlecht besonders zugeeignet: es eröffnet und wird gerühmt in den meisten Mutter-Beschwerden, befördert die Monatliche und Kindbetter-Reinigung, treibet die Nach-Geburt, und stillt die hysterische krampfhaftige Anfälle. Man giebt es inögemein in abgekochten Tränken. Die Engländer haben einen Syrup der aus dem Saft dieses Krauts mit Zucker gemacht ist.

4. NOM. GEN. Blitum *Rai. I. 195. Meth. 23. Syn. 153. Atriplex Heuch. Ind. 53. Chenopodium Tourn. 506. Rupp. 337. Dill. 106. Boerh. II. 90. Vaill. 35. Heist. I. 9. Syst. 11. Linn. G. no. 230. Roy. 218. Hall. 174. Kram. 34. Ludov. no. 776. Wachend. 251.*

5. NOM. SPEC. Garosimum *Dod. 616. Cord. hist. 256. b. Vulvaria Durant. 485. Tab. ic. 428. Lugd. 543. Cynocrambe affinis Connina Casalp. 161. Atriplicis sylvestris altera species Gesn. hort. 249. b. Atriplex olida Ger. 327. Rai. I. 198. Atriplex olida sive sylvestris foetida Park. 749. Atriplex olida pusilla hircina, & Vulvaria garum olens Lob. ic. 255. Atriplex foetida C. B. pin. 119. J. B. II. 974. H. Ox. II. 605. S. V. t. 31. f. 6. Volk. Fl. Nor. 53. Atriplex foetida vulgo Vulvaria Heuch. Ind. 53. Atriplex canina seu foetida, Bonus Henrichus, Blitum foetidum Trag. 715. Blitum foetidum Vulvaria dictum Rai. Syn. 156. Chenopodium foetidum Tourn. 506. Boerh. II. 90. Rupp. 338. Dill. 106. Vaill. 35. Heist. I. 9. Kram. 34. Chenopodium foetidum, foliis farinosis glaucis obtuse rhomboideis Hall. 175. Chenopodium foliis triangulari-ovatis Linn. H. Clif. 84. Roy. 218. Chenopodium foliis rhomboideo-ovatis integerrimis Linn. Fl. Suec. no. 216. Mat. med. no. 108. Wachend. 253. no. 11.*

6. *Nota.* Huic tabulæ Blackwellianæ addidimus fig. 2. ramulum cum flore, fig. 3. ramulum cum fructu a; fig. 5. florem a facie laterali, fig. 6. anteriori in magnitudine aucta, ubi a. calyx, b. b. quinque stamina; fig. 4. semen cum calyce persistente, fig. 7. a calyce denudatum a facie anteriori seu superiori, 8. laterali, omnia in magnitudine naturali (fig. 9. semina secundum exemplar Blackwellianum male representata) fig. 10. folium a facie superiori, fig. 11. inferiori.

Ann. Dieser Blackwellischen Tafel haben wir beygefüget fig. 2. ein Aestlein mit der Blüthe, fig. 3. ein Aestlein mit der Frucht a; fig. 5. eine Blüthe von der Seite, fig. 6. von vornen in vermehrter Grösse, allwo a. der calyx, b. b. die fünf stamina; fig. 4. der Saame mit dem beständig bleibenden calyce, fig. 7. von dem calyce entbloset von vornen oder oben, fig. 8. von der Seite, alles in der natürlichen Gröse (fig. 9. die nach dem Blackwellischen Muster übel abgebildete Saamen) fig. 10. ein Blat von der obern, und fig. 11. von der untern Ansicht.

FINIS CENTVRIÆ PRIMÆ.



INDEX NOMINVM LATINORVM.

Nomina, quæ medicis & pharmacopœis familiaria sunt, litteris grandiusculis erectis sistuntur; illa, quibus planta in hoc opere contenta indicatur, quæ quidem non ipsa, alia tamen vel ejusdem vel alius generis species, eo nomine in Germaniæ officinis pharmaceuticis nota est, litteris paribus, sed obliquis, distinguuntur. Quæ ex his nominibus officinalibus a systematicis Botanicis citatis vel penitus obsoleta censentur, vel saltem plantæ a superioris ævi auctoribus ita appellatæ nunc denegantur, præfixo * notantur. Reliqua systematicorum nomina litteris minoribus erectis, cetera, & ejusdem & alius generis speciei, litteris similibus, sed iterum obliquis, designantur.

Numerus indicat tabulam.

| | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| ABSINTHIVM 17. | Caryophyllus 85. | FICARIA 51. | Majorana 47. | SAXIFRAGA, SA- |
| Acanthus 89. | Castrangula 87. | Flos convallium 70. | Malva 54. 90. | XIFRAGIA 56. |
| Achillea 18. | Centaurea 66. 93. | Flos caryophyllus 85. | MALVA 22. | SCORDIVM 9. |
| AGRIMONIA 21. | Centaurea 66. 93. | — gariophilus 85. | * MALVA ROSEA 54. | Scorodonia 9. |
| Aiuga 64. | CENTAVRIVM 93. | — regius 26. | Malus Punica 97. | Scrophularia 86. |
| Alcea 54. | MAIVS 93. | — trinitatis 44. | Maria 79. | Scrophularia 51. |
| Alchemilla, Alchimilla, 72. | Chamæcytinus 70. | * FOENVM GRÆCVM 92. | Marifca 51. | Scrophularia 86. |
| Alchimilla 72. | CHAMÆDRTS 9. 47. | FRAGARIA 77. | Marum 47. | SCROPHVLA- |
| Alisma 52. 98. | Chamaeleon 79. | Fragaria 80. | * MARVM VERVM 47. | RIA 87. |
| ALTHEA, AL- | CHAMÆMELVM 67. | Fragula, Fragum 77. | MATRICARIA 42. | Sedum 56. |
| THAEA 90. | CHAMOMILLA 67. | Fraxinella 75. | * MATRISYLVA 60. | Sesamoides 57. |
| * AMARADVLICIS 34. | Chelidonia 51. 91. | Galearia 84. | MELILOTVS 80. | Seseli 95. |
| Anadendromalache 90. | Chelidonium 91. | GALEGA 92. | MELISSA 27. | Siciliana 94. |
| ANAGALLIS 43. | CHELIDONIVM 91. | Galeopsis 33. 84. | MELISSA 27. | Sideritis 63. 86. |
| Anagallis 48. | MAIVS 91. | Galeopsis 86. 87. | MELISSA 27. | Silybum 79. |
| Androsæmum 94. | CHELIDONIVM 91. | Galiopsis 84. | MELISSA 27. | SINAPI 29. |
| ANSERINA 6. | MINVS 51. | Galion 76. | MELISSOPHYLLVM 27. | Sinapis 29. |
| Anthemis 67. | Chenopodium 100. | Galium 76. | MENHA 32. | Sion 48. |
| Aparine 39. 60. | Chironia 93. | Galium 39. 60. 76. | Mentha 98. | Sisymbrium 28. |
| Apiastrum 27. | Chrysanthemum 42. | Garosmum 100. | MILLEFOLIUM 18. | Sisymbrium 32. |
| Apocynum 96. | Ciccorbita 30. | Garyophylla 85. | NASTVRTIVM 23. | Smilax 38. |
| Archangelica 33. | Ciciliana 94. | Gelfeminum 13. | Nasturtium 5. 68. | Solanum 34. |
| Argentina 6. | Clematis 59. | GERANIVM 58. | Orymastrum 86. | Sonchus 39. |
| ARTEMISIA 17. | Clymenum 86. 87. 54. | Glycypheros 34. | Orchis 49. 99. | Spanachium 49. |
| Arthritica 52. | Gonnina 100. | Granata, Granatus 97. | Orchis 53. | Sphacelus 9. 10. 71. |
| Aficlepias 96. | Consiligo 57. | Gruinalis 58. | Ovaria 98. | Spina alba 79. |
| Aspergula 60. | * CONSOLIDA 64. | Helleboraster 57. | PÆONIA 65. | Spinachia, Spinacia 49. |
| Aperula 60. | MEDIA 64. | Helleborastrum 57. | Papaver 2. 91. | Stachys 84. |
| Atriplex 99. 100. | Consolidamedia 42. | Helleborus 57. | PAPAVER ERRA- | Stella herba 72. |
| * BALAVSTIA, BA- | * CONSOLIDA MI- | HELLEBORVS 74. | TICVM 2. | Stellaria 72. |
| LAVSTIVM 97. | NOR 24. | ALBVS 74. | PARALYSIS 52. | Stratiotes 18. |
| Balfamita 98. | Consolida minor 64. | HELLEBORVS NIGER 57. | Parthenium 67. | Tanacetum 6. |
| Batifcula 66. | Consolida quinquifolia 63. | Henrichus bonus 100. | Pedicularia 57. | TANACETVM 98. |
| BECCABVNGA, 48. | * CONSOLIDA RE- | Hepatica 60. | Pentaphylloides 6. | Tapsus 3. |
| BECCABVNGA 48. | GALIS 26. | Heraclea 84. | PERFOLIATA 95. | Taraxaconoides 1. |
| Bedegaris 79. | Convallaria 70. | Herba paralyfis 52. | Perfoliatum 95. | TARAXACVM 1. |
| Bellis 42. | Convallium flos 70. | — Sanctæ Mariæ 98. | Periclymenum 25. | Testiculus 53. |
| Bellidioides 42. | Convolvulus 38. | — vulneraria 72. | Pervincia 59. | Teucrium 9. 47. 64. |
| Berula 48. | Costus hortorum 98. | Hibiscus 90. | Pes columbinus 58. | Thlaspi 5. |
| BETONICA 46. | Costus bortenfis 98. | Hieracium 1. | — Leonis 72. | THLASPI 68. |
| Betonica 85. 86. | Cota 67. | * HIRVNDINARIA 95. | Phaeolus 19. | Thymelæa 62. |
| Bimalva 90. | Cotula 67. | Hyacinthoides 61. | Philanthropos 39. | Tragium 75. |
| Blitum 100. | Crucialis herba 76. | Hyacinthus 61. | Pisifolus 83. | Trifolioides 20. |
| Bina 19. | Cruciata 76. | Hydropiper 48. | Pisum 83. | Trifolium 20. 80. |
| Bonus Henrichus 100. | CVCVMIS 4. | HYPERICVM 15. | PLANTAGO 14. 35. | Trifolium 77. |
| BORAGO, BORRA- | Cyanus 19. | Hypericum 94. | POEONIA 65. | Trifoli 80. |
| GO 36. | * CYNOSBATVS 8. | Jacea 44. | Polemonium 75. | Triphyllloides 20. |
| * BAANCA VRSINA 89. | Cynoforbis 53. | * IACEA 44. | Polygonatum 70. | TRITICVM 40. |
| BRVNELLA 24. | Daphne 62. | Jacea 66. | Potentilla 6. 77. | TVNICA 85. |
| Brucella 64. | Daphnoides 62. | Jasminum 13. | Primula 52. | Veratrum 74. |
| BRYONIA 37. | Delphinium 26. | Ibifcus 90. | PRIMVLA VERIS 52. | Veratrum album 74. |
| Buglossa 36. | Dens Leonis, 1. | Iris 28. | PRVNELLA 24. | — nigrum 57. |
| * BIGLOSSVM 36. | Dianthus 85. | Iris 69. | Pseudomarum 47. | Verbasculum 52. 66. |
| BVGVLA 64. | Diapensia 63. | IRIS NOSTRAS 69. | Punica 97. | VERBASCVM 3. |
| Buphthalmum 42. 67. | Dictamnus 75. | Labrum veneris 50. | Radicula, Radix 81. | VERBENA 41. |
| Bupleurum 95. | * DICTAMNVS AL- | LACTVCA 88. | Ranunculus 31. 51. | Verbenaca 41. 64. |
| Bursa, Bursa pastoria 5. | BVS 75. | LAMIVM 33. | Raphanus 81. | VERONICA 48. |
| BVRSIA PASTORIS 5. | Digitalis 16. | Lapathum 49. | Rhapontica, Rhaponti- | Vetonica 46. 85. |
| Caciliana 94. | Dipfacus 50. | LAVREOLA 62. | coides 93. | Vicia 19. |
| Calamentum 32. | Drosium 72. | Leontodon 1. | RHAPONTICVM 93. | Vinca 59. |
| * CALAMINTHA 32. | * DVLAMARA 34. | Lepidium 23. | ROSA 8. 73. 78. 82. | VINCA PERVIN- |
| * CALCATRIPPA 26. | Dulcis amara 34. | Leucanthemum 42. | Rubeola 60. | CA 59. |
| Calycotymus 70. | Ebifcus 90. | Leucographis 79. | Rubia 60. | VINCETOXI- |
| Caprago 92. | Elleborum album 74. | Liliago 70. | Rubus 45. | CVM 96. |
| Caprifolium 25. | Elleborum nigrum 57. | Lilium 11. | RVTA 7. | VIOLA 44. |
| Caprifolium 60. | Elleborus albus 74. | LILIVM ALBVM 11. | Ruta 92. | VIOLA 55. |
| Carduus 50. | Elleborus niger 57. | LILIVM CONVAL- | SALVIA 10. 71. | Virga pastoria 50. |
| CARDVVS MA- | Enneaphyllum 70. | LIVM 70. | SALVIA 10. 71. | Virginica 67. |
| RIÆ 79. | Ephemerum 70. | Lirium 28. | SANICVLA 63. | Vitis 34. 37. |
| Caryophyllus flos 85. | ERYCIVM 28. | Lonocera 25. | * SATYRIVM 53. | Volubilis 38. |
| | * EYPATORIVM 21. | Lotus 80. | Saxifraga 80. | URTICA 12. |
| | FABA 19. | Majanthemum 70. | | Urtica 33. 84. |
| | Favogello 51. | | | Vulvago 51. |
| | | | | Vulvaria 100. |

INDEX NOMINVM GERMANICORVM.

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----|--------------------------|------|-------------------------|------|--------------------------|---------|-------------------------|---------|
| Bachbunnen, Bachbun- | 48. | Frauen-Distel | 79. | Klapper-Rosen | 2. | Nessel (taube) | 33. 84. | Senff (Bauern) | 62. |
| Bachmünze | 32. | - Mantel | 72. | Klebrich, Kleb-Kraut | 39. | Nessel (todte) | 33. 84. | - (Weg) | 28. |
| Bären-Klau (welsche) | 89. | - Münz | 98. | Klee | 20. | Nieswurz (stinkende) | 57. | - (gelber) | 29. |
| - Klee | 80. | Frensam-Kraut | 44. | - {Barn- } | 20. | - weisse | 74. | - (weiser) | 29. |
| Batenige | 46. | Gäng-Blumen | 42. | - {guldbener } | 80. | Obermeng | 21. | Siebenfarben Blümlein | 44. |
| Baum-Lilie | 25. | - Distel | 30. | - {Stein } | 53. | Päonien-Rosen | 55. | Sienau | 72. |
| Baur Senff | 68. | - (gülden) | 72. | Knaben-Kraut | 37. | Pappeln (Garten) | 54. | Singrün | 59. |
| Betonick (Wasser) | 86. | Garb-Kraut | 18. | Knoten-Kraut | 3. | - (gemeine) | 22. | Speck-Lilie | 25. |
| Betonien (braune) | 46. | Gauchheil | 43. | Königs Kergen | 30. | - (Sammet) | 90. | Spinat | 49. |
| Betonien (wiesen) | 51. | Geiß-Blat | 25. | Kohl (wilder rauher Ha- | 66. | Pfaffen-Blat | 1. | Spinetsch | 79. |
| Bieberhöblein | 84. | - Raut | 92. | sen-) | 30. | - Höblein | 51. | Stech-Körner | 56. |
| Bien-Saug | 38. | Sicht-Rosen | 65. | Korn-Blume (grosse) | 3. | Pfannen-Ruchen-Kraut | 98. | Steinbrech (weiser) | 60. |
| Bindling | 38. | - Rube | 37. | - Rose | 23. | Pfingst-Rosen | 93. | Stenelwurz männl. | 53. |
| Blatter-Kraut | 51. | Gilgen, siehe Lilien. | 91. | Kress (Garten-) | 76. | Rapontick | 7. | Stiefmütterlein | 41. |
| Bohnen (Garten) | 19. | Gold-Wurz | 97. | Kreuz-Kraut (gelb) | 67. | Raute | 81. | Storch-Schnabel (gemei- | 58. |
| Borabi, Borrage, Bor- | 36. | Granat-Äpfel-Baum | 97. | Kröten-Dill | 32. | Rettig (langer Garten) | 26. | Täschel | 5. |
| retsch | 45. | Granaten = Blüthe (ge- | 97. | Rüß-Blumen | 1. | Rittersporn | 82. | Täschel-Kraut | 41. |
| Bram- Beer | 24. | füllte) | 85. | Runradts-Kraut | 57. | Rose (Damascener) | 78. | Tausendguldin = Kraut | 93. |
| Braunellen | 87. | Gras-Blumen | 45. | Läuf-Kraut | 88. | Rose (gem. rothe Garten) | 73. | Tode Nessel | 33. 84. |
| Braunwurz, grosse | 86. | Grasbeer | 6. | Lattig (Garten-) | 60. | - (gefeinte rothe) | 8. | Weil (Blauer) | 55. |
| - kleine | 12. | Grünsich | 49. | Leber-Kraut (Stein-) | 11. | - (weise) | 54. | - Neben | 13. |
| Brenn-Nessel | 45. | Gründheyl | 43. | Lilgen | 69. | - (Heck) | 25. | Violen (Merken) | 55. |
| Brombeer | 95. | - Sicilianisch | 94. | Lilie (blaue Garten-) | 1. | - (wilde) | 2. | Waizen (Grät) | 40. |
| Buchwurz | 67. | Grünig | 72. | Lilie (blaue Schwert-) | 25. | - (Herbst) | 54. | Walb-Männlein | 60. |
| Camlien (stinkende) | 94. | Gülden Gänserich | 64. | - (Speck) | 11. | - (Mund) | 65. | - Meiser | 86. |
| C. Ceciliaen Kraut | 57. | - Gungel | 76. | - (weise) | 1. | - (Stock) | 88. | - Bungen | 48. |
| Christ-Wurz, wilde | 43. | - Waldmeister | 80. | Lufftröblein | 79. | - (Gerich) | 10. | - (spiziger) | 14. |
| Coralen-Blümlein | 4. | - Klee | 4. | Marien-Distel | 98. | - (Korn) | 90. | Weinraute | 7. |
| Eucumern | 94. | Gurken | 31. | - Münz | 42. | - (Päonien) | 63. | Weizen Grät | 40. |
| Eunradts Kraut | 67. | Hahnen-Fuß | 30. | Maßlieben, grosse, | 100. | - (Pflingst) | 18. | Wermut | 17. |
| Dill (Kröten-) | 75. | Hafen-Kohl (wilder, rau- | 28. | Maugen-Kraut | 99. | - (Schafgarbe) | 51. | Winde | 38. |
| Diptam (gemeiner) | 79. | her) | 43. | Meyen-Blümlein | 27. | - (Schell-Kraut) | 51. | Windig (grosse weisse) | 59. |
| - (weiser) | 79. | Hederich | 69. | Melissen | 99. | - (Klein) | 72. | Wintergrün | 3. |
| Distel (Frauen) | 30. | Herbst-Rosen | 90. | - (Hund) | 76. | - (Schlüsselblumen) | 52. | Wollen-Kraut | 86. |
| - (Gänse) | 50. | Heyl aller Welt | 43. | Menerkraut (rauhes) | 2. | - (mit einzeln Blumen) | 91. | Wurm-Kraut | 38. |
| - (wilde Garten) | 79. | Himmels-Schwertel | 34. | Milte (Garten) | 1. | - (wilder) | 90. | - (Reiß) | 39. |
| - (Marien) | 30. | Hindisch-Kraut | 61. | Mohn (wilder) | 32. | Sammet-Pappeln | 63. | - Rube | 37. |
| - (Sau) | 44. | Höblein (Biber) | 51. | Molte (Garten) | 98. | Sanickel (Berg) | 30. | Sieger-Kraut | 80. |
| Dreysaltigkeits = Blüm- | 95. | Höblein (Pfaffen) | 8. | Münchs-Kopf | 98. | Sandistel | 18. | Sincken (blaue) | 61. |
| lein | 90. | Hüfen | 100. | - (Bach) | 54. | Schafgarbe | 51. | | |
| Durchwachs | 41. | Hunds-Melte | 61. | - (Krotten) | 27. | Scharbocks-Kraut | 51. | | |
| Eibisch | 41. | Hyacinthen, Blaue, | 13. | Münze-Wasser | 98. | Schell-Kraut | 51. | | |
| Eisenhardt | 83. | Je länger je lieber | 25. | - (Frauen) | 54. | - (Klein) | 51. | | |
| Eisenkraut | 77. | Gerich-Rosen | 90. | - (Marien) | 87. | Schlüsselblumen (wilde) | 52. | | |
| Erbis, Erbsen | 98. | Jeßmin | 15. | Mund-Rose | 86. | - (mit einzeln Blumen) | 91. | | |
| Erdbeer-Kraut | 79. | Jeßmin | 94. | Mutter-Kraut | 85. | Chöl-Kraut | 51. | | |
| Eherkraut | 51. | Jeßmin | 50. | Nacht- (Brauner) | 87. | - (Klein) | 51. | | |
| Fei-Distel | 87. | Jeßmin | 50. | schatten (schwarzer) | 86. | Schwalben-Wurz | 96. | | |
| Feigwarzen-Kraut | 16. | Johannis-Blumen | 42. | - (weisser) | 86. | Schwert-Lilie (blaue) | 69. | | |
| Fingerhut | 92. | - Kraut | 15. | Mägelin (Braune) | 85. | Schwertel (Himmel) | 69. | | |
| Flecken-Kraut | 2. | - mit Beern | 50. | Mägelin (Garten) | 85. | | | | |
| Flitsch-Rosen | 62. | Karten-Distel (wilde) | 47. | Nelken | 82. | | | | |
| | | Kasen-Kraut | 62. | Nessel | | | | | |
| | | Kellerhals (gros) | | | | | | | |

INDEX NOMINVM ANGLICORVM.

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-------------------------|-----|----------------------|-----|-----------------------|------|---------------------|-----|
| Agrimony | 21. | Bugle | 64. | Dandelion | 1. | Hellebore (vwhite) | 74. | Marsh Mallovs | 90. |
| Alecoast | 98. | Camomille (foetid) | 67. | Deat Nettle | 33. | Hepp-tree | 8. | Marum | 47. |
| Archangel (vwhite) | 33. | Celandine (great) | 91. | Dittany (vwhite) | 75. | Hig-Taper | 3. | Mastick (Syrian) | 47. |
| Arrach, Arrath | 99. | - (lesser) | 51. | Dooves-foot (com- | 58. | Hollyhocks | 54. | May-Lilly | 70. |
| - (stinking) | 100. | - (smal) | 93. | mon) | 62. | Honney Suckle | 25. | - Weed | 67. |
| Balm, Baulm, Baw- | 27. | Centory (great) | 57. | Dvvarf Laurel | 21. | Hyacinth | 61. | Melilot (common) | 80. |
| me | 19. | Christmas flovver | 39. | Eupatory (greek) | 86. | Jasmine, Jessamine | 13. | Milk Thistle | 79. |
| Bean (Garden) | 89. | Cleavers, Clevers, Cli- | 20. | Fig- {great | 53. | S. John's vvort | 15. | Millfoil | 18. |
| Bears Breech | 57. | vers | 64. | - {Knobby roo- | 16. | Ladies Mantle | 72. | Mint (Water) | 32. |
| - Foot | 86. | Clove-July-flovvers | 70. | vvort | 92. | - Thistle | 26. | Mug-Weed | 76. |
| Betony (Water) | 46. | Clover-grafs | 98. | Fools stones male | 75. | Larkspur | 62. | Mullein | 3. |
| - (vvood) | 38. | Confound (middle) | 58. | Fox-Glove | 83. | Laurel {dvvarf} | 62. | - (hedge) | 28. |
| Bind-vveed (great vwhi- | 34. | Convall-Lillies | 98. | Fraxinella | 88. | - {spurge} | 29. | Mustard Threacle | 68. |
| te) | 45. | Costmary | 68. | Goats-Rue | 39. | Lettice, Lettuce | 70. | - (vwhite) | 29. |
| Bitter fveet | 66. | Cranes Bill | 61. | Goose-Gras | 44. | Lilies of the Valley | 11. | Nettle (dead) | 33. |
| Blackberry Bush | 36. | Cress (Garden) | 76. | Harebells | 84. | Lilly convally | 52. | Nettle (stinging) | 84. |
| Blevv bottle (great) | 89. | - (Penny) | 4. | Hearts Ease | 99. | - (White) | 69. | Night shade (vvood) | 34. |
| Borage | 48. | Cross-Wort | 42. | Hedge-Mustard | 57. | Luce (garden flovver- | 99. | Ora-vvwhite garden | 99. |
| Brank-Ursin | 37. | Crovfoot | 42. | - Nettle | 57. | de) | 100. | che (stinking) | 47. |
| Bramble | 47. | Cucumber (Garden) | 82. | Hellebore (great ba- | | March-Violet | 55. | Ox-Eye | 47. |
| Brooklime | 37. | Daisie (great) | | flard black) | | | | Oxe | |
| Bryony (vwhite) | | Damalk-Rose | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----|---|--|---|--|--|---|--|
| Oxe heele | 57. | Pomgrates {double } {flowrs } 97. {Wild } 91. | Rose {red } {velvet } - {vwhite } Rue - {Goats- } Sage - {of vertue } Sanicle - {vwood } Satyrion male Saxifrage {vwhite } Self-Heal 24. Setterwort Shepherds Purse Silver-Weed Sovv-Thistle Speedvvel {vwater } Spinach, Spinage, Spin-ge | 78. 78. 7. 92. 10. 71. 9. 63. 53. 56. 63. 57. 6. 30. 48. 49. | Spurge Laurel Strawberry (common) Svvallov-vvoort Syrian-Mastick Tame-Poison Tanfie {vild } Teasel {vild } Thime Thistle {Ladiés } {Milk } - {Sovv- } Thorovv-Wax Threacle-Mustard Three faces unter a Head Tutfan Trefoil {Meadovv } | 62. 77. 96. 47. 96. 6. 50. 47. 79. 30. 95. 68. 44. 94. 20. | Vervain, Vervein {March } Violet {purple } {svveet } Water Betony - Figvvoort - Mint - Pimpernel - Speedvvel Waybread Wheat {vwhite } bearded vwithout avvns) Wood-Bind - - Roof Worm-Wood Yarrowv | 41. 55. 86. 86. 32. 48. 35. 40. 25. 60. 17. 18. |
|-----------|-----|---|--|---|--|--|---|--|

INDEX NOMINVM GRÆCORVM.

| | | | | | | | | | |
|---------------|------|--------------------|-----|--------------------|-----|------------------|-----|----------------------|-----|
| Ἀκάληφι | 12. | Βούφθαλμον | 42. | Ἰεροβοάνη | 41. | Μελίλατος | 80. | Σμίλαξ λεύκη | 38. |
| Κανθός | 89. | Γαλλόψις | 33. | Ἰός | 55. | Μήκων ῥοιὰς | 2. | Σόγχες | 30. |
| Ἀλθαία | 90. | Γεράνιον | 58. | - ἱππάρχου | 44. | Μυριόφυλλον | 18. | Σπανάκια | 49. |
| Ἀμπλόκαρον | 39. | Γλυκύπικρον | 34. | Ἴρις | 69. | Ὀμφαλόκαρπον | 39. | Σπινάκια | 18. |
| Ἀμπύλος λευκή | 37. | Γλυκυσίνη δηλσία | 65. | Κάδαμος | 23. | Ὄρχις | 89. | Στραλιώτης | 20. |
| Ἀνωγαλλίς | 43. | Δαφνοειδής | 62. | Καρυόφυλλον | 85. | Παιδαρεως | 65. | Τάκινθος | 61. |
| Ἀνδρομαλάχη | 90. | Δελφίνιον | 26. | Κισσάριον μέγα | 93. | Παιονία | 25. | Ἰπίριον | 41. |
| Ἀνδροάμιον | 94. | Δενδρομαλάχη | 54. | Κίερον | 46. | Περικλύμενον | 7. | Ἰσόβριον | 39. |
| Ἀνθρακίς | 67. | Δίλινος | 50. | Κλημνίς δαφνοειδής | 59. | Πιρίτρεων | 40. | Φλαγίον, Φλόξ | 44. |
| Ἀνθρακίς | 39. | Εἰλίπκος | 90. | Κνίδη | 12. | Πήγαιον | 81. | Φλόμις βραχυσιφύγιος | 52. |
| Ἀνθρακίς | 14. | Εὐελίπκος | 10. | Κόμαρον | 77. | Πίσον μικρόν | 78. | Φλόμις | 3. |
| - ἱππάρχου | 35. | Εὐελίπκος λευκός | 74. | Κρίον | 11. | Πυρός | 8. | Χαμμημέλιον | 75. |
| Ἀσκήπιος | 96. | - μέλας | 57. | Κύμας | 19. | Ράφανις, ῥάφανος | 73. | Χιλιόφυλλον μέγα | 91. |
| Ἀσκήπιος | 99. | Εὐρυδρόμιον ἄγριον | 60. | Κύμας | 66. | Ῥόδον | 97. | - μικρόν | 51. |
| - ἄγρια | 100. | Εὐρύμιον | 28. | Κυνόροδος | 8. | - ἄγριον | 31. | Χιλιόφυλλον | 18. |
| Ἀφάκα | 1. | Εὐπυλίστιον | 21. | Κυνόσβαλος | 24. | - λευκή | 4. | Χιλιόφυλλον μέγα | 18. |
| Ἀφάκα | 17. | Ἡγίγιον | 76. | Λαίριον | 11. | Ῥόια, Ῥοίη | 29. | Χρυσόλαχμον | 99. |
| Ἐλός | 45. | Θάλασπι | 68. | Λαίος ἡμερος | 80. | Σάκινον ἄγριον | 32. | Ψυχρόσφορον | 46. |
| Βαλάρχιον | 31. | Θειδάκη, Θρίδαξ | 88. | Μαλάχη | 22. | Σίκυς ἡμερος | | | |
| Βούγλωσσον | 36. | Ἰάσμιον | 13. | Μάρον ἢ ὑσώβριον | 47. | Σίνιπι ἱερὸν | | | |
| Βουρσάμιον | 64. | Ἰβίσκος | 90. | Μελισσόφυλλον | 27. | Σισυμβριον | | | |

INDEX NOMINVM HISPANICORVM.

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|---------------------|-----|----------------|-----|------------------------------------|-----|----------------------|-----|
| Agramonia | 21. | Cardencha | 50. | Lechuga | 88. | Ortiga | 12. | Serralha, Serraya | 30. |
| Agriris | 32. | Cardo pentador | 50. | Lhantern | 35. | Ortiga | 33. | Spenache | 49. |
| Alfaca, Alfalfa | 88. | Çarça, Çarza | 45. | Lirio blanco | 11. | - muerta | 33. | Tamehagem | 35. |
| Alofna | 17. | Celiduenha | 91. | - Cardeno | 69. | Paniqueso de flor blanco | 68. | Torongil | 27. |
| Amapolas, Amapollis | 2. | Ciliduenha | 91. | Madrefelva | 25. | Papoulas, Papoulla | 2. | Trigo | 40. |
| Anorca | 37. | Clavel | 85. | Majos flores | 61. | Pervinqua | 59. | Verbasco | 3. |
| Armoles, Armolles | 99. | Cogombro | 4. | Malpica | 23. | Pico de {Ciguona } {Cinguenha } | 59. | Verbena | 41. |
| Aroveias | 83. | Coraconcillo | 15. | Malvas | 22. | | | Verde gambre blanco | 74. |
| Aruda | 7. | Corajoncillo | 80. | Manzanilla | 67. | | | - nero | 57. |
| Assensios, Assentios | 17. | Corona de Rei | 38. | Marmaje | 90. | Plantem | 35. | Violeta | 55. |
| Azuzena | 11. | Correquila maior | 53. | Mastuerço | 23. | Ravanillo, Ravano | 81. | Urgebaom | 41. |
| Berbenha | 41. | Coyon de Perro | 75. | Mayveta | 77. | Rinchaon | 28. | Yerva de ballesta | 74. |
| Berros | 32. | Dente de Lion | 75. | Miezgado | 77. | Rosa del monte | 65. | - belida | 31. |
| Borraces | | Dittano blanco | 57. | Milhojas Yerva | 18. | - Albardeira | 73. | - campanilla | 38. |
| Borracha | 36. | Elleboro | 49. | Moltaxo | 29. | Rosás | 82. | - caunamera | 90. |
| Borrages | | Espinaca | 3. | Moltaza | 43. | Ruipontic | 93. | - cidreira | 27. |
| Borrageres | | Gordolobo | 19. | Muruges | 23. | Ruvia | 60. | - giguante | 89. |
| Branqua Ursina | 89. | Granadas | 97. | Nasturzio | 37. | Salva, Salvia | 10. | - delas Golondrinhas | 91. |
| Bretonica | 46. | Havas | 19. | Neuxa | | - menore | 71. | Golundrinhas | 18. |
| Buptharmo | 42. | Hierva vid. Yerva | | Norca | | Scrofolaria menor | 51. | - Millhoyas | 44. |
| Campanilla yerva | 38. | Hortiga vid. Ortiga | | Nueza | | | | - di S. Trinadados | |

INDEX NOMINVM ITALICORVM.

| | | | | | | | | | |
|------------|-----|--------------------|-----|----------------------|-----|--------------------|-----|----------------------|-----|
| Acantho | 89. | Batiscula | 66. | Centaurea maggiore | 93. | Elleboro nero | 57. | Giglio bianco | 11. |
| Agretto | 23. | Battifuocera | 41. | Ciano | 66. | Erifimo | 28. | - celeste | 69. |
| Agrimonia | 31. | Berbenha | 46. | Cicerbita | 30. | Fava | 19. | di S. Giovanni Herba | 55. |
| Aliso Fior | 66. | Betonica | 46. | Cinquefoglio maggio- | 63. | Favogello | 51. | Giula | 93. |
| Altea | 90. | Borragine | 89. | re | 64. | Favocello | 66. | Granato pomo | 97. |
| Anagallide | 43. | Branca Orfina | 37. | Concomero | 24. | Fior Aliso | 40. | Grano | 91. |
| Anagallo | 94. | Brionia | 24. | Consolida mezzana | 26. | - Campefe | 77. | Herba Donna | 15. |
| Androsemo | 39. | Brunella | 64. | - minore | 67. | Fiori di Primavera | 40. | - di S. Giovanni | 98. |
| Apparine | 99. | Bugola | 67. | - reale | 1. | Formento | 92. | - di S. Maria | 61. |
| Armola | 96. | Burfa pastoris | 66. | Cota | 50. | Fragolaria | 85. | Hyacintho | 15. |
| Asclepiade | 17. | Camamilla | 79. | Dente di Leone | 34. | Fragole | 13. | Hyperico | 58. |
| Assentia | 3. | Campefe. Fior. | 51. | Dillaco | 74. | Galega | 58. | Jacca | 44. |
| Assenso | | Cardo del Latte | | Dittamo bianco | | Garofoli | 28. | Irion | 88. |
| Atripice | | - da Panni | | Dolceamara | | Garofoni | 14. | Lactuca | 98. |
| Atriplice | | Celidonia maggiore | | Donna Herba | | Gelsimino | 98. | Lanciola | 98. |
| Barbasso | | - minore | | Elleboro bianco | | Geranio | | Lassulata | |

INDEX NOMINVM GALLICORVM.

INDEX NOMINVM BATAVICORVM SEV BELGICORVM.

| | | | | | | | |
|---------------------|-----|------------------------|------------------------|------|---------------------|-------------------------|---------|
| Agrimonie | 21. | Diftel (onfer Vrou- | Kad - Roofen | 78. | Balfam | Sanikel | 63. |
| Alfrance | 34. | vven) | Karden (groote vvilde) | | { Roomsche } | Savie | 10. |
| Alfen) | | Dood } Netelen 33. 84. | Keeskenskruyt | 50. | { onfe Vrou- } | - - (kleiner) | 71. |
| Alfene) | 17. | Doove } | Kerfle (Boeren) | 22. | vven | Schelkruyt | 91. |
| Althea | 90. | Drievaldige Bløemen | - - ('Tuin) | 68. | (Rosle) | Senegroen | 64. |
| Anjeliars | 85. | | - - ('Tuin) | 23. | (Water) | Sentory, groote, | 93. |
| S. Anthonis Raapie | 31. | Duyfend-Bladt | Klaaveren vide clave- | | Muur, baftard, | Silverkruyt | 6. |
| - - Kruyt | 86. | Duyven voet | ren | | Netelen, groote, | Sinnauvve | 72. |
| Balfam Munte) | | Eglantier | Kleeftkruyt | 39. | - - { doode } | Sleutel - Bløem (groote | |
| Balfeme } | 98. | Ertbefien) | Koorn bløem groote, | 66. | { doove } | vvilde) | 52. |
| Beekpunten | 48. | Ertbeyen) | Kuleries - Kruyt | 53. | Niesvvortel, fvarte | Speen Kruyt | 86. |
| Beerens-clauvv | 89. | Ervveten } | Lattouvve) | | - - vvitte | - - groot | 87. |
| Bekeboon } | | Ervvtlen } | Lettevve) | 88. | Papenkruyt | - - klein | 51. |
| Bekabung } | 48. | Fraxinella | Lilie) | | Paufeen | Spinagie | 49. |
| Bernagie-) | | Geyten \ Blad | Lelien vvitte) | 11. | Peper vvortel | Steenbrek, vvitte, | 56. |
| Bernasje) | 36. | Gheyten / Kruyt | - van den Daalen | 70. | Pioene-Rooſe | - - geelen) | |
| Betonie | 46. | Ginoffel bløemen | Lies bloem] | | Porfekens kruyt | - - claveren) | 80. |
| Børen Boonen | 19. | Gonfe-Diftel | Liefch] | 69. | Provincie - Roos | - - Rakette | 28. |
| - - Kerſe | 68. | Goudvvortel | Liſch | | Pungen | Sterrenkruyt | 60. |
| Boonen { Børen } | | Gounee } | Maghden-Kruyt) | | Raapie(S.Anthonis) | Stock-Rooſen | 54. |
| Boonen { Roomſe } | 19. | Gouvve } flinckēde | - - Palm) | 59. | Rabarbar, gemeyne, | Stovaluvve vvortel | 96. |
| Braambezie) | | Granaet [Appelen] | Madeliieven | | Radyſen | Tarvvven) | |
| Braembefien } | 45. | [Boom] | Madeliieyen, groote) | 42. | Rakette (Steen-.) | Tervve) | 40. |
| Braemen } | | Grein (Confilie de) | Malve, vvitte, | 90. | Rapontic, gemeyne, | Tuin kerffe | 23. |
| Bruynelle | 24. | Groffels Bløemen | Maluvve | 54. | Ridder Sporen | Vincoorde | 59. |
| Bryonie | 37. | Gulde vvortel, grote, | - - gemeene | 22. | Roomſche Boonen | Vrouwen - Diſtel | 79. |
| Camille, ſlinckende | 67. | Guycheihely | - - vvitte | 90. | - - Munte | - - Mantel | 72. |
| Chelidonia | 91. | Heems.vvortel | Mañekens) Kruyt | 25. | Roofen (Kad) | - - Munte | 98. |
| Claveren (roode) | 20. | Heul, rooden, | Mañetjes) | | - - (Provincie) | Walmeefter | 60. |
| - - (Steen) | 80. | Huel, rooden, | May bloemken | 70. | - - (Stock-) | Water Pungen | 48. |
| Concomeren | 4. | Huemſt, vvitte, | Melde | 99. | - - (veld) | - - Miñt | 32. |
| Confilie de Grein | 27. | Hyacinthen | - - vvilde | 100. | - - (vvild) | Weegbree | 14. 35. |
| Deurvvas | 95. | S. Jans Kruyt | Melilote | 80. | - - (vvitte) | Winde, groote, | 34. 38. |
| Diptamaum (vvitte) | 75. | Jefemin) | Melifſen | 27. | Rofle-Miñt | Wollekruyt | 3. |
| Diftel (Gonſe-) | 30. | Jefmin) | Moſtaert, vvilde, | 68. | Ruyte | Wyngaarde, vvilde | 37. |
| | | Jifer Kruyt | - - vvitte, | 29. | Salaet | Yſerkruyt | 41. |





Dens Leonis.

{ 1. Blume.
2. Wurzel.
3. Saamen. }

Paffenblat.
Mönchs Kropff.



Papaver erraticum
vel *rhoeas*.

1. Blume.
2. Frucht.
3. Saamen.

Glapper oder Flitsch-
Rose.



Verbascum Thapsus
barbatus.

1. Blume.
2. Frucht.
3. Saamen.

Müllkraut. Königs-
Ferkel.



*Cucumis
sativus.*

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Unfrüchtbare Blume. | } |
| 2. Fruchtbare Blume. | |
| 3. Frucht. | |
| 4. Saamen. | |

*Cucumern. Kürcken.
Kümmeling.*



Bursa Pastoris.

1. Blume.
2. Frucht.
3. Saamen.
4. Wurzel.

Fäschelkraut.



Anserina Argentina.
Potentilla.

{ 1. Blume.
2. Frucht.
3. Wurzel. }

Benferich. Brensch.
Silberkraut.



Ruta.

1. Blume.
2. Frucht.
3. Saamen.

Saure Beinraute.



Rosa Canina
seu sylvestris

1. Blume.
 2. Frucht.
 3. Saamen.

Wilde Rosen.
 Heek Rosen.



Salvia agrestis
 seu *Scorodonia*.

{ 1. Blume.
 2. Frucht.
 3. Saamen. }

Wilder Salben



Salvia hortensis
major.

{ 1. Blume.
2. Frucht.
3. Saamen. }

Salben. Breiter
Salben.



Lilium album.

1. Blume.
2. Frucht.
3. Saamen.
4. Wurzel.

Weiße Lilie.



Urtica urens
maxima.

1. 2. 3. Männliche Blume.
4. 5. Weibliche Blume.
6. Saamen.
7. Wurzel.

Große Bren-Nessel.



Jasminum album.

1. Blüthe.
2. Frucht.
3. Saamen.

Jasmin oder Nessel.



Plantago angustifolia Quinquenervia. { 1. Blüme.
2. Frucht.
3. Saamen. } Spikiger Wegrich



Hypericum.

1. Blume.
2. Frucht.
3. Samen.

Johannis Kraut.



Digitalis.

purpurea

{ 1. Blume.
2. Frucht.
3. Saamen. }

Fingerhut
Blumen.



Absinthium { 1.2. Blüthe. } Gemeiner Wermüth.
vulgare. Lam. { 3.4. Saamen. }
Artemisia abs. L.



Millefolium.

{ 1. 2. 3. 4. 5. Blüthe.
6. Frucht.
7. 8. Saamen. }

Yarb Kraut.
Schäafgarben.



Faba maior.

{ 1. 2. 3. 4. Blüthe.
5. Frucht.
6. Samen. }

Große Bohnen.



*Trifolium
vulgare.*

{ 1.2.3.4.5. Blüthe.
6.7.8.9. Frucht.
10.11. Saamen. }

Gemeiner Klee.



Agrimonia.

{ 1. Blume.
2. 3. Frucht.
4. 5. Saamen. }

Sedum.



Malva vulgaris. { 1. 2. Blume. 3. Frucht. 4. 5. 6. Samen. } Gemeine Pappel.



Nasturtium hortense. { 1. Blume. 2. Frucht. 3. Samen. } Garten-Trench.
Lepido sativ. L.



*Prunella seu
Brunella.*

{ 1. 2. 3. 4. Blume.
5. Frucht.
6. Saamen. }

Braunellen.



Caprifolium. { 1. 2. 3. 4. Blüthe.
5. 6. Frucht.
7. Samen. } Jerichorosen.



Consolida Regalis. { 1. 2. 3. Blume.
4. 5. Frucht.
6. Samen. } *Nitter-Sporn.*



Melissa.

{ 1. 2. Blume.
3. Frucht.
4. Saamen. }

Melissen.



Erysimum.

{ 1. 2. 3. 4. Blume.
5. 6. Frucht.
7. 8. Saamen.

Heeg-Deuff.



Sinapi album.

1. Blume.
 2. Frucht.
 3. Saamen.

Weiser Senff.



Sonchus asper. { 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Blume.
8. 9. Frucht.
10. 11. Saamen. } Nahe Ganz-Distel.



Ranunculus pratensis { 1. 2. 3. 4. 5. Blüme.
6. 7. Frucht.
8. 9. 10. Saamen.
11. Wurzel. } *Streichender Dahnen-
Fuch.*



Mentha aquatica. { 1. 2. Blüthe.
3. Frucht.
4. Saamen. } Wasser-Mint.



Lamium album. { 1. 2. 3. 4. Blume. 5. Frucht. 6. Samen. } Weiße taubeneßel.



Solanum lignosum { 1.-5. Blüthe.
6. 8. 9. 10. Frucht.
7. 11. Samen.
12. Wurzel. } Je länger je lieber.
Dulcamara.



*Plantago
septinervia.*

1. Blume.
2. 3. Frucht.
4. Saamen.

Blatter-breiter
Heegerich.



Bryonia alba. { 1. Anfrüchtbare Blume. } *Sain-Nube.*
Vitis alba. { 2. Fruchtbare Blume. } *Dicht-Nube.*
 { 3. 4. Frucht. }



Convolvulus major albus { 1. Blume.
2-8. Frucht.
9. Samen. } *Grote weißellende.*
Smilax laevis.



Aparine.

{ 1. Blume.
2. Unzeitige Frucht.
3. Zeitige Frucht.

Stellaria media.



I. II. III. *Triticum Spica mutica*
 IV. V. *Triticum aristis longis*. { 24-28. Blüthe. 22-28. Frucht. 29-36. Saamen. } Weizen
 Grät oder Barth-Weizen.



Verbena.

1 2 5-9 Blume.
3 10 Frucht.
4 11 Saamen.

Zisenkraut.



Bellis maior.

{ 1. 2. Blume.
3. Saamen. }

Große Gänse-
Blumen.



Anagallis terre- { 1. 2. 3. 4. 5. Blume. } Bäuchheil, Loral
stris mas. { 6. 7. 8. 9. 10. Frucht. } len Blumlein.
 { 11. Saamen. }



Viola tricolor.

1. Blume.
2. Blumen-Dulce.
3. Frucht.
4. Saamen.

Trensam-Seraut.
Stiefmutterlein.



Rubus.

{ 1. 2. Blume.
3. 4. 6. 7. 8. 9. Frucht.
5. 10. Saamen. }

Brombeer-Staude.



Betonica.

{ 1-14. Blume.
15-17. Frucht.
18-20. Saamen. }

Betonien.



Marum Syriacum. { 1-5. Blume.
6-11. Frucht.
12-14. Samen. } Flaxen-Sträut.



Anagallis aquatica { 1-9. Blume.
10-15. Frucht.
16-18. Saamen. } Bach-Zimmerman.
Becabungä.



Spinachia.

{ 1-5. Blüthe.
6-12. Frucht.
13-16. Saamen. }

Spinat.



Dipsacus silvestris
Labrum veneris.

1-6. Blume.
 7. Frucht.
 8. 9. 10. Samen.

Garten-Distel.



Chelidonium minus. { 1-9. Blume.
10. 11. Frucht.
12-14. Wurzel. } Klein-Schol-Kraut.



Primula Veris.

1. Blume.
 2. abge sonderte Blume.
 3. Frucht.
 4. Saamen.

Schlüsselblumen.



Satyrium mas.

1. Blume.
2. Frucht.
3. Saamen.
4. Wurzel.

Enaben Kraut
Heinlein.



Malva arborea. { 1. Blume.
2. 3. 4. 5. 6. Frucht.
7. 8. 9. Samen. } Bappel-Weiser.
Herbst-Weiser.



Viola Martia.

{ 1-11. Blume.
 12-14. Frucht.
 15.16. Saamen.

Merken-Steil.



Saxifraga alba. { 1-9. Blume.
10-15. Frucht.
16-18. Saamen. } Weiser Steinbrech.



Helleboraster

1. Blume.
 2. geschlossene Frucht.
 3. geöffnete Frucht.
 4. Samen.

Haush Kraut.



Geranium columbinum { 1-10. Blume.
Pes columbinus. { 11-15. Frucht.
 { 16-19. Samen.

Storch-Schnabel.



Vinca Pervinca
Daphnoides.

{ 1-10. Blume.
11-15. Frucht.
16. Samen.
17. 18. Wurzel. }

Wintergrün.



Asperula odorata
Aspergula.

{ 1-6. Blüthe.
 7-12. Frucht.
 13. 14. Samen. }

Hald-Weister.



Hyacinthus.

1. Blume.
 2. Frucht.
 3. geöffnete Frucht.
 4. Samen.

Hyacinth.



Laureola.

1. Blüthe.
 2. Beer.
 3. geöffnete Beer.
 4. Saamen.

Dzellershals.



Sanicula Diapensia. { 1-11. Blüthe.
12-15. Frucht.
16. Saamen. } Berg Sanickel.



Consolida media. { 1-5. Blüthe.
6-8. Frucht.
9. Saamen. } Gulden Günsel.



Paeonia foemina. { 1. Blume.
2. Frucht.
3. Wurzel. }

Befüllte Dichtrose
das Weiblein.



Cyanus major. { 1. Blume.
2. abgesonderte Blume.
3. Saamen. } Rose Thornblume.



Cotula foetida.

Anthemis cotula L.

{ 1-7. Blume.
8. Frucht.
9-11. Samen. }

Strotten Will.



Thlaspi.

1. Blume.
2. Frucht.
3. Samen.

Bairn-Senff.



*Iris nostras
hartensis.*

{ 1. Blume.
2. Frucht.
3. Saamen.

Blau^s Schwert-*Ilie*.



Lilium convallium. { 1-6. Blume.
7-9. Frucht.
10. Saamen. } Mayen-Blumen.



Salvia minor
Salvia virtutis.

{ 1-5. Blume.
 6-9. Frucht.
 10. 11. Saamen.

Spitziger Salben.



Alchimilla.

1-6 Blüthe.
7-9 Saamen.
10-12 Wurzel.

Mandrill.



Rosa alba.

{ 1. Blume.
2. Knospe. }

Weisse Döser.



*Eleborum seu Deratrum
album.*

1. Blüthe.
2. Frucht.
3. Saamen.

Weisse Nies Wurk.



Dictamnus albus
Fraxinella.

1-8. Blume.
9-12. Frucht.
13-14. Saamen.
15. Wurzel.

Heisser Diptam.



Cruciata.


{ 1-9. Blüthe.
 10. Saamen.
 11. eine Raupe. } *Gülden Waldmeister.*



Fragaria.

{ 1-9. Blume.
10-13. Frucht.
14.15. Saamen.

Erdbbeer Kraut.



Rosa rubra.

{ 1-9. Blüthe.
10-12. theile der
Frucht. }

Rothhe Rose.



Carduus Mariae. { 1-7. die Blüthe. } Marian-Thistel.
 8. 9. Saame.



Melilotus.

1-5. Blüthe.
6. 7. Frucht.
8. Saamen.

Stein-Mlee.



Raphanus hortensis. { 1-6. Blume.
7-10. Frucht.
11, 12. Saame.
13. Ackerwerbel. } Ganger Garten-
Kettig.



Rosa Damascena.

1-11. Blume.
12. Frucht.
13. Saame.

Benenne rothe
Garten-Rose.



Pisum.

1-8. Blüthe.
9-11. Frucht.
12. Saame.

Erbsen.



Galiopsis.

1-7. Blume.
8-12. Frucht.
13-15. Saame.

Birn-Haug.



Caryophyllus ruber { 1-8. Blume.
9-10. Frucht.
und Saame. } Garten Nägelein.



Scrophularia aquatica } 1-8. Blüthe.
 9-11. Frucht.
 12, 13. Saame.
 14. ein Insekt.

Wasser-Durr-Dürk



Scrophularia major. { 1-7. Blüthe.
8-10. Frucht.
11-12. Saame.
13. eine Raupe. } Große Durr-Wurk.



Lactuca. sativa

1-4. Blüthe.
5. Frucht.
6-8. Saame.

Garten-Salat.



Acanthus,
Branca Ursina.

{ 1. 2. Blume.
3. Frucht.
4. Saame.
x. Sommer-Vogel. }

{ Weissche Bären-Klau.



*Althaea, Bismalva,
Ibiscus.*

{ 1-7. Blume.
8-10. Frucht.
11-13. Saame. }

Ibisch Kraut.



Chelidonium majus. { 1-4. Blume.
5-9. Frucht.
10-12. Same. } Schöl Kraut.



Galega
Ruta capraria.
 1-6. Blüthe.
 7. 8. Frucht.
 9-11. Saame.
 12. Wurzel.
 Heih-Naute.



Centaurium majus
vel magnum.

1. 2. Blume.
3. Saame.
* Sommer Vogel.

Gros - Käufend -
Gulden Kerant.




Androsæmum.

1-9. Blüthe.
10-12. Frucht.
13-15. Saame.

Linnæus's Plantain
Gründheil.

II



Perfoliata.

1-10. Blüthe.
11-14. Saame.
15. Wurzel.

Durchwachs.



Adelpias Vincetoxi { 1-9. Blüthe.
10-12. Frucht.
13. Saame.
14. Wurzel. } *Schwalbenwurz.*
cum Hirundinaria.



Granata
Punica mala.

{ 1-3. Knopf.
4-7. Blume. }

Gefüllte Granaten
Blüthe.



Balsamita mas Innocentius Dief.
Costus hortorum.

| | | |
|---|---|---------------|
| { 1-5. Blüthe. 6. Ein Stück von der Wurzel. | } | Frauen-Künke. |
|---|---|---------------|



Atriplex.

1. Blüthe.
2. 3. Frucht.
4. Saame.


Weiße Garten-Melte.





Atriplex Olida. { 1-6. Blüthe.
7-9. Frucht.
und Saame. } Stinkende Meelte.





Charles Olin
[illegible]
[illegible]

















Zentralbibliothek Zürich



ZM02519406

